

OPVS MEDICVM PRACTICVM, VA
RIVM, VERE AVREVM, ET POSTREMAE LECTIIONIS.

CLAVDII GALENI
PERGAMENI, MEDICI LONGE OMNI
VM CLARISSIMI DE COMPOSITIONE PHARMACORVM
localium, siue secundum locos, Libri decem, recens fideliter & pure conuer
fiã IANO CORNARIO medico physico.

IANI CORNARII MEDICI PHYSICI
COMMENTARIORVM MEDICORVM IN EOSDEM GALE
ni libros conscriptorũ Libri decem. In quibus omnes corrupti illorum libro
rum loci restituuntur, & omnes difficiles exponuntur, ampliusq; aliquot mi
liarum ac locorũ in græcis ac latinis medicis obiter explicantur, emendan
tur, ac restituuntur.



BASILEAE ANNO M. D. XXXVII.
Cum priuilegio Cæsareo ad 1111 annos.

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

[illegible]

THE END OF THE WORLD

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

100-443887-100

JOHN L. JOHN HUNTER JAMES W. HARRIS

CONFIDENTIAL



1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

STUDY III: 1993-1994

REVERENDISSIMO AC ILLVSTRIS

SIMO PRINCIPI AC DOMINO, D. ALBERTO CAR-
dinali ac Archiepiscopo Moguntinensi ac Magdeburgen-
sibus administratori ecclesie Halberstaden. Marchioni
Brandeburgen. &c. Ianus Cornarius
medicus physicus s. d.



Nihil equidem uereor, ut uel illustri. Celsitudini tue ingratum futurum sit, uel inepte à me admissum iudicari possit hoc meum factum, quo Reuerendiss. C. T. ALBERTE illustrissime & sacratissimæ religionis & regnorum princeps, Galeni de medicamentis localibus liberos, omniū eius scriptorū præstantissimos & postremæ lectionis, à me in latinam linguam conuersos, & cōmentariis nostris medicis illustratos dedicare constitui. Tametsi enim ego C. T. ignotiss. sim. & doctrinæ ac conditionis mee tenuitatem non ignorem: tamen is semper optimarum artium earundemq; professorum status fuit, ut summi principes nullum eorū genus unquam fastidierint, sed & illas amauerint, & horum opera sibi dicari gloriosissimum duxerint. Videntur enim haud dubie prudētissimi uiri, & regnorum & terrarum Imperia salua esse non posse, imò neq; religionis integritatem consistere, nisi & literarum & optimarum artium studia integrum statum habeant & propterea nō tantum studijs bonis fauere, eademq; tueri ac defendere, quidā ex ipsi gloriosum putauerunt: sed nominibus etiam suis philosophiæ datis, ipsi quoque cōmentari ac scribere, scriptaq; sua edere honestissimum existimauerūt. Nec hic libet paucos aliquot ex immēsa multitudine regiorum scriptorum referre, hoc dicam plerosq; infimi generis scriptores operibus suis magnis principibus dedicatis maximā gratiam inisse: ut uel hoc nomine minus dubium apud me sit, C. T. hoc meum erga se studium acceptum fore: maxime quū honestiss. artis Medicæ præstantissimū auctorem GALENUM, qui suo tempore apud Imperatores Antoninos Augustos in summo honore ac dignatione fuit, nunc tandem primum latinè per me loquentem C. T. offerā, dicem ac dedicem, atq; illū ipsum in tali opere, quod quantæ utilitatis sit uix paucis satis explicare possim, quō magis exempturū me ab ineptiæ calūnia planè confido. Quid enim aptius fieri posset quā publicæ utilitatis insigne opus eius nomini publicari, qui uelut publicum aliquod bonum rebus mortalium iugandis diuina clementia præfectus sit? & qui omnes conatus suos eo dirigat, ut res pietatis literarumq; ac bonorū studiorum in tranquillo statu cōseruentur. Si autē citra omnem assentionem id quod res est dicere Celsitudo tua permittit, Tu ut Primas diceris Germaniæ princeps, ita primatum tuum spēditissimis uirtutibus longe illustriorem reddis, pietatis

ac philosophiæ studia & fauore prouehendo, & sumptibus ac præmijs excitando, & honore ac dignitatibus ornando, ut ex Germaniæ principibus conferri tibi pauci possint, præferri certe nemo. Testatur hoc multa insignia monumenta. Testantur tot celebres uiri, tum in aula tua, tum aliàs ad summam dignitatem euecti. Quibus sanè nominibus à studiosis ac doctis omnibus prædicandus uenis, & laus ac gloria immortalis tibi certatim debetur. Et certe eo nomine etiam ego omnem meorum studiorum fructum c. t. me debere confiteor. Quamquam quod ego has meas uigilias c. t. offero, nō tam c. t. honorificum ac gloriosum uideri potest, quàm mihi cōmodum ac gratiosum & omnino necessariū. Nimirum ut opus per se excellens per c. t. amplitudinem orbi commendabilius fieret, quod fortassis ob nostram tenuitatem uilescere uulgò poterat. Quod si autem utrunq; assequor, planè me felicem, qui pariter & c. t. & publice omnibus, de eadē ut aiunt, fidelia, me commendabilem feci, ut hic non paruam à me initurus sit gratiam, c. t. medicus primarius doctissimus uir Philippus Pucheymerus, qui sæpenumero prædicata splendidissima c. t. magnificentia, quæ factum hoc meum benignissime exceptura sit, hanc audaciam me audere fecit, aliàs uix ausurū ut c. tuæ nomen tam confidenter usurparem. Nam quum nihil hodie receptius sit quàm indiscriminatim quoscūq; libellos magnis principibus inscribere, nīdemq; laudandis maximam præfationum partem insumere, nullo alio ut apparet respectu, q̃ ut sibi fauorem ac gratiā aliquam eblandiantur, nulla consideratione quàm aptū sit principi munus, uel quàm utile & Reipub. literariæ cōducibile opus, ut hoc modo per magna nomina impostura magis fiat, quàm beneficium aliquod uel à principe uel à studiosis agnoscendum: ualde sanè ueritus sum, ne & hoc meum factum tale uideri posset: quod uidelicet Reuerēdis, ac illustribus, c. t. ad nugas meas uulgò uēditandas usurparim, & c. tuæ laudes proferendo, gratiam eiusdem sic emereri uoluerim. Aqua suspitione me doctiss. illius uiri c. t. medici consiliū & autoritas, ut spero, liberabit. Et tamen ut etiam ipse quod res fatear, c. tuæ gratiā ac clementem fauorem me ambire non nego. Quis enim tanti principis fauorem non expetat? quum ut ille inquit, principibus placuisse uiris non ultima laus sit. Verum quod laudibus c. t. hic explicandis datum mihi locum putarim, aut quod nugis meis per nominis tui splendorem claritatē inducere uoluerim, nequaquam uideri posse puto. Nam & illæ maiores sunt quàm ut tam paucis chartis comprehendi debeant aut possint: & ego minorem me esse scio artificem, quàm ut tanto operi recte absoluendo sufficere possim. Et si etiā me parem tāto oneri fore sperarē, tamē hic locus nō ferebat, angustior nimirū tantis uirtutibus, iusto uolumine aliquando immortalitati cōsecrandis. Hoc uero opus quod c. t. offero, & per c. tuæ clementem magnificentiam orbi communicō, nugas dicere uel inuidientissimi calumniatores eo nomine

mine prohibebuntur, quod summi medici Galeni tractatio est à nobis latine cōscripta: qui ut uir fuit in omni doctrinæ genere excellentissimus, sic ab omnibus qui unquam docti haberi uoluerunt, summo hōnori habitus est, & extra inuidiæ aleam collocatus. Cæterū ut huius operis Galeni omnium ipsius scriptorum postremi, præstantia propius æstimari queat, non uelim quidem aliam potiotē hos libros uertendi mihi causam fuisse uideri, quā ut studiosam rerum medicarū ad olefcētiā à barbaris & ineptis, tum Arabibus, tum Italis medicis practicis, planè empiricis autoribus auocem, ut aliquando relictis putidis riqis, cognoscant quantum præstet à fonte bibere, qui ceterè quantū ad componenda pharmaca localia attinet, in his libris limpidissimus cōspicitur: quāquam Galenus aliquando præter institutū, etiam abunde declarat, quæ ad affectuū, quorū gratia pharmaca componuntur, differētiās cognoscēdas cōducant. Tāta autē limpiditas ac sinceritas huius fontis ex quo cōponendi medicamenta ratio scaturit, existit: ut qui inde se proluar atq; exatiet, reliquos riuos facile fastidire, aut ceterè de ipsis quāti faciendi sint integre pronuntiare possit. Omnes enim & Græci & Arabes, & cōsequenter Itali ac Galli practici, sua ex hoc ante deriuarunt: quanquā postremi tres ferè nihil præter putidam fecem ac limum hauserint, cuius rei iudicium ex his libris uel imprimis ferre licet. At uero sicut Græci posteriores à Galeno omnes, Galenum hac parte sequuti sunt, eadem q̄ aliquando ad uerbū transcripserunt: sic Galenus nō ueritus est hos libros uelut Rhapsodian quandā cōfarcinare, quādo sanè omnia quæ tradit ex prioribus medicis trāsumit, Heraclida Tarētino, Archigene, Apollonio, Hera, Andromachio, Asclepiade, quemadmodum etiam hi ex prioribus sua per successiōnem quasi per manus acceperūt, ex Antonio Musa uidelicet, Mātia, Asclepiade Bithyno, & plerisq; alijs quorū nomenclationes diligenter adscribit Galenus: nimirum ut medicamenta maioris pondēris existant, à tantis autotibus prodita, uisq; ac experimento confirmata: quando sanè hoc potissimum in ipsis spectari debet ut experimento cōstent, eoq; non uulgari, sed pet grauiem aliquem autorem facto, ne uidelicet casu, aut intrinseca uel extrinseca aliqua aduēticia causa successum habuisse suspecta fiant. Quare nō dubium est quin ex horum librorum doctrina studiosis iudicandi uis continget de omnibus compositis medicamentis, tum ueteribus, tum hodierni temporis myropoliū, quorum aliqua dñj boni quantis ignorantie tenebris sunt obuoluta. Sed & ipsi iuxta Galeni doctrinam similia componendi facultatem adipiscuntur. Porro quam nos his latine reddendis operā impendimus, adeo nō exilem censuros spero utriusq; linguæ ex æquo doctos medicos, ut longe maioris operæ pronuntiaturos esse cōfidam, hæc latinis legenda dedisse, quā Galeno scripsisse, atq; id ob duplicem maxime causam, Primā quidē quod Galenus præter distinctionis & ordinis rationem,

iudiciūq; in eligendo ac expendēdo acrimoniā nihil magni in his libris præstitit, ut qui priorū medicorū præscripta sequutus, nō sententiam tantū, sed ipsam etiam uerborum seriem, nullo præterquam transcribendi labore expressit. Nos autem eadem ordinis ac distinctionis ratione iuxta interpretis fidem seruata, easdem citatorū ab ipso medicorum sententias ac uerba, alibi ob temporum illorū usum iam exoletum longe difficilima, non solum expendere, sed etiā in aliam linguā transfundere necesse habuimus: in qua parte nō paruam difficultatem, ob dictionis diuersitatem, uidere est, quum alienissimo ab omnibus alijs sua tradendi modo Archigenes utatur, & ab alijs non parum distidet Heraclidæ phrasis, sicut ab his omnibus ex æquo ea quam intertextit Galenus. Accedit ad hāc altera difficultatis causa, quod exemplar Venetijs inuulgatum, quod in his uertendis unicum sequuti sumus, tam corruptum ubiq; est, ut opē interpretum uisum fuerit commētarijs adiectis interpretationem nostram declarare: quo & fidem nostrā studio sis approbaremus, & non solum optimum librum in integrum restitutū legendum, uerum etiam difficilem intelligendum, publice proponeremus: atque ut hoc recte à nobis præstari posset, non iuxta quorūdam huius seculi interpretum morem, statum aliquod tempus operis absoluendi propositum habui, sed modo producto, modo recondito opere, singula quantum fieri potuit diligenter expendi, quo non abruptum, sed ad plenum completum opus à nobis inuulgaretur. Longe enim ab his dissentio qui uilissimi luelli gratia bibliopolis gratificantes, in præfationibus etiam fatentur, se opera sua non aliter extrudere, quā quomodo uulgo dici solet, Sutor cum calcis festinans ad forum: aut quod sibi etiam nuper quidam ex his nō libenter pessimus præfandum duxit, quomodo canis festinās cæcos catulos parit: quod mox alius quidam ex eodem ouo prognatus, tanquā maxime in loco dictum, sibi itidem usurpandum putauit. Sed quid mirum est, esse qui hoc modo cōuersa ac scripta suo nomine extrudere audent, quum sint qui etiam magno sumptu typis excudant, & qui excusa etiā magno coeant? Ar uero multo prudentiores hac parte mihi Hieronymus Frobenius ac Nicolaus Episcopus, typographi ac ciues Basilienses uidentur, in hoc ille paternas hic soceri uirtutes præclara laude imitantes, qui hoc genus librorum ne gratis quidem sibi obtrudi patiantur, nedū optimas chartas talibus exarandis misere perdant, & diuendendis studiosis imponant: id dictū familiariter subinde usurpantes, quod etiam IOANNES Frobenius cuius hæredes sunt libris aliquibus præscripsit: Paruo emit qui bonū librum magno emit, Magno emit qui malum paruo. Quod dictum ut prima sui parte de nostro opere uere posse dici uehemēter expeto, Ita affirmate possum, me nihil studij ac diligentiae intermisisse, quo hic meus labor talis uere sit, qualem uideri cupio. Quod si tamen quid humanitus nobis, quod possibile est, admissum fuerit,

fuerit, non dubitabimus nos ipsos aliquando repetita editione cōvincere ac superare. Interim non diffidimus quin hi libri omnibus rerum medicarum amatoribus commodissimi sint futuri: qui per Reuerendissimæ c. tuæ gratiam & auctoritatem non minus quàm per autoris sui diligentiā ac beneuolentiam, ut spero, placebunt. Imò c. T. hanc gratiam debebunt medicinæ studiosi, quod publice legendos ex auctoritate eiusdem R. C. T. inuulgant, quam diu ualentem, ac pietatis & bonarum artium studijs conferuandis su-
perstitem, deus Opt. Max. sospitet: illud tantum impetrem oro, ut
R. C. T. hanc nominis sui usurpandi audaciam, non ad im-
sturam, sed publicam quam plurimorum utilitatem
clementer nobis indulgeat. Nōthuse,

Calen. Martij, Anno Christi

M. D. XXXV. II.

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a message of condolence to the people of the State of California, who have been afflicted by a severe drought and famine. The President expresses his sympathy for the suffering people and offers them his best wishes for a speedy recovery.

INDEX VOCVM ET RERVM IN HOC OPERE TRACTA

TARVM COPIOSSIMVS QVEM QVT SIBI VO

luerit esse usui, ad numeris paginarum a 248 usque 553 ceter

temariam notam corrigat.

A



Baselathus. 480

Acantibion quid

141. 293

acris 158

abrotanum The

baicum 264

abscessus 456

abscessus crudi sectio 81

absinthialis 499

absinthium 209

absinthium pro cernis 77. 370

acacia 16. 296

acanthium 510

acer arbor 508

acetum album 151

acetum mulsum Italianum 49. 346

acetum scilliticum 199

aceti facultas ususque 24. 16. 47

acetabulum 518

acetabuli pondus 537

achariston antidotus 96. 392

achillea aurige confectio 193. 484

achor quid, eiusque cura 24. usque 32

achorum generatio 29

achras unde dicti 308

aciet quondam, hodie chathys 287

acicularum comparatio 6. 11

acini 459

acivna 418

acivntia 306. 374

acopa 172

acostia 522

acostia 412

acostia 307. 384

adeps salis et insulsus 363

adeps asperimus et gallinaceus 63

adipis vulpini usus 72

adipis vulpini usus 497

adipis colica 245. 291

adiantum 53

adulphus 496

adipon catapotium. 208. 496

adstringentia 358

adstringendo corroborantia 489

adulphus 527

agilopis morbi descriptio et curatio 120. 396

agilopis herba ibidem et 417

egyptiaca argentum 317

erianum collyrium 104

erugo nermiculus 166. 461

es cyprium 593

actij locum emendati quam expresse 285. 306. 307. 314. 316. 342. 376

425. 428. 487. 488. 518. 540

effectus cognitio coelestialis 46

effectus inopie et redidantiae 128

effect. curari, non adhibere lasas 278

effectus quoniam in se habet 318

agariici dosi 542

agariici iunioris 458

ageratus lapis 158. 456. 163

agariici et agariici 350

agariici et agariici 323

agariici 537 (371)

aglaia quid 526

agrostis amon 266. 548

agrostis 293

agrostis 409

agrostis et agrostis 504

agrostis 483

agrostis 432. 435

agrostis 522

agrostis 405

agrostis 389

agrostis 396

agrostis 431

agrostis 321. 430. 431

albugines oculorum que tollat 98

albicadion, albidion 559

alkekengi 459

alcman poetas 308

alcatras alcatras 325

alcatras fumambulatoria, et quoniam ab

halteribus differant 325

alcyonium 315

alcatras et alcatras 321

alex quid 562

alex 172. 336

alex genera 357

alex aceto cocta 113

alex latina vox 338

alex et alex 505

alex et alex 506

alex et alex 311

alex et alex 411

alex et alex 411

alex et alex 204

alex et alex 276

alex et alex 317. 344

alex et alex 473

alex et alex 291

alex et alex 324

alex et alex 823. 62

alex et alex 314

alex et alex 432

alex et alex 493

alex et alex 192

alex et alex 358

alex et alex 42

alex et alex 186. 476

alex et alex 52

alex et alex 291

alex et alex 448

alex et alex 147. 448

alex et alex 154. 448

alex et alex 448

alex et alex 119

alex et alex 53

alex et alex 155. 75. 177

alex et alex 308

alex et alex 285

ἀμφιβλήσας αἵματι	386	ἀπὸ τοῦ σπινθῆρος	420	araci magnitudo	328
ἀμφισμα	348	ἀφαιρέμα	337	ἀραχνοειδής	385
amphora quid	495	ἀφαιρέσθαι, ἀφαιρέσειν	456	araneorum ovis	350. 427
amuletis	233. 347	ἀφῆ	374	arbutus	340
amara condensata	114	ἀφάλεγμασις	307	archigenis doctrina empirica	5
amylum	82. 463	aphroditarium	142	indefinita	25
ἀναιμοσίς usus	282. 380. 434	ἀφροδισια	532	ardor quid	34
ἀνακογχυλίσαι ἀνακογχυλίσ- μα	353	aphroditum	4. 281. 306	arce quid latinis	276
ἀνακογχυλίσαι	353	aphronitum	281	argemon	399
ἀναδοξασμα	291	ἀφῆναι et ἀφῆναι διδύμα	462	aringe maris condite	361
ἀναδοξασμα	409	arbitre quid et unde dicta et apud curatio	165. 167. 462	aristolochia dasylitis	178. 470
ἀναδοξασμα	283. 395	arbitra infusum	250. 550	aristotelis loci	178. 282. 545
ἀναδοξασμα	483	arbitrii distinctionis utilitas	169	is ποδὶ τ' ἀνισοτέλει	319
ἀναδοξασμα	483	arbitre puerorum quo curande	168	armeniaca mala	346
ἀναδοξασμα	480	arbitre trisulcorum	256	aromatum vires	223
ἀναδοξασμα	421	ἀφῆναι ἀφῆναι	307	aromaticum collirium	210
anchilops	396	ἀπῆναι, ἀπῆναι mala	500	arquatus	513
anchora sacra	346	ἀπῆναι ἀπῆναι	353	arquato infectatis. vide lesteris	
andromachus quando mixis	496	ἀπῆναι ἀπῆναι, ἀπῆναι ἀπῆναι	353	artemidori locus de halteribus	325
ἀνῆναι	476	apodactylicis remedia 95. 390 (333)		artemonium collirium	109
anethum	225	ἀπῆναι ἀπῆναι et ἀπῆναι ἀπῆναι	391	ἀρῆναι idem qui ἀλῆναι	525
anethi usura	264	ἀπῆναι ἀπῆναι	390	arteria unde dicta	463
ἀνῆναι	481	ἀπῆναι ἀπῆναι	365	arteriarum sectio	90
Ang. Politiani locus expeditus	507	apophlegmatismi quid 512. 7390		arteriace	170. 463
Ang. Pol. lapsus	514	Apoionius Herophili sectator 64		arteriace triplices	171
angina remedium	156	ἀπῆναι ἀπῆναι	300. 301	arterie quondam uena appellatae	
anbelosi qui et quo curantur	197	ἀπῆναι ἀπῆναι	372	171 et 463	
ἀνῆναι et ἀνῆναι	314	ἀπῆναι ἀπῆναι	456	arteria aspera	171
animalcula ex arboribus	74	ἀπῆναι ἀπῆναι	372. 456	articuli contracti	537
animatum quid significet	479	ἀπῆναι ἀπῆναι	314	articularis morbus	544
animi deliquit quo curetur	214	ἀπῆναι ἀπῆναι	358	arthritis quid et curatio eius	260
anodyna pharmaca 195. 241. 483		ἀπῆναι ἀπῆναι	358	266. 544	
484. 514		ἀπῆναι ἀπῆναι	347 (ver 398)	artis sectorie corporum negligentia	386
ἀνῆναι	317	ἀπῆναι ἀπῆναι	520	titia	386
antherae compositio	135. 396	ἀπῆναι ἀπῆναι	489	ἀπῆναι	308
anthera pharmaca	157. 397	ἀπῆναι ἀπῆναι	368	aristum uinum	591
ἀνῆναι	397	ἀπῆναι ἀπῆναι et quid proprie	368	as eiusque partes in rebus mensura	
ἀνῆναι et ἀνῆναι	355	apryctos antidotus	215	bilibus	543
antidotus ex lapidibus	259	aqua Egelide	481	as foetida et dulcis	353
antiochus Paccius	544	aqua ferri extincti	238	Asari vires	525
ἀνῆναι	320. 544	aqua fontana	182	ascarides	543
ἀνῆναι	314. 34	aqua lactose	191. 481	asclepiade negligentia	54
Antonia Drusi quo collirio usa	106. 400	aqua maris	411	asclepiade ates	474
106. 400		aqua maris salinis	ibidem	asclepiades duo	500. 501
Antonyj Veri tonsura	293	aqua per plumbos candes deriuata		asclepiades dictus philosophicus	
auxij qui dicantur	485	aqua plumis	174. 182 (182)	196. 217	
euxiose affectiones	493	aqua dulcis usus	165	asclepiade rasura in curandis alor	
ἀπῆναι et ἀπῆναι	291	aqua distillata	299	perij	10
ἀπῆναι	341	aqua medicata	60. 354	asclepios collirium	107. 401
apelle Iudei	520	aquatum medicamentum	398	aselli mellipede	50. 70. 341
		ἀπῆναι, ἀπῆναι	480	aselli sub hydryis	192
				assatio	

Affatio humorum	61
affus lapis	94.389
affus lapis	390
affusio duplex	493
affusio duplex	ibidem
affusio duplex et affusio duplex	485.486
affragi	544
affragorum palustrum radices	332
affrenum herba	234.517
affrenum collarium	104
affrenum stomachicus et inexpectabilis	213
affrenum pastillus	195.484
affrenum qui et quomodo curatur	197.199
affragalus	291
affragalus	310
affragalus	20303
affragalus collarium	210.404
affragalus collarium	296.404
affragalus	214
affrenum pauciflorum	211
affrenum collarium	402
affrenum libellus	549
affrenum	300
affrenum scriptorij usus in medicina	59
affrenum futorum	147
affrenum	539
affrenum quomodo et affrenum	487
affrenum compositio	212
affrenum ex profundo	261
affrenum facies	279
affrenum	501
affrenum subtilitas	73
affrenum sterilis, satius, alba, et	417
affrenum	392
affrenum drachmalis	ibidem
affrenum tres festinus numeros octoginta quatuor valent	392
affrenum nulla re gramando	62
affrenum affectus quo et contingat	60
affrenum obturatio in fluore sanguinis et naribus	86
affrenum si quid illudatur quomodo eximas	76
affrenum specilla	61.55
affrenum anersum	310
affrenum	558
affrenum	396.398

affrenum	396.399
affrenum panis	468
affrenum quomodo et affrenum	332
affrenum quomodo et affrenum	494
affrenum	494.505
affrenum pharmacum	238
affrenum qui de ponderibus et mensuris scripserunt	377
affrenum quatuor facienda	484

B

Alaninum oleum	416
Balanon piteuma	371
Balanon quomodo et affrenum	332
Balanon de quomodo et affrenum	414
Balanon	146.144
Balanon	102.172
Balanon succus eius	48.150
Balanon castanea	289
Balanon reparatrix	395
Balanon collum	111
Balanon quod et tetrapharmakum	61.355
Balanon	147.444.446
Balanon	225.510
Balanon onix, et Balanon argus	510.511
Balanon quomodo et affrenum	428
Balanon	485
Balanon	415
Balanon oppidum	380
Balanon nitrum	142
Balanon pharmacum	101
Balanon pastillus	248.352
Balanon sextarij	427
Balanon	152.236.257.451
Balanon unum	405
Balanon panis	530
Balanon	175
Balanon pistrinarie auro capite in	331.428
Balanon genera	429
Balanon Byzantie ibidem et	510
Balanon usus	69.359
Balanon color	429
Balanon de quomodo	387
Balanon	399
Balanon	147.446
Balanon arbor quae	447
Balanon	296.475

Balanon	417
brassica	471
brassica usus	37.320
brassica cauliculi	182.472
brassica	338
brassica et brassica quid	171.463
brassica pulmonis	197
bryon	290
bryonia lachryma	407
Bov, et humastus nua	500
Bovus seu Bovus	292
bulbus albus	117
bulbus quid eiusque cura	216
bulbus	312.500
bulbus excitatio et profusio	267
bulbus fraxinus	500
bute	344
bute	344
bute emplastrum	322

C

Ca particula extensio	467
Ca particula	212
Ca particula et affrenum	404
Ca particula et affrenum	307
cadmia quid	393
cadmia fossilis in Germania ibidem	ibidem
cadmia ustura	96
cadmia unum, et unde dictum	467
caliculi	444
calix glandis	457
callina testis	306.430
callis lapis	430
callis quid	13.293
callionymi piscis fel	75
callionymum	53289
callionymum	97.394
callionymum prae et affrenum curat	12
callionymum unde contingat	2
candens flamma	245.536
candens appetitus	203.500
candens dum venter	125.423
candens partes ad quid com	modetur
modetur	422
capillorum usus	16
capill. conservandorum ratio ibidem	ibidem
capillorum tinctura	17
capillos demigratio pharmaca	18
capilli repositi	302
capillus et affrenum	332
capillus usus	408
capillus offendit	49

κρυώδ' αἷς	449	κόμμη σκώληκος	389	cornu ulsi stomachi	497
crustulicij	305	κομμοπικία	296	coptation	185.466.476
κεκαίσι	368.369	compages	293	κοπτὰ ὁ Coptā Rhodia	465
cocblee	226	composita faciēdi ratio	159	475	
Cocblea Aphricana	215.239	compositio Hispanorum	71.361	κοπὸν φάρμακον	476.522
cocblee cotinus	134	compositio simplicissima optima		copus Basilicnsis	277.318
cocclearium ad columellā aptum	158	471		cordyle	364.442
coctura aromaticis nocua	145	compositio simplex ex papaverum		Cornelij Celsi lectiones restitue	
collij Rhodigini locus expellus	324	capitibus	174.129.180	387.309.311.313.314.316.335	
colonia	399	compositionis pharmacorum utili		349.359.366.438.511	
κόλιν	355	tas gemina	457	Cornelij Celsi loci expelli	376.390
κογχυλάειον, κογχυλίαν et κ		comprehensua facultas	45.532	397.408.415.425.449	
κογχυλίος	353	comptoria medicina que	16	cornu cerui ulsi vires	423
κογχυλίον τοῦ ἰκτὸς	372	comptura	296	cornua cerui ὁ capre	94.437
κοινεστγίς	288	comptura initium	301	cornus	148.445
colica Sicula	247	concernationis modus	59.325	cornu lapidosa	446
colice confessiones	195.221	conchylium	360	coronarum rosacearum usus con	
colicorum pharmacorū descriptio		conchilij pars interna	78.572	tra capitis dolorem	53
241 ὁ inde		concessus accessioinum ad instum		corporis partium omnium actiōes	
coliculi	472	morbum	41	quatuor	221
κόλιος	512	concessio in taphia modus	76	κορυζα	296
collyrium ex cornu ceruino	104	366		κορυμπικία	296
collyria arida	95	condimenta	308	cotones herba	307
collyria ex glaucio	63	condita ὁ cornu usus	299	coxendicum morbis que optulenti	
collyrium Nili	105.116.400	κόρνιον, ὁ κόρνιονλοι	284	tur	260
collyria Libiana ὁ Cygni	90	condylomata	254.284	κράμα ὁ κυραμαλίον qd	508
collyrium Paccianum croceum ex		confessionis ex papaveris capiti		509	
nino	92	bus usus	182	κράμβη	471
collyrium ex sandyce	116.409	confectio ex fructibus	207.248	κράσις de quibus qualitatibus di	
collyriorum nasi molestia	88	405.528		catur	482
collyriorum varis appellationes	398	congius quid	150.450.495	cribrum medicum	156
collyria monobemera	91.388	κονία διδομενία, ἡ καὶ πολέπου		cribrum quid Grecis ὁ curatio ear	
collyrium ex nino	90	ωῦ πολοποιητικῇ, σισαμ		rum	99.115.396
colligations	212	κονία quid	303.305	critonis libri intercepti	302
colocastie folia	433	κονία pro calce ibidem		κρίσις μετὸ πον ὁ κριμετὸ πον	
colopbonia	351	κονία ποθετος ὁ ποθετον	304	ἐνδον, ὁ πρὸς κρίσις μέτων	
colum minarium	298	κονία βαλανιδιτικῇ	305	πον προσκολλησθαι	329
columella quid ὁ que pharma		κονία saxilla	305	κρίσιμους ὁ κριμους ibidem	
ca continent aut non conue		conicifera artificiosa	62	crocodillia	542
niant ci iuxta Galeum	157	conicifera species	72	croceum Asclepion	110
162.163		κονισαλος	374	croceum pedicon	106
columella laxate rectificatio	155	κονίς λιπαρά	ibidem	croci puer	242
columelle locus expellus	304.449	coni	374	κροκίς παρὰ φύσιν	359
colymbades olina	167.461	κόνος, κονία πον	452	croci ὁ myrrine vires	142
κόλυμβάδρα	352	contraria ὁ nocentia cur admi		crocomagma	340.512
κόμμη	304	ferantur	40	κροκουμα κροκου	454
κόμμη	301	contraria inter se mixta aptum me		κροκουον	512
comagennum unguentum	45.332	dicamentum sunt	170	κρότων	408
comensuratio	313	contraria morbo sint auxilia	155	cruda farina	112.344
		455		cradites	221
		contrariorum ratio	220.503	crudatis stomachi remedia	214

crudus humor qui	260.545	denarius aureus	392	dionysiacum quid	13
crumor hepatis hircini	408	denarius hodiernus	392	Dioscorides à Galeno taxatus	303
crustæ	376	διοσκοριδῶν	291	320.397.345	
crustarum in ore remedia	155	dentium affectibus quomodo uti		Dioscoridis loci restituti	279.333
κουβαρίδες	342	ric occuratur	127	444.526.548	
cubebe	331	dentes affici citra dolorem ibidem		Dioscoridis loci expensi	279.283
cubitus	427	dentium inflammatio et incrementum	128	284.296.303.342.365.367.369	
cuminum pro fota	118	dentium affectus duo ibidem et		390.405.415.420.423.437	
cuprum	393	423		458.505.510.525	
cupula glandis	457	dentes exigentia	131	dioscoridis interpretum error	414
curatione iuxta concarnationem	54	dentes quando extrahendi	430	διωπύλαιον	426
cutiones	342	dentibus citra dolore tollendis	135	διωπύλαιον ἄγχιον ἢ σκευός	424
κύματα	342	dentium stupor	134.452	diploia	179.424
κύματος que significat	433	dentium stridor et hebetatio	435	διωπύλαιον emplastra	314.421
κύματα ἴσως, κυματα λίαν		dentium foramina unde fiant	128	διωπύλαιον	380
308	412	et 423		discussoriorum pharmacorum usus	
cyathi pondus et mensura	121	dentium perforatorum remedia	130	2.279	
414.537		dentificationum compositio	137	discussoriorum usus error	129
cyathi pondus à Galeno confusum	419	dentificia et dentiscalpia	437	discussoria indurantium	146
κυαθίονος μέλις et σμάλις		dentitioni puerorum que conueniant	134	discussorie compositiones	119
310.357		deorum manus sunt medicamenta		διωπύλαιον	541
cybium	240.412	159.458		distentio	459
cygnus regine	103	derinatio	341	distichia	395
cydonia herba	22.307	desideria	326	distinctiones Herophilus laudat	
cymate, cyme	544	desillatio	296	64	
κυωόβατες, cynosbata	446	διωπύλαιον	487	distinctio multam enim habet ad ar-	
cynomorum quid	4295	διεγείρει	352	tis constitutionem	66
κυωοβάτες	408	διεγείρει	420	διεγείρει	426
cytini	444	διεγείρει	376	doctores nostri seculi	328
cyperifolia	318	διεγείρει	174.179.471	doctores titulum uendi	287
cyphi	340	diacodion	9	dodrans	426.427
cyphi Aegyptiorum	222	diacodion	497	dodrans mensurabilium omnium	
cyphi hieraticum	218.502	diapedesis	116.409.480	543	
cyphoides	212	διαφυλακτικὰ	296	dogmaticorum secta	326
κύρμα	454	διακίλον emplastrum	376	doisiof	378
		διεγείρει collyria	400	dolia naporatoria	515
		diarodon inculpabile	106.400	dolores quibus ex causis generaliter et communiter oriuntur	
		diarodon Nili	105.400	356.383	
		diarodon magnum	106	dolorum qui uehementissimi	42.327
		diaphrynon glaucidanum	100	dolorum discrimina	50
		diatritarij	363	διωπύλαιον	426
		διεγείρει	473	dosipychros	475
		διεγείρει	473	dothienses Græcis quid	121.418
		διεγείρει	380	drachma argentea	153.212.452
		διεγείρει	366	drachma argentea et denarius idē	
		διεγείρει	366	498 (391)	
		διεγείρει	314	dropaces depilatorij	407
		didymas quid	263	δρῶντικὸν ἔλαιον δρῶντικὸν ἔλαιον	
		dies pro die et nocte sumuntur	181	δρῶντικὸν	407
				dulce	296
				dulcis	

dulciaria liba	172.465	ἐμφρακτικὸν	305	ἐπιπικρυνκὸς χιτῶν	385
duplum mas	119.424	empirices origo	494	epiphora	372
duodecimanus sal	321	empirica secta	219	ἐπιπλησισμὸς	535
duplicita usfa apud Plinium	425	empirica secta incertitudo	493	ἐπισπαστικά	547
dyaricata	346	empiricorum transitio ad simile	326	ἐπιτρυκτικὸν, ἐπιτρυκτικὸν	398
δύωμας compositionem signifi-		empiricam sectam hodie regnare	387	ἐψομα ὁ ἐψομῶν	445
cet	275	ἐμπλαστὸς ὁ ἐμπλαστῶν	305	ἐψημυθλοῖ	484
dyspnoici qui proprie uocentur, et		emplotion pharmacum	21	erulis quid eiusque curatio	155.434
quomodo curandi	198	emplastrum tonsoris	239	erasia medicamenta	546
δυσαλκῆς	380	emplastrorum commoditas	114	ἐράσας	471
dysenterici proprie	248.527	emplastra viridia ὁ alba	116	ἐρύμωρ	411.465
dysentericorum curatio	248	emplastrum Bithynium	240	ἐρύμων ἑλδουρ	412.549
dysenterici inueterati	535	emplastra lenia, pinguis	511	ἐράδου ὁ ἐλδουρ	437
B		emplotium citrinum, fuscum, griseum	422	ἐράπας ὁ ἐράπας	465
ΒΚερδοματε	310	emplastrum laxatoria inflammatio-		ερεπι	192
ἐκκαθερίκον	306	nium ὁ partium disenteriarum	81.376	ἐρεπυπαρὲς καὶ εἰσυνπαρὲς	348
echion, echis	539	emplastrorum colores unde sunt	314	ἐρεπυπαρὲς καὶ εἰσυνπαρὲς	350
echini succus	255.539	emplastrum propter excoriatori-		erica ὁ erica fructus	89.384
ἐχίνου	473	um	127.423	ἐρύγερ	509
echymomata	116.409.461	emplastrorum colores unde sunt	314	erimaci pellis	520
ἐκλυσις καὶ ἐκλυσις καὶ αἵμα		emplastrum propter excoriatori-		erinos	539
318		um	127.423	ἐρεπτε ὁ τῇ λαφελῇ	308
eclecia, eclegmata	170.465	ἐνσπασμα	422	errhina que dicantur, eorumque	
ecphrastica	89.305	encantibus quid	95.390.402	usus	55
ἐκπίδμα	314	endimia	507	error de mutatione pilorum uul-	
ἐκπιδωγῶν	353	ἐνίμα	328	pis	277
ἐκπίπτε	318	ἐνίμα	328	error à nemine hactenus animad-	
ἐκπίπτε	310	ἐνίμα	328	uersus	548
ἐκπιδω	434	ἐνίμα	328	eruptionum in capite remedia	32
ἐκπίπτε	297	eupneupharmacum emplastrum	254	eruptiones pituitae	318
ἐκπίπτε	281	ἐνίμα	328	eryngium	179
ἐκπίπτε	348.509	ἐνίμα	328	erysipelas	462
ἐκπίπτε	348	ἐνίμα	328	ἐρύσας, ἐρύσας	155.455
ἐκπίπτε	371	ἐνίμα	328	ἐρύσας	472
ἐκπίπτε	313.358	ἐνίμα	328	ἐρύσας	355
ἐκπίπτε	409	ἐνίμα	328	ἐρύσας	412
ἐκπίπτε	423	ἐνίμα	328	ἐρύσας	3
ἐκπίπτε	344	ἐνίμα	328	enacuare que non possint	
ἐκπίπτε	281	ἐνίμα	328	enacuationes inferne quid ficiant	
ἐκπίπτε	305	ἐνίμα	328	256	
ἐκπίπτε	348	ἐνίμα	328	euphion Nicodemi	255
ἐκπίπτε	516	ἐνίμα	328	euchron efficax	108
ἐκπίπτε	485	ἐνίμα	328	ευκρίσια	307
ἐκπίπτε	343	ἐνίμα	328	ἐνίμα	412
ἐκπίπτε	381	ἐνίμα	328	ἐνίμα	507
ἐκπίπτε	381.382	ἐνίμα	328	ἐνίμα	381
ἐκπίπτε	307.308	ἐνίμα	328	ἐνίμα	341
ἐκπίπτε	352	ἐνίμα	328	euphorbij facultas	459
ἐκπίπτε	477	ἐνίμα	328	euphorbij quomodo fernetur	525
ἐκπίπτε	350	ἐνίμα	328	euphorbus Troianus	243.525
ἐκπίπτε	227	ἐνίμα	328	euphorbus medicus	525

eustachian collarium	109.403	fel saillum	11.70	galij ophthalmici collarium	106
Hybrya	318	fel terre	530	Galenii lectiones emendate	276
Hybrya	318	fel urfi	226	277. 281. 285. 287. 288	
Hybrya	318	ferula, inscriptio librorum		289. 294. 300. 307. 311. 313. 315	
Hybrya & Hybrya	438.439	433		322. 331. 332. 333. 348. 349. 353	
Hybrya & Hybrya	504	ferraria officina cinis	238	354. 357. 358. 359. 361. 362. 366	
Hybrya & Hybrya	310	sex vini usita	315	373. 379. 380. 381. 395. 399. 400	
Hybrya & Hybrya	501	sex Rhodia	316	403. 404. 405. 420. 423. 426	
excoriatoria	125	sex vini dulcis	166	427. 428. 429. 421. 425. 428	
Excoriatoria	478	fecis uocabulo Græcos uti	31	430. 431. 432. 433. 434. 437	
Excoriatoria	547	fibularum usus	39.54.323	438. 441. 442. 445. 451	
Excoriatoria	318	ficodula	512	452. 454. 456. 457. 460	
Excoriatoria	598	ficus	329	461. 462. 464. 466. 469	
exolutionis animi remedia	114	ficus Aegyptia & Cypria	445	470. 471. 473. 477. 479	
Excoriatoria	546	ficosorum tumorum remedia	111	481. 483. 484. 485. 487	
exornatoria medicina que	16	filix	115	488. 491. 494. 495. 497	
experientia	34	filicis radices	176	498. 499. 500. 501. 502. 503	
experientia unde	202	statum generatio	54	505. 506. 507. 511. 516. 517	
experientia incertitudo	203	florida medicamenta, floridi colo-		518. 520. 521. 522. 524. 528	
experienti fides	9.23.119	res	397	530. 531. 533. 535. 536. 538. 540	
expositoris officium	274	fluxus muliebris	477	542. 543. 544. 545. 546. 547	
exteriora facultas que	22	forni graci succus	88	548. 549	
exungues rose	398	folium	97.2.95.394	Galenii loci expensii aut interpreta	
Exulsiuones	504	foliatum ungentum	14.2.01.293	ti	285
		folium indicum	394	286. 290. 302. 305. 306. 307	
		fomentum per stipulam	74	309. 322. 323. 327. 329. 333. 351	
		fomenta bumida & sicca	66	356. 364. 365. 366. 398. 370	
		fomenta sicca	131. 133	375. 387. 396. 423. 420. 421	
		fomentorum usus tempus	112	430. 434. 438. 439. 441. 457	
		fomentorum ad aurium dolores ad		469. 470. 472. 475. 476	
		ria genera	75	477. 480. 484. 489. 495	
		fontana edulia	482	498. 501. 506. 507. 508. 509	
		fracturarum ossium differentie		511. 512. 514. 516. 518. 519. 520	
		473		521. 522. 523. 528. 529. 535. 542	
		fraxini semen	227. 509	545. 546. 547	
		fructus solustres	446	Galenii error	526
		frumentacea appellationes confusæ		galenus ad	308
		se	338	galeni experimenta	84
		fumi nulla utilitas	177	galeni industria	522
		fungi lacernarum & suilli		Galenii inuenta	244
		382		443	
		fungus pro spongia	ibidem	galeni iudicium de Arabigene	
		furfurum capitis curatio	12	130	
		furnus	306	Galenii libri postrema lectionis	
		furniculi	418	274	
		furunculorum curatio	111	Galenii mos curandi & metho-	
		G		dus	48
		Galaxias	481	galeni peregrinationes	443
		Galbanum nō lignosum	134	galgalus	512
		475		galla flaua	255
		galbula	512	galla immatura	457
				galla omni	

INDEX

galla omphacine	135	hemorrhoidum curatio	255.538	hiera ex aloë	44.175.331
gallac galline uis	333	hemorrhoides vulvarum	539	hiera ex colocynthide	2
gallinarum interanea	246	halterum usus	314	hiera Themiſſoni	211.497
gallicus morbus	418	halteres rotare	ibidem	hierarum compositio	277
γαργαρίζω	459	halteres ab alteribus differūt	325	hieracis collarium	108.109.403
gargarisari, γαργαρίζω	353	hamuli	323	Hippocrates Græci à Cornario	
garum Hippocrati	67.358	hapalona	529	roſtūm	395
garus odor ingratuſ	361	haploſiles caules	529.544	Hippocratis locus emendatuſ	372
garum pro muria in genere ibide		hapſuſ lane	323	Hipp. loci expenſi	285.334.408.
garum nigrum ſiue ſociorum	71	harena cur luſtantibus ſubſtrata		409.421.433.455.523.537.540	
358.361		374		Hippocras & hipp. ſuntis	298.199
garum ſacoſum, nigrū, πρωταῖον,		harmala	152.239.451	hippocraticum unum	102
primariū, ἀμωπῶν, arcuatum		harmation collarium	108.493	hirundinum palli	162
361.362		harmonia pharmacum	186.476	hirundinum uſtura & uſuſ	152.153
genadij collarium	104	bedychronuſ	85.381	hirundinum ſylueſtrium niduſ	164
γῆς φάρμακον	343	bedyſmata	16.297.298.355	hiſtoria	494.505
γύμναſτιον	568.569.511	bedydrorum curatio	32	Homeri locus	506.525
gingiue que dicuntur	128	belenium, nepenthes	506	horarum diuerſitas	330
gingiuarum curatio	128.134.136	belxine	440	horæum collarium	105
gizeroſa caſia	356	hemierania quid	353	humide affectiones	127
glans Aegyptia	119.414	hemieranie curatio	58	humiditas non facit dolore	35
glans palmarum	512	hemieranica pharma	ibidem. &	humores ſeroſi medicati	206
glans quercina	312	353		humorum impreſſio	78
glans unguentaria & palme	424	hemina etiam aridorum meſura		humorum ex loco in locum illeſuſ	
gleuedinū oculorum curatio	115	185		ibidem	
γλαυκώματα	395	hemine quarta pars	254.536	humorum utilitio et multitudo	311
gleſſum	281	hemiola proportio	392	hydromelum & hydrorofatū	299
γλοιὸς γλοιώδης	373.575	hemiolam quid contineat	96.392	hydrops quid	537
γλυκὺς ἄλμυς	412	hemionitis	517	hydropicorum remedia	277.239
γλυκὺ	296	hepar lapidei	226	hygidion collarium	104
glycyrrhiza Pontica	185	hepar uulpiſ	238	hygini aureum collarium	111
γόμερον γομερίον	413	hepatuſ actiones quatuor	221	hypophlegmata	113.405
grando oculi quid	99.396	hepatuſ canitantes	220	hypoglottides medicine unde di-	
grando	256	hepatuſ affectio, & quomodo cu-		ſe	178
Guil. Budæi loci expenſi	325.492	retur	219.220.222.503	hypopion quid, & eiſ cura	116
gutmi uſuſ	95.389	hepaticuſ homo	222.503	ἰκτερίκ	419
gutmi varia genera	389	hepſemaſ ſapa, defrutum, ſireon, ca-		iberidis herba deſcriptio	265.547
gutmi Thebaicuſ	108	dem	146.172.443	ἰχθὺς quid ſignific.	278.279.408
gurgulio ſeu columella, eiſq; re-		herba pediculariſ	308	ἰχθυα	285
media	157	herba ſacra	168	ἰχθυόματα	378
γυμναſτῆς	464	Hierophili diſtium	159.458	icteruſ unde & quid	512
γυμναſτῆς	336	Hefychij locus emendatuſ	433	icteruſ niger	513
γυμναſτῆς	477	hexingum	438	icterici ex varijs cauſis & eorū cu-	
		hexagium	138.458	ratio	137.512
		hibiſcuſ	291	ictericiſ que remedia conuen.	57
H Aemalops	113.405	hiera Antipatri	206	ἰκτερίκ, ἰκτερίκ	413
Hematites lapidei	95	hiera ad ſtomachicoſ	203	idiote pharmacum	236
hematitium	108	hiera piera	44.204	ἰδιωματῶν	336
hemoptoicorum remedia	189	hiera duplex	ibidem	ἰσχυρὸς	476
hemorrhagie	81	hiera aromatica	67	illicebra eiſq; ſuccuſ	99.396
hemorrhoidum cauſa & nomina		hiera exacuta	50.341	ἰνυμνῶν, ἰνυμνῶν	493

<i>Myris</i>	245	<i>iudicium de compositione pharme</i>	<i>λελυμασπορδίου</i>	364
<i>impetigo</i>	418	<i>corum</i>	<i>λίμματα ξοίδι</i>	444
<i>in aequalia coniunxit Archig.</i>	117	<i>inglaudes animata</i>	<i>λαμνίσκος</i>	383
<i>indicatio nū curationis genera tres</i>		<i>italius mensis</i>	<i>lennia rubrica</i>	478
<i>decies</i>	274	<i>in piter passillas</i>	<i>lenia pharmaca</i>	384
<i>iudicatio ab effectu, item à particu</i>		<i>iuuenalis locus emendatus</i>	<i>λεγνία</i>	513
<i>la</i>	141	<i>ἰσίδ' ὄρ</i>	<i>lenticule</i>	514
<i>iudicium aerianum</i>	109	<i>ἰσγ' f</i>	<i>lenticulata uasa</i>	514
<i>iudicium basilicum</i>	ibidem		<i>lenticulata scilptra incisoria</i>	
<i>iudurata affectio</i>	227		<i>ibidem</i>	
<i>infans infirmis quid</i>	13	L	<i>lentisci usas</i>	432
<i>inflammatorum affectio quales sit,</i>		<i>Labrusca</i>	<i>lentiscium oleum</i>	14
<i>et ordo curationis</i>	141	<i>lac caninum</i>	<i>lentiui liquores</i>	91
<i>inflammationis causa</i>	39	<i>lactis spuma, lac spumofum</i>	<i>leontarium</i>	07
<i>infusa</i>	328	<i>lactosa edulia</i>	<i>lepidij descriptio</i>	258.165.547
<i>in iun, occiput</i>	35	<i>lactuce unde dista</i>	<i>leporis testicular</i>	256.540
<i>in iudis</i>	475	<i>lacedaemonius orbis</i>	<i>λεπιδ' ὀρμου</i>	302
<i>inspersibilis paluis</i>	259	<i>lachryme olea</i>	<i>λεπιδ' ὀρμου</i>	301
<i>intemperata sunt morbi</i>	202	<i>laconicum quid, et laconum ri</i>	<i>leuce, nitiligo alba</i>	1276
<i>intemperature in singulis corpor</i>		<i>tus</i>	<i>leuce emplastrum</i>	500.314
<i>ris partibus octo</i>	202	<i>Lada et ladeum</i>	<i>leuce nitiligo</i>	461
<i>intemperierum differentie uarie</i>		<i>ladon quid</i>	<i>λευκία</i>	394
210		<i>λαγ' αωα</i>	<i>lexopyretos</i>	486.476
<i>interpretum graecorū medicorum</i>		<i>lana conchylio infecta</i>	<i>libianum collarium</i>	90.104
<i>supinitas</i>	274	<i>lana conuoluta</i>	<i>libra mensuralis usas</i>	491
<i>intertrigines</i>	313.501	<i>lana purpura infecte usas</i>	<i>libra partes pro partibus pedis</i>	
<i>intinctus</i>	307	359		426
<i>intybus</i>	507	<i>lana purpure uita</i>	<i>Item omnium mensurarum</i>	427
<i>inuerata</i>	564	<i>lana succide</i>	<i>librorum pessimorum pelagae</i>	
<i>inustiones oculorum</i>	399	<i>lapis arosus</i>		442
<i>ionthos quid</i>	121.418	<i>lapis iudaicus Palaestinus</i>	<i>lichenes quid, et unde</i>	418
<i>ἰσθ' ἡ λαοῦ</i>	375	<i>lapis syriacus</i>	<i>lichenum curatio</i>	113
<i>ipoterium malagma</i>	239.522	<i>lapis spongiarum</i>	<i>lichenosorum tumorum curatio</i>	
<i>iridium unguentum</i>	332	<i>larix arbor</i>		131
<i>iris</i>	522	<i>laricis resina</i>	<i>lichen tegularum</i>	233
<i>iris asfregalitis</i>	291	<i>laruae studiolorum</i>	<i>lichen petrarum</i>	418
<i>iris Chalcidonia</i>	184	<i>larynx</i>	<i>licium indicum</i>	93
<i>iris Illyrica</i>	291	<i>laser medicum</i>	<i>licium indicum</i>	362
<i>irrigationes</i>	47	<i>laseris genera</i>	<i>lien per accidens corpori auxi</i>	
<i>ischemos compositio</i>	26	<i>lassitudo inflammata</i>	<i>liatur</i>	234
<i>ischias qd. eiusq. curatio</i>	260.545	<i>lassitudo tensina</i>	<i>ligatura extremarum partium</i>	
<i>isochryson collarium</i>	110.404	<i>λεδ' αωα</i>		216
<i>isothecos antidotus</i>	187.477	<i>lauationum modi</i>	<i>lima dentium</i>	134
<i>ἰσθ' αωα pro inspectione</i>	317	<i>Laurentius Vrsalius</i>	<i>limaca Affricana</i>	70
<i>isypia</i>	465	<i>laurinum oleum</i>	<i>linamenta</i>	550
<i>Iuba rex Mauritanie</i>	243	<i>laxatorum medicationis duae</i>	<i>linamentum longum</i>	383
<i>incundia, confectio</i>	194.485		<i>linamentorum genera</i>	85
<i>incunditatis respectus in pharma</i>		<i>laxitas</i>		381
<i>cis quae deglutuntur</i>	145	<i>λεάνθ' et λεάνθ' αωα</i>	<i>λιου' αωα περ' ὀφθαλμ</i>	569
<i>iudicandi instrumenta</i>	200	413	<i>λιπ' αωα, λιπ' αωα, λιπ' αωα</i>	567
<i>iudicatio curationis scientifica</i>	46	<i>leodon</i>	<i>ἰν' αωα, λελ' αωα, λελ' αωα</i>	567
			<i>lipare</i>	

<i>Epore</i>	29.311	<i>mal</i>	316	<i>medicinium ab opio differre</i>	483
<i>luppidinis curatio</i>	91	<i>mala Cestiana</i>	58.321	<i>media que sint</i>	115
<i>liquores singulis affectionibus con-</i>		<i>mala horagaula</i>	529	<i>medicis ex libro</i>	491
<i>grui</i>	210	<i>mala hermbilaca</i>	519	<i>medicorum secte</i>	101.110.493
<i>liquamina, liquamenta</i>	307.308	<i>malum Matianum</i>	311	<i>medicorum vulgus</i>	43
<i>litracolla</i>	396	<i>mala orbiculata</i>	248.519	<i>medicinis pauperum & ditum</i>	144
<i>litram & litri spuma</i>	281	<i>malum punicum, granatum</i>	521	<i>medicamenta multi usus ad diuer-</i>	
<i>liuent oculorum, uide faggitatio</i>		<i>malorum puniceorum genera</i>	84	<i>fas affectiones</i>	67
<i>lixium</i>	302	<i>mali punici nucleo carentis grand</i>	214.215	<i>medicamentorum ordines seu gra-</i>	
<i>lixium balnearum</i>	305	<i>malum oculi</i>	401	<i>us quot sunt</i>	280
<i>lixium culineriorum</i>	304	<i>malabathrinum pharmacum</i>	103	<i>medulla olivæ</i>	509
<i>lixium coactiliorum</i>	304	<i>malaguate quid</i>	217	<i>medulle que prebent</i>	154
<i>lix quid</i>	304	<i>malagma Nilei crocerum</i>	218	<i>megaleum unguentum</i>	317
<i>lixium ex calce, et figulorum</i>	71. 303.304	<i>malagma Nili</i>	ibidem	<i>melæ qualis uox, & quid</i>	531
<i>lixium figulorum aqua</i>	267.549	<i>malagma hieroticum</i>	218.501	<i>melæ πικρὴ</i>	363
<i>locos pios</i>	398	<i>malagma ex meliloto uarium</i>	201. 213.219	<i>melan</i>	300
<i>localis auxilia</i>	277	<i>malagma aurei coloris</i>	236.237	<i>melan canticæ</i>	ibidem
<i>locales differentiæ quot sunt</i>	341	<i>malagma ex seminibus</i>	240	<i>melæ, μελασσε</i>	310
<i>loci affecti cognitio difficilis</i>	33	<i>malicorium</i>	146.444	<i>melan pro cotoneo</i>	310
<i>λογισμός</i>	517	<i>malua mascula & sylvestris</i>	291	<i>melis διατετα</i>	380
<i>lolum</i>	512	<i>malua πικρὴ</i>	359	<i>melanthium</i>	58
<i>lomentum fibarum</i>	412	<i>mandragora</i>	496	<i>melapia</i>	499
<i>lomentum</i>	289	<i>mandragora mala</i>	197	<i>melan</i>	500
<i>lolum & extinguitur idem esse</i>	102	<i>mandragora malorum aut radice</i>		<i>melanthioides, melanthioides</i>	309
<i>Luciani locus expensus</i>	314.407	<i>mandragora succus</i>	245	<i>melanthioides</i>	482
<i>Lucius apothecariorum preceptor. Ga-</i>		<i>manna quid</i>	94	<i>melasma</i>	106
<i>leni</i>	314	<i>manna Arabum</i>	449	<i>melasma emplastra</i>	30.314
<i>lumbriorum species</i>	343	<i>manna emplastrum</i>	117	<i>melomeli</i>	199
<i>lupi hepar</i>	156	<i>manna thuris</i>	313	<i>melomeli, melomeli</i>	310.355
<i>lusciosi quomodo curandi</i>	115	<i>matizoma</i>	311	<i>melis usus varius</i>	154
<i>lularia testudo</i>	53	<i>matizoma</i>	190	<i>menstrua cerebri sanctorum quomo-</i>	
<i>luxatio</i>	501	<i>Matrocellus medicus</i>	489	<i>do glutinatur</i>	39
<i>lychnium</i>	398	<i>Matrocelli loci</i>	285.358.379. 383.401.403.449.479.513. 539	<i>menstruorum</i>	340
<i>lycium indicum</i>	266.461	<i>Matrisalis locus</i>	407.437.497	<i>menstris quid</i>	327
<i>lycij radix</i>	160	<i>mare car uis mixtum</i>	404	<i>menstrum uinum</i>	ibidem
<i>lycium quæstio lyctis, & ly-</i>		<i>Marinus medicus</i>	496	<i>menstrum unguentum</i>	ibidem
<i>lycium</i>	501	<i>marina dici sylvestris</i>	335	<i>melan</i>	477
<i>lynceus collirium</i>	108	<i>marisca</i>	389	<i>menodorus Rhipali</i>	136.476
<i>lyphonon</i>	106	<i>marzapanes</i>	465	<i>menotiades quis</i>	515
<i>lyssa</i>	525	<i>massiche</i>	204	<i>mensium uaria nomina</i>	295
<i>lyssa</i>	525	<i>materialia pharmaca</i>	234. 317.516	<i>mensura</i>	477
M		<i>matricaria</i>	440	<i>mensurarum aridorum ratio</i>	519
<i>Acer quid</i>	143	<i>meconides lactuca</i>	215.500	<i>mensura liquidorum describuntur</i>	419.435.451
<i>μαχαίρα πικρὴ</i>	42			<i>mentagra</i>	115.418
<i>μαχαίρα</i>	352			<i>mentagra & lichen agrestis idem</i>	127
<i>μαχαίρα, μαχάρα</i>	352			<i>merces allicui ante datum pharma-</i>	
<i>mador</i>	204			<i>cum prasumenda</i>	195
<i>madolapuro</i>	390.406			<i>μελας</i>	277
<i>manarium uisura</i>	250				
<i>magnum</i>	468				

muscaria	334
muscatellum	334
muscatellus	ibidem
muscatellum	47.334
musca	552
metallica medicamenta que dicantur	309
metallum lota	253
metallum	309
metallum unde dicantur	ibidem
metallum	343
metallum propter	ibidem
metallum	352
metallum que Grecis	641
metallum	32.37.32.382
metallum	471
metallum propter	516
metallum rationalis	140
metallum ratio que	275
metallum pharmaca miscendi	35
metallum secta	37.388
metenchyle Grecis quid	255.355
540	
micra	352
micra thuris	358
micra	478
milax	413.456
milij aires	343
milipede	342
millic	320
milphe quid	95.390
milphus	390.406
milphus	494
minia	240.438
minia varietas	522.523
minium sinopium & hispani	397
minium cinabari	366.367
minnea myrrha eadem que Troi	
glostica	420
minium illud	ibidem
misf cum nino	169
misf aires	489
misf	502
modius italicus	438
melantheria sutorum	164
myolares compositiones	135
monobemera feculentia	92.388
morus & mora	445
mora rubi	143.147.444
mori arboris lac	330.425
morborum duo genera	288.315

morborum in profundo corporis cognitio difficilis & coniecturalis	202
morbis simularum partium	377
morsu	397
mortua scriptura	441
mos	290
moschimalagma	113
Mose & Iudeorum physiologia & Galeno irridetur	275
moscilla	395
moscilla	381
moscilla	383
moscilla	351
motodes casta	61.356
multipede	342
multitudo & moles à pondere differt	145
mutalium	440
muria insusis premititur	259.330
muris stillatitia	412
murium species	ibidem
muria & quod paratur	117.412
muria data, matura, cruda	411
murium capita	285
myrrha & myrrhea, & myrrhina	
myrrina	431
myrrum capita	285
myrrum ex animalibus	290
myrrum marinus	ibidem
myrrum arborum	290
myrrum sanguis	80
myrrum	360
myrrum lincium	360
myrrum	320
myrrum fructus & semen	168
myrrum eiusque genera	414
415	
myoccephalon	401
myrrum	218
myrrum	314
myrrum quid	13
myrrum	209
myrrum odor	41
myrrum minus	124.410
myrrum	117
myrrum potio	195.355
myrrum quid	466

myrrum herba	244
myrrum officinae que, & quomodo curentur	32
myrrum	355
myrrum & myrrum	433
myrrum vulgo que	277
myrrum collorum molesta	89
myrrum nigrum	334.317
myrrum sylvestre	548
myrrum lauri textura	243.527
myrrum fieri	306
myrrum Euboicus	143
myrrum ex libro	492
myrrum antidotus	214.506
myrrum eclogia	246
myrrum, myrrum & myrrum	506
myrrum	107
myrrum Marci	101
myrrum	410
myrrum	506
myrrum	394
myrrum antidoti duplices	257
myrrum ligatori	213
myrrum locus	412.531.539
myrrum palomale	415
myrrum qui, & quomodo curentur	115.408
myrrum	384
myrrum malagma	313.44
myrrum Aegyptium	280
myrrum Alexandrinum	280
myrrum Berenicarium	4.280
myrrum nigrum	198.394
myrrum gleba, spuma	281
myrrum quid, eiusque curatio	165
248.453	
myrrum gingivarum	135
myrrum studium	176.504
myrrum amara	287.358
myrrum anellana	363
myrrum muscata	415.496
myrrum oleosa & rancida	126.416
myrrum picea	154.452
myrrum	256

O Coloris callis quomodo mendendum
 oculi fluxionibus dicta
 oculi tunice et humor
 oculares copositio
 97 & index
 ocularium

Nardum optimum 61.355
 Nardinum unguentum 294

oculorum affectionis signa & cause 87.384.	onyx lapis, ut angustariū, onyx murrheus.	ouicula pontica	365
oculorū pharimacortū genera 93	onyx alij rosarum 546	oxybaphum	518
ὀφθαλμαγωγόν plurimum 430	ὀνυχίς ibidem	oxydorcion collyriū	109
ὀφθαλμογλυφα ὀφθαλμοτρομα- ται 437	ὀνυχίς rosarum & ὀνυχισμῶς ῥόδου ibidem	oxygala	538
odoramentum ad somnum 113	onychinus color, onychina pira, pruna 429.431	ὀξύμυλα	340
oenanthe 201	ὀνυχία 533	ὀξύμυλον	342
ὄνους ἀπαράχυτος 404	ophisius unde contingat, & quid 2.276	ὀξύμυλον, ἔξοχον, μακρὸν 499	
ὄνους ῥιόλιτος 380	orūm 209.243	ozeine quid, earū, curō 82.576	
ὀνώδης uine 448	orūm, Asiaticū, Achaicū, Theba- icum, & quod præstantius 483	P	
oesophus & esopham 253.348	orūm & Castorium cur torren- tur 65	Pædotriba 464	
ὄλκωμα 475	orūm Hispanum 107.151.483	pedicūm pharimacum 101	
ὄλκωμα κατὰ πλάσµα 547	orūm Lybicum & album 542	peonium catapotium 235	
olee germinis 168	orūm & Castorium cur torren- tur 65	pagri fel 99	
oleum album 18	orūm Hispanum 107.151.483	παρωδάλη 317	
oleum anethinum 231	orūm Lybicum & album 542	παλαιόν 426.437	
oleum chamæmelinum 231	orūm & Castorium cur torren- tur 65	πέλας 317	
oleum eruginosum lucernarū 78	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palladij locus expositus 299	
oleum ex olearum germinib. 279	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmæ passæ 252	
oleum insusum 22.305	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmula pateti 208.146	
oleum lentiscinum 129	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmularum ossa 165	
olei lucernarum usus 6375	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmule cortex & cerebrum 348	
olei myrti facultas 26	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmiprinum uinum 460	
olei rancidi cura 416	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmus paruis & magnus 426	
oleum sabinum 537	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmus paruis & magnus 426	
oleum serpyllinum 36	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmus paruis & magnus 426	
oleum sycionium 50.342	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmus paruis & magnus 426	
oleum ricinum 36	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmus paruis & magnus 426	
olea que præsent 37	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmus paruis & magnus 426	
oleorum illitio impura 523	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmus paruis & magnus 426	
oliue immature succus 154	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmus paruis & magnus 426	
ὀλίβουρος & ὀλίβουρος 405	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmus paruis & magnus 426	
162.343.405.460	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmus paruis & magnus 426	
ὀμωγόν 317	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmus paruis & magnus 426	
ὀμωμογόν 317	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmus paruis & magnus 426	
omotarichos 118.363	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmus paruis & magnus 426	
ὀμωταχόν & ὀμωταχόν 376	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmus paruis & magnus 426	
ὀμωταχόν 376	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmus paruis & magnus 426	
omotribes & omphacium Græ- cis quid 3	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmus paruis & magnus 426	
ὀμφαξ & omphacitis galla 158	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmus paruis & magnus 426	
283.284.456	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmus paruis & magnus 426	
ὀμφαξ κνήκ 457	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmus paruis & magnus 426	
omphacium 142	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmus paruis & magnus 426	
omphacomeli 299	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmus paruis & magnus 426	
ὀνι & ὀνισκος 342	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmus paruis & magnus 426	
ὀνις aromaticus 429.510	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmus paruis & magnus 426	
onyx bdellium 262.546	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmus paruis & magnus 426	
onyx ex conchylio 256.542	orūm & Castorium cur torren- tur 65	palmus paruis & magnus 426	

παρεκκρίσιμος	484	306.315.324.346.351.375.380	φαρμακωτίε κυματῆρια	514.515
παρελόντος	352	413.436.465.473.476.477	φαρμακοὶ ἑκατοπας	514.515
παράλυσος	545	511.530	phaei pharvacum	101
παλατικοί	484	pauli loci expenſi	phagedenica ulcera	312
παρ' ἡμῶν	352	314.318.327.332.333.337.342	phagedena stomachi	312
παρ' ἡμῶν	552	369.375.398.539.541	φαλαγγισίς	395
παρ' ἡμῶν	556	pediculorum generatio	phamion	103
παρ' ἡμῶν	501	tio	pharmaca examinandi modus	118
parabiles omnis generis	149	peduncularia	pharmacorum compositionis scilicet	129
parenchyma	101.504	pelamides	pi	129
πίεσις	484	pelargi Pelasgi dicti	pharmaca miscendi methodus	5.170
paronychia quid	105.494.495	pelargitis herba	pharmaca petrosus	107
πρίσθια	450	pelargium herba	pharmacum sticum ex charta	24.310
perietaria & paritaria	440	pellicula factus	pharmacorum uigor unde cognoscat	4.180
περιχέτωσις	341	pellis alba à spina appel.	pharmacum unum non potest ad multas affectiōes esse optimū	210
περιχέτωσις	438	penalōgriov σακεν	pharmacorum scriptores	165.174
περιχέτωσις	434.437	pentaphyllon etiam eupatorium dici	φάρμακ	442.460.463.464
perotides qd. ipſarumq. curd	78	περιχέτωσις	φάρμακ	433
peribenium, quae & plarium herbarum appellatio	440	περιχέτωσις	φάρμακ	530
perygrium emplastrum	25310	perdicis herba	pherecydes Syrius	308
περιχέτωσις	497	perdicis fel	philadelphinum pharmacum	103
passum	196.360	perdicis succus	philanthropus herba	53.348
passum Hispanum	251	perdicis usus in medicina	philippi pastillus	152
passum scybelides	360	περιχέτωσις	philonis antidotus	123.242.514
pastillus amarus	105	περιχέτωσις	philonij censura	144
pastillus Amazonum	110	περιχέτωσις	philote emplastrum	125
pastillus croceus	49.335	περιχέτωσις	φίμος φίμοσις	536
pastillus ex mandragora	196	περιχέτωσις	phloginum pharmacum	100.398
pastillus ex seminis	193.335	περιχέτωσις	φλυακία φλύσας	312.313
pastillus frictus	251	περιχέτωσις	phorasi	172.465
pastillus trigonus eiusque defectus	335	περιχέτωσις	φλυακία φλύσας	312.313
pastillorum usus	85	περιχέτωσις	phoribon & phoribon alumen liquidum	146.444
pastillus ex succino	192	περιχέτωσις	phosphorus medicamentum	100.398
pastillus ex corallo	ibidem	περιχέτωσις	phthiriosis seu pedicularis morbi curatio	23
pastilli infusibiles uarij	530	περιχέτωσις	φύλας	197
pastillus ex subere	530	περιχέτωσις	φύλας quid	394
pastilli ex glacio usus	63	περιχέτωσις	φύλας περὶ τοῦ	312
pastinace piscis uis	335	περιχέτωσις	phoenix colligitur	108.405
patetos palma	312	περιχέτωσις	φαινισιανός	312.414
πατέτος	374	περιχέτωσις	φρυγίς	517
πατέτος ἀπὸ τοῦ νοσήματος	316	περιχέτωσις	φρυγίς	351
πατέτος & πατέτος ἐπὶ τοῦ νοσήματος	316	περιχέτωσις	φουρνίτης ἄστρος	524
πατέτος	316	περιχέτωσις	φουρνίτης	507
πατέτος	560	περιχέτωσις	picatio	407
patroclus	514	περιχέτωσις		
paulina compositio	196	περιχέτωσις		
paulini eclogia	216	περιχέτωσις		
pauli lesiones emendate	277	περιχέτωσις		

INDEX

picationis usus	305	plinij lapsus	292, 298, 310, 311, 312	447, 512	
picatorum nasorum usus	306	365, 390, 414, 416, 440, 447		potio Rufi	194
picis cum aqua & nitro potus		478		potus multus & medicus quibus	
162		plinij lectiones emendate	286, 309	conuenit	198
picis flos & serum	360	321, 322, 340, 343, 346, 349, 362		præcoccia mala	346
picis serum	25, 74	381, 391, 410, 419, 420, 425, 426		πρακτικωτέρως	381
picris	114, 507	433, 440, 445, 447, 450, 460		prispismus quid, & eius cura	256
πίσσμα	314, 372	474, 475, 497, 500		primitiua causa	316
πίσσμα μυρεβαλιδιον	511, 546	plinij loci interpretati aut expensi		πρισματι	378
πίλημα	455	184, 285, 286, 287, 297, 298		προλατταρικήλην causa	316
πίλημα πικρίων	325	304, 308, 312, 318, 332, 339, 358		πρόχουμα	360
pilorum affectiones	1	368, 370, 382, 385, 390, 405, 410		προκινηρώσεως	285
φίλησ secula	315	413, 415, 415, 429, 443, 444		προγγογυθρία causa	316
pilorum generatio duplex	275	456, 459, 464, 472, 476, 510		prolapsus oculi	401
pili palpebrarum & superciliarum		532, 541, 548		προπταίνουός	320
276		plinianorum errorum occasio	511	προφολακτική	296
pili capitis, menti & pudendo /		plinius excusatur	ibidem	προπταίνωσις	400, 401
rum	ibidem	plinius sua ex Graecis transcripsit		propomata	298, 299
pilos corrumpentis pharmaca	20	plinij locus defensus	347 (341	proteus collyrium	110, 404
pilos attenuantis phar.	21	plinius medicis legendus & imi-		proteus excoxiatoriū empl.	127
pili usi & capre	112, 89	landus	349	πρωτοτομή	336
pillule unde diste	278	plutarchi locus explicatus	452	πρωτοτομής	332
pillula arborum	307	πνίξ ὑπερικόν	498	πρωτοτομήσας	505
pince animate	479	podagra quid	260, 545	prototomi caules	260, 529, 544
pinguedo arietina	496, 486	podagre curatio	266	prototropi passiam	70, 360
πίον	350	πόγων λυσιμύων	289	prudentiam in medico requiri	24
piperis genera	526	παιότας	511	προϋμμα	448
piperis scari	65	poliius similaginis	468	pruni folia	168, 461
pira Scauriana, Seneriana	519	polenta	344	prunorum nox Asiana	147, 448
pira Tarentina	528	polente flos & usus	317	pruna satina & sylvesteria	448
pira Tyrraniana	ibidem	polyarchion malagma	218	ψάχω	547
pira Terrentiana	243, 512	polychrestia que	205	pseudanchusa	539
piscium marinorum coria	367	polygonum & succus eius	388	psorica pharmaca	93
pissantibus & Pissileon	17, 300	polyide Sphragis	381	psoricum Eumeri	111
pissileon	45, 300	πολύπαιος	342	psilothra que	20, 21, 302
pista semina ferenda	339	πολύπαιος ἔτυμα	388	psittacinum Scribonij	105
pituitaria	308	polypus quid & eius cura	82	ψύδακας, ψυδακία	315
πίτυσις	305	polytrichum	289	psyrachiorum curatio	32
pityides quid, & ad quid utiles		poma Arantia	321	πτερύδια	588
452		poma Scandiana	529	pterygiorum oculi, remed.	115
pitulisma & πτυλίξ	514	πόμωλα προφύρω	372	pili qui dicantur	114, 406
πτύλος, πτύλισμα, πτυ-		pompholyx	88, 384	πτυλίσις	317
λίξ	514	pompholygis uires	255	πύσσω	337
ptysis	515	ponderum ratio ex Paulo	451	ptisana generatilis appellatio	ibide
placentie ex simlagine	465, 466	ponicum pharmacum	191, 483	πύσσω	485
πλακωνία τετυρωμένη	466	porcellus sine liene	255	ptolomei sterutatoria	56
πλάτυσμα σαμώματος	286	πώρεν inde	545	πύγμα, πύκτωρ	455
πλάξ	455	πορφύρεος ἰριον πύγμα	370	πύγμα ἰριον	523
πλάξ ἰριον	323, 370	πορφύρεον ἰριον	ibidem	pudendorum affectionibus meden	
plethora, plenitudo	35	πορβία quid	99, 396, 115	ita	255
plinius suggil.	278, 308, 340, 449	poterilii quid, & eius fructus	446	pulmo porci	118

INDEX

pulsatio per ueritas 141.514
 pulsus 463
 punicum nucleis carens 350
 punicorum duo genera 368
 putrefacta laconica, & ubi optima 394

purpurea Laconicae tomentis 97
 purpura Tyria 370
 purpurarum casuum 372
 pusillum 418
 pusillorum cura 32.92
 pusillum ulcerose 316
 πυύλιν 352
 πυύριν 466
 πυύριν 513
 πυύριν 368
 πυύριν πυύριν 387
 πυύριν 310.380.387
 πυύριν 452.454
 pyrethrum aceto conditum 631
 πυύριν 514
 pyriacaria uaria ibidem
 πυύριν 454
 πυύριν 526

Q Vadrans sextarij, librae, mine, & omnium rerum mensurabilium 545

Qadrans iugeri & sextarij 437

qualitates tactui obiecte 482
 qualitates secunde 64
 qualitatis expertis 89
 quartarius 434
 quinquiesfolium dici eupatorium 129.425

R

radix 224.517
 radix 285
 radix 300
 radix filio dicta 145
 radix dulcis sine medulla 177
 radicit dulcis succus ex Crete 182
 radicit dulcis usus 150
 radius 378
 rane dryophyte & calamite 406
 ranunculid 475
 rane harundinum 114
 raphani usus 320
 ratio 34

rationalis secta 120
 rancedo 296
 rance & rance 385.458
 recorporate, recorporata 285
 redunite 495
 reficentia uires 216
 refrigerationum modi 35
 refrigerandi modi 319
 refrigeratio per aquam frigidam, & refrigeratio per uires ibid.
 regina reparatrix 58.395
 regius morbus 518
 regius 480
 repellentia 141
 repellentium usus ubi 260
 repensaffiorum usus error 129
 resina fricta 263.351
 resina laguncularis & locularis 351

respiratio 463
 respirationis partes quomodo affluantur & capentur 370
 respirationis ex & respirationis 351
 respirationis per que fiat 30.341
 respirationis 311.480
 respirationis confectiones 257
 rhinarium 394
 rhinema collyrium 108.394
 rhinicon 58.394
 rhodacenes arbor que 345
 rhodacena mela, que & unde dicuntur 346
 rhodomelum 299
 rhodotium 299
 rhodis succus 142
 rhodus duplex 147.448
 rhodus culinaris, tinctorius, coriarius, syriacus, marinus, orientalis, eupatoricus, ponticus 448.449
 rhodus Eupatorica 181.471
 rhodus Pontica 181.471
 rhodus Syriacus 156.161.455
 rhodus & sanguis eius 114.407
 rhodus sedis & pudendorum remedium 255.311
 rhodus 277.310.355
 rhodus 378
 rhodus 402
 rhodus marinus 449
 rosacei facitiles 47

rosaceum optimum 35.87
 rosaceum absque sale & cum sale 120
 rosarum extremitates 101
 rosarum unguis usus 305
 rubi radices cortex 228
 rubi candidi fructus saluus 233
 rubificatoria 216
 rubia tinctorum 455
 rubus & rubus caninus 148.445
 rubus acidus quomodo curetur 214
 rubus acidus & nidorofus 499
 rubus an 311
 rubus uires 256
 rubus 465
 rubus 373
 ruytica medicamenta 94

T

tadacens 348
 taceum pro excolatum 298.471
 tadacens 298
 tadacens 298.527
 sacrificuli confectio 186.476
 taceus ninerius 318
 taceus colatorius 298
 tadacens Sagina 348
 sal in oleum aspersus 305
 sales condimentarij, theriaci, tannici, bluchi, Polletis 322
 sal doderacens 186
 saline in stomacho aggregate cu ratio 215
 saline multe significatio 167
 salamenta, & salamenta usque 140
 salinago salinarum 411 (4.41)
 salvia herba 194.485
 sandaracha 410
 sandaracha color floridus 397
 sandyx 409
 sanguinaria 388
 sanguis caninus 407
 sanguis draconis 367
 sanguinis ex uescia profusis res media 157
 sanguinis reiectiōis remedia 189
 sanguinis e naribus erumpentis res media 85
 sanguinis colores, & sanguinem non gelari 505
 sanguiculorum satura ibidem sanguificare

INDEX

significare	504	serum lactis	481	sorborum genera	528
sapa, siraon, defrutum, hepsma		sesquiythi pondus	536	sordes barbe hircine	13
eadem	146, 171, 443	sexcenties	320	sordium candabrorum usus	6
sapo Gallicus	122, 419	sexarii mensura et pondus	438	stransa	426
sapo liquidus, spissus, uenetus		518		stransus, eiusque species	545
420		ficcum ex charta	510	strawley	348
sarcophagus lapis	390	fientes uinum	161, 459	συνεχόμενα	310
sarcotica pharmaca	189	fideritis herba seu perdicium	440	stratula	310
σάρκωμα	305	357, 140		specillum aversum, aduersum	310
σκαλινός	363	σιόλη	444	387	
scatificatio talorum	241	σινιζήτης, σινιζήτης	499	specilla aurisuforia	355
scelotyrbe	513	signa ex ardore	35	specillum fusorium	310
σκαπτερόδον	286	signa ex frigore	36	specillum latum	310
σκαλινός	506	silices nigri	456	specillum fusorium	56, 57, 61
σχισίς, ή ή σχισίς afflicta	318	siligo et σιλιγίς	468	specillum duos nucleos habens	
σχισίς	473	siliginis flos ibidem		85	
σχισίς et χαίρος	473	siliginis usus	175	specillum concuum	91
scirtus	462	silique, et siliqua spina	296	σφίμα et σφίμα de eodem	461
sciuri adeps ad quid utilis	67	silique in recrementis uarum ad		σθάγνον	200
σκαλινός	385	seruata	298	σφαίρα σφαιροειδής	300
scobes eris rubri	85	σφαίρα σφαιροειδής	427	sphaericon collyrium	110, 404
σκαλινός hoc	463	similago	468	sphaeritis cupressus	11, 288
scelopendria	517	simplicium cognitio	169, 172	σφαίροειδής	508
secombraria	362	sinapi Alexandrinum	256	σφαίρα	315
Scribonius medicus	488	sinapismus	266, 549, 346	σφαίροειδής	383
Scribonij Largi libellus et loci		singultus quid, et eius causa	208	sphendarni siue acris radix	125
378, 379, 388		210, 497		508	
Scribonij pharmacum	246, 527	singultibus que conueniant	216	sphragis Neapolita	502
Scribonij atas	474	sinon sryacus	246, 478	sphragis confectio	193
scriptores rei rustice	532	siphtherii Aegyptij quid uocet	9	sphragis pastillus	196
scybelites uinum	173, 184, 466	siraon siue sapa	466	spicatum pinguentum	14, 294
scylacium pharmacum	102, 398	sison	478	σπίδα	418
σκαλινός	348	siti non affici egrum quid significat	207	spiritus acutus	236, 520
scitatum uis	200, 490	cat		spiritus sublimis	233, 516
secundiformis unde dicta	386	smegmata uaria	30	spissamenta quid	529, 530
sedantium dolorem scopus	175	314		σπίδα	426
sedis affectionibus et uitijs que me		smilax arbor	425, 486	solanchon	290
deantur	293	smilacis fructus usus	118	splenes et splenia quid	285
sedis ruge ac rime quomodo cu-		smilacis uirgulta	185	splenis alimentum	233
rentur	28	σπίδα quid	278	splenis affectionum remedia	267
sedis sensus subtilis	293	smilium emplastrum ruptorium	79	splenici proprie	234
σκαλινός	395	373		spodium	88, 384
selinusia terra	21, 305	solanum halicacabum	459	spongia marina	17, 300
selinum triticum	305	solum	352	spongia ocularis	66
σκαλινός	468	somnus altior	301	spongia aque	214
semina odorata	209	sonus uocis fractus	473	spongia maris	315
senecio	227, 509	sopor	301	spongiarum species quatuor	287
sepie atramentum	112, 78	soporifera confectioes	286	spongia eris, quid	287
septica uis	302	sorani Ephesius	283	squamine cutis	285
seris	124, 507	sorba Ephesina	248	σπίδα	302
serosi humores	278	528		σπίδα	412

station, stationem	403	strabonis loci	307.352.397	συμβιβαστικά quid	326
stiles & stiles eadem	565	stomatia preparandi ratio	147	συμπύβια	320.336
staphid'ay genera	431	stomatomet stomatosis squama	286	συμμετρία	313
σταφυλάει από σταφυλῶν, από		στρωτός	381	συμμετρίως	320
χύνει, εκ των σταφυλῶν	534	στριμασία	501	symphonos, pharyngum	186.476
σταφυλὴ quid significat	458	strigiles	355.358	symptomata, accessiones quid	326
staphis agria	308	strigmenta trium generum	373	σύμφυτος osium	350
staphyloma	401	strigmentitia crassitudo	375	symphyton petraem	307
staphylomatium curatio	114	στράβος, nux pinea, & arbor	173	συνολή	350
stiles & stiles	365	451.453		συνολή	385
stilis	358	στράβος	455	συνολή	326
stellionis caput	73.364	στράβος ἰσίου	323	συνολή	489.490
σταφυλά	534.460	struthion	143.131.315	συνολή	490
stip blati	429	stymmata stessamenta	61.297.355	συνολή	490
stereus bovis	240	σύνωδι	297	syriacum unguentum	45.253.332
stereus capre	241	συνωρία	444	536	
stereus caninum	156	subactum quid	4.282	syriacus succus duplex	455
stereus columbinum	59	sucus	186.476	σύριξ quid	401
stereus humanum	156	sucus, per excellentiam de Cyre		syricum	411
stidium	592	naico intelligitur	160.459	σύρις	299
σήμεσμάτα	302	sucus Cyrenaiicus	12.353.148	συνολή	325
stilis	358	450		συνολή	350
stiles herba	11	sucus lybicus	259	σύνολη συνολή quid	293
stiles αὐτοθῆτι	317	sucus medicus	148.353.403.450	συνολή	288
stiles	311.312	sucus Parthicus	553	σύνολη	323
stiles αὐτοθῆτι	312	sucus Syriacus	297.149.353	σύνολη ἰσίου	323
stiles Britannicus	110	440.455		σύνολη ἰσίου & συνολή	420
stomatice	513	succo corrupti	158	σύνολη ἰσίου	420
stomachus quid medicis	44.202	suffocatio uterina	498	421	
stomachi subversio quid ibidem		suffusiones	350.386		
stomachi subversionum remedia	207	suffusionis causa	43		
stomachi inflationis ex atra bile cu		suffusionis oculorum remedia	95.114		
ratio	215	suillata	409		
stomachi supinitas quomodo cu		suillationis sub oculis curatio	116		
randa	207	suilli pilli	2		
stomachi ardor quomodo curetur	208	sumach	449.455		
stomachi cruditatis remedia	214	superexcretiones	82		
stomachi inflammatio	201	surdausti, cornu curatio	74		
stomachi astus & dolorum & nau		sutura	54.350		
see cura	215	σύνωδι	359		
stomachi variis morbis affecti		σύνωδι & συνολή ἰσίου	389		
pharmaca. 200 & inde.		sycamina mora	415.445		
stomachica Galli	206	sycamora, & cur dicta, & ut na			
stomachici qui	44.203.499.503	scantur	445		
stomachicorum dieta	215	sycionum oleum, simplex & com			
stomachicorum compositio	149	positum	342		
stomatia que dicantur, cornu		sycosis	92.388		
scopus & varietas	140, & inde	συνκεύματα	282		
& 450		συνκεύματα	350		
		σύνωδι	308		

T	Abidin de fiant	537
ταγὰ κοφύρα, ταγὰ σαρ		
κόνου, ταγὰ σαρ		416
ταγὰ		343
tamariscus & tamarix		385
tamariscina nina		385
ταγὰ σαρ ταγὰ σαρ & ταγὰ		362.363
ταγὰ σαρ		363
ταγὰ σαρ		363.441
ταγὰ σαρ		396
taxus, & eius usus		456
tecolithos		541
testioria ulceri obducta		376
tepe pingues		148
temperaturarum pharmacorum na		398
ricitas		102
temperantis aquosa		102
temperatura crassa		101
temperatura media		310
tenta		310

τάρπη	302	toft articuloſum	269	uene ſectio ante purgationē quam	
terra Aethiopiae	113.406	toft uſuſque quomodo curandi	259	do conueniat	269
terra ampelitis, pharmacitis, ni-		tonſiſſe affectus	459	uena retro ſiniſtram auriculā	521
gra	406	tonſura per peſtinem uſus	293	uena ſub lingua	162
terra ceromatum	374	τοπος & τοπικός	277	ueneroſa à lethaliſſis quo diſſe-	
terra nigra & ſigilina	77	tormina inteſtinalium	528	rant	142
teſſe Attice & Romane	357.65	τορνεύματα	378	uermes terreni	343
teſta Callinae	132.430	torquilla	395	uermiculi uernales	422
teſtudinis ſanguis	27	toxicum ledumum	292	uernix, & quid ſit	281
τελερεν, τελερενός, τελερενός /		τραχύματα	388	ueteres egri	515
μαία, τελερενός, τελερενός		tragos	473.338	ueterinus	301
419		τραυματικά	412	uetaſtatem pharmaci obſeſſe	4
τελερενός	419	trogodyte	292	uictoriatuſ	402
τελερενός	543	τριανθέρεα, τριανθέρεα	543	uigilantiū cauſe ſunt fluxiones	
τελερενός	434	τριανθόν	378	180	
τελερενός pro τριανθός	469	tricca	343	uinum dulce	369
τελερενός δινο	296	trichiaſis quid	99.114	uina aquoſa	38.322
τελερενός	61.355	τριχονόμος τριχονόμος	395	uina caſtigata & caſtrata	398
τελερενός & τελερενός		trichomanes	532.89	uina greca ſaſa	404
404		trigonus paſtilluſ	485	uina integra	ibidem
τελερενός	462	τριμυα	466	uina Romancia	431
thapſia uis, & uſus	3.4.266.549	τριπτάκος	352	uina dulcia	145.226
279		τριπτόν	434	uinum Cnidium	368
thebeae emplaſtrum	30	tritici ſuccuſ	113	uinum Hiſpanum	524
Thaleſſerum collyrium	109.403	τριφύλλος quid	487	uinum maris expert	112.404
thaleſſerum, & thaleſſerum		τριφύλλος & τριφύλλος quid	507	uinum Mendicum	102
θαλεſſία	360	τριφύλλος qui fructuſ	508	uinum non excolatum per ſaccum	
theopriti locus	447	τριφύλλος colliria	388	537	
theriacae deſcriptiones	526.527	τριφύλλος	335	uinum non ſaccatum	ibidem
theriacum uinum	173.176.184	tryphtrum collyrium	103	uinum pramiſum	184.475
466.469		trypheros paſtilluſ	192	uinum ſpicatum	241.524
therium collyrium	104	tumorum ſacici genera	417	uinum nardinum & nardites	
therinum uinum	173.466.469	tunica oculorum	90	241.524	
thiariſis	478	tunica agnata	91.385	uinum ephreſium	241
theſſiana Apolloni	187.478	tuſile pharmacum	237.521	uinum roſatum	84.380
theſſiana conſectio	196.478	tuſſis remedia	186	uiole albe	166.461
theſſiaſis aſini	387	tutia	384	uinacei	459
theſſaliorum auxilia tria	443	τύλωση	388	uipere adeps	97
thiſus & thiſus	350			uirgily locus non probe à Plinio	
thiſus & thiſus	514			expenſuſ	410
thiſidacine & thiſidex quid	36			uitia	316
thus integrum uoſectum	119.424			uitaligo alba	1276
thus maſculum	549			uinerra	513
thyani	364.441			uina uox	140.441
thiſis	381			ulcera ſenium	515
tinea pro tenijs, & tinea uelium				ulcera quibus egre ſenſcunt	85
343				ulcerum cura eadem genere	
tiularis	388			388	
τιπάρης ἀκτινός βιος	303			ulcerum pura aqua manārium cu-	
timolites uinum	173.466			ratio	112
timolites duplex	466				

INDEX

abyssippo emporium	367	nolunose stomachi subuersiones	unarum seruandarū ratio, earumq;		
uncia quantum contineat	96.150	que dicantur	209	asseruatarū facultates	533
212.450.391		nomitus utilitas	261	unde conuersio	498
uncia usus	543	urecolaris	440		X
uncia mensurales	201.519	urgens quid Galeno	182	φενίζουσι, φενίζω	352
uncia miseralis & pōderalis	491	urina asini	163	φραγ, φραγία	309
uncia diuersitas	497.498.523	urina cameli	27	φραγρίαι	365
uncia latitudo & longitudo	426	urina canis	18	φυλονόματα	296
uncia argenti ualet drachmam		urine humane potus	359	φυρδύραι	565
auri	392	urine suis fere usus	69.359	φύμα δλονίαι	383
uncialis nummus	392	urforum pili	289	φύσις	ibidem
uuido δυνωδύαι	340	ustio per cauteryum	457	φύρα	358
ungues rosarum	398	ustio per ferramenta	346	φύω	547
unguentum Aegyptium	51.264	uteri suffocatio; eiusq; cura	256		Y
unguentum arabicum	73.364	uteri suffocatio	355	ὕδωρ γαλακτώδες	482
unguentum Mendesiū	41.51.327	uteri affectionibus que succurrat		ὕδωρ μέν	352
unguentum casie	358	una Taminiā	308 (256	ὕδωρ	378
unguentum Mezaleū	52	una morbus, & quis morbus	158	ὕδωρ υἱοῦ	350
unguentum foliatum & spicatum	14.193. 294	160.450		ὕδωρ ἑλμαῖα	466
unguentorum imparitas	124	una passa Rhodis	198	ὕδωρ ἑλμαῖα	395
uox intercepta & rauca quomo-		una passa	223	ὕδωρ φάρμακα	409
do curetur	171	una passa exacinata	176	ὕδωρ φάρμακα	498
uocis studiosi errorem sepe in-	465	una passa alba	135.432		Z
ducit	190	une acerbe succus	155	Zea	239.511
uocis organa que	171.463	una urfi que	191.483	ζέον υἱοῦ	356
uolema poma & pira	529	una cur dicta affectio, & quid sit		zigeros casta	61.356
uolubilis	440	261.458.459		Zingiber collum aceto mullso	333
		unarum genera	448	zingiber pro myrrha	379
		une ollares & ex olla	534		FINIS

CLAVDII GALENI

PERGAMENI DE COMPOSITIONE

PHARMACORVM LOCALIVM SIVE SECUNDUM LOCOS, liber primus Iano Corna

rio medico, interprete.



QUOD non solum affectus qui curatur curationem ipsam indicet, sed tum ipsius aegri temperamentum, tum affectus particula natura, non parum illam simul demonstret, id ipsum sane ante in curandi methodo docuimus: quemadmodum etiam quomodo quis ex simplicibus medicamentis per se compositum aliquod faciat, compendio quidem in illa ipsa methodo, fuit uero in septem libris ante hunc item editis, totius disciplinae adhibita ratione ostendimus. Nunc uero quomodo quis per se ex methodi ratione phar

macorum compositiones prepararet, ad singulas corporis partes convenientes, et quomodo a prioribus medicis inuentis recte utatur, percurrere propositum est, a capite initio factum uelut omnes etiam ante nos Medici fecerunt. Accidit autem capiti plurimarum affectionum cum reliquis omnibus partibus communes: uerum capillum affectionem cum paucis communem habet: propterea quod pilosum esse iuxta primam rationem non multis inest. Generatio enim pilorum eadem est quae terrae nascentium, quemadmodum in libris de temperamentis est demonstratum.

Quemadmodum enim ex istis quaedam arte & arbitrio agricolae; quaedam uero iuxta naturales causas proueniunt. Eodem modo & in animalium corporibus contingit, quum aruo quidem alicui triticum, aut hordeum, aut aliud quoddam cerealium seminum, in se insita habenti, caput adsimiletur. Alijs uero herbis quae iuxta humidiores regiones proueniunt, reliqui totius corporis pili similem generationem habeant: non enim secundum primam rationem, sed per accidens quoddam natura eos generare solet. Et pili quidem palpebrarum ac superciliorum non paruam utilitatem animalibus exhibent, uelut alibi est ostensum: menti uero & pudendorum pili minoris utilitatis gratia producti uidentur. Quapropter etiam affectiones pilorum in oculis & supercilijs, praecipue nos ad curam sui ipsarum impellunt: secundum uero locum capitis capillorum affectiones habent, deinde menti & pudendorum. Sunt autem pilorum affectiones, perfecta perditio, & coloris ipsorum alteratio, uelut in uirilagine alba, Leuce graecis appellata, fieri consuevit. Ad haec etiam in alopecijs & ophiassi non modicum atque indecorum detrimentum simul capillis accedit. Quidam igitur promiserunt ueluti has, sic etiam incipientem caluiciem, se ne auferat prohibitu: sunt autem qui hoc impossibile esse dicunt, itaque ad alopeciarum & ophiassis curationem progressi, pharmaca scripserunt per quae perfectam ipsarum sanationem pollicentur. At uero plerique medici ex ipsorum usu aliquando non solum successu longe frustrantur, sed etiam uelementer nocent, ut affectio ipsa incurabilis reddatur: quod sane ipsis etiam citra alia pharmaca contingit, quibus citra methodi rationem utuntur. Ego uero id quod Hippocrates praecipit, in artis operibus facere semper annitor: nimirum ut quod auxilij loco adhibetur, uelut ille scripsit, iuuat uel certe non noceat. Quod uero pharmacorum citra methodi usus non solum non prodest, sed frequenter etiam obstat, ex illo sane discere licet, iam uero ordiendi quod proposuimus tempus adest.

De Alopecia, Caluicie & Ophiasis.

Cap. 1



Vemadmodū plantæ aliquæ ob humoris inopiam ressecatæ corrumpuntur, aliquæ uero ob humoris alieni ab ipsarū natura attractionē: eodem modo & capilli aut propter humorū ex quibus nutrirī cōsueuerūt inopiam, aut propter eorundē uitiationē corrumpuntur. Et propter inopiā sanē humorū caluicies cōtingit, propter uitiatos uero humores Alopecia, & Ophiasis. Vnū quidem ambæ secūdam morbosam affectionē malum, nomina autē iuxta figurā habentes diuersa: serpētis enim similis læsa capitis pars in ophiasis apparet. Alopecias autem ob id appellatas ferunt quod uulpisbus frēquēter accidunt. Nos autem propter quid sic appellari conigit non quærimus, unde uero oriātur causam quærentes, eam ipsām humorum uitiationem redundantiam comperimus. Quales autem tandem sint corrupti humores, ex colore cutis capitis cognosces: aliquibus enim mutata albidior apparet, aliquibus nigrior, aut pallidior. Quare in istis primum totius corporis purgationem adhibebis, aut pharmaco pituitā ducente exhibitō, aut quod bilēm pallidā, aut nigram trahit, cōiectura redūdantis humoris ex colore cutis facta. Ego uero semper per hieram purgaui, aliquando ueratro nigro adiecto, ubi atq; bilis expurgare uolui humorem, aliquando scammonia, si amara bilis purganda esset, si uero pituitosorem exuperare cōiecissēm humorem, nihil ammisit. Tales enim præsertim ex capite, hiera ex colocynthide purgare consueuit, simulq; cum his etiam alios quosdam humores, etiam si scammonia, aut ueratrum nigrum, aut epithymum non addatur. Quin & ex aloë catapotia quæ tum scammoniam tum colocynthidem admixtam habent, commodius ita affectos purgare solent. Cæterū post totius corporis purgationē, Apophlegmatismis pituitam ē capite detrahēre præstat, atq; deinde lo calibus auxilijs ut de quorum compositione dicturū me hoc opere recepi. Oportet enim uelut in alijs, sic & in his affectioni mederi, cuius accessio siue symptoma est uitiatu capillus. Siquidem igitur uitiatu humor circa unum locum fuerit collectus, scopus medendi erit ut is quā celerrime euacuetur, prius quā ab ipso cutis in quendam malum habitum deducatur: tātum ut etiam si quis uitiatum ipsius humorē euacuet, & boni sanguinis influxū præparetis adeo etiā a malo in ipsa habitu prius inducto corrūpatur. Si itaq; uitiatum humorē in cute euacuare uolueris, discussorijs pharmacis opus habebis. Atqui cōtradiceret forsan aliquis, cōmunem scopū in omnibus affectionibus quæ ex influxu humorū fiunt, cōtemni ac subuerti ratus: repellī ipsos debere asserens partem refrigerando ac adstringēdo, non attrahi calfaciendote ille autem discussoria omnia facultate calida. Et certe affirmamus nos quoque uere hæc dicta esse. Incipientes enim ophiasis & alopecias per huiusmodi pharmaca prohibere oportet ne augeſcāt: non tamen principium ipsorum alopeciam aut ophiasin appellari, sicut neq; pſoram aut lepram iam appellamus quæ ex lichene orditur. Ego itaq; quemadmodum nostis, etiam iam factas alopecias aliquādo sola purgatione sanauī, nullo amplius medicamento post ipsam ad locū affectū admoto: ut autem ampliorem eius rei experientiam facerem, ex eiusmodi quopiam successu sum impulsus. Adoleſcens quī ipsam bonæ habitudinis & exercitijs adſuetus hanc affectionem in capite habebat erat autem satis familiaris mihi, ut dietam ipsius quā iam per tres aut quatuor menses usus erat, probe nossem: explebat enim se quotidie fermē fungis. Hūc itaq; sola hiera ex colocynthide purgaui, bis in quinque diebus: in prima sanē purgatione quatuor ex ea drachmīs, in secūda quinq; exhibitis. Prius quā uero ad has purgationes peruenirē, catapotia ex aloë undecim ei præbui, ciceribus ferē magnitudinem parem habentia. Habent autem

catapotia

cataportia hæc: Colocynthidis partem unā, aloes & scammoniae utriusq; partes duas, his ego unā partē succi absinthij addo. Antea uero etiam mastichen chiam & bdelium adieci. Hoc enim modo Quintus utebatur. Verum propter quid ea resecerim postea, alio sermone explicabitur, quem in cōpositionis purgantium pharmacorū libros referuo. Quū igit post has tres purgationes hominī pituitam ē capite deducere per apophlegmasmos uellem, atq; deinde pharmacū quoddam ad affectū partē adhibere, conigit ipsum de repete in profectionem quandam ablegari: in qua quum boni succi cibis, de quibus a me instructus erat, uteretur, post dies forte uiginti redijt ab affectione circa capillos penitus curatus. Ex hoc sanē successu incitatus ego quū in alijs eandem curationē fecissem, expectaui ut uiderem quid citra pharmacorū ad caput adhibitionē, esset sequuturū. Curati sunt itaq; omnes hoc modo, non tamen in iam inueteratis huiusmodi experientie periculū feci. Difficiliter enim eluūtur in his cuni impactū, serosi humores, multo uero magis in his quibus iam ipsa cutis ad malum habitū peruenit desperanda est per solas purgationes curatio. Atq; hæc quidē necessariō præfatus sum. Cæterū de pharmacis affectioni huic cōmodis iam dicere incipiam. Euacuatiua igitur omnino esse oportet ipsa affligētis humoris, uerū euacuare nihil potest quod non discutiendi uis sit præditū, eam uero uim citra calefactionē habere non potest. Sed si quidem ex uehemēter calfacientium numero fuerit, cutem exuret; quod si uero nō urat, in principio quidem præclare iuuabit, progressu uero temporis cuticula capitis super resiccata talis euadet, qualem in caluis uidemus. Nō tamen simpliciter moderate calidū esse pharmacū oportet, intra uidelicet fines scopi propositi retentum. Nam & tenuium partium ipsum esse cōuenit, quod sanē in altum sit progressurū, unde radices capillorū generationis sue principium habent, & uis qualem diximus præditū: propterea quod crassior sit & durior capitis cutis, & ob id medicamēto opus habeat efficaciorē. Itaq; si supra hoc quod uitiatos humores discutiat, etiam idoneum sit ad bonū sanguinem adtrahendum, uelut est thapsia, optimum sanē pharmacū est censendum. At uero quum thapsia longe calidior sit quā affectioni sit ex usu, merito eius adhibitionē perse uitamus: exulcerationes enim in cute excitare cōsueuit, & omnino quosdam inflammatoris tumores, quia propter necessariō quædam quæ eius uehementiam mitigent admiscemus. Id ipsum uero ceratum ex oleo apparatus præstare potest. Sit autem tenuium partium oleum quale est Sabinū, præstat item moderate esse uetustū. Ad hanc rem cōfert item oleum cicinū, quod mox ab initio eiusmodi naturam habet, quali præditum est Sabinum inueteratū. Quod si neutrum horū ad manū sit, ex reliquis græcis oleis citra olearū germīna apparatus quodcūq; tandem admiscemus, præsertim si sit uetustum. Perspicuum itaq; esse opinor oleum ex Iberia, aut Hispania, aut quomodo cūq; quis eam appellare uelit, fugiendum esse, itemq; quod ex oliuis nondum plenē maturis apparatur. Omo tribes & omphacīnū a græcis appellatū. Vtus sum autē & sola thapsia uehementi eius facultate larga aquæ amixtione exoluta. Verum nosse operæpretium est circa thapsiæ usum, maximam differentiam esse recentis ad uetustiorē. Vis enim huius pharmaci post annū multū exoluitur, atq; amplius adhuc post duos annos, ausimq; ferē dicere inutīlē penitus eius usum ad triennū progressæ. Eius igitur ætatis animaduersione habita imparem aquæ modum admiscebis. Ad recentem enim plurimum aquæ addes, eamq; sæpe singulis diebus illines: ad eam uero quæ per tempus imbecillior reddita est, minus adfundes, quo & ob crassitudinem diutius adhærere, & propter liquiditatē non statim desuere contingat. Quin & quum compositum pharmacum paras quod thapsiæ amixtione re-

quiris, quale est quo ego assidue utor, non æquale semper pondus thapsiæ ammi-
 scebis, sed quantum pro tempore ætatis etus cõuenit, tantum ipsum pondus auge-
 bis. Ceterũ de hac tota re paulo post diligẽtius quum ad cõposita peruenero ex-
 plicabo, ubi prius simplicia pharmaca affectioni huic familiaria recensuero. Ete-
 nim ex his quæ fortiter calfaciunt est euphorbiũ: quæ autẽ sufficenter, laurinum
 siue oleum siue ungentũ, aut quocũq; tãdem nomine id appellare uelis. Nam &
 his unã cum calfaciendi ac discutiendi facultate inest uis adtrahendi sanguinẽ in
 locũ ab ipsis calefactũ. Licet igitur ipsis per se uti, euphorbio quidẽ in oleo trito
 ac leuigato, laurino uero solo citra alterius ammixture illito: si tamen nimis flui-
 dum appareat, parum ceræ addatur. Quũ uero multo calidius sit receptus euphor-
 bium, si quidẽ eo quod duorũ aut trium annorũ est uteris, ad librã unam rhoma-
 nam olei, euphorbij unciam unam insicies, quæ sanẽ duodecima olei pars existit.
 recenti uero euphorbio parce utaris, q̃ minima eius parte primũ ammixta, aut
 etiã ceræ uncia una insuper addita, quo uideas quãtum hominẽ excalefaciat: lice-
 bit enim tibi ubi rursus uti uoles, denuo addere siue oleũ siue cerã malis. Eodem
 modo etiã thapsia utendum est, omnibusq; fortibus medicamẽtis. Peccatũ enim
 infra modũ nullum detrimentũ affert, supra uero aliquando exasperat & exulce-
 rat cutem, inflammationeq; suscitãt. Atqui etsi in sequẽtibus cõpositis pharma-
 cis quãdoq; euphorbiũ aut thapsia scribatur, pondus ipsorũ in uigore existentĩũ
 non ueterũ intelligere oportet. Valde enim uetusta omnino fugere oportet, non
 solũ in his pharmacis, sed omnibus etiam alijs, quæ uidelicet succi & liquores, &
 flores, & folia, & fructus, & radices, & semina existunt, quãdo sanẽ etiã Metalli-
 ca ipsa per longioris tẽporis situm uires suas amittant. Vtimur tamen quibusdã
 pharmacis uiginti aut etiam triginta annorũ, propterea quod nondum uergen-
 tem omnino habeãt etatẽ: alia enim altam tum uigentẽ, tum uergentẽ seu inclina-
 tam etatẽ habent, atq; etiã si ita dicere libeat senectam. Vnũquodq; aut propritũ
 uigorem his qui ea sepe uiderũt indicat, tum ex odore, tum ex gustu, aliquando
 etiam ex colore, & secundũ crassitiem cõpage. Quemadmodũ in alijs omnibus
 pharmacis non solum quòd calefaciant operãpretiũ est cognoscere, sed & quan-
 ta distãta quotoq; ordĩne id faciant. Sic item in his quæ alopecijs cõferunt phar-
 macis nosse oportet quòd calidissimũ quidem ex eis est euphorbium, Eo autẽ mi-
 nus calidum est thapsia, post thapsiam autẽ sinapi & nasturtiũ. Iuxta aliũ autem
 modum limnitis nulli horũ secundũ est, habet autem præter hanc duas alias ap-
 pellationes: nam & Adarcium & Adarce uocatur. Post hæc succedunt sulphur,
 & nitri spuma, ipsumq; nitrũ molle ustũ, & quod Berenicariũ appellatur, quem-
 admodum & Aphrositũ album, leue, ac laxũ, quod nullam in se terream asperi-
 tatem habet. Deinde ueratũ utrunq; & crucæ semen, & laurini siue oleum siue
 ungentũ uelis appellare, ad hæc alcyonium utrunq; ustum & nõ ustum: præstat
 tamẽ ustum: & calami radices itemq; cortex, ambo usta. Quin & pix liquida, &
 cedrinum quod aliqui cedriam appellant, & murium sterco, ursæq; adeps: præ-
 stat autem si uetustior extet, quanquam etiam hyenæ, leonisq; ac pardalis ac an-
 feris adipēs conueniunt, & quicunq; tenuiũ partiũ substantiã habent, quo prom-
 pte in cutis profundũ penetrare queãt, atq; ad radices usq; capillorũ pertingãt.
 Sed & amygdalæ amaræ totæ usq; commodæ sunt, & thus aceto acerrimo suba-
 ctum. Subactum autem intellige quum pluribus diebus & maxime ad solem fre-
 quẽter cum acri aceto sit cõritum. His itaq; omnibus pharmacis licet utaris, ad
 fortia quidem cerato liquido addito, debilibus uero oleo laurino imbutis. Et in-
 ueteratas quidem ac difficulter curabiles cum fortibus per sanare conaberis, in-
 cipientes autem & paruas cum debilibus.

Ad Alopecias cōposita.

CAeterū pharmaca cōposita, quæ partim a prioribus medicis qui alicuius æstimationis fuerunt; magnopere sunt laudata, partim uero à nobis ipsis per longam experientiam sunt examinata ac probata, eiusmodi existūt. Euphorbii, thapsiæ, laurini, singulorū drach. ij. sulphuris uisui, uterari utriusq; drach. unā, neque refert albo an nigro ueratro quod ad manum sit utaris. his ammiscui ceræ drach. vi. laurino aut cicino aut ueteri oleo liquefactas, utereq; hoc ut fortissimū pharmaco, ad inueteratas & ægre curabiles alopecias. His etiā aliquādo nasturtij drach. unā, aut alcyonij uisui drach. i. ammiscui. præstat autem in hunc usum alcyoniū quod durius est & magis asperū. Quod si thapsia nō adsit, pro ipsa tantum pondus seminis nasturtij aut erucæ addes, aut ipsum adeo nasturiū. Si uero laurinum non habeas bonum, picem liquīdam adde; laurinum nanq; picem si quidam non multum excellit, thapsia uero reliquorū respectu maximum excessum habet. Hoc sanē pharmacū omnium quæ ad hanc affectionem efficaciter faciunt fortissimū & ualentissimū est, quādo uidelicet affectio ægre recipit curationem. Quæ enim parua est & incipiens etiamnum, sola purgatione sanatur, & per singula quæ recensui simplicia uisita, laurino aut cedrino, aut liquida pice, aut cicino uel ueteri oleo excepta. Ammiscui etiam aliquando mel pro cerato, minori tamen copia & pondere, neq; peius euasit pharmacū. Porro quæ ex adipibus cōponuntur modica itē thapsia ammixta, similiter profunt, præsertim si euphorbium & adarciū addatur. Sit autē adeps trium generū leonini, pardalij, & hyænæ, cuiusq; pars una. Si uero hyænæ adeps nō adsit, sufficit præsentibus reliquis duobus uti, anserino ammixto. Si uero omnes quatuor habeas, simul omnes miscebis, addito insuper si adsit ursino. Ad totam uero eorū molem duodecimam thapsiæ aut euphorbij partem addere satis est; aut si omnino fortius facere uelis, ambō addes: nam & per experientiam hæc ipsa pharmaca efficacia sunt iudicata. Maioris enim experientiæ habendæ gratia, petentibus subinde medicis à me amicis, singulis aliud atq; aliud eorum quæ experientia cognita habui, rudī modo digestum exhibui, & reperta sunt sanē plurima ex eis optime conducentia. Verum ante omnia methodi meminisse oportet circa eorū usum, quæ cōmunis in omnibus præsertim fortibus pharmacis existit, quare etiā sæpe eius mentionem facio, utpote in qua magna omnino uis sita est. Qui enim singulis fortibus pharmacis utitur, in principio quidem ipsa molliora adhibebit; ammissione uidelicet eorū quæ uires ipsorū exolunt; qualia sunt oleum & cera, & ex simplicibus quæ diximus debilia, uelut est thus, & calami cortex ac radices exustæ, & amygdalæ amaræ, & quæcunq; eius generis existūt. At uero post primū usum quum iam secundo adhibere uoles, intueri oportet qualem alterationem in affecta partícula prius admotū pharmacū fecit, atq; illius respectu aut uehementiam facultatis eius lenire, aut augere. Velut in hac quam iam tractamus affectione, primum quidē capillos nouacula tollere oportet, deinde affectā cutem per linteolū neq; asperum neq; molle nimis cōfricare, ac uidere ad quantū ruborē per huiusmodi molimen ac confectionē peruenit. Magnā enim spem successure curationis tibi injiciet, si per modicas defrictiones rubescat, quæ moderate affectionis significatio existit. Si uero per multas tandem, grauiorē tum affectionē, tum curationem indicat, præsertim quū quædā cuticulæ etiā si multū cōfrices non rubescant. Manifestū igitur est has omniū difficillimē curari, sicut cōtra facillimē, quæ facile rubescunt; quæ uero inter has mediō mōdo habēt, tantū inter se differūt, quantū uel ad pessimas uel moderatissimas accedūt. Atq; hæc quidē obiter & extra propozitū dicta sunt, quanq; non omnino præter rem sint. Rursus itaq; ad id quod pro-

positum erat reuersus methodi te cōmonefaciam quam usus pharmacorū requirit. Post primam igitur pharmaci culus usum elegeris adhibitionem, intueri conuenit primum quidem An etiam ante confrictionem cutis coloratior appareat; deinde autem an cum pauciore quā prius frictione, aut an cum equali quidem, magis tamen quā prius rubicūda fiat. Præ omnibus uero animaduertere oportet ne in fortium pharmacorum admotione cutis ultra quā conuenit concalescat, id quod tum ex colore ipsius, tum digitorū tactu deprehendes. Colore namque flauior apparebit, & digitorum cōtactu satis calidam cognoscēs. Horū itaq; animaduersionem habere oportet; periculum enim est iterum atq; iterum recepto eorū usu, cutem exuri. Quare ad molliora transeundū est, aut eodem utendum quidem, sed ceratū, aut adipis, aut liquoris cuiusdam oleosi ammixtione, ui ipsius exoluta. Utēdum est & olei calidi dulcis irrigatione, & cataplasmate ex pane, fermentisq; & scarificationibus ac cucurbitis, & ceratis, uirium item refectrice diæta. Cæterum perseverantē affectione utendum est assidua rasura, & rubificatione ex sinapi uelut est prædictū, itemq; frictionibus præscriptis, & sequentibus diebus illita pice aut oleo cedrino, & post confrictionem scarificationibus. Quidam uero a ciculas colligantes hoc modo ut aciem ad cutem uergentem habeant, per ipsas cutem compungūt. Verum post rubificationem per desfrictionē inductam, & post scarificationem, pharmacis quæ ex alto euocare ac meatus transmutare possunt, *Metasyncritica* Græci appellant, utemur. In omnibus aut cōmunis scopus hic sit, ut in aere calido pharmacum ipsum adhibeamus, & maxime si fieri possit in loco insolato, qui non habeat auram ipsū persistantem, hyemis autem tempore præstitit in balneo his pharmacis uti.

De pharmacis compositis ad Alopeciam affectionem à senioribus me medicis conscriptis.

Heras quidem igitur in serula iuxta dictionis seriem sic scribit: Alcyonium quod asperius est ustum ac cum oleo tritum ac leuigatum loco illinito, sit autem oleum maxime ex lucernis acceptum. Hæc quidem sunt Heræ uerba: Verum nosse oportet medium esse uiribus hoc pharmaci, & propterea ad medias magnitudine alopecias curandas sufficiens. Moderatum equidem pharmacum est si calami radicem aut corticem, aut amygdalas amaras, aut eius generis quipiam ustum cum oleo cōmittas. fortia uero sunt quæ ex euphorbio & thapsia & adarco apparantur. In medio uero istorū est alcyoniū ustum, sed & ipsum moderatius redditur oleo ammixto, fortius uero liquida pice aut laurino affuso. Miscetur itē prædictis adipibus, & sanè ego cuidā qui ad hanc affectionē urfino adipe usus erat, nec quicquā profecerat, alcyoniū ammiscere consului, à quo postea breui sanus euasit. Cæterū oleū lucernarū non ob aliam rationem aptum est, quā quod magis tenuium partium existit, id quod ipsi ex lucerna in qua ueluti coquitur accedit, sitq; tum ueteri, tum cicino adsimile, ueluti si etiā alias ad ignem oleū uelis calefacere. Itaq; & sordes quæ in candelabris liquido luto similes gignuntur, his qui apud nos ruri degunt cognitæ sunt, ad ulcera in medio digitorum per dum curanda efficaces, quæ ulcera frequenter illis oboriuntur propter illuuiem & negligentiam perluendi ea singulis diebus. his itaque sordibus lutosus confusus cuidam rurali alopecia quam scalptam mihi ostenderat illinire, unā cum assidua loci rasura: qui sanè ab ipsis persanatus, etiā alios tentauit hoc modo curare, utpote qui putaret omnem alopeciam ab hoc pharmaco posse curari. Verum ego quum moderatā eius affectionem essem intuitus, speraui ipsum quidem per illas sordes sanitatem consequuturum.

Aliud

Aliud compositum pharmacum Heræ pueris aptum.

Aliud autem deinceps pharmacum Heras post præscriptum, iuxta seriem di-
ctionis hoc modo scripsit: Seminis erucæ, partē .i. nasturtij, partem .i. nitri,
partē .i. In aliquibus aut exemplaribus simpliciter scriptum est. Erucæ, partē .i. nastur-
tij, partē .i. nitri, partē .i. cōtritū picē liquidā affunde, et loco prius cōfricato impo-
neatq; ubi abstuleris pharmacū, locū spongia calida imbuta extere: auferes autē
his per diē, & in pueris maxime efficax conspicitur hoc pharmacū. Fortius enim
est priore. Verū inueteratā & ægre cedētem alopeciā nō curauerit, quod ipsum
etiā Heras indicat, qui in pueris ipsum maxime efficax adscripsit, hoc est in cor-
poribus molli cute præditis, Ex huiusmodi enī uisitati humores facile discutiun-
tur. Habent autem consimilem pueris cuticulā eūnūchi & mulieres.

De his quæ Crito ad Alopecias conscripsit.

Crito uero in tertio libro eorum quæ ad corporis ornatū pertinent, sic scri-
psit: Ad affectionem alopeciā appellatā quæ capillos deuastat, & cōmuni-
ter deformitatē inducit, sub scriptis cōpositionibus utendū est, ut Heraclides Ta-
rentinus tradit: Amygdalas amaras cum corticibus uistas ac tritas aceto excipe,
modico item affuso melle: usu uero expetente loco per mundū linteolum præfri-
cato, assidue illine. Prodest autem maxime etiā assidua rasura antequam pharma-
cum imponatur. Aliud quo Moschus usus est: Herinaceorū marinorū
testas exustas & aqua subactas locis præfrictis impone. In quibusdā exemplari-
bus nō aqua, sed adipe urfino excipi debere Herinaceorū cinerem reperi, quod
mihi magis placuit, hoc enim modo efficacius redditur. Aliud, Calami
radices uistas adipe urfino excipe atq; impone. Aliud, Thapsiæ corticē
tritum cum aceto imponito. Aliud, Chameleonis radicem cum aceto di-
ligenter tritam imponito. Hæc præfatus Criton deinceps ita scribit. Quod si ue-
ro perseueret affectio, subscriptis cōpositionibus utendum est, quibus uerbis
planè indicat per præscripta medicamenta moderatas affectiones sanari: itaque
deinceps quæ ad horrores affectiones conducūt scribit, quæ iuxta seriem dictio-
nis ipsius hoc modo habent.

Quæ Heraclides ad inueteratas Alopecias descripsit.

Ad alopecias uelut Heraclides Tarentinus tradit. Orefini ad alopecias in-
ueteratas: muscerdæ drach. .ii. thuris drach. .ii. aceto acerrimo dissoluta præ-
fatis locis illine. Aliud, Herinaceorum marinorum una cum testis exustorum
drach. .ii. gallarū omphacitidū, tantundem, amygdalarū amararū uistarū, tantun-
dem, muscerdæ drach. .i. aceto dissoluta & probe trita imponito. Aliud Ore-
fini, Pilorum urfi ustorum, adiantū usti, radicū calami ustarum, foliorum sicci
ustorum, panniculi Cicij usti, singulorū æquales partes adipe urfino & cedria
excipe. Vius uero tempore, loco foto & per sicca folia cōfricto, ac per nitri exten-
so, pharmacum quotidie illine. Quod si cutis superficies exulceretur, ceramū ex
oui luteo impone, & farinarum tritici ac hordei succum recentem superline.
Aliud Orthonis Siculi a commodatū, Cineris ranarum minimarum in ollula
ustarum, partem .i. muscerdæ, ueratri albi, radicis calami ustæ, piperis albi, singu-
lorū æquales portiones aceto excipe, & ad præfrictū ac præratum locum utere.
Aliud, Cineris ungarū caprinarum ustarum, succi thapsiæ, alcyonū, muscer-
dæ, spumæ nitri, myrrhæ, piperis albi, zingiberis, singulorū æquales partes pro-
be tritas felle caprino excipe.

Quæ Cleopatra in libro eorum quæ ad corporis ornatū pertinent scripsit.

In libro Cleopatræ de ornatu corporis, ad alopecias descripta sunt pharma-
ca, quæ iuxta illius dictionis seriem hoc modo habent: Sandarachā tritam lar-

gog; uisco quercino exceptam, & in linteolum inditā, loco per nitrū prius præparato imposito. Ego uero etiam nitrī spumā ad prædictā animāscui, & egregie efficax pharmacū reperi. Aliud. Scillæ drach. i. uetamī albī drach. i. ex aceto trita prærasis & nitro cōfrictis illinito. Aliud. Sinapis drach. unā, nasturtij drach. unā, trita ex aceto, prærasis & nitro exteris locis imposito. p̄stat aut locū uulnuscū impactis scarificare. Aliud. Corticis calami drach. iij. spumę nitrī drach. iij. pice liquida exceptis utere. Ceterū locū assidue radere oportet, & cum linteolo cōfricare, sic enim quā celerrime pilos producet. Aliud. Mā scarū capita contrita affrica. Aliud. Muscerdas tritas illine, loco prius per linteoli affricatū subruento reddito. Aliud. Amygdalas amāras unā cū corticibus exustas cum aceto & melle cōtere, & loco per defricatōē subruentō reddito illine, idē ipsum assidue facere perge, & locū nouacula rade: sic enim capilli cito prodibūt. Aliud. Ceterū ea quę sequitur cōpositiō omnes uī sua præcellit, faciens item ad profuuiū capillorū, cum oleo aut ungento dissoluta, facit & ad rarecentes in principio capillos, & in caluiciē prolabētes. Estq; omnino admirabilis: Muriū domesticorū ustorū partem unam, panniculi ampelini usti partem unam, dentium equinorum ustorū partem unam, adipis ursini partem unam, medullę cēuinę partē unam, corticis calami partē unā. Hęc omnia arida leuigentur, & sufficienti melle ammixto ad crassitudinē mellis redigantur, indeq; adeps & medulla liquefacta addantur, & pharmacū ipsum in aream pyxidē reponatur, ex eoq; alopecia donec capillos producat defricetur. Similiter autē & profui capilli quodidie ex eo illinantur. Porro inter hęc ipsa pharmaca itemq; ea quę deinceps describentur, non difficile est diiudicare quę acriora ac fortiora, rursusq; quę molliora & imbecilliora existāt, modo quis ea quę in principio dixi in memoriā reuocet. Ita enim & rectius eorū usus continget, nimirū ad mediocres alopecias mediocribus adhibitis, ad fortiores fortioribus, uelut etiam ad eas quę fortissimę sunt, fortissima remedia admouentur.

Quę Archigēnes ad Alopecias commoda conscrip sit.

Archigēnes item hęc pharmaca ad alopecias hac uerborū serie descripsit. Alopecias leues & in superficie hērētes, nitro cōfrictas ac linteolo exteras, uerbenaci in sole trita acetoq; diluta largiter illine. Aut eodē modo exteris betę folia impone, in superq; linteolo humecto cōlege, aufer autē ea per loci humectationem. Ceterū in alium progressas cum aceto, nitrī gleba, aut sepia testa, aut aspera squatina cūte, aut fici folijs, usq; ad dilaniatōē defrica: deinde deter so sanguine, betā ex uīno coctā impone, aut caricas uistas cū uīno, aut lentis farinam cū uīno pro cataplasmate adhibe. Aut huprestī cū aceto, aut ranunculo, aut ari radice in cerati formā redactis, & per noctē impositis, bullas ex alopecia excita: mane uero bullas cōpunctas, alio aut buselino, aut frēmij folijs inlege. Probe faciūt etiā post excitatas bullas hippocāpi marini usti, & cū modico atramēto surtorio crudo trito in super, itemq; ossa maxillarū suillarū usta. Aut rasis & cum nitrī spuma extersis, & cū alyonio ex acri aceto cōfrictis donec cruentę reddantur, nucū ponticarū putamina usta cū melle leuigata illine, atq; id bis in die facito: sed ac si sit eas ut plurimū in diebus decē. Aut mures domesticos in olla exustos nitroq; axūgia excipe, & præfrictis cū alio alopecijs in splenio impone, idē donec capilli enascentur quodidie repete. Aut ranū culos paruos similiter exure, eorumq; cinerē cū pice sepe usq; quo crassa facta sit seruefacta illine, loco neq; raso neq; prius cōfrictō. Aut muscerdas & thus æquali portione cum aceto ad mellis crassitudinem redacta loco prius rubificato illine. Aut ficus aridas uistas cum oleo tritas illine. Aut uetatrū albū, piper, muscerdas, præfrictis & cōscalpis ex aceto

aceto illine. Aut raphano & cepis oblique concisis probe cōfrictas illine. Aut alyonium torrefactū cum digito oleo madefacto diligenter affrica, donec morsum percipias, & correctam alopeciam emendabis. Aut alyonium ad lucernā torrefactū, adipeinque ursinū similiter liquefactū misce, & præfrictis ad solem, illine. Aut præpunctis pro more, cepas tritas cum melle cataplasmatas modo impone, Aut raphani corticē eodem modo. Aut facta scarificatione, calami corticē superiorem quem Aegyptij Siphtheriū appellāt, ustum cum pice liquida committe, spleniumque impone, & quater aut quinquies solue, deinde exterge ac aliud splenium impone. Quidam niri decimā cineris ipsius partem ammiscēt, ualdeque eis succedit. Aut quamquam stomomatis ferri cum aceto & oleo illine eodē modo. Aut felis siue crocodili stercoris drach. vi. sinapis drach. iij. cum acri aceto illine. Aut cantharidas uistas pice liquida exceptas ad cerati liquidi formā redige, præfrictisque ex nitro allo locis, & exteris in splenio impone, & per noctem sine macine uero tolle, locumque exsicari permitte usquequo circū circa rumpatur: ubi uero eruperint capilli cō assidue rade. Aut nasturtium, uel ut alij piper, muscerdas, ueratrum album, æqualibus portionibus ex aceto illine. Aut cum aspera squatinæ cute, aut folio ficulneo, aut pumice leui, superne alopecias cruētas facito, deindeque amygdalas amaras uistas cum aceto mulso illinito, idque assidue facito ac radito: auget enim statim capilli. Aut testudinis marinæ sanguinem illine, ex laudatissimis enim hic est. Aut hippopotami corium ustum illine. Aut nucs ponticas uistas & staphidas syluestres cum unguento laurino. Hoc enim ab Archigene laudatur. Aut muscerdas & ueratrum album illinito. Aut corticis calami usti & niri æquas partes cum pice liquida ad malagmatis formā redige. Aut nucs amaras uiam cum corticibus uistas ex aceto aut melle crassius illine, idque loco prius per linæolum exterso: post uero assidue radito. Aut ammoniacum thymiam cum succo rithymalli asfricato. Aut felis stercus aridum ex aceto. Aut rhois drach. iij. uel ij. sinapis drach. ij. cum acri aceto illine. Aut amygdalas amaras & pumicē illine. Dionysodorus autē medicus, Soleam inquit, nouam uistam cum acri aceto illine. Egrege autem facit ad inueteratas alopecias, si thapsiæ sucum aut radicem cerato exceptā loco impolueris, etiam si nihil prætereā aliud facias. Decedit enim superna cutis & sanis serosa madet, capillique sua spōte subnascentur. Vides itaque quomodo Archigenes ex thapsia pharmacum collaudet, neque enim aliud eo præstātius reperias, Auget autem fidem commoditatis eius consona historia experimenti, quapropter & ego omnia apud Empiricos medicos obseruata hic adscribo.

Quæ Asclepiades in libro de Alopecia scripsit.

Non recetioris nunc mentionem facio Asclepiadae, qui memorabiles sane pharmacorum compositiones in multis libris conscripsit, sed uetustioris Bithyni uidelicet. Hic itaque Asclepiades curandi uiam se reperisse gloriauit, per quam multos immedicabiles alopecias habentes sanatos dicit. Verū plus ad curationem totam dietā ualere quam pharmaca ipsa tradit. De dieta itaque hæc scribit: Abstinentiū itaque ab omni uino in totū propter has ipsas causas. Manifestū uero est inde, ipsum antea retulisse causas, quas si quis discere uelit ex libri ipsius lectione requirat. Deinde subiungit: Abstinentiū etiam a nimia repletionē. Prohibet autem & carniū esum, & casei, & lactis, & leguminū, omniumque simpliciter quæ etiam exigua copia accepta plurimum nutriunt & inflant. Quin & exercitiū plurima fugere iubet, uelut etiam assidua balnea, & multas exudationes. Ceterum de pharmacis iuxta ferentem dictionis sic scribit. Est autem primum unguentum tale: Spumæ niri partes duas, salis ammoniaci partem unam, uista

Partes tres

trita

trita acerrimodq; aceto diluta donec strigmentorū cōassitudinem accipiant, præscalptæ leuiter alopecie, quo densetur & cruentus reddatur locus, moderate illinimus, defricamusq; donec caput ea concipiat, & pharmacū in altū probe deferatur, atq; ita quiescere usq; ad crepusculū sinimus, postea ad uesperam idem repetentes, similiterq; sequenti ac tertia die, magnam permutationem reperimus. Sistitur enim nome siue ulceratio serpens, & capilli uellcati, imò & ui tracti resistunt, & non euelluntur. Deinde sequenti die præfictis acetum cataplasmatismodo imponimus, usq; quo bullæ exurgant, & cutis leuem exulcerationē incurrat: post uero pertusis bullis ad biduū aquositatem effluere sinimus quæ ab ipsis ulceribus prodit. Inde q; rursus eodem ungento utimur, ulceratis tantū locis parcentes eosq; transgredientes. Sanos uero contingentes, eosq; defricantes usque ad crepusculum quiescere sinimus, quo idem repetentes paulatimq; confricantes usq; ad septimum aut octauū id facere pergimus diem: quo sanè tempore uidemus iam ab extremis alopecie non amplius tenues ut ante, & lanuginosos prodire pilos, sed longiores & robustiores, consimilesq; postea paulatim etiam in partibus denudatis excrecentes, uicissimq; tēnues & imbecilles deficientes. Contingitq; simile quiddam quale in ulceratis uidemus. In ulceribus enim cicatrix ab extremo initium faciens, postremum in medio ulcere definit ac coit. Ita in alopecia partes pilosis uicinæ primum conualescunt & densæ pilis redduntur, quæ uero in medio sitæ sunt omnium postremo pilos producunt. Si itaq; curatio hoc modo processerit, reliquis medicamentis nihil opus habebimus, sed uno hoc per multū tēpus semper utimur: ceditq; benigniter affectio, nisi omnino magna nuditas existat. Medio autē tempore sculpturā per acutum cœlum assidue facimus. Aliquādo etiam cuspidē acuti spiculi cute pertusa, per fissuras ipsas sanguinem moderate elicimus. Hæc his uerbis præfatus Asclepiades, deinceps de rasura cōtra quā alij tradit: neq; enim assidue sed per interualla affectam partem radere iubet, ubi iam mediocriter densi capilli in ea fuerint exorti: prodeuntes autē iam & adhuc tenues rasura non dignatur. Ceterū post rasuræ factam mentionē, deinceps hæc uerba scribit. Quod si uero remoretur capillorum exortus ad subscriptas cōpositiones confugimus. Sunt autē tales: Herinacij terrestres caput aut coriū, ustum tritum ac melle subactum illinito. Aliud, Hippocampū marinū & nitri parū coexure, adipeq; anserino ammixto, loco nitro pparato illine. Aliud, Thiapsiam aqua maceratam illine. Aliud, Muscerdas aceto tritas illine. Aliud, Calami Cyprij folia in olla exurito, deinde resina pinus cinerē ipsum excipitō, & præscarificatæ alopecie imponito ac obligato. Aut corticem siue comam calamorū eodem modo præparato, ampliusq; nitri parem cineris modum ammisceto, & pice exceptis utitor. Est autē non inualidum sed plurimum efficax. Post hæc uero etiam muscarū Asclepiades meminit, iubens quā plurima ipsarū capita mox ubi capte sunt, nudis alopecie partibus affricari, atq; id maxime ubi alopecia fuerit exulcerata. Etenim confert, inquit, muscarum sanguis partibus tunc per pharma ca ex nitro ac alijs cōposita exacerbat, nimirum quum non mordeant hæc ipsas tantum, sed bullas etiam in eis excitent.

Quæ Soranus ad Alopecias conscripsit.

PRæfatur quædam quæ iuxta propriæ sectæ ductum digessit, meminitq; eorum quæ Asclepiades scripsit: deinde uero hæc, hac uerborum serie subiecit. Quapropter ubi recens malum est, primum abstinentia proderit, deinde simplex cibus boni succi, & irrigatio ex oleo dulci calido, & panis in cataplasmate, fomentaq; & sculpturæ, & cucurbitæ, ac cerata. Vires item reparentur. Inueterata autē iam affectione assidua rasura, & rubificatio ex sinapi; & frictiones præscriptæ

scriptæ, ita ut in sequentibus diebus picem superlinas aut oleum cedrinum. Proderit item rubificatio ex affrictu foliorum fici aut cæparum, aut linteoli pollicis aut indicis obuoluti, et post frictionē scarificationes. Quidā uero acus cōligantes ita ut cuspidēs ipsarū in eundem locum porrigātur, per ipsas cutem cōpungunt. Cæterum post rubificationē per defriccionem inductam, postq; scarificationem pharmaca conueniunt ex alto euocantia ac transferentia, metasyntetica græcis appellata, tum illita, tum emplastri modo imposita. Eiusmodi aut multa particula existunt. Nam & cepe tritum, & raphani cortex, utrunq; cum melle impositum ualeat. Aut spumæ nitrī partem unam, rhois partes duas, salis ammoniaci partem unam, uisā & cum acri aceto trita ad strigmentorum crassitudinē redigantur. Scripta sunt & alia multa, inquit, apud Asclepiadem & Heraclidem Tarentinū, Elephātidemq; ac Moschionem in libro de ornatu. Ex quibus sanē & ipse ea quæ ex Asclepiade præscripta uidisti exscripsit, & alia item quedam quorum deinceps mentionem faciam: Adipis ursini partem unam, cineris foliorum calamī ustorum partem unā, squamæ stomomatis ferri partem unā, aceto & oleo ueteri subacta illine. Aliud, Stercoris felis aut crocodili drach. viij. sinapis drach. iij. ex acri aceto. Aliud, Hordei uisti & muscerdæ par pondus ex acri aceto. Aliud, Nasturtiū & muscerdas, ueratū albū, piper, equali mensura ex acerrimo aceto. Aliud, Sinapi & nasturtiū aut spondyliū uisā trita ex aceto illine. Aliud, Ranarū uistarū drach. xviij. pumicis uisti drach. xij. alij xv. habent. sinapis drach. viij. nitrī drach. iij. nucum uistarū, drach. xxxij. Aliud, Præstat & ceratum ex pipere, pyrethro, calce, & oleo myrteo. Oportet autem & partem affectam præfricare uel per alcyonium uisum, donec morsum persentiscat, uel per herinaciū marini uisti cinerem linteolo inuolutum, donec locus rubescat. Alia pharmaca quæ partim mihi, partim præceptoribus meis, partim amicis medicis in usu fuerunt. Pumice rubificatorio præfricato, præfomentatoq; & thapsiæ succum donec cutis eleuetur illinito, deindeq; somno adhibito, cerato rosaceo utitor. Aliud, Foliorum ac radicis calamī ustorū, pilorum ursi, adiantī, adipis ursini, picis liquidæ, pilorum caprarum ustorum, cedriæ, omnium octo par pondus accipe, liquidaq; cum aridis committe, & præfricis adhibe. Aliud, Fici folia cū aceto donec lanugo prodierit affrica: deinde uero herbæ quæ Stœbe appellatur succū illine. Aliud, Ranas paruas uistas picis liquidæ tepidæ insperge, deinde neq; prærafis neq; præfricis illine. Aliud, Spumæ nitrī, drach. iij. stercoris muris, drach. ij. corticis calamī uisti, drach. ij. pice liquida excipito, & splentiū formato, idq; prærafo ac cū nitro preparato loco imposito, & ante biduū uel triduū nō auferto. Aliud, Sinapis & stercoris felis æquas utriusq; partes, loco præfricto illinito. Aliud, Scarificato ac sepiæ aramentum illinito, aut marrubium uiride tritum illinito. Aliud, Sphæritidis folia torrefacta cum aceto leuigata imposito. Appellatur autē sphæritis, cupressus quæ sphæria, id est, pilulas producit. Aliud, Noces amaras unā cum putamine uistas, prærafis ex aceto & melle illine. Aliud, Herinaciorū marinorū testas uistas, ex melle & aceto prærafis illine. Aliud, Alcyonium uisum & muriū stercora cum porri succo illine. Aliud, Radicis thapsiæ, drach. iij. radicis chamæleonis, drach. ij. uisco probe subacta excipe & cataplasmatris modo impone, quumq; exacerbatus æger fuerit adime. Aliud, Foliorum calamī græci ustorum, drach. iij. muscerdæ, drach. ij. herinaciorum ustorum, drach. unam cum aceto trita illine. Aliud, Salis ammoniaci, drach. unā, nitrī drach. unā, utrunq; torrefacito, acetoq; rigata ter in die illinito, loco prius cum nitro preparato. Aliud, Amygdalarū amararum testarum

testarum obolos tres, pumicis obolos duos, salis ammoniaci, obolos iij. similiter illine ex aceto. Aliud, Piper, muscerdas, ueratru albu equali pōdere cum aceto illine. Aliud, Squamā stomomaris ferri cum aceto & modico oleo illine. Aliud, Locum per pumicem proritato, & sulphuris, spumæ niri, ammoniaci singulorū æquas partes mixtas cū aceto illinito. Aliud, Alcyonij drach. unam, sulphuris uiui drach. vi. muscarū ad ariditatem torrefactarū cyathū unum. muscas per se terito itemq; sulphur, alcyoniū uero aqua coctum unā cum siccis leuigato, felle fusillo ac aceto paulatim affusis usq; quo strigmento sum reddatur. Deinde axungiam à rotis derafam; & manu emollitam ut emplastrum confiat misceto, & præpara alopecia ac rubificata pharmacum ut optimū cōsiderenter illinito. Aliud, Alicam aceto maceratam terito, & paululo succo cyrenaico adiecto, præfricto loco illinito. Aliud, Loco præfricto ac scarificato caricas affatas cum passo cataplasmatris modo imposito. Aliud, Passum illinito, ac deinde ferulam ustā inspergito. Quæ deinceps sequuntur duo pharmaca admiranda sunt, & uerbis eius qui ea prodidit inscripta ad alopecias, caluiciem, raritatem capillorum ægre curabilem in capite, in mento ac supercilijs. Pilorum ursi unc. unā, radice calami unc. vi. filicis cum radice quadratē ac uncie dimidium, castanearū hispidi corticis quadrantē, lanarum succidarū quā pinguissimarū sexuncem. capita muscarū numero xxxvi. muscas v. capitibus reiectis. Omnia in nouam ollam indita in furnum mitito, deinde cinerem ipsum terito. Habeas autē in uino Amineo prius trita ladanū unc. unam, myrrhæ unc. unā, adijciaturq; olei ueteris sextans, & cedrini unc. una, malabathri sextans; deinde inspersis aridis tritis medicamentum reconde, atq; ubi linteolo alopeciam præfricuieris, deindeq; aut cepa aut scilla uellicaueris, aut fici folio lente exscalperis, pharmacum ipsum illitu affrica. Insequentibus uero diebus locum rigidum ac aspero linteolo confricato, atq; hoc modo illinēdo usq; ad menses duos progreditor. Quod si amplius in hac curatione perseveraris, etiam caluiciem ea perfanabis. Adipis taurini in solati lib. unam, adarces unc. unā, succi thapsie sesquunciam, alij uncie dimidiū habent, myrrhæ bonæ unc. unā, polytrichi lib. dimidiū, callitrichi lib. dimidiū, membri asinini lib. unā. splenis asinini lib. unam, ladanū tantundem. Ego ladanum in uino modico maceratum contriui; adipem uero aquæ uapore liquefeci, deinde asini membrum affarum donec insumatur radito; splenem uero cum callitricho & polytricho in noua olla torrefacito, contusisq; quæ contundi possunt ac cribratis, omnia gleucino aut sabino excipito, & ante balneum uel tor capite prius pectinato. Manifestum uero est quod eadem pharmaca etiam ad menti pilos non enascentes cōducunt. Aliud, Fœni græci sextarios iij. seminis lini sextarios ij. ladanū bessem, succi acaciæ sexuncē, folij malabathri sexuncē, gallas numero xx, onychis aromatici sextantē, calami Syriaci sextantē & unc. dimidiū, alij unc. unā habent, bdellij sextantē, myrri ustæ sextariū unū, musci, quæ alij splanchnon, alij bryon aromaticū uocant quadrantē; iridis astragalidis, alij illyricæ sextantē. Singula per se cōtundito, ac per cribrū arcūius excunito, & deinceps ut præscriptū est misceto. Vsu uero experite, pharmaci tertiam partem, aut quantum sufficit, in æreum aut testaceum uas consicito, deinde uini Italici odorati tantum ut liquidum reddatur ammisceto, atq; ita prunis impositū donec semel ebulliat cum lignea uirga agitato, animaduersione habita ne comburatur. Post uero illines agro in aquam desidere iussu, sensimq; in solio sedenti asfricabis, ac pro more capite ex aqua persuso pharmacum abluēs. Deinde autem staphidem syluestrem per se tusam ac cribratam, post quartum usus diem phar-

maco ammiscebis, similiterq; coques, eodemq; modo illines, parce tamen ac caute ne in oculos destillet. Vngento autē balneo uteris, olei myrti libra una, cum ladani triente contrita. Consians & cetera est pharmaci huius facultas, neq; citra effectum dilabitur. Aliud ad eadem, Pericalamitidis unc. i. myropisso ceri, sordis pilorum barbæ hircinæ utriusq; uncie dimidium, adipis infantis informis libram unam, succi foliorū dionysiaci tenerorū, succi foliorū ladonidis tenerorū, succi calliceros, succi herbæ uerbenacæ, succi foliorū calami, singulorū cyathos iij. cynomori, herinaciorum marinorum ustorū, uiriusq; sextantem aut amplius si melius reddere pharmaci uelis, acanthionis terrestres corium ustum, Hæc omnia ad plures dies in pila plumbea terere oportet, donec omnia probe leuigata uniātur, atq; etiā donec a pila quippiam detritum eis accedat. Vtere loco contenente ex crudo linteolo ex lino præfictio, ac deinde cum althææ siue hibisci radice deterfo, illinito. Hoc pharmacum eo modo scriptum reperit Claudia, nus amicus noster in libello ex membranis contexto, eo qui pharmaco usus fuerat uita defuncto. Multi autem faciebant eius possessionē, propterea quod duos quosdam caluescere iam incipientes ex eo curatos cōspexisset ita ut neq; ulterius caluities progrediretur, ipsq; denudatus locus pilis densus redderetur. At uero nos hoc ipsum obscure & coniecturaliter scriptum naſti, singulatim considerabamus quid tandem singulis significaretur, quumq; iam hoc, iam aliud mente cōciperemus, per magnam experientiam tandem nos ueritatem reperturos sperabamus. Verū in præsens quidem quod sentimus scribemus, scripturi etiā in posterum si quid experientia cognūm repperimus. In præsens autem pericalamitidem, calami corticē dici putamus. Nam & aliās ipsum eiusmodi affectionibus conuenire scimus maxime ustum, nouimus item alios ex eiusmodi pharmaca composuisse, quapropter credibile est quoniam cortex calamo circum adhæret pericalamitē ipsum appellari. Potest autem etiā id quod ab aliquibus limnestrum, ab alijs adarce & adarcū dicitur, pericalamitē appellari, propterea quod calamis adnascatur. At uero myropissocera picea & cera dici æstimamus, ungento quopiam ad huiusmodi affectiones congruenti eliquata, uelut est gleycinum & laurinum, nardinum, lentiscinum, sesaminum & cedrinum. Cæterum barbæ hircinæ sordes statim nobis uisæ sunt de ladano dictæ esse; nam ad hæc affectiones conuenire in confesso est. Et sanē generatio eius circa mentum hircorum in quibusdam locis contingit, quod ipsum & Rufus Ephesius per hos uerus indicat.

Inueniās in Eremborum quoq; ladanon orbe

Caprarum circa mentum, gratissimus illis

Succus is ē cisthi folio decerptus amico.

Imbuti hoc uilli menti laterumq; madescunt,

Non tamen ad morbos hoc præstat, laudem ab odore

Egregio quo spirat habet, quod plurima mixta

Pharmaca Erembi habeant diuinis uiribus aucta,

Orta solo & campo longe lateq; parenti.

An quidem igitur hoc solum ladani is qui pharmacum composuit inſicere iubeat non satis manifestum est: possibile est autem per unam speciem totum genus ab eo designari. Porro infantē informē uidetur mihi uisam dixisse, Visam enim parere aiunt informem quandam uelut carnis molem, uerum post per linctū matris animal formari ac effigiari. Dionysiacum autem uitē mihi dicere uidetur, quanquam & de hedera dici posse aliquis opinari queat. At uero quod ladonidem laurum appellet nemini puto dubium esse. Calliceros autem sœnum græc

cum appellare uidetur, nō minatur autē hac planta apud nos in Asia Aegoceros. Cynomorum deinde rubum canis uerisimile est dici. Acanthiona autem postremum terrestrem, herina cum terrestrem appellatum ab eo existimo.

De Defluuio capillorum

Cap. II



Si & alia pilorum affectio quæ ad raritatē cutis, inopiamq; substantiæ pilos generantis cōsequitur. Quapropter etiā curatio hoc modo latorum, non eūdem scopum quē alopecię habet, in alopecijs enim ut uiciatus humor cōsumatur, intentionem summā ac primariū scopum

habemus. In his uero ut capitis habitū robaremus, & boni succi allationē procuremus, cutemq; ad densitatem ac raritatē moderatā reuocemus. Quam ob rem sanē ad pharmaca humectantia aliquid moderate adstringens ammiscere oportet, quale est ladanum, quod utraq; in se moderate cōplectitur quæ ad hoc symptoma cōueniunt, caliditatem uidelicet mediocrem, & adstringendi uim iuxta eandem proportionem. propter hoc itaq; oleo mixtum quo illini possit, symptoma, siue accessionem defluuij capillorū sistit. At uero manifestum est capitis frictionem necessario huius pharmaci usui præmitti, & multitudinis pilorum refectionem, aut si anni tempus id fieri permittit perfectā ablationē. Ira enim in affricu & illitu robusta & calida reddetur cutis, & moderatam densitatem acquirat, eam uidelicet quæ secundum naturam est. Consueuit autem hæc circa pilos ob læsio sæpe his qui ægrotarunt accidere. Raro autem citra morbum, & magis sanē diæta salubri & uires reficiente opus habet. Multiq; citra medicamentū perfecte sanati sunt, atq; id breui. Composuerunt tamen medici eius gratia pharmaca moderatam densitatem cuti inducētia, ita tamen ut ne simul eam refrigerent; quæ enim uehementer adstringunt, omnia etiā refrigerant, & alimenti influxū reprimunt, propter cuius inopiam capilli defluunt. Intentio itaq; medicamento- rum est sanguinem affluentem non solum non præpedire, sed etiā proleciare, cogere autem sensim & adstringere rarefactam cutem. Tale autem sponte naturæ est ipsum ladanum, quod quia ceræ similem compagem habet, largo aliquo conuenienti liquore indiget, quo capiti illini possit. Præstat igitur huiusmodi liquorem similem ladano esse, hoc est, ex cōtrarijs facultatibus mixtum, adtractoria nimirum & coactoria. Nequaquam ergo oleum Sabinum aut uetus aut Cicinum ad hanc rem aptum fuerit, sed in Hiberia aut Hispania, aut quomodo cunq; tandem appellare uelis, natū. Habet enim & adstrictoriū quippā, atq; amplius adhuc eo lentiscinū, sponte naturæ tale existens, quale est ipsum ladanum. Quare neq; expertus sum, neq; mente concipere possum, ullum præstantius pharmacum fore ad defluos capillos, quā est quod ex ladano & lentiscino oleo permixtum cōstat. Manifestū autem est quod raso quidē cūptā, crassius ad mouere medicamentū oportet, ad ipsam uero cutem præfectos & artiosos habētibus pilos, liquidius. Quod enim comam alere non oporteat priusquam quis curetur, euidentis puto. Quod si uero large defluant capilli, & coniectare possis multā raritatem cutis capitis faciā, non ineptū fuerit in præsens myrtū oleum pro lentiscino ad ladanum ammiscere. Licebit etiā aliquando ungentū nardinum adhibere in ætate frigida, & tempore hyemali. Bonum autem pharmacum ad omnia est diuitem foeminarū ungentum, quod Romæ uocant soliatum. Nō minus autem eo cōmodum est, imò magis quod appellant Spicatū. Quare cū his uel solis diuites ungi iubeto, & cum optimo nardino. Ladanū uero in duplo uase liquefacto, & liquefacto unā cū nardino ex prædictis preciosis ungentis quodcunq; ad manum fuerit ammisceto. Atq; hæc quidē medicamenta mihi suffecerunt unā cum resectoria ac salubri diæta, quæ in plerisq; etiā sola sufficit. Composuerunt

autem

autē, ut dixi, quidā ex prioribus medicis pharmaca ad defluos capillos, in quorum relatione ubi inuicem dissentiant exponam. Primum autem referam compositiones ab Hera scriptas, quarum priorem quidem laudo, posteriorem uero curiosam & præter rem auctam existimo. De priore uero ita scribit.

Compositiones pharmacorum ad defluos capillos ab Hera scriptæ.

Heras in ferula duo subscripta pharmaca habet, iuxta hanc ipsam dictionis ipsius seriem, ad hoc ut capilli in capite ne defluant: Ladanum in uino austero rigatum terito, & oleo myrteo ac uino uicissim affuso ad mellis crassitudinem redigito, ex eoq; ante & post balneum, caput illinito. Præstat autem & polytrichon quod quidam Adiantum uocant, dimidia ladani portione adijcere, & cum myrteo aut nardino uti. Hæc de priore compositione loquutus Heras, deinceps hæc scribit. Compositio olei ad defluos capillos, quæ & nigros eos facit. Intra calendas & Idus Iulias, nuces uirides centum triduo, eisq; olei primarij sexxtarium l. affundito, & aluminis liquidi libras 111. Hæc simul in uas nouum testaceum præmadefactum indito, id ipsumq; quam diligentissime oblitum, in loco neq; humectio nimium, neq; calido reposito, & per menses tres sub terra situm sinito, deinde auferto oleoq; utitor. Hæc ipsa secundi pharmaci est descriptio, quæ plus q; cōuenit ipsum pharmacū adstringens reddit. Quapropter ut uehementem adstringendi uim ipsius corrigeret is qui primus hoc pharmacum composuit, defodere ac uel ut putrefacere ipsum iussit, inde nimium magis tenuium partium reddere in eo commixta conatus. At uero tale pharmacum in tempore, regioneq; ac natura corporis calidis commodum fuerit, adeo ut in cōtrarijs non tutū sit tali uti. Etenim perfrigeratas eius usu mulieres uidi, ut inde in grauedinē ac rauedinem defluxumq; à capite ad fauces delaberentur.

Quæ Archigenes ad defluos capillos conscripsit.

Archigenes in primo libro pharmacorum secundum genus ad defluos capillos in hæc uerba scripsit: Ladani & absinthij æquales partes, & iuniperi baccas x tritas, in linseolum illigato, & in oleo per dies v macerato, ex eoq; caput illinito, & neq; capilli defluent, neq; furfures habebunt. Aut dum capillos pectus, adiantum cum myrteo aut rosaceo oleo adhibeto. Aut adianti, myrti nigrae æquales partes, gallæ duplū, cum oleo ueteri, aut lentiscino, aut myrteo, ad mellis crassitudinem redige ac utere. Aut thus & misy, & gallam, & adiantum, æquis partibus cum uino maris experte ad mellis spissitudinem in sole terendo redige. Aut molliter cocta donec nigrescant, deindeq; cum oleo ueteri, aut lentiscino, aut myrteo mixta in usum adhibe. Aut brassicam aridam tufam cum aqua impone. Aut loti radicem eodem modo.

Quæ Cleopatra in libro de ornatu scripsit.

Quæ à Cleopatrá in libro de ornatu scripta sunt, illius ipsius uerbis sic habent: Ad capillorum in capite generationem, calamorum tenerorum radices uisas exuocato, muscasq; in ollula torrefactas succo admisceto, & adipem ursinum ac oleum cedrinum in uinum trita ac unita, isdem addito, & ad illinendum exhibeto. Quo uero odore obtundas uinū aut passum affundito. Aliud. Non longe post præcedens his uerbis conscripturn: Quo capilli enascantur linteum semen siccum unā cum calamo suo exurito, tritumq; cum oleo sesamino illinito. Aliud paulo inferius scriptum hoc modo: Ad defluos capillos terram cimoliam solidissimam uino austero & mororum succo, tanto quantum combibere potest, rigato, eiq; hyoscyami tenuissime triti acetabulum adijcito, indeq; pastillos formatos quos in umbra siccatos in uas sigulinum nouū reposito. Visu uero postulante aqua dissolutos illinere iubeto. Deinde quum exaruerint per dies quinque

eluito, rursumq; illinito. Facit itē ad faciei & colli impetigines. Aliud, Capillos augens cito, densansq; ac denigrans. Ladanū cum oleo & uino dulci leuigatum ac crasse factum præfrictis illinito. Nō longe quoq; postea aliud pharmacum scriptum est his uerbis. Ad defluuium capillorum citra morbum accedēs. Brassicam aridam tritam ex aqua impone, aut loti radicem eodem modo.

Quomodo comptoria ab exornatoria medicinae parte differat.

Comptoriae quidem scopus est, ut pulchritudinem acquisiticiam inducat, Exornatoria uero medicinae partis, ut quicquid secundum naturam est id omne in corpore custodiat, ad quod consequitur etiam naturalis pulchritudo. Indecoro enim aspectu est caput alopecia uittatum, uelut etiam oculi pilis palpebrarum denudati, similiterq; superciliorum capillorum defluuiū. Non solum uero ad pulchritudinem, sed multo prius ad ipsam partium sanitatem capilli ipsi conducūt, quemadmodum in libris de usu patrum est demonstratum. Quid attinet aut dicere de lichenis, aut psora, aut leprae quā præter naturam talia existant. At uero faciei colorem per pharmaca nitidiorē aut rubicundiorē facere, aut pilos capitis crispōs, aut fuluos, aut nigros, aut quemadmodū mulieres solent, in longitūdinem auctos, hæc ipsa & quæ huiusmodi sunt comptoriae malicie existunt; non medicæ artis opera. Verum propter societatem quandā quam cum illis habent, quādoq; ad regiarum foeminarum, atq; adeo ipsorum Regum imperium, etiam comptoria adtingimus, utpote quum his negare non liceat, docendo tamen cōptoria ab exornatoria medicinae parte differre. Quapropter usum est mihi ea quæ Crito scripsit pharmaca capillos conseruantia, eisdemq; augentia, ex primo illius de ornatu libro subscribere.

Quæ Crito ad conseruandos ac augendos capillos scripsit, itemq; quæ à defluuiō ipsos præseruent.

IN primo libro Exornatoriorum statim in principio post præfationem Crito hæc uerba scripsit. Ad conseruandos itaq; capillos subscriptis compositionibus utendum est. Heraclidæ Tarentini conseruatiua capillorum. Premij florem cum oleo trium illine, idem etiam eos denigrat. Aliud, Ladanū uino aut stero maceratum ac tritum oleo myrtēo excipe, eoq; pilos ante balneum subline. Aliud, Verbenacam rectam appellatam unā cum radicibus arefactam cōtundito & per angustissimū cribrū concernito; deinde oleo ammixto ut strigenti crassitudinem accipiat, in uas æreum reposito, atq; ubi cōputruerit, pro oleo similiter utitor. Aliud, Ladanū partes duas, polytrichi quod quidā Adiantum appellant, partem unā uino & oleo myrtēo excipe ac utere. Nos autē pro myrtēo nardino uisum. Aliud, Quod ipsum & subnigros reddit. Baccarum myrti nigrarum quadrantē, ladanū tantundē, dissoluta cum acaciæ fructus, hoc est, siliquarum ipsius spinæ appellatarum, decoctio cōtere; atq; ubi limi crassiciem acceperint, nardino, aut myrtēo, aut aliquo alio hedysmate excipe. Aliud, Vngentū conseruans pilos, quod ipsum etiam subnigros reddit. Baccarum myrti nigrarum sextarium 1. seminis apij sextarium 1. seminis betæ sextarium 1. uirgultorū myrti sextariū 1. adianti sextarij dimidiū, ladanū tantundem. uini nigri sextarios 7. hisquequo penitus dissoluantur coquito, atque ubi tertia pars superfuerit, olei cuiusdam aut hedysmatis sextarios 11. aut 111. addito, rursumq; coquito. Vbi uero bis aut ter ebullierit, liquorē exprimito ac diligēter per sacculū excolatum in hydriam recōdito. Vsu uero expetente in præfatis penitus utitor, illitis ex eo bis per diem capillis. Aliud, Passi cretici sextarium 1. ladanū unc. 1. corticis nucū pinearū uisi sextantem, polytrichi uisi unc. 1. adipis ursini librā 1. succi betæ cyathos 141. Ladanum & passum donec cogantur in unam

timam cōpagem coquito, deinde reliqua inijcito, & sublata in uas plumbeū ser-
uato. Vfus autē tempore quantū sufficit in quocunq; uelis hedyfmate diluito.
Vfus eius debet esse quotidianus, quidā uero raso capiti pharmacum illeuerūt
nullo hedyfmate dilutū.

Aliud, Ladani unc. i. passi sextarii i. corticis nu-
cum pinearū ustri drach. ii. alij scsquidrachmā habēt, spongiam marinā ustram tri-
tam unam, paniculi Cilicij ustri triti cyathos iii. polytrichi ustri triti cyath. ii. adi-
pis ursini lib. i. coquito & apparat ut dictū est.

Aliud quod pilos conser-
uat, & defluentibus quoq; auxiliatur. Seminis apij sextantē, callitrichi sextantē,
thuris sextantem, nuces iuglandes numero x. v. ladani sextantem, corticis nu-
cis pinearū lib. i. Omnia in nouam ollam coniecta, & cum argilla probe obturata,
in balnei formace affato, deinde extracta terito, & adiecta adipis ursini libra una
subigito, & in pyxide sicea reposito. Vfu uero expetite quantū satis uidebitur
ex pharmacum accipito, ac quocunq; uelis hedyfmate conquassato, ex eoq; caput
bis in die illinito. Quidam uero capite raso pharmacū illinunt eum solo adipe ur-
sino subactū.

Aliud ad caluiciem quo usus est Andromachus iunior, Le-
porū uentres sex accipito, probeq; siccatos in testaceo uase torrefacto, ad eosq;
baccarum myrti quadrantē & uirgultorū eiusdem tantundem cōijcito, indeq;
a danti quadrantē addito, omniaq; simul attente torrefacta tundito, ac per angu-
stum cribellum excernito, deinde adipis ursi ac phocæ aquis partibus adiectis
subigito, ac emollito, sublaturūq; pharmacū in pyxidē plumbeā recondito. At
uero ubi usus tempus institerit, quocunq; uelis hedyfmate ipsum diluito, ac uti-
tor. Atq; de his quidem hæc tenus.

De tincturis capillorum.

Cap.

III



Vni uero post præscripta pharmaca Crito alia quædā scribat, quæ
quidem conseruationem capillorū promittunt, uerū primū ipsorum
opus est ut tingant ipsos, quo siue nigri, siue flauī reddantur, uisum sa-
ne est mihi in principio ea relinquere, quā omnia talia manifeste com-
ptorij generis existant. Quandoquidem haud scio quomodo dogma commune
inoluerit, ut uetulae foeminae capitis capillos denigrent, tanquam turpe sit canos
habere, atq; hoc ipsum etiam maritis probatur, qui onerosum esse aiunt, aniculā
uxorem cano capite habere. Quæcunq; quidem præ delicijs seipsas ornant, hæ-
rum nulli tale quippiam à me petenti exhibui. Quæcunq; uero honesti respectu,
quo notæ culpam effugerēt, & importunitatem maritorū uitarent, pilos suos ni-
gros reddere cupierunt, ne tamen ex adstrictoria uel nigrorem inducentium ob-
laererentur, illis cōsului cedriæ usum, ita ut tribus aut quatuor horis ante balneū
illinerent, & postea detergerent, idq; per quatuor aut quinque dies facere perge-
rent. Ad hoc enim quod nihil lædit, amplius etiam commoda est eis quæ facile à
frigore offenduntur. Nimirum pharmacum existens cedria quod abunde calefa-
cet. Oportet autē ipsam citra olei ammixtionem adhibere capitis uel uementi
resiccatione & calefactione indigentibus, quibus scilicet humida & frigida inter-
peries per se inest. Alijs uero oleo mixtum adhibere pharmacum oportet. Quin
& defluentes capillos corrigit, & non defluentes auctiores reddit. Cæterum o do-
rem eius uitant delicatæ mulierculæ, qui sanè non iniucūdus est his quæ in eius
usu aliquandiu perseverarunt. Porro in Asia apud nos agrestes mulierculæ mon-
tana incolentes, non cedria solum illinuntur oleo permixta, tum capite, tum reli-
quo uniuerso corpori. Sed & picem liquidam cum oleo eodem modo permixtā,
ad radices capillorum capitis illinunt, uocātq; hoc compositum pharmacū pissif-
laxon, hoc est, oleum picatum, quod omnino aliud est ab eo quod pissanthos, hoc
est, flos picis appellatur, quod ipsum liquidæ picis intēbit & superstat, tenuium

pissiflaxon
7

magis partium quàm ipsa pix existens, tum compage, tum etiam facultate. Huiusmodi itaq; pharmaca tarde canescere faciunt, nulla utentium oblatione. At uero quæ ex austeris & acerbis composita sunt, magnopere lædunt. Cæterum materiam ex qua cõfiunt hæc, adstringentis qualitatis ac facultatis existentiæ, etiam quippiam tenuium partium habere oportet, quo nõ in superficie tantum, sed & in profundo cutem permurent, usq; ad locum radicum capillorum progrediendo. Atq; hæc quidem est Methodus componendi ea: habes autem in simplicium pharmacorum tractatu particulatim materias ipsorum, in quibus facultates & qualitates earũ dictæ sunt, quapropter ex illis tum ea quæ iam à prioribus composita sunt iudicare ac quali nam ui prædita sint inuenire potes, tum etiam per te ipsum de integro noua componere. Vile autem hoc est & ad cognitionem affectionum quas iam incurrerunt aliquæ mulieres, & ad futurarum præuentionem, præsentiumq; sanationem. Non solum enim in periculo uersatas sæpe scio scæminas, sed & mortuas, ex perfrigeratione capitis per huiusmodi pharmaca indurcta læsio autem eis maxime accidit, aliquando quidem in stuporem attonitum, aut comitalem, aut ueritum, aut soporem profundiores, aut animi apprehensionem, Catalepsi in Græcis appellatam, delabentibus aliquando uero destillationibus indissolubilibus apprehenduntur, ut inde etiam pulmo afficiatur, & tabes ex eis consequatur. Offenduntur autem citius quæ frigidius temperamentum capitis habent, tardius uero quæ calidius. Frigidæ enim particule frigidis affectionibus, calidæ calidis facilius corpiuntur. Arqui periculum minus subeunt, utpote quum à minore causa lædantur, quæ frigidius temperamentum habent, At uero calidæ propterea quod ægre & uix tandē à frigidis causis lædi possunt, quum sanè à magnis causis fuerint exuperatæ, maiorem læsionem incurrunt, quæ comuni & uniuersali rationi subiacet, in Aphorismis ab Hippocrate relata. In morbis minus periculum subeunt ægrotantes, quibus congruus naturæ, ætati, habitui, ac tempori adfuerit morbus, quàm quibus nihil secundum hæc ipsa congruerit.

De pharmacis capillos denigrantibus. Archigenis.

PAulo antè dixi quodd nõ ex mea sententia medicus eiusmodi pharmaca con-
trectat. Verum quum regiæ aliquando scæminæ, quibus minime negare licet nigros aut flauos capillos reddere expectant, eam sanè ob rem etiam Archigenem puto, quanquam honestissimũ uirum, de illis scripsisse in hæc serè uerba. Denigrant capillos hæc. Radicẽ capparis tritã cum muliebri lacte, aut ut alijs placet asinino, ad tertias coquito, & ad noctẽ pro cataplasmate imposito. Aut urina canis in quinque aut sex dies adseruata lauato. Aut corticem radicis ilicis donec mollis fiat coquito, eumq; cataplasmatibus modo imposito, cum aqua uero decocti lauato. Aut quod in fremio intrinsecus nigrũ est, cum oleo myrteo tritum affricato. Aut spumam argenti, emollam, alumen liquidum, pari mensura prælotis & siccatis capillis in noctẽ illinito, & betæ folijs superne obligato. Aut selinusiam terram, argenti spumam, calcem, cum aqua ad mellis crassitudinẽ redige, & capillo ex lixiuio liquido præloto illinito, similiterq; betæ folijs impositis obligato. Mane uero distictos pilos defricato. Aut absinthij, ossium palmarum syriacarũ, fabarũ ægyptiarũ, omnũ ustorũ cinerem pari mēsurā cum uino Mendefio ad strigmenti crassitudinẽ redigito, & cerato myrteo liquido ammixto affricato. Aut corticis salicis succũ cũ oleo affricato, Summe denigrat. Aut nodos ad racemorũ similitudinẽ ex arbore nucẽ enatos coquito, & bitumine liquido ammixto unitor. Post prædicta etiã hæc Archigenes adscripsit. Denigrant barbam, Suber aridum, & plumbũ ustum cum betæ crudæ succo mellis spissitudine

tudine illita. finito usq; ad prandium, deinde abluto. Aut ferri retrimentum ac plumbū in aceto cocta ad tertias, illine citra oleū. Post hæc Archigenes ex com-
pioria damnata arte accepta hæc scripsit. Fuluos autem reddunt capillos lupini
crudi cum aqua & nitro illiti. Flauos ac crispōs pilos reddentia. Crispōs
autem reddes capillos si spuma salis cum myrrha cōfricaueris. Aut succo cāpali
illine, & manebunt crispī ac nigri. Aut myrri baccis ac betæ semine aequali pon-
dere cum oleo tritis uitor. Aut asphodeli radicem cum mero illine. Aut lupi-
norum cortices ac parum nitri in aqua ad quattiduū macerato ac uitor. Horum
pharmacorū mentionem ob id feci ut ostēderem necessariū quosdam etiam ho-
nestissimos uiros talium sibi comptoriorū experientiam parare. Quando enim
Archigenes hæc scribere nō est uertus, multo amplior uenia Critoni danda est,
qui in Imperatorijs ædibus est medicatus. Apparet autē & Heraclidem Tarenti-
num multa & probata pharmaca cōptorie speculationis scripsisse, quanq; non-
dum tantæ delictæ foeminas occupant, quantæ nunc sunt. Verū quæ Heraci-
des, & Cleopatra, & quicunq; alij post ipsos inreriecto tempore medici scripse-
runt, ea omnia Crito cōacervauit, ad quæ sanè remitto eos qui quomodo capilli
nigrescant aut flauescant, & alia huiusmodi, discere uolunt. Scripsit enim quatuor
de ornatu libros qui in omnīū manibus uersantur. Quid igitur ego nunc ipsa fru-
stra transcriberem? quī possint ex illo discere qui ad ea cognoscere uelint. In
primo quidem libro omnia quæ ad capillos pertinent statim in principio scripta
sunt, reliqua uero deinceps iuxta propriū quodq; ordinē. Quo itaq; facile inue-
nire queant singula talium pharmacorū absq; longa inuestigatione, uisum mihi
est capita singulorum librorum indicare. In primo itaq; libro capita hæc sunt.

P R I M I libri Critonis de ornatu Capita. Cōseruantia capillos. Augē-
tia capillos. Præseruātia capillos. Tincturæ canorum. Tincturæ fla-
uos & auricolores capillos reddētes. Smegmata capillorum. Illitiones
præseruātes. Faciem erugantia. Illitiones faciē nitidā reddentes. Ca-
taplasmata faciē nitidā reddentia. Superciliorū illitiones. Supercilia de-
nigraantia. Oculorū illitiones. Illitiones ex stridio. Ad graueolentiā
narū. Denifictia. Manducationes. Ad foetorē sub alis affrictiones.
Manducationes ad foetorem oris. **SECUNDI** libri capita. Quæ nigredi-
nes colli repurgent. Illitiones ad exudationes sub alis. Illitiones mamil-
las cōseruantes. Vētre purgātia. Smegmata manus nitidas reddentia.
Ad nigredines à partu. Ad rugas à partu. Ad fissuras à partu. Illitio-
nes ad emīnētes umbilicos. Quæ pueros impuberes cōseruant. Quæ uir-
ginitatē conseruant. Ad humectas & frigidas mulierculas. Ad cicatrices
nigras. Psilothra capillorū. Smegmata attenuantia pilos omnis generis.
Illitiones capillos disperdētes. Smegmata totius corporis. Repurgatoria
nitorem inducentia omnigena. Cōspersiones aromaticæ uestiū. Odorate
tincturæ uestiū. Aspersiones thalamorū & ambulacrorū. Suffimentorū
omnigenorū cōpositiones. Illitionū & ungentorū omnis generis cōpositio-
nes, uidelicet amygdalini, balanini, nucum, sesamini, myrtel, lentiscini, laurini, ro-
facei, gleucini, melsini, cenanthini, sampuchini, telsini, fusini quod aliqui crini-
num, hoc est, lilaceū appellant, cicini, irini, narcissini, phoeniciū, cyprini, cro-
cini, nardini, amaracini, hedychroi, mendesii, malabathrini. **TERTII** libri
Critonis capita. Ad fursures omnigenos. Ad capitis eruptiones. Ad
achoras, hoc est, ulcera manantia. Ad pediculos & lēdes. Ad alopecias.
Ad scabiosas faciei affectiōes. Ad lētigines. Ad maculas à sole prouocatas.
Lotiones faciei. Ad stigmata. Ad lūetia. Ad fugillata. Ad uaros.

Ad pustulas nocte erumpentes. Ad menti tubercula. Ad menti lichen-
 nes, lichenorū illitiones. Epithemata excořiatoria. Emplastra uiridia
 quę ab excořiatione imponuntur. Emplastra alba ad cicatricem inducen-
 dam. Pharmaca emollientia quę lichenis affricantur. Q V A R T I libri ca-
 pita. Ad alphas, id est, uiridines nigras & albas. Ad cicatrices nigras.
 Ad leucas, hoc est, uiridines alius insidentes. Ad lepras. Ad ungues
 scabiosos. Ad pruriginosas affectiones. Ad tubercula parua psidracas
 gręcis appellata & ad excořiata. Ad serpiginosas affectiones. Ad sca-
 bies. Ad thymos uerruę genus. Ad uerrucas. Ad fornicarias
 uerrucas. Ad umbilici inflationē. Ad intestinorū delapsionē. Ad
 hydrocelas. Ad apellas. Ad procidentes anos. Ad chimethla hęc
 mis tempore oborta ulcera. Ad rimas pedum. In his quatuor libris Cri-
 to diligentissime omnia fermē excořiatoria pharmaca scripsit, appositis etiā com-
 ptořijs quę spuriam pulchritudinē non ueram inducunt, quapropter etiam ego
 ea relinquam. Solumq; mentionem eorū faciam quę pulchritudinem secundum
 naturam conseruant. Quanquam enim uel maxime cognita habeam sinegmata
 corpori nitorē inducentia, itemq; quę in uirginibus mamillas cōseruant, & quę
 impuberum puerorū testiculos ad multum tempus paruos cōseruant, similiter
 & quę pilorū exortum cohibent, uerecundor tamen eiusmodi scribere, atq; mul-
 to magis eas quę Crito tradidit conspersiones uestium aromaticas, odoratasq;
 uestium infectiones, & aspersiones thalamorum ac ambulacrorum, Suffimento-
 rum item omnis generis uarietates, illitionumq; & unguentorum, Extra enim me-
 dicinę documenta talia existunt. At uero ubi decoris secundum naturam con-
 seruatiua scripsit, si quando locus ita uulerit ea referam, ac primum quidem quę
 circa capillos medicis utilia mihi uidentur, docebo.

De pharmacis pilos corruptentibus.

Cap.

IIII



Vemadmodū ex pharmacis quę pilos augēt, alia medici usus, alia
 cōptorij existunt, Eodē modo & quę ipsos corruptūt. Aliquādo
 enim & his medici necessariō utūtur iuxta triplicē eorū differentiā.
 Nempe quī quādā ex eis proprie psilothra appellantur, alia Atte-
 nuatoria capillorū, alia uero ipsos penitus extirpātia. Hęc itaq; po-
 stremo loco nominata periculosi sunt usus, Ex eis enim illiq; corporis partes, nō
 solum in posterū depiles omnes penitus redduntur, sed & usq; ad caput, & men-
 tum, superciliaq; & palpebrarū pilos nuditas ipsa procedit. Reliquę uero duę
 differentię usum minime periculosum habent. Et quę quidem pilorū denudato-
 ria sunt, & proprie, ut dixi, psilothra uocātur, rantū non quotidie in omnium mu-
 liercularum, fermē etiam quorundam uirorū, usu habentur. Altera uero quę te-
 nuiores pilos reddūt & minores, eis cōueniunt qui duos & magnos, multosq;
 & crassos pilos habent, & ob id suillis non ab similes existunt. Cęterum hęc ipsa
 secundū excessum & defectū inter se differunt, quum unum genus sit pharmaco-
 rum quod in hunc usum compositū est, nimirū eorum quę erodentem, & ustor-
 iam habēt facultatem; præstant autem erodentē facultatem habentia, quod mi-
 nori periculo admoventur; periculosiora autem quodammodo sunt ustoria, quę
 si quis paulo negligentius adhibeat, bullas excitant, & exulcerant, & aliquantū-
 lum cutem exurunt. At uero particularem eorum syltiā omnem in commen-
 tarijs de simplicium pharmacorum facultate tradidī, Sed tamen exempli gratia
 ea quibus assidue utor recensēbo. Ex liquidis igitur est lixiuum tali ut prædi-
 ctum, Ex aridis autem & metallicis arsenicum & sandaracha, & calx nō extin-
 ctā, quam plerique uitā, Gręci uero etiam solius asuesti nomine appellant
 Manifestum

Manifestum itaq; est uehementem ipsoꝝ uim per ammissionem imbecillioꝝum pharmacorum tum liquidorum tum aridorum frangi, quorum congruentem mixtuꝛa modum coniecturaliter primum faciet, uisum eorū expertus. Deinde uero per experientiam defectum corriget, aut etiam addet. Quo uero etiam eorum, quæ per experientiam iudicata sunt notitiam habeatis, adscribam ea quæ in primo libro de oriati à Critone sunt relata, ubi prius ostendero etiam medicis sapientiusculis ipsoꝝum usum necessarium esse. Quemadmodum tincturas experientibus, honeste negare possumus, ut quæ cõptoriæ sint malicie, Sic depilatoria negare minime licet. Si enim moderatos quispiam habeat capillos, non subseruiemus ipsi ad superfluas delicias. Si uero multos & longos duososq; habeat, honestum esse uideur & rationabile ipsoꝝ pauciores, & tenuiores, mollioresq; ac rariore facere. Contingit autem aliquando necessitas, ut eis qui multos & alte nixos, nō tamen duos habent, in totū pilos tollamus, quando aut picatione opus habet totum corpus (quandoq; enim hoc præsidio iuxta medicinæ rationem utimur) aut quando pharmacū Emplaston, hoc est quod meatus obducit, imponere uelimus: tunc enim necessario à parte pilos prius tollimus, quod quidem per nouaculam facere licet. Quidam uero siue reuera siue ficte nouaculæ timorē confitentur, quoniam periculum sit ex ea cutem fauciari, Quidā autē non citra rationem fortasse metuunt, maxime quum partes gutturis radi oportet. Quapropter necessarium est medicum etiam huiusmodi pharmacorū experientiam habere, tum quod ad compositionem, tum quod ad usum attinet.

Psilothrā à Critone hac uerborum serie conscripta.

Psilothra capillorū, auripigmenti auricoloris scrupulos v. i. l. aut x. calcis uiuæ tantundem, amyli sextantem, terræ quæ Romanis Selinusia appellatur, unc. l. Omnia trita & per angustis cribrum excussa reponito. Vfus uero tempore ex pharmaco quod sufficit acceptū aqua cõquassato, dein de illinire iubeto ac animaduertere ne exurat. Aliud. Euestigio leuē reddit: Calcis uiuæ partes ii. auripigmenti partē i. hæc in mortariū plumbeū coniecta, aqua aut prisanæ succo affuso terito, atq; ubi nigra reddentur, calefacta illini maxime in balneo iuribeto, leue enim corpus reddunt. Quod si uero tenuis capillus enascens subeat, calcem coquito, & auripigmentū cum aqua terito, & in uas fictile nō picaū cõiecta coquito, atq; ubi coacta fuerint, nigraq; reddita illinito. Paridis saltatoris psilothrū. Statim pilos auferit: Sādarachæ unc. l. calcis uiuæ sextantiū l. Trita cum aqua diligēter coquito, atq; ubi ebullire cõperint, ablatis uisior. Experientium huius facies, si pinnulā in ipsum psilothrū immergas, breui enim glabra fiet.

Aliud. Amyli unc. l. calcis uiuæ unc. l. auripigmenti unc. l. cõrufa & cribrata reponere, utereq; ut dictū est. Heradidæ Tarēni psilothrū. Euestigio pilos tollit: Calcis uiuæ sextantiū l. cimolix sextar. i. pumicis usti sext. l. auripigmenti partes iii. trita ac leuigata reponito. Vfus uero tempore aqua dilutis, ut dictū est uisior. Hæc quidē igit Crito scripsit. Ceterū eorū usus melior est quæadmodū nūc mulieres utunt, post corporis uidelicet illitionē in tepidā balnei domū ingredites, atq; ubi exudare cõperint, strigili pharmacū ex aliqua corporis parte detrahētes; deinde quū simul auferri pilos senserit, reliquū corpus omne abluētes.

Quæ pilos disperdant:

Scriptum quoq; de his est, quæ pilos disperdant in cõptorijs libris, quæ sanè siam ex medica materia exciderūt. Quapropter & ego simpliciu tantū ex eis faciā mentionē, in simpliciu itē pharmacorū tractatu à me relatorū. Iuxta rationē enim propolita pharmaca componunt. Ex lepore marino, hepate chunni putrefacto, cedria, ranarū in uiridibus aridinetis degentū cruore siue muco, marinæ testudinis

testudinis sanguine, lachryma uitis albæ, lachryma hederæ, similiterq; bryoniæ, ac oleo quod insullum appellatur. Ex marinis itē scolopendris, urticaq; marina, & stellis marinis, nitro ac amurca ad hæc ammixtis. Quin & fortiora his ex heri naceis & salamandra componūt in oleo coctis. Ammifcent autem ipsi & alcyonia & sandatachen, & quæcunq; alia eius generis existunt.

Quæ pilos attenuant.

Cap. V



Tetur etiam aliquando medicus uelut dixi, his quæ pilos attenuant, quæ nō eandem cum depilatorijs facultatem habent. Quam enim in simplicium pharmacorum commentarijs exterforiam facultatem appellauimus, eiusdem sunt etiā ea quæ pilos attenuant. Quemadmodū autem in omnibus eiusdē generis pharmacis, differentia secundum excessum & defectum existit, Sic etiam in exterforijs habet. Ordei itaq; farina, & fabarū, ampliusq; erui, spuma nitri, ac ipsum nitrū, familiaria pharmaca sunt omnibus ad tollendas sordes usurpata. Assiduus autē corū usus etiam pilos attenuat. Quæcunq; uero fortiori uel exterforia prædita sunt, in his qui ualde duros & magnos pilos habent adhibere conuenit. Eius itaq; generis pharmacorū est nitrū ustum, & nitri spuma, & aphrolitrum spumofum. In assiduo autem usu faciunt item Nigra appellata uasa Alexandriotica, confusa uidelicet & tenui cribro excreta. Cæterum pauperibus ego etiam fictilium, & clibanorū in quibus aliquid sub textu coquitur, testas, itemq; pumicem ustū, ac non ustum indicaui. Vili autem & gratis habuerit quis citra mare degens, aut utbe quapiam non longe à mari sita, testas uistas, tum buccinorum, tum purpurarum, aliorumq; ostreorum, Sepiæ uero testam etiam citra uestionē, atq; hæc quidem pro ualde egenis indico, pro alijs uero alcyonium, & herbam lanariam, utrunque ueratum, Bryoniæ itemq; dracunculi radicem, aristolochias, canchry, & panacis radicem, & quæcunque eius generis existunt: plura enim, ut dixi, relata sunt in simplicium pharmacorum tractatu. At uero si hæc ipsa odorata facere uolueris, cyperū, & melilotum, rosasq; siccas, & iunci odorati florem, iridem illyricam, melissophyllumq; & cydoniam herbam, eis ammiscebis. Et si pro diuitibus paraueris, spicam nardi indicam, celiticamq; & montanam iniicies, & terram Eretriada. Ad des etiam folium malabathri, amomum, myrrham, crocum, costum, & hedychroum. Qui uero preciosiori materiæ parandæ non sufficit, ei uiliores hi qui exornatoria composuerūt, excogitauerunt. Quorū etiam Crito meminit in primo de ornatu sic scribens: Oulam nouam figulinam magnam, operculum habentem accipito, in eamq; cimoliz glebas pro situs ratione cōfiscito. Componantur autem hæ quantum fieri potest ad theatri formam, ut in medio ipsarum locus uacuis relinquatur. Inter glebas autem uicissim mala cotonea recentia uiginti locentur, hæc autem per interualla uariare iubeto, deinde operculo imposito marcescere ipsa mala sinito. Visu autem expetente quantum satis uidebitur accipito, terito, ac uti iubeto. Post pilorum thororum uero impositionem, suauem quendā odorem habet. Aliud, Rosas quàm odoratissimas per diem unā in umbra refrigeratas, quo humor saltem ab eis desiccet, in uas figulinum composito, eodemq; modo ut dictū est glebas cimoliz indito, ita ut rosæ substernantur, rursusq; inter glebas eadē imponantur, deinde operculo addito, combibere sinito. Visus iam demonstratus est.

De fursuribus.

Cap. VI



Vibuscum se scalpentibus, fursuribus similia ex capitis cute decidunt, & propterea fursures medici hanc accessionē siue symptoma appellant, à uisatilis serosis humoribus proueniētē quos cōsumere scopus est eis qui malum hoc sanare uolunt. Manifestū igitur est discussoria & exte-

& exterforia pharmaca adhibenda esse preparato prius uniuerso corpore, si uis
 tiaris humoribus repletū uideatur. In omnibus enim huius rei meminisse oportet,
 etiam si aliquādo in sermone relinquitur. Ammisuerunt autē quidā prædic-
 tis pharmaeis quædam adstringētia, quo per ea affectū membrū corroboreretur,
 ut ne facile in seipsum suscipiat influentes humores serosos, sed resistat eosq;
 repellat: & ob hoc sanē Archigenes in pharmaco ex atramento sutorio compo-
 sito hæc uerba adiecit, Hoc inquit adeo efficax est, ut neq; in posterum fiant. Cri-
 to equidem in tertio libro de ornatu, eiusmodi pharmacorum syluam scripsit in
 principio statim ipsius libri, quare uelut paulo antē dixi, minime necessariū est
 me ipsa hic rursus describere, quum omnes illius habeant libros. Cæterum quæ
 Archigenes scripsit indicabo ob id maxime, quod quibusdam ex eis adscripse-
 rit, Quod non permittant symptoma hoc rursus fieri. Scribit autem hoc modo
 suis ipsius uerbis: Diæta eis constituatur flatus expers, nihil ex crassi succi cibis
 habens admixtum, quales sunt tubera, fungi, bulbi, legumina, carnesq; maxime
 bubulæ, ac quæ similia existunt. Sint autem cibi quibus uescuntur boni succi,
 faciles concocti, & mel ipsdem addatur. In sinu conferunt acetum cum sapa-
 Condimenta, cumini & fœniculum, Alijs parce utantur, & a bellarijs omnibus
 maxime abstineant. Vinum conducit eis album & tenue: uoluptatis uero gra-
 tia dulce, & uinum mulsū. Ex fructibus optima est uua arefacta, deinde ficus,
 quibus ante cibum reliquum uesci præstat. Verum ante omnia bonæ concoctio-
 nis cura habenda est, Deambulationes lenes plurimæ & mane & uesperis opti-
 mæ sunt, lauatio ex frigida balneis præstat. Si uero quis calida lauit, incongrua
 ei est longior in aere mora, & perussio capitis præ solio est eligenda, postea uero
 larga frigide adfusione refrigerato. Dormire ad fatietatem usque utile est. Ira, in-
 dignatio, uersatio in sole, & uehemens refrigeratio uitanda, omnia item quæ ca-
 put replent. Archigenis ad fursures capitis. Quibus fursures caput oc-
 cuparunt, his cum sceno græco, betæ succo, ac nitro præfrictis & extersis, cimo-
 liam felle bubulo aut sullo acetog; subactā illine. Deinde post horam ablue, atra-
 mentumq; sutorium ac nitrum cum oleo trita illine. Aut myrobalanum & faba-
 ceā farinā æquali pondere trita, in aqua coque, & affrica. Aliud, Amyg-
 dalas amaras decorticas cum aqua aut aceto affrica, quumq; exaruerint capiti
 calida ablue. Aliud, Aut maluam syluestrem aqua marina ad decimæ
 partis residuum coctam terito & affricato. Aliud, Aut niri spumam &
 atramentum sutorium, æquis partibus cum uino, ter aut quater in mense affrica-
 to, hoc adeo efficax est ut neq; in posterum fiant. Aliud, Aut uini Rhodij
 fecem, & pumicem, & nitrum, pari pondere cum lupinis affrica. Aliud,
 Aut cimoliam cum fœni græci cremore adhibe. Aliud, Aut nitrū assa-
 tum & bulbum. Aut hæc omnia simul pari pondere affrica. Aliud, Aut
 ubi picis liquidæ serum illeueris, alumen insperge.

De Phthiriasi, hoc est, morbo pediculari.

Cap. VII

Pediculorū generatio quibusdam in capite cōtingit acetuatim, ex mul-
 tis uidelicet humoribus calidis quidem, sed non ad tantā caliditatem
 progressis, ad quantā perueniunt a cres & serosi humores. Quare ma-
 nifestum est in profundo cutis, pedicularis morbi affectionem fieri,
 ubi etiam animalia hæc generari possibile est, nō in superficie cutis, in qua fursu-
 res consistere diximus. Pharmaca itaq; ipsorū necessario exicantia sunt, & que
 ex alto trahere ac euacuare possunt, magis utiq; quàm ea quæ fursuribus conue-
 niunt. Atq; hæc quidem Methodus est ea componēdi, Verum sylua eorū quæ
 experiētia cōstant (Oportet enim, ut dixi, in omnibus maxime attendere ac con-
 siderē

fidere his quibus experimentum testimoniū præbet,) in tertio libro Critonis de ornatu scripta est, Apponam autem etiā nūc ego ab Archigene scripta hac serie uerborum. Remedia morbi pedicularis: Morbo pediculari affectis hæc cōferunt. Staphidis syluestris partes II. sandarachæ & nitri utriusq; partē I. cum aceto & oleo capiti illine. Aut Rhoen qui in obsonia additur cum oleo tritum similiter illinito. Aut oxylapathi radicem cum oleo eodem modo. Aut uerratū album, & staphidem syluestre, & nitrū pari pondere cū oleo in balneo adhibe. Aut cum aqua marina, aut muria meraca cum aceto perfundito. Quod si nuditas pilorum adsit, syluestrem staphidem cum oleo & aceto imposito. Aut alumen tritum cum oleo illinito.

De Achoribus, hoc est, ulceribus capitis manantibus.

Cap. VIII

INter affectiones cutis capitis connumeratur quoq; ea quæ Achor appellatur, ex genere tumorū præter naturam existens: propriam autem & singularem appellationem nacta, ob accessionem quæ ad eam cōsequitur proprietatē: ualde enim tenuibus foraminibus eroditur, quæ tenuem in se humorem modice uiscosum cōplectuntur. Ad similitudinem uero eius proxime accedit alia cutis affectio quæ satius, græcis Cerion uocatur: maiora tantum foramina habens, in quibus humor hymettio mellis similis continetur. Generatio ipsius ex humore mixto est, qui partim tenuem serosumq; ac mordacem, partim uero crassum succum in se habet. Tenuis itaq; humor utpote mordax, primum quidem ad scalpendum ipsos impellit, progressu uero temporis ad scalpituram tum tumor augefcit, tum foramina circa ipsum erumpūt. Manifestū igitur est euacuare oportere humores affectionem ipsam operātes. Qui si etiam influant ampliū, prohibendus primum est ipsorum influxus, per capitis euacuationem, præmissa totius corporis purgatione, uelut in alopecijs est proditum. At uero si parua affectio existat, sola localia & partialia appellata remedia, citra totius corporis euacuationem suffecerint. Conuenient aut ipsi ob crassitudinē uel delictet & uiscositate humoris eas generantis, pharmaca quæ ipsum incidunt, quæq; facultate sua necessariō discuntant & repellant. Atqui acetum ex incidentium ordine existens, ultra hoc quod discunt, præcipuum quiddam in se habet, quo reprimiq; ac quod influit depellit, utpote quod substantia sua modice calidum est, plurimum uero frigidum & partium tenuium; tali namq; facultate præditum esse, in primo de simplicium pharmacorum facultate demonstratū est. Sit itaq; acetum exquisitè acidum, in quo nulla penitus uini qualitas appareat: hoc ipso sanè pharmaca metallica appellata, modo hoc, modo aliud imbues, achoribusq; ex eis medeberis. Incipere autē ab imbecillioribus præstat, præsertim si dolor simul ipsis adsit. Cimolia igitur ad hanc rem apta est, & Cretica lemniaq; terra, pompholyxq; & spodium, spuma argenti & cadmia tenella. Quod si neq; ex his quiescat malum, pharmacum ex charta siccum aceto dilutum illinito. Neque obscurum est tollendos prius capillos antequam talia admouear. Si uero acrius tibi ex charta pharmacum appareat, miscebis ipsi argenti spumā: siquidē sufficienter mordacitatem eius exoluere uelis, pari copia: si uero modice tantum remittere uelis, minori, quemadmodum etiam si plurimū eius uim exoluere placeat, maiorem eius copiam addes. Porro quum aliquādo rurū degenti mihi pharmacum ex charta ad manum non esset, conspecta in agri domo inutili aliā charta faculam postulauī, exustaq; charta ac aceto diluta, locum affectū illeui, hominemq; ad me postredie uenire iussi: sciebam enim quōd quum dura carnis esset pharmacum ferre posset, qui ubi uenisset, parū aberat quin curatus esset: quare ad aliud pharmacum non transiui, sed eodem uti iussim, postera die perfecte sanitati restitutum.

tum cōspexi. Prudenti igitur uiro, quod saepe iam dixi, opus est, & qui tum cur-
randorum morborū substantiam, tum aegri naturam probe nōrit. Insuperq; phar-
macorū facultatē non iuxta genus tantum, sed & iuxta quantitatem cognoscat,
quo singulis diebus quali prēsidio opus sit cōiectet. In extēdenda enim aut exol-
uenda pharmaci, quod prioribus diebus admotum fuit, facultate in quantum sa-
nē affectio ipsa indicat, congrua curatio consistit. Ad Achoras inflāmatos.
Quod si quando in ulcus manās inflāmatū simul & dolorosum incidās, lenies
primum per humectum concoctoriumq; ac emolliens & acrimoniā arcens phar-
macum dolorem, Tale autem est parygrū appellatum, ab Hera alijsq; plurimis
descriptū. Satis manifestum autem est quod ipsum in manu per specillum latum
cum rosaceo emollium & ad unguentī formam redactum, non emplastri forma,
qualem à principio habebat, adhibere oportet. Conueniunt etiam hoc tempore,
ea quæ ad sedem ex ulceribus aut rupturis dolentem faciūt, de quibus priuatim
destinato sermone ac tempore dicitur, Sicut etiam conueniunt ea quæ cancos
mīgant. Hæc igitur omnia ubi prius cōsideraueris, etiam particularem pharma-
corum uarietatem utiliter cognosces. De qua ego quoq; dicere aggrediar, Quæ
apud præstantissimū quemq; medicum laudata reperi pharmaca deinceps scri-
pturus. Ad Achoras Archigenis. Archigenes in primo pharmacorū iux-
tā genus, ad Achoras sic scripsit. In quibus Achores, aut papulæ feruidæ, aut
eruptiones circa caput ulcerosæ sunt, ab omni acri & salso abstineant, itemq; aci-
do. Deinde derafis capillis, aut ter, aut sæpius quotidie ex calida in qua myrtus,
aut lentiscus, aut rubus, aut bryonia, aut sycomorus, aut lupini, aut lētes, aut aspa-
ragi radix incocta sint, lotis & maxime ubi multa sanies effluerit, salicis folia ex
aqua imposito, aut lentem cum melle, aut asparagi radicem coctam eodem mo-
do. Aut foenum græcum betæ succo maceratum pinguius emplastris usu cō-
gnitis ammisceto ac utitor. Aliud præclare faciens. Pinus corticem cum
cerato. Aut cadmiā cum oleo ueteri illinito. Aut cinnabari similiter triū im-
ponito. Ilicebit & myrti baccas, aut ordeū ustum, aut argenti spumam, aut cerus-
sam, aut ostreorū testas uistas ammiscere, singula etiam cum oleo ueteri illinire.
Aut spodium & mannā ex uino. Egregie constanter facit & chalcitis cum ace-
to & oleo ueteri illita. Aut betæ decoctum cum modica cimolia, sale & uino am-
mixtis, in balneo affrica. Aut hyoscyamum & semperuiū minus, trita cum ro-
saceo mellis spissitudine illine. Aut ulceribus ex smeignate quopiam repurga-
tis, Terram cimoliam torrefactā cum uino, aut fecem uini rhodij ustam cum ui-
no ueteri, aut radicis cucumerū syluestris decoctum adfundito ac proluo. Aut
ragacantham aut argenti spumā, aut sandarachæ duplum, cum uino, aut etiam
cum oleo myrteo, ut pingui quopiam illinito. Aut argēti spumā & calcem pari
pondere cum aceto & oleo illine. Aut chalcitidem cum myrteo oleo uel fusillo
felle liquido illine. Hæc quidem Archigenes scripsit, doctrinam tradēs non mo-
do Empiricā sed etiam indefinitā. Inuenire itaq; est apud Empiricos, qui sanē
non in contentiosis sermonibus uitam contriuerunt, sed in medicæ artis operi-
bus diligenter uersati sunt, quod in quibusdā apparētibus cognitionibus euiden-
tā discriminā retulerūt, qualia & ego paulo antē in alopecta feci, faciām autē &
nunc in his quæ Archigenes scripsit pharmacis. Quædā enim ex eis incipientes
achoras, citra humorū in uniuerso corpore uitiationē aut eorūdem multitudinē
redundantē, sanant, adstringentem nimirū & repulsiuā uim habēda. Quædam
uero ubi magnū quoddā malum minuitur Achores, eos augeri prohibent, simul
& quod insiuit repellentia, simulq; quod iam in eis continetur concoquentia &
discutientia, quæ euidēs est mixtæ facultatis esse oportere. Quædā autē eis quæ
in superficie

in superficie hærent, paruisq; tantũ auxiliantur, quæ moderatis uiribus prædita esse oportet, & nihil quod irriter habere, ex discussoria nimirum facultate. Alia autem uiribus omnino robustissima sunt, adeo ut etiam Achoras ex crassis ac uiscosis humoribus obortos, ineluctabiliterq; cuti infartos euacuare possint, atq; id adeo ualide ut etiã si obduratũ quid habeant, id ipsum deturbare ualeant, quãuis ipsum cutis habitũ in eiusmodi malum habitũ inducant, ut quod insinuat corrumpatur, etiam si cõmodum id existat. Hæc autem sunt ex efficacissimis pharmacis cõposita, quale retulit Archigenes ubi salem ad reliqua discussoria ammiscet. Sal enim & chalcitis, & uini fex usta & sandaracha, & calx uiua fortissima uiribus pharmaca sunt, calfacientia, mordentia & discutiẽtia. Eius generis est etiam fel calidiorũ & siccorum animalium, quorũ non meminit Archigenes, sed uisus suilli tantũ, quod omnium moderatissimũ existit ad cuius facultatem etiam proxime cinnabari accedit, propinquũ deinde locum habent cõcha usta, & hordeum, & post hæc oleum uetustũ. Quemadmodũ autem hæc emouent, secant & discutiunt uolenter impactum, Sic repellunt adstringentia, Aliqua quidẽ simpliciter citra cõtrariæ facultatis ammixtionẽ, aliqua uero per dominũ adstringentis in eis facultatis. Myrti equidem earumq; bacca, & pinus cortex, ex eorũ numero sunt quæ non habent cõtrariæ facultatis ammixtionem, uelut etiã rubus & lycomyrus, quãuis moderatius adstringant, q̃ myrti earumq; bacca, sed tamen adstringendi uim sensibilibiter in se habent. Mixta aut facultatis est oleum myrtẽũ. Nam & ex oleo, & ex baccarum myrti, aut ipsius etiam myrti succo est compositum. Oleũ autem ipsum emollientẽ habet facultatẽ, Myrtus autem eiusq; bacca adstringentem, non mollire, sed cogere & stringere natam. Rosaceũ item quanquã minus q̃ myrteum adstringat, tamen & ipsum mixta facultatis existit. Quemadmodũ autẽ hæc per præparationẽ mixtas uires habent, Sic alia sponte naturæ talia sunt, uelut lãtiscus, cyprus, & lentes: quod ipsum in sermone de his est demonstratum. Cæterũ discussoria & repurgatoria, citra sensibilem caliditatẽ, facultate præstāt ex eis quæ iam Archigenes retulit, Beta ipsa, & cimolia usta, priusq; uero uritur imbecillior uiribus q̃ beta est, sed fortior his est cucumeris, et bryoniæ ac aparagi facultas. Spuma uero argenti præstantius quidẽ quàm cimolia usta pharmacũ est, Multo uero debilius q̃ ad propositæ affectionis sufficiat medela. Cadmia autẽ moderate habet ad mediæ magnitudinis achoras. Citra mordacitatem uero resiccat spodium. Manna autẽ etiam concoquit. Oleum uero ut iam dixi, laxantẽ quidẽ habet uim, sed eam non adeo fortẽ, atq; ob id per mixturã facile exuperatur. Itaq; ubi fuerit cum obducentibus meatus & refrigerantibus permixtũ, uelut est cerusa, possibile est hanc magis uim suam demonstrare, quæ est cogere, oppilare, & adstringere substantiam corporũ quæ cõtinent. Porro hæc omnia in Archigenis sermone confusa sunt, neq; in quibus achoris, neque quãdo eis utendũ sit, ipso demonstrante. Vitur autẽ & uino in eodẽ sermone, neq; apponit quale probet. Atqui multijuga circa uinũ differentia existit, Aliud enim austerũ, aliud acerbũ, aliud dulce, aliud acre manifeste est, aliqua etiã plures qualitates simul ex se ostendit, nimirũ & dulce quippiã & adstringens & acre cõplectentia. Quando igitur simpliciter quis scribat, dulci debere quippiã uino, lectorem cõiectare oportet quem scopũ pharmaci cõpositio habeat, & ad illum respiciendo, id quod aptum fuerit uinũ eligere. Adstringens quidem ubi repellere uelit, acre uero in quibus discutere. Reliquis item utetur quemadmodum uniuscuiusq; uim demonstraui in loco ubi de uinorũ differentiis docuimus. Acetũ uero in omni occasione ad achoras aptissimũ est, utpote crassos & uiscosos humores secans, atq; id quod insinuat discutiensq; & repellens. Verũ ipso non utiq; per se

per se quispiam utetur, siquidem non proluere aut lauare achoras uelit, sed ad diluenda cum eo pharmaca, moderata quidē in quibus incipit & adhuc parua est affectio, fortia uero in maioribus & diuturnioribus, fortiora autē adhuc in inueteratis iam & agerrime curabilibus. Verum differentia pharmacorū iuxta fortitudinem iam ante à me relata est. Cæterum ex relatis ab Archigene pharmacis, in totum non uti exoptem semper uisusq; & cerusa. Illud enim strenuius refrigerat quā conuenit incipientes achoras refrigerari. Cerusa uero modicā quidem habet frigiditatem, & ex pharmacis est obducentibus meatus, pro ea autem uti possumus spodio & pompholyge.

Quæ Apollonius in primo de parabilibus ad Achoras scripsit.

A Pollonius in primo de parabilibus ad achoras primū quidem sic scripsit Rosaceo oleo caput illine. Deinde post hoc, beræ succum similiter illine. Tertium deinceps, Testudinis sanguinem eodem modo adhibe. Quartum, Laurino oleo caput illine. Et quintū, Crocinū ungentū inunge eodem modo. Ex his sane primum debilissimū est pueris & mulierculis teneræ carnis in principio affectionis utile existens. Concoquit enim & discutit ac repellit, eaq; omnia moderate facit. Secundū uero ubi beræ succo uti cōsultat, efficacius quidem est rosaceo, discussoria uim habens, nō tamen ad fortes ac iam obfirmatos achoras sufficit. At uero testudinis sanguis curiosum & superuacaneū est pharmacū, neq; unquam tentari eius periculum facere. Quod uero deinceps scriptū est laurinum, fortiter calfacit & discutit, opusq; habet corporis totius & capitis euacuatione, quo discutiat humores achoras facientes. Crocinū deinde ungentū discussoriū quiddam habet & astringens, & cōcoctorium, atq; ea tria fortiora in ipso sunt q̃ in rosacei natura: ex eis igitur quæ de illo dicta sunt, etiā de hoc ratiocinari licet. Post hæc autem ipsius uerbis ita scriptum est: Tauri urinā affrica. Deinde sequitur, facit & cameli urina eodem modo. Utendū autem eis, inquit, ad plures dies. Verū ego utq; dixerim ad ipsum, Non esse quod ad multis dies, sed ne ad unū quidem, purus homo tolerare queat, ut uilius alicuius eiusmodi animalis urinā capiti affundatur, præsertim in affectione adeo parua, & quæ facile curari potest. His enim per omnia (quod dicitur) distans est, rosaceo uidelicet uti, quod penitus exiguum habet ad propositum symptoma facultatē, & tauri ac cameli urina quæ acerrimæ grauissimæq; & penitus iniucundæ existūt. Deinceps uero tale quoddam pharmacū his uerbis scriptū est: Fursurū chœnicē dimidiū in aqua heminis duabus madefacito, posteaq; terito ac succum excolato, cumq; dimidiā aceti hemina ad limi spissitudinē coquito, & ex eo caput fricato. Deinde aqua in qua beta, aut fœnum græcū, aut lupini cocti sint, abluito. Vngētō autē irini fece utitor. Hoc pharmacum discussoriū est citra mordacitatem, ex repurgantibus atq; extergentibus appellatis cōpositum. Eiusmodi enim facultatis sunt fursur, beta, & lupint: discutit autem simulq; calefacit non uehementer fœnum græcū: ex eo autem genere est & irini ungenti fex. De aceti uero facultate antea quoq; dictum est, quod aptum sit ad achorum affectionē, quare hoc ut cōuenientissimo & efficacissimo pharmaco utendū est. Aliud deinde post hoc pharmacū scriptū est ab Apollonio his uerbis: Cucumeris syluestris radices decoquito, & succum affrica. Didicimus autem cucumeris radicē plurimū discussoria facultatis esse. Et postea hoc pharmacū scriptum est: Terræ cinoliz, sulphuris utui, par pondus cū aceto terito, & in balneo affricato, calidæq; abluito. Hoc illinire etiā cōuenit pharmaci, nō solum ut dixit in balneo adhibere. Omnes enim habet facultates quibus affectio indiget, a ceto quidē ipsas habente uelut antea est dictū. Solū uero sulphur ulterius quā cōuenit excalfacere & discutere potest. Quæ

propter cinoliam ei ammiscuit, quæ cōpositionem ex utroq; ad moderatā temperaturam reducit. Ceterū quod sequitur pharmacū ubi inquit, Maluam extercatam & iusam in urinam inspergito & affricato, reprehendo, in quantum etiā superius urinæ usum detestatus sum, etiā si facultatem eius affectioni cōuenire non negauerim. At quod deinceps scriptū est, in quo ait sic folia in aqua coquito, & aquam sub diuo per noctē exponito, inieciāq; in ipsam fece usta affricato; post hæc uero tepurgantibus pilos, eluito. Acce ualde hoc extersorū medicamentum est, quod si in balneo tantū adhibeatur, nō uehementer ualet achoras irritare, præsertim si quis, ut ipse deinceps iubet proluat, hoc est, ex aqua dulci caput perfundat. Ad illud uero ei usmodi pharmaco uti periculosum est. Est enim plurimum acre medicamentū sex usta, quemadmodū in libris de simplicium medicamentorū facultate est cōmonstratū. Quod uero sequitur pharmacū securi usus est, eoq; confidenter quis utetur ex spuma argenti laurinoq; cōposita. Miror autem quomodo, ut laurino simile, oleum simplex ammiscet, sic quodāmodo scribens. Argenti spumā cum oleo albo, aut laurino tritam, ubi calida prælaueris circumlinito. Longe enim deficit à laurini facultate, oleū cōmune quod album appellauit, ea ipsa usus est à laurino distinctione. Quin & quod post hoc scriptum est, consimilem habet absurditatem; pro spuma enim argenti cerusa utitur, diluit autē ipsam myrteo aut laurino, quā multā omnino differentiā hæc pharmaca habent; alterū enim repulsorū est, alterū uero plurimū calfacit & discutit. Vfusq; eorum est repulsorij quidē in principio, discussorij uero ubi humor qui achoras generat iam est firmatus. Amplius autē deinceps quā rubi canini folia cōtundere & exuccare iubet, deinceps oleo miscere, imbecille est pharmacū, & incipit ad affectioni solūmodo aptū, utpote quā rubus caninus adstringat. Tale pharmacum est etiā plumbago cum cerusa, uino subacta, usq; quo ad cōpagem quæ illini queat redigatur. Porro contrariæ prædictis facultatis sunt quorū æqualiter, nulla distinctione appositā meminit, id uidelicet quod ex nasturtio, & quod ex Scilla constat. De priore quidē hæc uerba tradens. Nasturtij & salis parem modum adipianserino ammisceto, terito ac utitur. De altero uero sic scribit: Scillā in fornace uelut cucurbitā cinere obruito, quumq; mollis fiet, exprimito, deinde ad succū oleo non multo ammixto, illinito. Manifestū uero est multo uehementius esse quod ex nasturtio apparatus. Quod uero deinceps tradit ex mitigatoriorum pharmacorū genere est, quod ubi dolor quispiam uehemens circa achoras exiit, donec cum leniat, conuenienter adhibetur. Si uero duos & inueteratos achoras discutere uelimus, omnino imbecille est. Scripsit autē in hunc modū de eo Aselepiades: Olei quā optimi heminā in pilam plumbeam insundito, & plūbeo pistillo terito, donec crassum & subnigrū reddatur. Deinde seorsim spumæ argenti libram 1. & cerusæ tantūdem terito, oleoq; ammisceto. Postea uero eloto & siccato capite pharmacū illinito. Neq; uero ex simplici tantum oleo, sed quandoq; rosaceo, quandoq; myrteo apparatus, & ad rugas anī intumescentes rimasq; ac fissuras sedis, ad ulceraq; dolentia, omniaq; alia quæ ex fortiorū pharmacorum usu exacerbata sunt, optimū medicamentū habebis. Egrege enim ea lenit, etiā si serpendo exedentia, aut eū cancerosa, aut quomodocūq; maligna existant. Nequāq; itaq; eius cōpositionem nunc scribere oportuit, sed quemadmodū ego antea dixi, sufficebat illud dicere quod dolorifici achores eiusmodi phar macis mitigantur. Cōmune enim hoc est in omnibus dolore adfectis, proprie autem faciens ad achoras. Deinceps autē tale pharmacū scripsit: Spumæ argenti drach. viii. foliorum rutæ tenerorū drach. v. olei drach. viii. aceti heminæ quartā partē, simul trita capiti illinito. Hoc sanē pharmacū multo usu habemus exploratum.

explorati. Propinquum autem ipsi facultate est id quod consequenter ab eo est conscriptum, iuxta hanc comensurationem. Cerusæ drach. VI. spumæ argenti drach. III. ceræ tantundem. sulphuris drach. VI. olei rosacei aut myrtei quod satis est ut ceratum liquidum fiat. arida cum cerato committito, caputque inde illinito. Hoc autem & ad omnes in toto corpore eruptiones uehementer commodum est, ut rite sit ab Apollonio conscriptum. Quin & quod postea sequitur plurimum diffusorium est, ut quod spumam nitri habeat multam, adeo ut nisi olei multitudinem castiget, acrius sit quam conuenit. lubera autem ad unam spumæ argenti partem, quinque ipsam spumam nitri ammisceri, hisque dum teruntur paulatim oleum adfundi, donec ad copiam illusioni aptam redigantur.

Quæ Crito ad achoras pharmaca scripsit.

IN Methodo de curandis morbis uniuersales facultates pharmacorum ad singulos morbos recensui, uerum paucorum definitæ materiæ exemplorum mentionem feci, dilata tum multitudinis ipsorum commemoratione. At uero in præsentem, quam nunc in manibus habemus, tractatione, omnia quidæ quæ omnes pharmaca scripserunt, longum fuerit recensere. Quæ uero à probatis medicis per experientiam tradita sunt, ea omnia uisum est mihi conducibilius enumerare, quo etiam inter se propinqua, & quæ omnino eadem apparent, paululum uero iuxta appositionem aut præparationem euant, hi qui in his scriptis uersantur cognoscant, eaque maxime præparent quorum materias in promptu habent. Cōtingit enim aliquando ut aut in totum ea quæ in cōpositionem miscuntur non reperiamus, aut alia reperiamus, ut ipsa inijcere non audeamus. Carterum eius maxime in cōponendis pharmacis cura habenda est, ut bona integraque & in uigore sint omnia quæ ammiscuntur. Ob id igitur etiam iam omnium quæ Crito tradidit mentionem faciam, nam is sanè diligentius achorum curam tractasse mihi uidetur. In quinque itaque sermones doctrinam de ipsis distinxit, quos primum & ipse recensebo. PRIMVS Critonis sermo de achorum curatione. Scribit itaque Crito hæc uerba. Ad achoras in capite contingentes, qui plerumque sursum præcedentibus sunt, & feruere etiam scabie, in principio subscriptis cōpositionibus utemur. Ad achoras recentes, gluten fabrilis aqua coctum oblinat. Aliud. Papaueris syluestris & hyoscyami folia cum oleo impone. Aliud. Fici uirgulta aut folia tenera trita cum aqua imposito. In inueteratis uero cum aceto terito. Aliud. Nucum amararum nucleos in aqua tepida iniectiones & decorticos, cum aqua terito, & cerati crassitudine præparatis imposito. In inueteratis cum aceto diluito. Aliud. Recrementi ferri & rosarum par pōdus cum uino terito & imposito. Quidam uero trita cerato rosaceo excepta adhibent. SECUNDVM sermonem ad achorum affectionem his uerbis conscripsit. Circūtensa autem cute, & ob id molestiam inferente, subiectis cōpositionibus utendum est. Liparum seu pinguis cōpositio ad achoras, pydracas, papulas feruidas, intertrigines. Est comoda quoque uirgis sedis. Spumæ argenti drach. I. foliorum rutæ tenerorum drach. XXV. aceto diluito, & rosaceo aut myrteo excepta, cum penna illinito. Alia. Spumæ argenti drach. CC. cerusæ drach. CL. rutæ drach. C. staphidis syluestris drach. XXV. aceti sextarios III. myrtei libras III. particulatim singula terito, & affuso liquore, ut dictum est cōponito. Alia. Cerusæ drach. CL. spumæ argenti drach. C. rutæ drach. C. myrtei sextarios III. particulatim tritis liquore affundito. Alia. Cerusæ uisæ drach. C. rutæ drach. C. manne thuris tantundem. corticis pinus drach. L. olei myrtei sextarios II. aceti tantundem similiter cōponito. Alia. Recrementi plumbi drach. C. pampinorum uitis drach. C. thuris drach. C. myrrhæ & spumæ nitri tantundem, aceti & myrtei quantum sufficit.

In TERTIO autem hæc tradit. At ubi affectio inueterata fuerit, subscriptis cōpositionibus utendum est, & deinde

ceps ita scribit. Damocratica cōpositio ad achoras humectos & inueteratos. La-
dani drach. viii. cerusæ tantundē sulphuris uiui drach. iiii. uino & myrteo oleo
subactis utitur. Alia, Spumæ argenti drach. viii. pampinorū uitis drach.
viii. succi hypocisthidis drach. iiii. spumæ nitri drach. ii. gallarū drach. iiii. aut ii.
ex aceto & myrteo adhibe. Alia, Malicorij, gallarū, acaciæ fuluæ, Malico-
rium & gallas uino macerata coquito, acaciā uero uino dilutā reliquis probe
trititis adijcto, quumq; recte omnia cōparata fuerint myrteo excipito. Alia,
Spumæ argēti, cerusæ, hyoscyami, misyos, ramulorū cicuta, æquales portiones,
thuris usti, ramulorum oleæ tantundem. aceto & oleo lentiscino exceptis utere.
Alia ualde cōmoda. Cerusæ uisæ drach. viii. spumæ argenti drach. viii. atrā-
mentū futorij drach. iiii. Rhois rubri drach. iiii. sulphuris uiui drach. ii. opij drach.
ii. myrrhæ drach. ii. aceto & lentiscino oleo excipe. **Q V A R T V M** uero ser-
monem de achoris curandis hac uerborū serie cōscripsit. Quando uero ex his
quæ ad achoras scripta sunt pleraq; resiccat, magisq; dolorē inserit, utpote cute
in ipsīs affectūs circūtena, itaq; subscriptis cōpositionibus utendū est p̄ quas post
hæc omnia citra dolorē emēdari. Leuce emplastrū albū inexuperabile, Fa-
ciēs ad humectos achoras, & qui a græ tolli possunt, facit & ad papulas feruidas
& intertrigines. Spumæ argēti drach. c. ceræ drach. c. alij l. habet. cerusæ drach.
c. thuris drach. xxv. aluminis scissi drach. xv. terebinthinæ drach. xxv. pīpe-
ris albi drach. iii. olei sextariū i. arida tundito. Oleū uero & argēti spumā ac ceru-
sam in ollā nouā cōiecta ad prunas coquito, atq; ubi mutationem acceperint, cer-
ram & resinam addito, ac donec nō inquinet amplius manus a girato, deinde ab
igne ablatis, & quodāmodo refrigeratū arida adijcto, & in pīlam translata dili-
genter emollito. Utitur aut in linteolum impactis, soluitorq; tertiā die. Magis au-
tem cōmodatū pharmacū hoc si cum Melino emplastro Pasionis fuerit permi-
xtum, ita ut emplastri inexuperabilis, Anicetū Græci hoc appellant, partes dug,
Melini aut Pasionis una pars committantur. Alia, Cerusæ drach. cxx.
spumæ argēti drach. lxxx. ceræ drach. xxiii. terebinthinæ drach. xii. mānæ
drach. xvi. aluminis scissilis drach. vii. olei heminas ii. cōmitte ut dictum est.
Melinum Leucij emplastrum, quod omnem fluxū resiccat, faciens ad achoras
inueteratos & humectos, ceræ drach. viii. sandarachæ drach. iiii. adipis uitulini
drach. iiii. terebinthinæ drach. ii. thuris drach. i. myrrhæ drach. i. aluminis scissi
usti drach. l. corticis pinus drach. l. olei myrtei qd satis est: liquefacta cū aridis cō-
mitito. Aliud Melinū Hygieni, resiccat omne fluxū. Spumæ argēti lib. i. ceru-
sæ lib. i. salis fossilis lib. i. aluminis scissi libræ dimidiū, atramenti futorij sexūcem,
olei sextarios ii. aceti sextariū i. Oleū, salem, cerusam, spumā argēti donec nō in-
quinet manus coquito, arida uero tusa, cribrata, acetoq; diluta, ad refrigeratū
pharmacū addito paulatim adstillando ac assidue agitando, deinde in pīlā transla-
ta a probe emollita, tollito ac utitur. Thebæi emplastrū ad achoras humec-
tos. Spumæ argenti drach. xl viii. cerusæ drach. xxiii. corticis thuris drach.
xii. gallæ omphacitidis drach. xii. ceræ drach. viii. resinæ terebinthinæ drach.
xvi. olei sesquihemina cōponito ut dictū est. **Q V I N T V M** postremū ser-
monē de achoris Crito ita ordif. Cæterū ubi affectio decreuerit & cicatrix per-
fecte fuerit obducta, ad totius mali translationē subsequētibz cōpositionibus
utendū est. Deinde smegmata plura scribit. unūquodq; iuxta hanc cōpositionis
formā. Smegma ad achoras, furfures, asperitates & scabies. Terræ cimolix
lib. i. nitri rubri lib. i. retrimentorū quæ ab expressa myrobalano reliqua sunt sex-
uncē, alij lib. vi. habent. myrrhæ drach. viii. pīperis albi drach. viii. nardi celticæ
drach. iiii. castæ drach. iiii. costi. drach. iiii. cōtusa & cribrata reponē, ac utere in
balneo

balneo. Aliud, Nitri rubri lib. iiii. terræ cimolizetātundem. retrimentorū ab expressa myrobalano lib. ii. cypri lib. i. alij iiii. baccharum lauri lib. i. iridis aridæ lib. i. radices bryoniæ, alcyonij, amygdalarū repurgatarum, cornu ceruini uisti, singulorū lib. i. Composito ut dictum est. Aliud, Fecis uini ustæ quam Romani feculā, nos tryga appellamus lib. xxiij. aquæ pluuialis sextarios xlviij. thuris lib. ii. terræ samiae lib. ii. olei Sabini lib. iiii. alij sextarios iiii. ceræ lib. iiii. & dimidiā. Fecem & aquam in dolum figulinū non picatum coniecta ad dies vii. madescere finito, & ter in die cum ferula agitato. Sequenti deinde die dilutum & sacco excolatū liquorem in uas æreum stanno oblitū transfero, & igni impositum coquito, luculentiore aut igne utaris: atq; ubi tertia pars reliqua sit, oleum & ceram iniice, rursusq; ad lentū ignem decoque: postquam uero iniecta fuerint liquefacta, thus, & terram samiam trita, addito, conquassato, & in uitreū uas robustū transfero, Tenuia enim rūpuntur. Vfus autē tēpore affectos locos circūlinens & diligēter cōfricans, abluere iube. præstaret quidē in balneo id facere, quod si fieri nequeat, in domo abluat. Cōmodum est pharmacū ad omnes sor-des, asperitatēq; ac scabiem cutis, itemq; ad lichenas. Aliud, Fecis uini ustæ lib. i. aquæ pluuiæ sextarios vi. thuris albi lib. ii. mastiches lib. ii. alcyonij lib. i. am-moniaci thymiamatis lib. ii. terræ samiae lib. ii. olei rosacei lib. ii. ceræ Tyrrheni-cæ albæ lib. ii. fecē in aqua ut dictū est macerato, ter singulis diebus cū ferula stre-nue agitando. Deinde excolatū per saccū liquorē in uas stanno oblitū trāsfero, po-sitūq; ad ignē ad dimidiā partē coquito, deinde liquecibilia adijcito, atq; ubi dis-soluta fuerint, alcyoniū tenuissime tritū infarcito. Habeas autē ad manū promptas in fecis aqua dissoluta, probeq; trita, thus, ammoniacū, mastichen, terrā samiam, eaq; strigmenticia prædita crassitudine, reliquis infarcito ac diligenter cōquassae-to, & ablatis utitor. Aliud Diasmyrū appellatum. Fecis ustæ lib. xxiij. aquæ pluuialis sextarios quadraginta octo, olei Sabini lib. iiii. ceræ lib. iiii. terræ samiae lib. ii. thuris lib. ii. mastiches lib. i. ammoniaci Thymiamatis lib. i. myrtiæ drach. viij. Composito ac utitor ut dictum est.

Quæ Cleopatra in libro de ornatu ad achoras scripsit.

Porro quæ Cleopatra ad achoras scripserit ea deinceps referent illius ipsius uerbis. Feno græco tenui cocto, et in betæ nigre succo macerato caput elua-tur: aut betæ decocto, aut terra cimolia in his macerata; Post ablutionem uero myrto cū uino & oleo trita illinat, superneq; betæ folia imponantur. Aliud ad ualde ulceratos. Cerusæ frictæ drach. ii. thuris drach. ii. sulphuris drach. i. trita ex oleo illinito. Aliud, Quod & ad furfutes facit. Nitri, atramenti futorij, utriusq; drach. i. terito affuso oleo & illinito. Aliud ad achoras. Myrrham & myrti albæ folia uiridia uino trita illinito. Aut terrā cimoliā torrefactā cum uino nigro illinito. Aut cerusæ & plūbaginis æquales partes cū myrteo tritas illinito. Aut sulphuris uiui, drach. vi. thuris masculi drach. i. aluminis scissi, sta-phidis syluestris, eruce, spūmę nitri, singulorū drach. i. atramēti futorij drach. i. ru-tæ ramulos tres, terito acetō moderate affuso, utq; laurino, aut myrteo, aut croci-no, aut oleo peteri ad stillato, quo pinguis cōposio fiat, eaq; ubi prius hoc sme-gma affricaueris illinito. Smegma, Hyssopi choenicē. i. lupinorū choenicēs ii. prisanæ choenicē i. fabæ fresæ choenicē. i. radices cucumeris syluestris drach. iiii. Hæc trita misceto & adfricanda præbeto. Idem & ad leprā & ad uatos facit.

Quæ pharmaca Soranus ad achoras scripsit.

Quandoquidem uero & Soranus de achoris, tum in quarto, de medicina, tum in unico medendi libro quem Monobiblū inscripsit, pharmaca quædam tradidit, quæ etiā nobis per experientiam constans, partim quidem proprio,

partim uero præceptorū, aut medicorū amicorū usu cognita. Quare etiā ea ipsa hic apponemus iuxta ipsius dictionē hoc modo tradita. Vbi multus saniei fluor exister, & uexatio doloris uehementer incūbat, lenticulam coctā tritam cū modico melle cataplasmaris modo imposito. Aut panem cum coriandro, aut plantagine, aut solano, aut feride, aut polygono, aut perdicio herba. Soranus quidem igitur uelut in implicata affectiōe, eiusmodi remedia adhibet, iuxta propriā sectā rationcinatus. Apparēt autē reuera cōmoda in principijs & circa generationes, communi repellendi ratione. Deinceps uero inquit, Vbi autē exacerbationes remiserint, radendi sunt loci, & fœni græci decoctio aut betæ, & similis, ex aqua, nō urina cōfricandi. Quemadmodū etiā nos prius reprehendimus eos qui per urinam eiusmodi mixturas faciunt. Postea uero pharmaca scribit etiam nobis, ut dixi, cognita. Plumbaginis, sulphuris uiui, æquales partes terito, & affuso rosaceo, aut myrteo, aut lentiscino donec strigmento sum reddatur, illinito. Aliud, Sulphuris uiui, spumæ argenti, cerusæ, omniū æquales partes, croci dimidiam, trita cum passo cretico illinito. Aliud, Rutæ leuigatæ, drach. iiii. Spumæ argenti drach. viii. aceto & oleo rosaceo ammixto illine. Aliud, Spumæ argenti drach. xx. calcis uiuæ, drach. xx. aceti heminā unā, terito ac uelut liparā aliquā seu pinguem compositionem illinito. Aliud, Chalcitidis drach. ii. sandarachis drach. iiii. spumæ argenti drach. i. uino austero & myrteo oleo simul trita illinito. Deinceps uero Soranus aliud forte pharmaci cōscripsit, quod profuæ sectæ instituto Metasyncreticū, hoc est, quod ex alto euocat humores ac transfert, appellauit: conuenit autē in inueteratis & ægre cedentibus achoris, ex eiusq; usu quispiam medicus nobis amicus magnū nomen adeptus est. Olei cedrini sextarius i. acetis acris sextarios iiii. coquito donec exhalet acetum, deinde adijce adipis suilli ueteris sale seruati lib. ii. eodē liquefacto, ollam ab igne auerto, & nitri triti bessellem, sulphuris uiui sexuncē, sandarachis unc. i. infarcito. Postquam uero illitum pharmacum exaruerit, in balneo per prædicta smegmata cōfricari iube, perq; unum & oua ac nitrum, & per radicem cucumeris syluestris decoctū; aut fece rhodiā, & pumice, cum aqua calida.

Ad psydracia, & achoras, pustulasq; ulcerosas, helcydria Græcis appellatas, & eruptiones in capite. Cap. ix.

AD præscriptas affectiones cōuenienti diætā uti oportet, corporisq; ac capitis purgationē adhibere, per pilulas ex aloe, colocynthide & scamonia, ita ut brassicæ succo coactæ ex his pilulæ exhibeantur. Deinde ipsa locali curatione utendū est, cuius generis est, adiantū cū rosaceo illitū. Aut fœni græci decoctū adfrictū. Aut malua cum farina ordeacea pro cataplasmate imposita. Aut melilotū cū farina fœni græci ex uino impositū & cicerū decoctū, ipsumq; cicer coctū impositū, nuces amaræ cōmansæ & illitæ. Discutit aut maxime & lilij radix affricta, & thus cū uino & aqua, & lupinorū amarorum decoctū affricctū, bulbi cum nitro affriccti, thus ex aceto illitū, putamen mali puncti cum laurino illitum. Aut anchusæ radicē ustam & tritā cum oleo donec strigmenticiam crassitudinem accipiat, cum pinna illinito, & ægrum iuuabis.

Finis primi Libri.

CAPITA SECVNDI LIBRI.

De omni capitis dolore, dimidiq; eius partis affectiōe uniuersalis doctrina.

Cap. i.

De cephalæa capitis dolore antiquo.

Cap. ii.

De Hemicrania, hoc est, dimidiæ partis capitis affectiōe.

Cap. iii.

CLAVDII

CLAVDII GALENI PERGAMENI

DE COMPOSITIONE PHARMACORVM SE-
cundum locos, Liber II. Iano Cornario
medico interprete.

De omni capitis dolore, dimidiaq; eius partis affectione,
uniuersalis doctrina. Cap. I



VICVNQVE citra distinctionem indiscriminatimq; doloris capitis auxilia scripserunt, maius detrimentum, quam emolumentum his qui eis fidem habuerunt, attulerunt. Ne quæ enim omnes ob unam affectionem caput dolent, sed tum ipsæ affectiones plures sunt, tum curatio ipsarum singularum propria existit. Vna etenim affectio est iuxta intemperiem simplicem, citra humorum complexum, Alia iuxta humorum qualitatem, uelut etiam tertia quæpiam alia iuxta multitudinem tantum ipsorum humorum contingit, Quibus accedit ea quæ fit, quum humores transiis liquorum ac uaporum obturarint. Et ad hæc alia est, quum in quibusdam capitis partibus, propter imbecillitatem, flauosus spiritus innascitur. Quandoq; etiam ob causam aliquam externam & laessentem, procatactice Græci appellant, uelut est ardor, frigiditas, ebrietas, plaga, capitis dolor contingit. Vehementissimi igitur capitis dolores fiunt iuxta caliditatem & frigiditatem, maxime quum inæquales existant. Moderati uero iuxta siccitatem. Ad humiditates uero nullus consequitur dolor. Eodem modo quum ob redundantes humores siue iuxta omnes capitis partes, siue iuxta unam quamcunq; tandem, siue duas, dolor contingit, uehementior quidem ob calidos & frigidos. Moderatior autem ob resiccantes citra caliditatem aut frigiditatem manifestam oboritur. Humectantes uero penitus nullum dolorem inducunt, quantum ad qualitatem ipsorum attinet, ob multitudinem sanè instrumentalium partium morbos faciunt, nõ tamen simularium partium ullum aliquem, in quibus solum affectiones iuxta intemperiem simplicem fiunt. At uero affectiones ob humorum multitudinem, citra quidem obturationem, caput grauant, cum obturatione uero, si quidem ea moderata fuerit, moderate dolorosæ, sin fortis, fortiter contingunt. Quod si etiam mordacem qualitatem humorum multitudo cõplectatur, etiam iuxta hanc dolorem augebit. Atq; hæc quidem differentiæ sunt affectionis, quantum ad causas attinet eas producetes. Aliæ uero sunt iuxta affectarum partium naturam, Aliquando enim extra caluariam affectio est, aliquando intra. Et quandoq; quidem omnium exteriorum aut interiorum est, quandoq; non omnium, sed unius tantum corporum generis, Arteriarum uidelicet, aut uenarum, aut ueruorum, aut membranarum, aut cutis, aut ipsius adeo cerebri. Itaq; difficilissimè est affectum cognoscere locum, siue unus, siue plures uno existant, aut qui tandè hijsi extent: nec uero affectionem inuenire promptum est, sed & hoc exercitato homine indiget, qui tum per rationis exercitium, tum per multam & assiduam affectionis ægrorum inspectionem, eam cognoscat. Proprietates enim aliquæ quidem omnino dici non possunt, quædam uero ægre circa ægotantia corpora ostendi possunt, utpote quæ tantum his qui eas sæpe uiderunt cognobiles existant. Non parum uero ad affectionis cognitionem faciit quædam ex causis laessentibus & externis, quæ priuatim procatactice medicis Græcis uocantur, uelut quum manifestus sensus & offensa ægros ardoris aut frigoris contingit: & facile sane eiusmodi

eiusmodi affectiones recentes sanantur; probeq; & rite ab eis initium sumptis medicis, qui præsidia ac auxilia morborum cum distinctionibus descripserunt. Multa quidem igitur à uetustioribus pharmaca simplicia & composita ad huiusmodi affectiones descripta sunt, Mihi uero etiam hic satis erit ex recentioribus apponere, qui sanè tum ea quæ ueteres inuenere conscripserunt, tum ipsi etiam alia quædam addiderunt. Equidem uniuersum curationis scopum singularum affectionum ratio nos docet, At uero materiæ facultates experientia ipsa demonstrat. Per hanc igitur auxiliorum copia progressu temporis augetur, Atq; adeo nunc tempus adest sermoni, propria auxilia iuxta singulas affectiones describendi, Initium ab his quæ secundum qualitates solas à naturali cuiusque particulæ statu discesserunt, facturo.

Quæ Apollonius ad capitis, propter ardorem, dolorem conscripsit.

Apollonius igitur in primo de parabilibus ad capitis, dolorem propter ardorem sic scripsit: Rosaceo assidue caput irrigato. Aut lanam siue linteolum rosaceo tingito & imposito. Aliud, Narcissino ungento similiter utitor. Aliud, Melino ungento eodem modo utitor. Aliud, Aut mori succo per linteolum expresso, cum pari rosaceo utitor. Aliud, Portulacæ folia trita, per se, & cū polentæ flore imposito. Aliud, Cupressi folia trita per se & cum polentæ flore imposito. Aliud, Solanum per se & cum polentæ flore imposito. Aliud, Sesamum terito & rosaceo adstillato imposito. Aliud, Viris folia cocta trita cū mulla aqua imposito. Aliud, Folia ricini contusa & in octo aquæ heminas coniecta sub diuo per noctem exponito & cum aqua caput perfundito, & posthæc descripta iam ante imposito. Aliud, Conyza odoræ fasciculum decem & sex digitorum, in aquæ heminas octo coniectum, sub diuo per noctem exponito, & leniter aquam effundito. Utendū & cibi subtractione, & uentris euacuatione, somnoq; & quiete. Vitanda autem maxime uinum, sol, & balneum. Amplius autem & fomenta, clamor, contentio, omnisq; mentis perturbatio, & percussio. In bona autem animi habitatione & firmitate degendum.

Ad capitis dolorem ex frigore.

Irino ungento calido caput rigato, Vtere etiam lanis ac linteolis in eo madefactis. Aliud, Laurino ungento similiter utere. Aliud, Farina cocta cum aqua mulla utitor. Aliud, Lauri folia tenera cū irino ungento trita capiti infunde. Aliud, Samsuco cum uino trita aut rosaceo similiter utitor. Aliud, Cyperum tusum adipe asnerino ammixto, capiti illinito. Aliud, Cornu cerui exurito, eiusq; acetabulo, uinum odoratū dupla mensura ammisceto, terito ac illinito. Aliud, Conuenient & fomenta per spongas calida imbutas & expressas, maxime si lauri folia tenera in aqua fuerint in cocta, aut samsuci, aut cyperi, Et lanarum mollium fasciculi ungento irino & uino rigati, capitiq; circumpositi, Item tegmina, & tepor, & ciborum subtractio, ac uentris euacuatio. Amplius autem & somnus & quies, & corporis tranquillitas ac læticia. Vitanda uero similiter clamor, contentio, uinipotus, & frigiditas. Hæc quidem auxilia aduersus capitis dolorem ex ardore obortum Apollonius scripsit. Appellant autem ardorē ex sole æstiuo circa caput factam perseuerantē caliditatē. Omnes enim homines in sole æstiuo diutius uersantes capite incalescunt, non tamen omnibus æqualiter caliditas permanet, sed statim quiescit, quibusdā etiam ante balneū, plerisq; uero post lotionem; quibus cunq; autem permanserit, affectionem capitis iam iuxta habitum non simplicem modo contractum factam putantes, ardorem appellant. Aliquando igitur sola intemperies

intemperies cōsistit, affectione circa caput calidiorē facta: aliquando uero etiā humorum aut uaporum multitudo ad ipsum caput decurrit: & maxime quū redundantia quædam humorū, quam Erasistrati sectatores plethoran, hoc est, plenitudinem uocāt, in toto corpore oberrat, sit autem hæc quatuor humoribus æquo auctis, aut etiā sanguine solo. Nam quum alius quispiam humor redundat, uelut sit pituita, & flaua bilis itemq; nigra, eiusmodi auctiōe siue redundantiam, non plenitudinē, neq; simpliciter multitudinem, sed cum appositione, pituita, aut bilis flauæ, aut nigræ, in corpore factā multitudinem dicunt. Cæterum eis qui ex ardore caput dolent, cutis tactū aridior ad primum cōtactum apparet oculosq; rubros habet, frigidisq; tum perfusionibus, tum illitionibus gaudent. Principio igitur repulsoria curatione utendū est, ex refrigerantibus & adstringentibus conitante. Postea uero mitigatoria & concoctoria pharmaca ad repulsoria ammiscere oportet. Deinde etiā ex diffusorijs quippiam addendū, paulatim detractis pharmacis quæ repellunt. Optima sunt autem cēsenda quæ tenuium partium substantia prædita adhibentur. Quapropter in principio, quidē melius est rosaceo probe appaato quā frigidissimo caput perfundere, la nā fasciculo in orbem circumposito, iuxta frontem quidem, ubi pilosa eius redun desinit, iuxta utrumq; uero eius latus, ubi pili ipsi aures contingunt: & retro in loco post uerticem, non tamen longe inferius. Neque enim facile exuritur capitis ea pars quæ occipit, & græcis Inion appellatur: neque etiā citra molestiam, refrigerantia sustinet, propterea quod isthic principium medullæ spinalis existat, ad spiritūs modum in multos ramulos diuisæ, in sexaginta puto iuxta numerum nervos. At uero regio capitis iuxta sinciput, propter laxitatem coarticulationis iuxta coronalem suturā, & ob ossium tenuitatem & raritatem, facile tum caliditatem tum frigiditatem omnium quæ adhibentur pharmacorum intro diffundit, Quare siue refrigerare oporteat ex caliditate ardorem, siue calfacere frigiditatem, aptissimus est capitis iuxta sinciput locus. Optima autem in principio refrigeratio ex rosaceo frigido, æstiuo tempore existente, in quo maxime ardoris affectio oboriri cōsuevit. Dictū autem est mihi de rosaceo tam sæpe, quod optimū est ex oleo crudo, quod Omotribes & omphacimon bifariam appellant, citra salis admixtionem confecto, rosas quā plurimas in eo maceratis præparatum. Sit autem rosaceum non uetus, sed eo ipso anno confectum, siue in uere, siue principio æstatis. Proximū à rosaceo chamæmelinum locum habet, in his corporibus quibus uehementem frigiditatem inducere ueremur, qualia sunt foeminarum, & eunuchorum, ac puerorum, & quicumq; molli carne præditi albumen habentes colorem, solis sunt insueti. Mensuram autem tum rosacei tum chamæmelini, quod ad refrigerationem attinet, ex prædictis corporis habitibus, & ex ardoris magnitudine inuenire oportet, cōsiderata simul ægri ætate, et ambientis nos aeris temperie, nō minus autē & domo in qua æger decubuit. Refrigerabis autē quæcūq; adhibere uoles, in aqua uehementē frigida collocata: quæ si non adsit, niuem uasculo circumpones. Hoc auxilium siue humorum siue uaporum multitudo in caput imperiū faciat, præclare auxiliatur. Repellit enim eos infraq; in corpore derudit, adeo ut ego in sexcentis hoc medendi modo usus, nullo alio habuerim opus. Nam & frigidorū fontū multa Romæ uertas est, & niuis apud nos in Pergamo, & in plurimis Asiæ Græciæq; ciuitatibus. At uero in calidis regionibus qualis est Aegyptus, in qua & fontū frigidorū & niuis penuria est, necessarium est præfrigerato rosaceo, per expositionē sub diuī per integrā noctē, & per obuersionē ad aurā alicuius æstati, Ita demū addere ei sempiuui succū, aut porculacæ, aut laſuacæ, aut pſyllij, aut polygōni, Quin & solani aliquādo paululum & pampi

*Not. qd. siue uetus sit
frigiditas, siue non*

& pampinorum uitis, & uuarum immaturarum. Tales enim sunt adhuc tempore æstatis. A papaueris uero & mandragoræ succo abstinendum, non enim citā damnū refrigerat. uitanda etiam quæ cum refrigeratione manifeste adstringunt, quare si quando necessitas postulet, parum quiddam ex eis ad refrigerantia ammiscere oportet. Propterea sanè & Solani succū, aut nunquā penitus, aut omnino modicè ammiscemus, sic etiā mali punici, & mali cotonei, & mespili. Ad hanc tamen rem malorum punicorū acidorum succus præstandus est, magis enim refrigerat. Porro quum aliquādo ruri degerem nihilq; horum ad manum esset, curbitæ ramenta exsuccata ad uix immaturæ succum ammiscui. Poterit autem quispīā in tali loco etiam feridis succo uel, lactucæq; tum hortēsis, tum syluestris, quam proprie Thridacinen Græci appellant: hortensem enim Thridacem uocant. Quin & sycomororū succus aptus ad refrigerandum. Sint autem nō ualde matura. Quod si caluus sit æger, aut omnino breues habeat pilos, maxima ubertas refrigerantiū existit. Quæcunq; enim ad Erysipelata auxilia scimus ex cataplasmatis & liquidis ceromatīs, ea omnia ab ardore exustis conueniunt. Ceterum Apollonius Ricini folia tenera tusa in aquam coniicere iubet, & deinde per totam noctem uasculum in quo cōtinentur sub diuum exponere, & postera die uti. Ego quidem igitur nō ualde experius sum ricini facultatem, uerisimile est autem Apollonium qui longo tempore in Alexandria uixit, per magnam experientiam uim eius cognouisse. Atqui oleum ex ricino factum manifeste cognoui calidius esse facultate oleo quod apud nos est: quare etiam si non præsens sit, ueteri utimur. Puto autem & potamogetonem & Niliacum Stratioten quiddam refrigerantiū habere, mirorq; eorum Apolloniū nullam mentionem fecisse. Quin & Tribolus apud nos, uelut etiam Polygonum, quiddam refrigerans habent, tēnera uidelicet, & nondum dura ac sicca facta. Conyzam autem non solum refrigerare impossibile est, uerū & moderatè calfacere potentem noui, & miror sanè cur Apollonius eam inter refrigerantia retulerit. Quod si & ab arboribus & fruticibus auxilia ad caput præter naturā calidius petere oporteat, uitex cōuenientior ad hoc existit, & uitis, & lentiscus, & platanus, si quis eorum teneris germīnibus acceptis, deinde tritis, ab ipsis succū exprimat. Erasistratus uero magnum quoddam præseruatiū in calidis habinibus tradit, quū uidelicet eos solem perferre oportet. Si spongiā latam & densam ac cauam in aqua madefactā, & probe expressam capiti imponas. Porro signa dolentium caput ob frigiditatem, contraria sunt eis quæ ex ardore oboriūtur. Nam & incontracta minimeq; arefacta, & decolor ipsorum facies existit, & frigidis neque gaudent, neq; ab eis iuuantur. Quemadmodū autem ardor non ægre solubilis affectio est, ita neq; frigiditas ex ambiente nos aere contracta difficulter curatur si recens est, sed sufficit oleum rutaceum calidum, sincipiti ut dictū est affusum, perfecte hominem liberare. Si uero uehementiori calfactione opus sit, Euphorbium ad oleum cōiiciatur, & quæcunq; ex pipere pharmaca constant. Inungenda autem est facies & nares hisce ungentis, maxime quidem irino & amaracino, & nardino. Quin & comptoria ungenta ex calfacientium numero existunt, atque adeo ipsa opulentarum scēminarum preciosa ungenta, quæ foliata & spicata Romæ appellant. Opobalsamū uero sæpe experti sumus, nullum manifestum cōmodum ad ullam aliquam affectionem calfactione indigentem conferre. Quemadmodum autem rutaceū conuenire dixi, Sic etiam samuchinum & laurinum laudo, itemq; serpyllinum, sæpe & in plerisq; ipsis usus. Dandum etiam uinum tenuium paruum, & motus corporis præcipiendus, laua crag; calida, & quandoq; à raphano uomitus.

De inueteratis capitis affectionibus calidis & frigidis.

IN inueteratis capitis doloribus ac affectionibus necessario pilos radimus, aut ualde ad ipsam usque cutem praefecamus. pharmacaq; tum emplastrorum ac ceratorum forma, tum etiam liquida adhibemus: atq; ea quidem quae emplastrorum ac ceratorum formam habent, raris penitus adhibemus, liquida uero his qui breuissimè praefectos pilos habent. Est autem & horum materia multiformis, quod parum quidem magis, partem uero minus refrigerentq; & calfaciant. Ea igitur quae frigefaciunt ex his quae erysipelata curant transferenda sunt, calfacientia uero ex pharmacis calfacientibus componenda. Quorum simplicissimum est ex euphorbio praeparatum. Sufficit autem unciam euphorbij unam, ad tres ceræ liquefactæ in olei libra una cōficere. Utendum autem oleo ad omnes affectiones calefactione opus habentes, neq; omphacino, neq; eo quod uulgo ab omnibus hispanum appellatur, neq; omnino eo quod cum olearum germinibus praeparat. Sed eo quod ex maturis oliuis conficitur apud plerasq; gentes circa germinum iniectionem. Optimum autem ex eis quæ ego noui, est fabinum, non procul ab urbe Roma in Sabinorum regione prognatum. Cæterum pharmaca quæ recentiores medici seipsos Methodicos appellantes, Metasyncritica, hoc est, ex alto euocantia a contraria ferentia appellant, ea omnia ad huiusmodi affectiones comoda existunt, ex quibus optima in septimo libro huiusmodi tractationis, quæ ante hanc à me edita est, relata sunt. Tempus igitur iam est me ad aliam capitis transire affectionem, ad scripturum primo quæ ab Apollonio cōscripta sunt, quæ iuxta illius dictionem hoc modo habent.

Quæ Apollonius ad capitis dolorem, ex ebrietate & meri potu, scripsit.

UTendū est omnibus descriptis auxilijs ad dolorem capitis ab ardore obortum. Quod si dolores amplius inualecant, rutæ folia cum aceto & rosaceo trita strigmenti crassitudine capiti illinenda. Aliud, Nuces amaras cum aceto & rosaceo ad strigmenticiam spissitudinem tritas capiti illinito. Aliud, Iridem siccam ac uiticem aridum cum aceto & rosaceo, eodem adhibe modo. Aliud, Lauri baccam & rutæ folia cum aceto & rosaceo trita adhibeto. Cōueniet autē somnus, fames, quies, corporis tranquillitas. In potu aqua calida, aqua mulsa, & euacuatio. Hæc quidem Apollonius scripsit, atq; huius rei gratia laudare uirum decet, quod cum discrimine de unoquoq; auxilio scripsit, quum neque Archigenes id ipsum fecerit, quem quum posterior Apollonio natu sit, apponere quidpiam ad discriminum certitudinem oportebat: uerum quæ ipse in priore de pharmacis libro conscripsit, paulo post referentur. At uero quæ ego per longam experientiam de capitis dolore ex uini potu cognoui, iam exponam, utpote qui ipsem quidem utilitatis ipsorum ex affectione inueni, diligentem autem comprobationem per multam experientiam feci. Capitis itaq; dolorem ex uinorum temperatura calidorum productum indicat, quod ipsum caput omnino uaporibus repletur, quandoq; etiam humoribus calida temperie præditis. Nam & citra uini potus eiusmodi ad caput prompte deferuntur. Curatione itaq; opus est, quæ scopum primum uniuersalem & communem omnibus habeat, nimirum euacuatione indigentem. Quum uero calidi sint qui caput repleuerunt humores, etiam refrigerant eos medela opus erit. Iubendi igitur sunt, si crudum adhuc in eis uinum permaneat, ut tepida aqua hausta uomant: quod si etiam post concoctionem caput doleant, refrigerantibus utendum est ac repellentibus. Quale est rosaceum per se & cum aceto, aut hederæ aut brassicæ succo. Quin & ipsa brassicæ folia calida macerata, capitiq; circumposita ac obligata, naturaliter ebrietati resistunt. Cæterum somni ac quietis cura imprimis habenda est: quod ubi factū fuerit per

rit per totum diem, ad uesperam lotum, boni succi cibis, non tamen calfacientibus nutrire oportet. Sunt autem tales pisanæ succus, & sorbitio ex alica, & panis ex aqua, & oua sorbilia absq; garo: ammisceatur autem eis ex melle quātum ad edulcandum satis fuerit. Si uero ad mel accipiendū non fuerint appositū, sales aromatū condimentis ad saporem edulcati, pro eo addantur. Ex holeribus est lactuca, utpote boni succi & refrigeratoria, & brassica, ut que uapores resiccet. Sic & ex leguminibus lens est. Potu uero omnino aqua utendū est, at uero quū stomachus in quibusdam propter aquæ potū subuertatur, Malum punicum eis in super exhibendū est aut solum per se, aut cum alica flaccida calida, probe cocta, Quin & mala cestiana appellata in urbe Romana, citra cocturam quidem sunt austera, post cocturam uero stomacho cōmoda fiunt. Coquēda autem sunt ipsa in ollam nouā aqua calida infusa, deinde malo in olla suspensio, igneq; sub ollam cōiectio, quo uapor ex aqua calidus sublatus cocturam ipsi malo præbeat. Vuz passæ etiam & pira, aliqua quidem cruda, aliqua uero, ut malū ipsum cocta, stomachum corroborant. Abstinendum uero à glandibus palmarū, proprietatem enim quandā habent capitis dolorem inducendi. Quod si uero post hæc probe dormire non possint, ad balneum postridie quā celerrime inducantur, calidæq; aqua eis in balneo saepe affundatur, deinde ubi dormierint aut omnino interposito tempore quieuerint, rursus ad balneum ducendi sunt, deinde ueluti pridie cōnutriendi. Si uero moderate habeant, & aquam bibere non possint, permittendus est eis potus dilutus ex uinis aquosis, quale est in Italia Sabinum. In Asia Titacazenum, & Arsyenium, & Aruifium. Quin & moderate habentibus gallorum testiculi, & alæ, & ex piscibus petrosi, & teneris carnibus præditi exhibebuntur, & columbarū pulli. Hæc uero omnia citra garum & uinum, in albis ac simplicibus iusculis coquantur, in quibus aqua sola cum oleo, & anetho, ac modico porro, cocturam perficiat, modico adiecto sale, nō statim in principio cocturæ, sed quum iam aliquo modo flaccida facta fuerint ac uicia. Mansseltum uero quod tum hoc, tum omnes qui caput dolent, augescēte adhuc & trigēte dolore, quiescere melius est: remittenti uero ac decrescēte, in locis aptis deambulare. Apti sunt autem his qui calfieri opus habēt loci calidiores, qui frigesieri, frigidiōres. Et ante cibum quidem pluribus deambulationibus utendū, post acceptum uero cibum breuibus & lentis. Oportet autem neq; multa comedere, neq; statim deambulare, sed post duas aut tres aut etiam plures horas. Quod si quando ex uaporibus & humoribus in caput sublati reliquæ quædam relinquatur tenuibus poris ac meatibus impactæ, & ob id etiā capitis dolor perseueret, à rosaceo quidem abstinere expedit. Utendum est autem primū quidem chamæmelino moderate calido, postea uero irino: maximopere enim huiusmodi affectiōnes iuuant. In balneo uero caput calida perfundatur, nō solū ob id ut quippiam circa ipsum discutiat, sed & somni conciliandi gratia, quapropter etiam secundum, aut tertium etiam, ad uesperam balneum apparandū est, acceptis ab eo lactucis ex aceto, modico aut omnino nullo addito garo, uerū aqua affusa multa, ut acetum planè exæquet, nisi omnino aquosum sit acetum, nam & huiusmodi magis quā acerrimo opus habent. Caliditatem enim in se aliquam tale acetum complectitur. Post hæc uero postera die, quæ magis caput calfaciāt adhibenda, ita ut ad irinum aliquando Amaracnū ungentū addamus, aliquando uero Nardū. Quandoq; etiam preciosa, quibus opulentæ sceminæ etiam si nihil habeāt mali, uti consueuerunt. Per huiusmodi sanè medicationis ductum, capitis dolores ex uini potu abortos in totū persequi, nullo ab Apollonio præscripto pharmaco usus. Quum enim per ea quæ iam dixi scopum contingerem, in nullo ab

Apollonio scriptorum spem aliquam posui, tanquam rite ac probe ab ipso relata essent, & superuacaneum amplius erat eorum experimentum facere. Ceterum post prædictas tres affectiones capitis dolorē inducentes, Apollonius quæ tam hanc insuper addidit.

Ad dolorem capitis ex plaga aut casu. Apollonij.

Rosaceo & aceto tepefactis caput rigato. Aliud, Rosis siccis maxime coctis, aut certe in passo maceratis, aut aqua mulla tritis pro cataplasmate utitor. Aliud, Meliloto similiter apparato utitor. Aliud, Myrti albæ folia tenera cum uino & myrrha trita imponito. Aliud, Irino uingento & aceto illinito. Aliud, Absinthium tritum cum uino & myrrha sitidē trita imponito. Aliud, Pulegio trita ex uino similiter utitor. Aliud Pulegium & myrrham trita similiter adhibeto. Aliud, Apij comas cum uino coctas ac tritas imponito. Aliud, Mala cototica cocta ex uino imponito. Cōuenient & fomenta per spongas aqua calida imbutas, Et mollium lanarum fasciculi aceto & rosaceo conspersi. Ad hæc & quies, & corporis tranquillitas, Subtractio cibæ euacuatio, fuga eorum quæ offendere possunt, qualia sunt sol, balneum, uisui potus, clamor, contentio, & ex his quæ alimenti loco exhibentur, acida & acris ac falsa. Hæc quidem Apollonius scripsit de capitis doloribus ex conspicua plaga abortis. Verum operæpretium est nosse nos, eiusmodi affectionem nullam aliam quàm inflammationem esse, quæ non ex plaga solum aut casu, sed citra etiam manifestam causam, iuxta omnes corporis partes, propter humorum influxionem fieri consueuit. Siquidem igitur plaga uulneris aut contusionis causa existat, plures scopi erunt ad remedium inuentionem. Vnus quidem in uulnere, ad quod conglutinantibus & inflammationem arcentibus pharmacis uti oportet, postquam ulceris labia fibulis impositis constrinxerimus. Alter uero in contusione, & tertius in doloribus, qui quandoque in ipsis solis percussis partibus fiunt, plerumque uero etiam ad uicinas partes extenduntur. Etenim pellicula quæ caluariam ambit, & cutis quæ forissecus circūtenditur, utraq; propriam substantiam continuam habet per omne caput extensam: & ob id sanè sæpe caput ipsum dolere contingit, præsertim si usque ad pelliculam os caluæ ambientem plaga penetret, quam diducta pellicula caluariam ambiente, offeque conscalpto, iuxta concarnationis modum curare oportet. Quod si per communionem membranæ caluam ambientis, quam ad duram cerebri membranam circa futuras habet, etiam intra caluariam inflammatio ipsa distribuatur, non absque periculo eiusmodi capitis dolor existit. Contingit autem non parum sæpe in casu præsertim ex sublimi facto, ut quædam circa cerebrum aut membranas eius, partes abrumpanitur: quod ubi contingit, etiam amplius capitis dolor inualescit, ipsaq; affectio tota ægre curabilis redditur, & periculum ingens ac præceps imminet. Optimum itaque fuerit in his, nisi ætas prohibeat, & nisi uitalis facultas debilis appareat, à uenæ sectione curationis initium facere, & conuenientibus capitis irrigationibus uti, ex lana nimirum oleo dulci imbuta, capiteq; ex ea contexto. Quod si quippiam horum, siue ætas, siue uisum debilitas, aut etiam ambo simul, sanguinis detractionem fieri præpediant, altum per clysterem euacuabimus, tum ut superflua in ipso recrementa extrahamus, tum ut humores qui ad affectas partes inde ferri consueuerunt reuelamus, atque inde auxilijs ad inflammationes commodis utemur. Si uero membrana cerebri fuerit uulnerata, egregie ipsam conglutinat, inquit Archigenes, calaminthæ succus infusus, & farina milij arida inspersa. Deinde buryrum & ro-

faceum, ac adeps suillus infusus uetus, tepefacta ac mixtum infusa. Cæterum hoc modo affectos à uino & cibis crassioribus abstinere oportet, maxime si febris sint correpti. Atqui prædictam euacuationem consulit etiam Apollonius, qualem autem fieri oporteat non ostendit. At uero acetum rosaceo ammisceri iubet, quem admodum in phreniticis & letargicis in principio plurimi medici facere consueuerunt, uerum non recte mensuram utriusque dicere reliquit, Empiricorum simili transiitione usus, non indicatione dogmaticorum. Affectio enim ipsa nobis indicat auxilia, Quantitatem autem singulorum, & particularem materiarum differentiam simul tum affecta particula, tum ægri temperamentum indicat. Et ad hæc uitalis facultas, deinde ætas, & ambientis nos aeris temperatura, iuxta regiones, anniq; tempora, & prædominantem anni constitutionem euarians. In phreniticis quidem igitur, quum omnia quæ intra caluariam, circaque cutem & pelliculam caluariam ambientem ab affectione immunia sint, ueteres conuenienter acetum ammiscuerunt; eà ratione persuasi, quam in commentarijs de pharmacorum compositione per longum recensui: quando uidelicet ad affectiones in profundo corporis obortas, pharmaca diuersa ab his quæ ad affectiones in superficie hærentes destinata sunt, adhiberi oportere dixi. Exoluitur enim omnium ipsorum uis in transiitione per profundum, & ob id ad propria affectioni auxilia, aliquando contrariæ & nocentis facultatis pharmaca ammiscemus. Quum namque inflammatio dolorem inducat, maxime contrarium est acetum reliquis auxilijs ammiscere, utpote quod neq; mitigandi neq; laxandi uim aliquam in se complectatur, Sed quum per sinciput, (neque enim per aliam quampiam capitis partem transitus patet) pharmaci facultatem intra penetrare uelimus, tunc sanè ad ammixtionem alicuius eorum quæ propria natura auxiliantur ac in profundum ducunt, deuenimus: tenuium partium substantiam quandam inuenientes, quandoque quidè frigidam, uelut acetum: quandoq; uero calidam, uelut euphorbiū, affectione quæ curationi subiaceret considerata ac perspecta, num calfacientibus opus habeat an refrigerantibus. Iuxta hanc igitur ratiocinationē, si quidem crassæ cerebri membranæ nudæ rosaceum offeratur, quemadmodum in his quibus capitis ossiculum aliquod excisum est fieri consuevit, solum ipsum leniter tepefactum adhibemus. Quum uero citra denudationem, per capitis iuxta sinciput partem, sana & integra existente caluaria, rosaceum ad cerebri membranam peruenire uelimus, acetum ei ut eò perducatur ammiscemus, Cuius item rursus uehemens facultas tum per uiarum transiitionem, tum per rosacei mixturam exoluitur. Quapropter Apollonius in eo quod acetum rosaceo indefinite ammiscere iussit, peccauit. Cutis enim capitis aut quæ post eam est membranæ caluariam ambientis inflammationes, citra quidem uehementem dolorem obortæ, per modici sanè acetū ad rosaceum ammixtionem iuuari possunt: lædètur autem ubi magna fuerint, dolorem quæ uehementem induxerint. Deliquit amplius Apollonius, quod neque tempus usus singulorum ab eo descriptorum auxiliorum apposuit. Quædam enim incipientibus & nascentibus adhuc inflammationibus auxiliantur, Quædam etiam in uigore consistentibus aut decrescen-
tibus, aut etiam induratis opem ferunt. Rosaceum itaque cum aceto incipientibus, In uigore uero consistentibus, rosaceum solum adhibemus, Quemadmodum etiam in induratis absinthiumq; ac pulegium ei ammiscemus. At uero quæ citra indurationem decrescunt inflammationes, pharmacis laxantibus appellatis solum opus habent. Relata est autem tum materia, tum compositio ipsorum in prioribus huiuscemodi tractationis commentarijs, quos edidimus antequam hoc opus sumus aggressi. Quapropter affecti loci multam indicationem faciunt
simul

simul cum ipsis affectionibus ad inuentionem remediorum. Quum igitur affectiones ab Apollonio descriptæ quatuor sint, quæ capitis dolore faciunt, ob manifestas causas obortæ: deinde uero ex ordine transierit ad eas quæ ex obscuris causis produciuntur: merito sanè quis ipsum reprehenderit, nō solū quod à dogmatica descuerit doctrina, sed quod neq; Empirica sit usus. Distinguunt enim etiam hi affectiones per symptomatum cōcursus syndromas ab ipsis appellatos, qui sanè accessionum ad morbos ipsos congregationes sunt, quæ omnibus eundem apparet: in quibus cōcurribus etiam externas & lacessentes causas ipsi comprehendunt, tanquam partes totius concursus existant. Verum nullam talem congregationem, neque symptomatum siue accessionum, neque signorum Apollonius scripsit, quemadmodum discimus ubi & ad sequentem uiri doctrinam non minus quàm ad priorem animum adhibebimus.

Condependens ex præcedenti Apollonij doctrina, ad temporum ac totius capitis dolores, citra manifestas causas obortos.

Vngento Mendefio caput illine. Aliud, Adipem anserinum Mendefio ungento dilutum illine. Aliud, Myrrham uino quàm optimo tritam, & ad succi pisanæ crassitudinem redactam illine. Aliud Myrrham ungento preciosissimo trita similiter adhibe. In pueris autem sinciput do-
len-
lenibus, myrrha cum oleo trita uitior. Aliud, Vitis semen tritum & aqua dilutum imposito, aut linteolo illitum similiter imposito. Aliud, Loli farinā cum adipe anserino contritam pro cataplasmate imposito, adipe prius liquefacto. Aliud, Portulacā per se & cum lini semine tritam imposito. Aliud, Oleæ folia terrissima oleo ac uino nigro affuso terito ac imposito. Aliud, Cinerem quenquag habes aceto aut aqua diluto, eoq; caput rigato. Aliud, Solanum & terram figulinam trita ac leuigata imposito. Aliud, Halicacabi fructum cum adipe anserino, aut ungento balanino tritum adhibeto. Aliud, Lenisci folia trita ex aqua imposito. Aliud, Blitū tritum ac oleo dilutum adhibeto. Aliud, Ricini semen aqua tritum imposito. Aliud, Coriandri semen & anethi trita ac melle mixta imposito. Aliud, Melanthium tritum ac oleo dilutum imposito. Aliud, Cuminum & adipem anserinum trita imposito. Aliud, Succum papaueris fabæ ægyptiæ quantitate, & salis partes duas, & pulegij partem unam, cum aceto & ungento optimo trita illinito. Conuenit item cibum subtrahere, & aluum euacuare, caputq; contegere, amplius uero & quiete agere, omnemq; motum uitare. Quod igitur Apollonius quemadmodum dixi, indefinite tradendo, hæc remedia ad capitis dolores, dupliciter peccarit, neque ut dogmaticus uir affectiones explicans, neque ut Empiricus earum concursus, id ipsum ex illius ipsius dictione didicimus, Quod uero & pharmacorum facultates inter se non parum differant, ex tota uirium ipsorum perpensione discere licet. Etenim primum ab eo descriptum simplicis est potentia laxantis. Talis enim est Mendefij ungenti facultas, Secundum uero eandem uim intense possidet, in quo ad Mendefium ungentum, anserinus adeps ammiscetur. Tertium autem propter myrrham quidem resicatorium est, unaq; calfacit, propter uinum uero adstringit, utile his existens in quibus redundantem humiditatem simul repellere ac discutere proposuimus. Scimus porro myrrhæ odorem plurimis etiam sanis dolorem capitis inducere, quare sanè eos ipsos qui iam caput dolent parū offendet. Eiusdem autem facultatis est & quod sequitur quartum. Quantum uero non pro-

Myrrha odor

pe ad horum uim accedit, ubi scilicet cataplasma ex aqua & uiscis semine com-
ponit, quod non solum ab utraque facultate tum calefaciendi, tum resiccandi,
quibus ea præstant, quæ ex myrrha composita sunt, multum deficit, sed & con-
trarium facere potest in his qui caput ob frigiditatem dolent. Quod uero dein-
de sequitur ex lolij farina & anserino adipe compositum, in quibus resiccare in-
tendimus utile est, neq; in capite solum, sed & in alijs partibus rationabiliter ad-
hibetur, id ipsum uero ob anserinum adipem citra molestiam resiccantem con-
tingit. Abunde enim pharmacum hoc & mitigat & sedat dolorem. Verum quod
deinceps sequitur, de quo hæc uerba scripsit: Portulacam per se & cum lini se-
mine tritam imposito, refrigeratorium est pharmacum, præclare faciens ad af-
fectiones calidas. Quod uero post hoc scriptum est hoc modo: Oleæ folia re-
nerrima oleo ac uino nigro affuso terito & imposito, dolorem quidem non mi-
tigat, uerum humiditates succorum euacuat. At uero quod deinceps scriptum
est forti facultate præstat, in quo uidelicet iubet cinerem aceto aut aqua dilui,
eoj; caput rigari. Si quidem enim ex aceto præparetur, inueteratas affectiones
& in scirrbum induratas sanare potest, non tamen doloris mitigatiuum existit.
Si uero cum aqua cinis diluatur ac percoletur, fortitudine quidem plurimum ab
eo deficit quod ex aceto constat, neque tamen sic doloris mitigatiuum erit.
Quemadmodum neque id quod postea descriptum est, ex terra sigulina & solar-
no compositum. Superfluum autem compositionem Apollonius in eo quod ex
halicacabi fructu constat, ostendit, utpote quod neque prædictis, neque postea
dicendis quicquam amplius habeat, Quemadmodum sanè ea quæ deinceps se-
quuntur singula alia facultate prædita sunt. Non rite autem fecit hæc omnia in-
definite tradendo, Quid enim simile habet cataplasma ex blito cum oleo trito,
ad illud quod ex ricini semine, aut coriandri, aut Melanthij componitur. Ca-
lescunt enim hæc & resiccant, Blitum uero debiliter humectat & frigefacit. Por-
rò quod in fine sermonis ipsius scriptum est, primum neq; ab ullo in usum assu-
mi experiundi gratia consuluerim, nedum sæpe. Raro enim cogimur pharma-
cis ex opio uti, quum uidelicet præ doloris uehementia homo de uita periclitat-
ur, quanquam & tunc solidæ partes ex eius usu offendantur, adeò ut post hæc
correctione opus habeant. Sic & ex opio collyria multis detrimento fuerunt,
adeò ut debilem oculum reddiderint, & uisus hebetudinem, Amblyopiam Græ-
cis appellatam induxerint: uelut etiam auditus grauitatem inducunt, quæcumq;
ad uehementem aurium dolorem ex papaueris succo cõposita sunt. At uero ob
capitis dolorem uehementem nemo unquam animi deliquio cõprehensus mor-
tuus est, neq; seipsum occidit, quemadmodum quidam coli dolore uexati fecer-
unt. Vtq; enim doleant, longè minor ipsorum dolor est, quàm eorū qui colic-
aut auris, aut oculi, aut dentis dolore uexantur. Mitigantur illi ipsi perfusionibus
& cataplasmarum impositione.

Quæ Archigenes ad capitis dolorem remedia conscripsit.

Relato igitur iam Apollonio, ad Archigenem trãseamus, qui in priore libro
de pharmacis secundum genus ei inscripto, hoc modo scripsit.
Archigenis ad capitis dolores citra febrem obortos. Communiter in princi-
pio auxiliatur eis aquæ potus, parcitas cibi, solutio alui. Hæc præfatus deinceps
pharmaca multiformia conscribit. Præstabilius igitur mihi uiderur singulatim
unaquaque ipsius dictione in manus sumpta, eam considerare, & primum sanè
principium eius collaudare, in quo manifeste discrimen à febris inductum distine-
scit.

xit. Fuit itaque Apollonius non quidem uulgaris medicus, uelut & Mantias & Heracides Empiricus, uerum ad diligentiam quam circa artem fecit, etiam hoc Archigeni accessit, quod posterior natus illis ipsis fuit. Caterum maximum hoc censeretur, his qui artem quamcumque tandem rationalem ediscere rite uolunt, quum natura apti ad eam fuerint, ingeniosique & à pueris in primis disciplinis eruditi. Plerique autem ex his qui eiusmodi artes tractant, non ut ipsi sapientes in his euadant, sed ut uulgo tales uideantur studio habent. At uero Archigenes ut si quis alius, quæ ad medicam speculationem attinent diligenter ediscere studuit, atque ob id merito scripta quam plurima memorabilia reliquit. Nō tamen in omnibus sanè quæ tradidit irreprehensibilis mihi uidetur, uerū uelut ipse pleraque eorum usorum à quibus aditus optimus euasit, reprehendit, sic par est ipsum delinquentem à nobis posteris redargui. Difficile enim est ut qui homo sit non in multis peccet, quædam uidelicet penitus ignorando, quædam uero male iudicando, & quædam tandem negligentius scriptis tradendo. Quemadmodum sanè & nunc mihi in distinguendo non febrientes à febricitantibus peccasse uidetur, quum non omnes eorum qui non febriunt distinctiones & discrimina apposuerit.

De his qui ex stomacho caput dolent.

Statim igitur primum in his discrimen est doloris capitis ex stomacho producti. Quidam enim etiamsi modicus quispiam humor acris in uentre, & præsertim circa os eius congregetur, statim caput dolent, atque ob id si diutius famem tolerant offenduntur. Augetur enim ipsis inedia ferentibus eiusmodi humorum malicia. Eos igitur qui hoc modo affliguntur sanare oportet, ita ut nihil remedium capiti adhibeamus, quandoquidem neque proprius est hic capitis affectus, sed ab humorum in uentre malignos uapores excitantium in ipsum adscensu affligitur. Quemadmodum alij in suffusorum symptomata ob huiusmodi humores incidunt. Quæ igitur horum erit cura, ut uidelicet affligentes in uentre humores quam celerrime euacuemus. Euacuantur autem ad uomitum prodiuis facile ab aquæ potu, Aegre uomentibus uero difficilius, adeo ut etiam digitorum siue pinnularum immisione uenter ad uomitum irritatus, quibusdam nihil amplius effuderit. His igitur conabimur quam primum cibum boni succi ac stomacho commodū exhibere, si res ita ferat à balneo, si non, ante balneum tantum cibi offeremus, ut ne lædantur inde postea lauantes. A cœna autem postridie modicum absinthium in potu dabimus, eoque modo in posterum dietam ipsis constituemus, donec ualde bene concoquentes ipsos uideamus, atque tum sanè modicum panem eis præbebis circa tertiam aut quartam horam, aut paulò prius uel etiam serius, ut satis amplum spatium ad conuersam balnei horam intersit. Quicumque uero panem citrà obsonium edere non possunt, his oliuas, aut palmulas, aut uuas, aut tale quiddam addemus, per experientiam cognoscendo quid ex eis præstet, quum aliud alio melius sit iuxta naturæ proprietatem. Caterum ad uitiosorum in uentre humorum redundantiæ tum facultatis concoctoriæ debilitas, tum oris uentris infirmitas, plurimum conferunt. Quemadmodum etiam sensum mollicies & ad hæc caput ad eiusmodi humorum uapores suscipiendos aptum, quemadmodum & in quibusdam oculi. Ego quidem igitur sepe & in multis expertus sum hanc quam narraui, curam diuam ad capitis ex stomacho dolorem commodam. Archigenes uero quum simpliciter ad omnem capitis dolorem citrà febrem, cibi parcitatem auxiliarem

scribat, palam facit se nihil de eo qui ex bilioso humore oboritur scire. Quod sane etiam amplius quis crediderit qui postremam eius dictionem legerit, quæ hoc modo habet. Archigenes. In his uero qui ex stomacho caput dolent, flatuoseque distenduntur, acetum in quo papaueris capita in cocta sint affundito, aut spongas eo imbutas imponito, deinde potentiam cum menta & aceto fronti pro cataplasmate imponito. Aut pulegium cum iisdem. Aut solani succum cum cum rosaceo illinito. Stomachum equidem os uentris appellat, quum & medici hanc partem ita appellare sint aduersi, qui etiam stomachica animi deliqua appellant, & quosdam stomachicos esse dicunt à quopiam uidelicet in eo loco oborto affectu ita appellantes, uelut etiam hepaticos ab hepate, & colicos à colo, & nephriticos à renibus, & splenicis à splene affectos. Vnam autem ex stomacho affectionem dolorosam scripsit quæ caput occupet, eorum quos ipse flatuose distentos uocauit, quam ex uini largi potu magis oboriri scio. Qui enim propter humores caput dolent, mordacem dolorem, non distendentem percipiunt. Fames igitur in distensionibus commoda est, at non his qui mordaces humores in ore uentris habent. Quum itaque hic mordax humor fuerit amarus, palida & flaua bilis appellatur, quæ ob naturalem lenitatem ad uentris os sursum fertur, quum uero pituitosus, aut acidus, aut falsus fuerit, magis in totius uentris spatio continetur, quam quod in ore ipsius firmitur. Optimum autem fuerit (quantum sane nunc in his dicere licet) in fundo uentris ipsum contineri, facile enim relicto uentre in intestinum delabitur. Pessima autem sit affectio ubi uisiosi humores in uentris tunicas ineludibiliter fuerint imbibiti. Quorum optimum remedium est ex aloë pharmacum, quod aliqui pteram, hoc est, amarum, aliqui hieram, id est, sacrum ex aloë appellant: inque eius compositionem aloës drachmas centum consciunt, & sex uniuscuiusque reliquorum, quorum etiam sex numero existunt, cinnamomum, spica nardi, xylobalsamum, mastiche chia, asarum, crocus. Præstantius autem sit pharmacum ubi minus de aloë additur. Visum nanque mihi est, nimiam eius copiam centum drachmas esse, ad proportionem reliquorum quibus hæc adduntur, quapropter etiam per .x.c. drachmas ipsum composui, & per lxxx. Quin & per pauciores aliquando crocum, propterea quod quidam ex eius usu capite lædantur, quod ipsum sæpe ex solo croci odore perpetimur. Quare optima eius fuerit compositio, quæ ex aloës drachmis .x.c. & croci drach. v. constet. hæc ego utor. His uero qui neque croci odorem citra molestiam ferunt, sed statim capite replentur, ex quatuor croci drachmis pharmacum compono. Cogor autem assidue hoc pharmacum præparare, propterea quod non solum his de quibus iam dixi, sed & suffusorum speciem patientibus, aut etiam alia symptomata ex stomachi affectione habentibus, id ipsum exhibeam, & præterea his qui aluo adstricta laborant, & mulieribus, quæ non probe purgantur. In quibus maiorem efficaciam habet, ubi aloës drachmæ lxxx. & croci vi fuerint commixtæ, præstata uero & carpesium pro asaro consicere, quanquam etiam utrisque coniectis aliquando composuerim. Datur ad summum ex pharmaco hoc drachma una, cum aquæ calidæ cyathis non pluribus quam tribus. Minimum uero dimidium eius præbetur. Datur & intra hos modos, quantitate iuxta ætatem, corporis magnitudinem, & anni tempus permutata.

Quæ Archigenes consequenter ad primam dictionem scripsit, in quibus est etiam Galeni censura.

DE his quidem igitur qui caput ex stomacho dolent hæc suffecerint. Trans
secundum

secundum itaque iam ad ea quæ Archigenes post primam dictionem deinceps scripsit. Faciam autem iuxta singula ipsorum consimilem expensionem qualem circa primam feci, connectendo ad ipsa propter rerum consequentiam etiam ultimam ipsius dictionem, Sed nunc à secunda initium faciam. Archigenis.

Irrigationes autem siquidem à frigore aut hyeme patiuntur, conueniunt, oleum tepidum. Et, Illitio narium, succus è baccis lauri expressus, aut oleum laurinum, aut ungentum Syriacum, aut cicinum, aut styracinum, aut gleucinum, aut tale aliquod aliud calfactorium. Ut igitur à posfiremo exordii, opinor ipsum resinam quæ sua sponte emanat dicere, quæ plurima in Lacedæmone prouenit, & Capnelæon, hoc est, oleum fumosum Ciliciæ, & Amaracinum ac Stryacinum in Cyzico, & quod in Perga apparatur iuinum. His uero ungentis nares oblinere operæpretium ducit, quo per odorem ipsorum caput calefiat. quod ipsum inde euenire manifeste apparet, adeo ut & idiotæ uulgo his utantur, & maxime eis quæ facile parati possunt. Parabilia autem sunt alijs alia, quæ uidelicet apud singulos rediunt. Et apud nos sanè in Asia agrestibus & ruri degentibus hominibus cedrino appellato uti mos est, & si quando eius inopia sit pillelæo, quo nomine id appellant quod ex oleo & liquida pice constat. Ammiscent autem tum huic, tum cedrino, oleum aliqui plus, aliqui minus, in quantum utrum ipsorum uehementiam exoluere uelint. Viuntur autem omnibus quæ dixi & circa caput, & præsertim circa sinciput ueluti dixi. Illinunt & frontem ex eis, & aurium meatus. quidam etiam uestigia pedum, ac sedem. Cæterum quum Archigenes succum è baccis lauri expressum dicit, quod simpliciter laurinum dicitur ipsum nominare putandum est, uelut id quod oleum ammixtum habet, laurinum oleum appellatur. Syriacum uero ungentum, eum dicere Comagenum existimo, quandoquidem id ipsum nobis ex Syria apportatur. Archigenis. Aestate uero aut ubi aliàs æstuose distenduntur, per acetum & oleum, aut aquam & rosaceum. Amplius uero & per polygoni succum, aut portulacæ, aut solani, aut aliquo alio ex refrigerantibus irrigato, spongiæq; posca imbutas capiti imponito. In hoc sane sermone uidebitur forte quibusdam negligētis legentibus, unam simplicem affectionem Archigenes curare, uerum non ita habet. Ex eo enim quod æstuose dicit, calidam affectionem indicat: ex eo uero quod addit, distenduntur, affectionem quæ hoc modo à flatu uentoso affligitur ostendit: ut non solum secundum intemperiem mutata sit, sed etiam uaporosi status rediundantia adsit. In principio itaque in eiusmodi utrisque affectionibus, refrigerantium auxiliorum facultas apta est, quæ intemperiem calidam refrigeret, & uentosi status allationem repellat & retundat. Acque mea quidem opinione præstiterit diligentior rei inquisitionem facere. Aliquando etenim ex corpore uentosos status affertur, quemadmodum in doloribus capitis ex stomacho relatum est. Aliquando uero in ipso capite generatur. Venter namque interdum agre solubili modo inflatur. Interdum uero etiam post ipsum sita intestina, quandoque quidem ieiunum, aut tenue intestinum, quandoque etiam colum. Nihil igitur mirum est, neque impossibile, eandem affectionem in quibusdam iuxta caput partibus obortam, uentosum flatum generare, cuius generationis in locis circa uentrem causam inuenimus, tanti caloris inopiam, ut ex cibis ac potibus uaporosum & uentosum flatum generet, propter infirmitatem uero comprehensuæ facultatis, interna ita affectarum partium capacitas infletur & expleatur, ut propter expletionem quidem distendatur, propter tensionem uero dolore afficiatur. Inuentum equidem & hoc nobis in cōmentarijs est, in quibus communes & generales dolorum causas considerabamus, quod ob dissolutionem

nem continuitatis similariū partium, dolor oboritur. Dissolunt autem ipsam erodentia, dissiccantia, distendenda, & uehementer calfacientia ac refrigerantia. Quapropter in doloribus circa caput, ægros ininterrogare consueui, qualis ham eorum qualitas sit. Quidam enim uelut erodantur corpora, doloris sensum perceptant. Quidam uero uelut distendantur, aut grauentur, aut tundantur, aut solius uehementer inualescantis caliditatis aut frigiditatis. Siquidem enim uelut erodantur aut pungantur senserint, uel humorum uel eiusmodi flatus acredo, causa putanda est. Si uero citra morsum distendantur, repletionem distensarum partium, uel per uentosum flatum, uel per multi humoris influxum, causam putabimus. In quo genere & inflammatio & erysipelas existit. Inflammatio quidem ubi inflammata corporis pars multum sanguinem in se continuerit. Erysipelas uero ubi biliosum continuerit humorem. Quod si ex utrisque redundantibus pars aliqua expleatur, aut inflammatio erysipelata, aut erysipelas inflammatum oboritur. Et ne quis putet nos longum sermonem de una particula iuxta unum symptoma affecta facere, Communis enim omnium dolore affectarum ratio est, quam si quis diligenter in articulos digesserit, promptior ac expeditior ad auxiliorum inuentionem, in omni affecta parte fuerit. Artis etenim curandi coniectura in affectionum cognitione maxime consistit. Quæ ubi inuentæ fuerint, curationē non coniecturaliter sed scientificè indicant, cum hoc quod & cognoscere datur, quàm ægre aliquæ affectiones medelis cedant, in quibus rationabiliter iuxta indicationem remedijs utimur, etiam si nihil efficere in principio appareant, atque hoc est quod in aphorismo dictum est, in quo ait, Omnia secundum rationem facienti, si iuxta rationem non succedat, ad alia transeundum non est, sed perseverandum in eo quod uisum est à principio. Aliquando enim adeo uehementer in angustijs meatuum flatus uaporosus infarcitur, atque eo adhuc magis uiscosus aut crassus humor, ut multo tempore opus sit ad curationem. Etenim quæ sic infarta sunt attenuare oportet, meatus que dilatare per quos excernantur, habita simul providentia nequid aliud, puta humor aut eiusmodi flatus, amplius influat: & ad hæc corroborandum est affectum membrum, ut neque ipsum uentosum flatum gignat. Qui igitur primi ad eiusmodi affectiones pharmaca composuerunt, merito uaria materia opus habuerunt: si quidem insipientem substantiam siue humor, siue uapor fuerit, repellere necessarium existit: impactam uero concoquere & attenuare, eandemque ipsam discuteret atque nihilominus, imò magis circa affectam partem similitatem inducere, ne uidelicet quod influit suscipiat, attenuatum uero excernat, impactumque concoquat & attenuet. Verum in mixtura pharmacorum hæc facultate præditi, alius alio feliciore coniectura usus, alius minus, alius magis commodam fecit compositionem. Quapropter uelut nostis, ad uos enim sodales loquar quibus maxime hæc scribuntur, Duo omnino uidistis mihi præparata pharmaca eundem effectum promittentia, quandoque etiam tria & quatuor, & ex horum mixtura in ægre curabilibus affectionibus à me sæpe quod oportuit, factum esse. Considero nanque in quo eorum sit simplex pharmacum amplius calfaciens, aut frigefaciens, uelut etiam resiccans, aut humectans, aut tenuium partium, aut crassarum; Deinde contemplans quid effecerit quod agro iam fuit admotum, secundum usum aut per aliud quoddam, aut per hoc ipsum facio. Sæpe quidem ad aliud quod idem promittit transeo, aliquando uero utraq; committo, ac medium quiddam ex eis conficio. Talia autem omnia abunde à me non uniuersim tantum, sed & particulatim in medendi methodo relata sunt, nosseque oportet, quod & iam ante dixi, hanc tractationem illam sequi, & cogor tamen etiam nunc rursus

rursus meminisse, quo magis ea quæ isthic tradidī assequamini. In prædicta itaque affectione, calore doloroso prædominante unā cum flatu uentoso, in principio quidem repulsoria curatione utendum est; quæ ex refrigerantium facultate constat: quod ubi moderate factum est, ex mitigatorijs ac cōcoctorijs quippiam ammiscere ad repulsoria oportet. Deinde etiam discussoria addenda, ita ut paulatim repulsoria pharimaca detrahamus, donec ad contrariam mixturam perueniat pharmacum ei quā in principio habuit, hoc est, ut plurimū quidem discussoriam sit & attenuatoriam. Minus uero cōcoctorium & mitigatorium, minus autem repulsorium. Portulacā quidem igitur refrigerantis & aquosæ substantiæ esse didicistis. Minus ea polygonum. In solano autem tantum ammixtum esse crassæ & terree, quantum adstrictionis. Acetum uero repulsoriam simul & attenuatoriam, imò & discussoriam habet facultatem, utpote in temperatura à tenuium partium frigiditate exuperatum, quemadmodum exacte serenus aquilonaris aer. Didicistis etiam rosacei facultatem, quod uidelicet & repulsoriam quiddam habeat, habet autem & cōcoctorium & mitigatorium, & ad hæc etiam discussoriam. Merito igitur Archigenes in prædicta affectione eiusmodi pharmacis utitur, ipsum quidem per se solum acetum neque alibi exhibens, neque hic, ob facultatis ipsius uehementiam, ammiscet autem ei uel rosacei uel aquam. Transseamus autem iam ad sequentem Archigenis dictionem. Archigenes. Si uero augetur affectio, perfecta cibi abstinentiā cōgrua est. Deinde uenæ sectio e cubito, & alui euocatio per ualidū clysterem. De his auxilijs dictum à me prius est, quando Apollonij dicta cōsiderabam, ubi sanè in biliosis causis fami renuntiāui, uelut etiam uenæ sectionem in pueris & senibus ac uiribus debilitatis fieri prohibui: laudauī autem euacuationem per clysterem, non solum propter euacuationem eorum quæ intestinis continentur, sed etiam ob reuulsionem eorum, quæ ad caput feruntur: atque ob id probe in his quæ scripsit Archigenes non simpliciter dixit, Euacuatio alui per clysterem, sed addidit ualidum: multum enim in huiusmodi clysteri situm est; quantum ad reuulsionem attinet, ultra hoc quod non solum ea quæ circa uentrem & Mesarum sunt euacuat, sed etiam quæ circa hepatis sima hærent. Archigenes. Irrigationes autem; Ruta cum aceto & oleo trita. Memores affectionis ad quam auxilia scribere proposuit, sic iudicamus unumquodque eorum quæ recensere cœpit. Affectionem itaque sic scripsit. Aestate uero aut ubi aliās actiuose distenduntur. Deinceps uero refrigerantis facultatis auxilia subiecit, & postea inquit. Si uero augetur affectio, perfecta cibi abstinentiā, & uenæ sectio, & clyster ualidus adhibeatur, & post hæc propositam conscripsit dictionem, in qua cum aceto & oleo tritam rutam adhibere iussit, non apponens an uiridem an aridā uelit. Est enim non parua differentia, quum arida multo acrior & calidior, quā uiridis existat. Mihi sanè uiridem consulere uidetur, neque enim aceruatim à refrigerantibus ad contraria transgressus est. Acetum uero ad hoc quoddam refrigerat & repellit, discussorium, quid habere antea dictū est. Mitigatoria autem & laxatoria facultatis existens oleum merito ipsis ammiscuit. Alia. Succus à lauri baccis expressus cum aceto & ruta, hæc priore longe efficacior existit. Ad succum namque à lauri hæc expressum fortiter calfacientem, rutam ammiscuit cum aceto, relicto oleo. Alia. Succus radicum iridis cum aceto. Hoc remedium nihil calfactorium habet, melius itaque fuerat ipsum primum in transitu ad prædioriora auxilia positū esse. Alia. Salicis folia trita cum aqua. Hoc præscripto ex iride imbecillius est, atque his quæ omnium primum scripta sunt simile, ut intēpestiue nunc ab eo sit relatu. Alia. Serpyllum cum aceto & oleo tritū.

Acet. facul. rosace.

De aceto

De aceto & oleo prius dictum est: adiecit autem nunc eis serpyllum & cris qualitatibus pharmacum, & ob id etiam calfactoriae facultatis. Negligenter uero etiam hic reliquit, an utride aut aridū uelit praestiterit autem fortassis utride intelligere. *Alia*, Polygonum cum ruta oleo & aceto dilutum. Polygoni succo iuxta primam rationem ut refrigerante usus est, nam & reuera talis existit, Quare etiam ad inueteratos dolores iuxta primum transitum rationabiliter quis eo utetur, ruta ammixta. *Animaduersione* autem dignū est in singulis contrariae facultatis pharmacorum mixturis, ut in principio parum ex praestantiore ammiscemus, iuxta secundum uero & tertium usum, copiam augeamus. *Alia*, Amygdalae amarae delibatae tritae cum aceto & oleo irrigationis modo adhibita, aut cerati crassitudine in linimento fronti imposita. Et hoc ad primum transitum pertinet, didicimus enim discussoriam citra mordacitatem facultatem amygdalas amaras habere. *Alia*, Ruta syluestris cum oleo & aceto eodem modo. Inordinate rursum hoc ualde forte pharmacum interposuit, in doloribus multum inueteratis merito adhibendum. *Alia*, Populi albae fructus cum aceto tritus. Discussoriae facultatis est albae populi fructus. In quibusdā autem exemplaribus non cum aceto, sed cum posca scriptum reperitur. *Alia*, Ocyimi semen cum aqua. Ocyimi semen calfactoriae & attenuatoriae est facultatis, non tamen uehementer, cum aqua autē sola inueterata affectione minime rationabiliter quis eo utatur, melius enim erat oleum & acetum, uelut in alijs dixit, etiam huic ammiscere. *Alia*, Facit & balsamum, peucedanum, castorium, simul & singularim unumquodque cum oleo & aceto. Hoc pharmacum rursus uehemens est, maxime quum ipsum peucedanum solum adhibeatur, citra castorij ammixtionem. Quid uero balsamum nunc uocet, non habeo dicere, Num uidelicet plantae semen, aut succum quem opobalsamum uocant, aut ramulos ipsius xylobalsamum appellatos. Melius tamen mihi uidetur opobalsamum accipere, quod tenuium partium & discussorie substantiae existit, non tamen manifeste calentis. *Alia*, Lauri folia, & populi albae, & uiticis cum oleo & aceto. Et hoc pharmacum ex simplicibus facultatibus differentibus compositum. Lauri enim folia calidissima, uiticis uero moderate refrigerantia sunt: in medio utrorumque populi folia existunt. *Alia*, Panacem cum oleo illinito. Nihil hic refrigerantium ammixtum est, & ob id ualde inueteratis affectionibus & nihil amplius caliditatis habentibus utile existit. Quapropter merito quis ipsum reprehenderit citra distinctionem pharmaca auxiliorum conscribentem. Panacem uero negligenter nunc ipsum dicere puto, panacis radicem, neque enim opopanax putandum est ab ipso panacem dictum esse. Dissert autē a radice hic non paruo caliditatis excessu. *Alia*, Viticem aut mentam, amygdalas amaras, iridem, aequali mensura cum aceto & rosaceo mixta adhibeto. Aliorum uires supra relatae sunt. Mentae autem nunc primum mentio nem fecit, pharmaci calfactoriae facultatis. *Alia*, Aut mororum succo cum aceto ammixto rigato. Hoc pharmacum euidenter apparet refrigerantium medicamentorum generis ab ipso conscriptorum esse, quae incipiente affectione conueniunt, minimeque recte nunc ad pharmaca auctis affectionibus commoda ammiscuntur. *Alia*. Inueterata autē affectione pilis denudato, illitionibusque & rigationibus praedictis, crassius tamen apparatus utitor. *Alia*, Resinam cum melle teporibus & fronti illine. Aut muscerdas cum aceto & rosaceo. Tertium hoc tempus est & oportunitas in capitis remedijs adhibendis. Primum namque erat incipiente affectione. Secundum uero ut ipse scripsit augefcente. Tertium autem hic quum ait inueterata, quod ipsum uehementioribus auxilijs opus habet, quorum aliqua non recte prioribus ammiscuit.

De his qui ob biliosum humorem caput dolent.

Signa in his similia sunt eis quæ ex ardore oboriuntur, accedit his maior mor-
sus & faciei pallor, & aliquando oris amaritudo. Aetati autem uigoris, &
temperaturis calidioribus, & uitæ curiosæ, & his qui flauam bilem congregant
hæc affectio præcipue contingere solet. Itaque balnea temperata, & unctiones, &
porus dilutus eis exhibenda sunt, omnisque dicta liquidior & boni succi constitui-
da. Euacuandus item biliosus humor per absinthij cremorem, aut per aloen, &
per ipsam picram antidotum per se datam, aut modica addita scamonia, uel pe-
cataportia ex aloë confecta. Illinenda frons pastillo croceo aut Trigonio appelli-
to, aut aliquo alio his consimili.

De dolore capitis per consensum.

Siquidem uniuerso corpori caput per consensum coafficitur, illi prospicien-
dum, tum intemperiei, tum materię prædominanti instando, easque urgendo.
Et si quidem humorum multitudo & maxime circa uenas fuerit, uenam secabi-
mus. Si uero qualitas magis inualuerit, purgatio pharmaco utemur. Si uero
uni alicui parti cõdolet, uelut hepati, aut uentri, aut stomacho, his ipsis auxiliabi-
mur, calida quidẽ in ipsis subsistente intemperatura, panẽ ex uino diluto exhiben-
do, & sorbitiones ex alica, Et foris irrigationes moderate refrigerantes & firmita-
tem addentes, uelut antea dictũ est. Si uero propter uiscosos & crassos in stom-
acho cõtentos humores, caput doleant, etiã hos exturbabimus, acetũ multum in
potu præbendo, tum simplex, tum Iulianicũ appellatũ. Ex hyssopo etiam ac ori-
gano potionibus, & quæ his adhuc fortiores sunt magisque incidendi uel prædic-
temur, & uomitu à raphanis, irrigationibusque ac cataplasmatibus calidioribus.

De capitis in febribus dolore.

In doloribus capitis qui in principio cõ febribus irruunt, uena secanda est post
primam aut secundam remissionem, nisi quid impediat, & præsertim in cor-
poribus bonæ habitudinis & multo sanguine redundantibus. Animaduerten-
dum autem num ob uapores à uentre sublatus, aut ob alius suppressionem capitis
dolor cõtingat. Quod si serius post septimum tandem irruat diem, alio per cly-
sterẽ qui aliquid operæpretij faciat præuacuata, cucurbitæ ad occiput siue cer-
uicem affigantur, caputque rigationibus ex oleo mitigetur, rosaceo quidem in cal-
dioribus ac horæ æstiuæ, & cum modico aceto. Chamamelino uero in frigidio-
ribus habitudinibus ac hyeme, quinta aceti parte adiecta. Illinenda frons ex cy-
phi in frigidioribus, ex crocomagmate in calidioribus. Cætero ad capitis dolor-
es ob febris magnitudinẽ obortos, medelæ præscriptæ sunt in febriũ tractatu.
Porro uisitare oportet hæc, non solum in dolore capitis per consensum stomachi
oborto, sed omnibus etiam alijs circa caput obortis affectionibus. Sũt autem ea
quæ sequuntur. Viticis semen, absinthij succus, lac in potu, glandes quercinæ in
cibo, oliuæ nigrae, arbuti fructus mæmecylon Græcis appellatus, cruum, quod
ipsum etiam articulos dissoluit. Amplius autem offendunt myrrha, thus, hede-
ræ cacumina. Mentem etiam perturbant lentisci fructus, crocus, peucedanũ, cy-
claminus sicca cum uino potata. Stryax modicus quidem potatus tristitia uul-
tus discutit, multus uero somnos multum turbulentos inducit.

De Cephalæ capitis dolorẽ antiquo.

Cap. II



Cephalæa inueteratus & ægre cedens capitis dolor appellatur, qui ex
facili occasione, maximas exacerbationes habet, adeo ut neque strepi-
tus, neque uocem uehementiorem, neque lumen splendidũ, neque uini po-
tum, neque odoramenta caput repletia tolerare possint, neque item mo-
tum, sed in quiete & tenebris ob dolorum magnitudinem decumbere uelint, tan-
quam

quam à malleo enim pertundi sibi uidentur. Quidā enim uelut cōrundantur aut distendantur ea quæ circa caput sunt sentiunt, non paucis uero usq; ad oculorū radices dolor progreditur. Habet autem hæc affectio aliquando quidem continuos dolores, aliquādo uero exacerbationes & intersualla siue ordinata, siue inordinata. Intermitunt enim quandoq; eiusmodi exacerbationes, uelut in comitiali morbo apprehēsis, interceditq; tempus aliquod quod omnino accusari non potest. Manifestum igitur est hanc affectionem cōsimilem apūtinem capitis ut facile lædatur, uelut in cephalalgicis habere. Verum ad maiorem debilitatem deueniunt in hac affectu capitis partes, Et quidā ex eis cerebri inuolucra dolitāt, quidam uero membranam tantū caluariam ambientem. dolores igitur cum grauitate, humorū multitudinem significant, cum mordacitate uero, aut humorum aut uaporū acredinem, cum pulsu autem inflammationem; cum tensione uero, si quidem circa grauitatem & pulsū fiat, status tenuis & uentosi multitudinem demonstrāt; cum pulsu uero, membranosi corporis inflammationē. Si uero cum grauitate dissentio fiat, humorū multitudinem intra mēbranulas contentam. Et dolores quidem in superficie herentes, mēbranæ os caluæ ambiētis affectionem significant; qui uero in profundo sunt, cerebri inuolucrorū. Quibuscunq; enim affectio intra caluariā est, his usq; ad oculorū radices dolores procedunt, propterea quod oculorū tunica ex cerebri inuolucris habeant ortum. Si uero humor putrefactus calidior fiat, cum feбри caput dolitāt; febricitant autē omnino & qui ex inflammatione dolent. Si quidē igitur humorū aut uaporū multitudinem reppereris causam, si quidē propter totius corporis repletionem facta est, uniuerso corpore euacuato capitis dolorē sanabis. Si uero uelut debile existens caput ad se sublato humores ac uapores susceperit, materiā reuellere oportet in totū corpus, atq; ita particulæ mederi. Per dynteres itaq; reuulsio fit, & ligaturis extremis tantum, & pluribus infernarū partiū confrictionibus. Interdū etiam sanguinis excubito detractio. Quod si amplius sanguis redundare uideatur, etiam ex naribus aperta uena, & quantū sufficere uidetur sanguine euacuato. Deinde hieram dabimus exacutam, & postea apophlegmatismis pituitam. detrahētibus & medicamentis quæ naribus indūtur utendum est, qualia sunt quæ ex elaterio & cyclāmino cum lacte & porro apparantur. Caput autem curabis, quando quidem reuulsorij tui oportet, per reuulsorias irrigationes. Cæterum post totius corporis euacuationem, iam caput euacuātibus uteris, deinde his quæ firmitatem addere possunt ad motū. Repellit igitur oleum omphacinum, & rosaceū, per se & cum aceto, & ex papaueris capitibus, & oleæ teneris germinibus, & hederæ cuminumibus, ac menta uiridi apparatus. Afferantur autem remedia tepida quidē, ubi frigidior & crudior fuerit humorū multitudo, frigida uero ubi calidior & biliosior extiterit. Discutit autem oleum dulcissimum calidum, & magis inueteratum, itemq; sicyonium. Si uero crassior sit humorum multitudo, spondyliū, aut serpillum, aut pulegij comam aut calaminthen, aut mentam oleo incoquant, multitudinem euacuabis. Eadem hæc etiam firmitatem parti addunt, quæ propter usq; ad perfectam curationem eis uti conuenit. Omnium porro longe maxime discutit & perfecte corroborat, uerbenaca recta maxime uiridis, Imo & arida cum radicibus & simul cum serpyllo, oleo incocta. Coniicienda etiam ad ea crocodiliadis maximæ iuxta aquas nascentis radix. Quin & ipsam per se uerbenacā si oleo incoxeris, caputq; inde rigaueris, omni capiti dolori antiquo ex frigidityte, aut ex crassis humoribus oborto medeberis. Maxime etiam profunt sub aquario uase nascentes aselli, Millepedæ appellati, si oleo incoquantur.

Archigenes de Apophlegmatismis.

Post hæc uero Apophlegmatismi quibus pituita à capite detrahitur, ex sinapi aut hyssopo cū passio cocto, aut ex staphide syluestri cum pipere & melle trita, aut ex oleo ammixto melle, aut ex staphide syluestri per se uel cū melle trita, cōueniunt. Galenus. Pharmacorū quæ pituitam à capite euacuant, & medicis pro more Apophlegmatismi appellantur, materiā postea referā. Nunc autē tantū ostendere cōmodum fuerit, quod hocce auxiliū pituita infestate auxiliare est, quemadmodū sanē & ipsum nomen eius apud Græcos ostendit. Archigenes autē calidā & flagrosam affectionē se curaturū pollicitus est, non frigidam & pituitosam. Archigenes. Iuuatur autem plurimū lauri, aut rutæ, aut pānaciis, aut papaueris capitum, aut baccarum lauri decocto perfusi. Galenus. Fortibus calefacientibus pharmacis, non scio quomodo papaueris capita nō in strennue refrigerantia annumerauerit, quum in sermonis cōtextu singulis dictis aliquem per se uti posse ostenderit, & fortasse etiam aliquando simul mixtis: non tamen manifestum fecerit, num quippiam ex papaueris capitibus ipsis adijciendum sit, quo uidelicet aliorum pharmacorū uehementia minuatür & mitigetur: an & solis aliquando utendum sit, quod sanē incipiente & augescēte affectione tempestiuus fiet. Inueterata enim affectione non solum nō profunt, sed etiam nocentiora capita papaueris existunt. Archigenes. Commodum est & ex salibus fomentum. Galenus. Omnem rationem Archigenes hic cōfudit, quum fomenti mentionem faciat per pharmacum resiccans quidem non strennue, uerū & calfactoriū quiddam in se habens. Meminisse enim eum oportebat, quod quā calidam affectionem curare assumpsisset, aut semper ab illa ipsa indicationem seruaret, aut de transmutatione in diuersam speciem quippiam diceret, iuxta quam temporis progressu calore sedato, obturatio, aut intensio, aut tale quiddā accessisset, quod contraria curatione indigeat, & non ea quæ in principio fuit determinata. Archigenes. Post perfusiones uero aut fomenta iuuantur si lini semen rosaceo infartum adhibeas, & lanas sordidas ex aceto rosaceo calidas circumponas ac obleges. Galenus. Hoc mitigatum est auxiliū, quum uehementer infestat dolor, unā cum hoc quod & subiecta cōmō det affectioni. Quare ubi ad intensum capitis dolorē remediā scripsit, isthic præstiterat etiam de hoc fomento mentionem facere, Verum pro præsentis temporis oportunitate, de qua nūc sermo instat, si quis fomentis aut cataplasmatibus uti uelit, fomēta ex milio meliora fuerint. Quēadmodū enim Hippocrates ait, leue & lenē milium existit. Sales uero ob grauitatē molesti sunt præsertim capiti admoti.

De cataplasmatibus in capitis dolore. Archigenes.

Cataplasmatibus uero utere ordeacea cruda farina quæ iridem contusam habeat ammixtā. Aut rutæ semine eodē modo. Aut feniculi radice similiter. Aut cruda ordeacea farina cū aceto mulso apparatus. Aut polenta & pulgō mixtis. Galenus. Et hæc cataplasmiata ad secundā tēporis oportunitatē pertinet, quā supra augescēte capitis dolore cōstituit, nam & hūc mitigat, & affectionē iuuat. Archig. Aut Nilei pharmacū castorij & iridis decima parte ammixta, cum aceto & rosaceo imposito. Nilei quidem igitur pharmacum quod ad emplastri formā paratum est, iam olim nobile & laudatum pharmacum est, & ob id omnibus notū. Promittit autem reliquiarum inflammatorium in præcordijs inueteratarū curationem. Verum eorum quæ ei ammiscuntur castorij uidelicet & iridis Archigenes obscure mixtionem conscripsit. Incertum enim num alterius ipsorum decimam Niliaci malagmatis partem esse uelit, an utriusq; Verūm mihi præstabilius uidetur utriusq; decimam partem ammiscere

scere. Oportet autem castorium atq; iridem probe trita esse, & Nilei pharmaco diligēter emollito paulatim hæc ammisceri, manibus partim rosaceo, partim aceto madefactis. Aut nuces amaras decorticatas, & rutam, ac partē ex iride, cum aceto & rosaceo committito, & malagmaris forma imponito. Quum eiusmodi multa pharmaca circa secundum propositæ affectionis tempus Archigenes conscripserit, facultatis ipsorum expositionem in illis fecit. Aut uiticis seminis, per seæ uiridis foliorū & myrrhæ, æquales partes cum ungento Aegyptio fronti cataplasmatīs modo imponito. In sola Alexandria perfectæ arborem uidi, & in nulla alia Romanis subdita gente. Quidam Persi ipsam appellant, aiuntq; in persis lethalem eius arboris fructum esse, qui in Aegyptiorū regione in hoc uis existat. At uero Aegyptium unguentum, non solum sic, sed & Mendesium nominatur, Quidam etiam Megaleum uocari aiunt, utroq; cognomine à Megalo, qui ipsum composuit accepto: & ab illius quidem proprio nomine in denominatiuorum forma Megaleum, à patria uero ipsius Mendesium appellari. Est autem laxatorium & sedat dolores. Aut sulphur, castorium, baccas lauri, æquis portionibus cū cerato rosaceo infarta, temporibus & fronti imponito. Hoc pharmacum multū calfacit, & frigidas affectiones relaxare potest. Aut castoreum & peucedanum pari mensura. Consimilis est & huius pharmaci facultas cum præscripta. Quod si affectio perseveret, uenæ sectione à naso aut fronte, aut cucurbitis ad occiput affixis uitore. Sanguinis à locis affectis detractiones in affectionibus inueteratis conuenire omnes ferè medici consuntur, Verum cucurbitæ ad occiput affixæ, ex reuulsorijs auxilijs sunt, quum humores ad oculos, aut ad anteriorem capitis partem ferri consuetos auertere conamur. Aut sternutatorio quopiam concutito, fasciolaq; collo circumposita spiritum cohibere iubeto. Utilitatem ex hoc auxilio indicauit, per uerbū concutito adiectionem, Quod uero fasciolam collo circumdare iubet, ad uehementiorem affectionem pertinet. Aut per nares purgato. Hoc præfatus deinceps ea quæ per nares purgant recenset. De quibus ego sermonem faciam, uelut etiam de Apophlegmatismis, ubi pharmacorum quæ capiti adhibentur tractationem absoluo. At uero in uehementē inueteratis, sinapi ut moris est capiti adhibe & per rure. In omnibus plurimum inueteratis affectionibus quum nihil profecerint reliqua auxilia, curationem Metasyncriticam à Methodicis appellatam, omnes ferè adhibere consueuerunt, prioribus medicis haud scio qua ratiocinatione primum ad eius usum progressis. Ego uero quum intemperies quæpiam humida & frigida, aut per seipsam, in partibus affectis adest, aut propter eiusmodi humorū frigiditatem fuerit oborta, ex sinapi & thapsia ac similibus adhibeo pharmaca. Calidis uero & siccis non adhibeo. Cæterum hi qui affectiones cognoscere nō possunt, ad eiusmodi pharmaca uelut ad sacram appellatam anchoram cōfugiunt, & ob id sæpe quod conuenit perficiunt, quod plerisq; hominū eiusmodi affectiones propter malam & uitiatam dietam infestent.

Archigenes, De his qui ex ebrietate caput dolent.

IN his qui ebrietate caput dolent, iridem siccam & uiticis folia ex aceto & rosaceo adhibe. Aut apij comas coctas in uino impone. Aut pulegium ex uino eodem modo. Aut Mendesium unguentum per se, uel cum anserino adipe irrota. Aut myrrham cum uino Mendeseo impone. Aut rutæ folia, baccas lauri, uiticem, populī albæ fructum, æquali mensura trita, cum aceto & oleo tepesfacta irrota. Cæterum Amethista quæ ab ebrietate præseruent, eiusmodi esse poterunt, Absinthium mane ieiunis bibendum præbe. Aut myrti florem & myrrham ac rutam trita ex aqua. De his qui ex ebrietate caput dolent satis dictum

cum à me est quum ea quæ Apollonius ad hanc rem tradidit expendere.
At uero post hanc præscriptam Archigenis dictionem, alia sequitur de his qui
caput ex stomacho dolent, de qua iam dictum est.

Eiusdem Archigenis amuleta quæ capiti coronæ modo cir-
cumposita & alligata, dolorem eius arcant.

QVandoquidem uero & Amuleta ad dolorem capitis Archigenes scripsit,
quæ quidē nullam medicā rationem habent, ea his qui talia per experien-
tiam cognouerunt, & secundum mirabilem quandam cōtrarietatem homini in-
cognitam efficacia esse dicunt, relinquam. Quæ uero ab eo iuxta medicam ratio-
nem tradita sunt selecta referam tantum, iuxta illius ipsius dictionem, queadmo-
dum hæcenus de pharmacis facere consueui. Polygoni duos ramulos coro-
næ modo imponito. Quodd polygonum calidis & flatuosis capitis doloribus
cōueniat, ipse prius dixit, Nihil itaq; miri est in talibus sæpe ipsum iuuisse. Nam
propter ardorem & ebrieta tem dolores capitis assidue cōtingunt. At uero quodd
duos omnino ramulos esse oporteat, ab illis adiectū est qui polygoni utilitatem
ex incognita contrarietate, & non ex ipsius temperamento procedere uolunt.
Aut cichorium quodd Romanū Intubum olus appellant, ægri capiti imponito, &
maxime si ex ardore doleat. Ego uero etiā apponam, si ex ebrietate. Sic enim
& rosaceæ coronæ iuant. Eas igitur uolenti itidem licebit adscribere, nume-
rumq; quemcunque tandem uelit addere, & ex totidem rosis nexam coronam
capiti mederi asseuerare. Deinceps Callitricho coronare caput operæpretiū
ducit, quodd Trichomanes, inquit, quiddam appellant. Ego uero eos qui de her-
bis scripserunt Adiantum magis appellare Callitrichum scio quā Trichoma-
nes. Deinde paulo post philanthropo herba coronari iubet, & palmulæ ma-
sculæ cortice summo. & post hæc, in hæc uerba scribit. Aut aduersus solē ægrū
expositum, donec dolor quiescat sinito. In Amuletorum catalogo & hoc ab
eo relatum est, quodd quiddem ex frigidityte dolens caput iuuare potest, si neque
humoribus omnibus æqualiter redundet homo, neque ex cruditate laboret, aut
aliquem uisitarum humorem in uentre, maxime circa cauitatem eius habeat: ue-
rum calidos capitis dolores, ex quorum numero sunt & ex ardore ac ebrietate
oborti, non parum lædet. Cōsimilia his deinceps scribēs ad chamæmelum per-
uenit, cuius experientiam habemus quodd capitis dolorem iuuat, si quis eo ue-
lut ante dictū est queat uti. Appellat autem Archigenes Anthemidē hanc her-
bam, quemadmodum alij multī, & ait florem quiddem ipsius tritum, olfactu pro-
desse, folia uero summe nocere. Liberat à capitis dolore uerbenaca herba, quam
aliqui hieram, id est, sacram uocant, tum coronæ modo circumposita, tum illita
ex rosaceo & aceto. Hoc auxilium oportebat eum non nunc inter amuleta,
sed prius inter medicamenta referre, si quiddem adeo ei confidit, per longam ex-
perientiam cognito & probato. Aut testudinis palustris, quam quiddam am-
myda, hoc est, iurariam uocant, sanguinem sincipiti instilla. Et hoc si quiddem ue-
rum est, inter pharmaca & cum discrimine referri cōueniebat. Nisi sanē hoc uult
quodd omnem capitis dolorem iuuat, idq; omni temporis occasione. Ita enim &
nos contrarietatis testimonium ei præbebimus, non efficaciæ quam ex tempe-
ramento habet, Absoluto igitur de amuletis sermone, deinceps hæc scribit.

Archigenis de fissuris & contusionibus in capite factis.

DE uulneribus porro in capite factis deinceps dicitur. Parua autem fissu-
ra facta, aliqui myrrham aceto tritam, auraloen cum linamentis indunt,
glutinaturq; ita & absq; inflammatione mirabiliter adseruatur. Cæterum in con-
tusionibus

tusionibus citra disparationem ac fissuram circa caput factis, polenta imposita commoda est. Amplius uero & Oesypum, hoc est, lanæ sordes, atque ipsæ a deo lanæ sordibus sudoris succidæ, eodem modo. Magis autem proprie similitudinem ex aqua pro cataplasmate impones. Aut origanum cum polenta. Hæc utilia iudicata esse quid attinet referre? uerum alterius negotij atq; operis sunt, quam ut ob huiusmodi causam caput dolentibus apta esse iudicās ea adscripsisse putandus sit. Sed ut quæ obortas inflammationes curare, aut easdem prohibere possint. Atqui in aliquibus exemplaribus hæc in totum non habentur, uelut in alijs etiam plura his in huncce modum. In mediocribus capitis uulneribus, aut quæ omnino legitimo medico non habent opus, In quibus quidem nuditas per se non adest pilos, rademus, fibulisq; impositis constringemas, ac glutinantibus experimento cognitis utemur. Egregie glutinat uulneratam cerebri membranam, calaminthæ succus infusus, & farina milij arida inspersa, deinde butyro, & rosaceo, ac adipe suillo ueteri mixtis ac reperfactis infusis. In quibus uero os denudatum est, diuisa membrana caluarias ambiente, os ipsum scalpe mus & per suturæ adductionem, tanquam non sit denudatum curabimus. Si uero non permaneant suturæ, iuxta conarnationem uelut etiam aliorum uulnerum curam faciemus. Referetur autem huiusmodi curationis ductus in proprio loco. Cæterum in quibus uulneribus aut propter paruitatem, aut alias futuris uti non licet, linamentum conuulsum cum aceto & oleo imposito, aut cum myrti succo, aut lentisci, aut rubi, aut conyzæ tenuia folia habentis, ad aliquem eorum modico ammixto melle ita ut linamentum ex his imbutum imponas, Et folijs alij cuius ex prædictis pro cataplasmate utitor. Aut spongiam nouā aceto & oleo imbutā imposito, Aut lanam sordidam eodem modo. At uero ad ipsum uulnus brassicæ folia adponito, aut polentam aceto subactam per se imposito, aut cum brassicæ folijs tritis. Hæc quidem Archigenes scripsit ad capitis dolorem, discriminibus simul quibusdam additis, quemadmodum etiam Apollonius fecit. Asclepiades uero uaria quidem pharmaca scripsit, sed eorum discrimina iuxta affectiones non ita multum apposuit, sed saltem in incipientibus & inueteratis, quāquam neq; hoc in multis fecerit, sed in primo solum & postremis duobus. Postrema igitur credere quis possit inueteratis efficacia esse, utpote ex fortibus simplicibus pharmacis cōposita: primum uero ob id fortassis solum quis in usum talem adsumpserit, quod papaueris succum uō paucum ammixtum habet: huiusmodi autem didicimus, non propterea quod affectionibus profini, sed quod sensilem facultatem stupefaciūt, dolores mitigare solere. Quare etiam ea omnia deinceps à me conscribentur.

Quæ Asclepiades ad capitis dolorem in primo externorum scripsit.

AD recentes capitis dolores irrigatio, qua usus est Nicomedes, foliorum rutæ drach. II. mentæ drach. II. peucedani, drach. IIII. iridis drach. II. seminis cœymī drach. VIII. seminis papaueris nigri drach. IIII. alij drach. V. III. poscæ herminas duas, ad dimidium coquito, & expressum succum cum rosaceo conquisato, & caput assidue ex eo irrigato. Aliud quo usus est Charides, Amygdalarum amararum depuratarum drach. II. seminis uiticis drach. II. radices peucedani drach. II. mentæ uiridis siue aride drach. II. ramulorum rutæ drach. II. baccharum lauri depuratarum drach. II. serpylli drach. II. sphondylii drach. II. castorei drach. II. rosarum uiridium aut siccarum drach. IIII. aceti heminas duas, rosacei quod satis est, apparato ac utere ut dictum est.

Pastillus ad capitis dolorem quo usus est Antonius herbarius,
qui multa artis experientia clarus fuit.

Succi peucedani drachmas V l. succi papaueris drach. III l. croci drach. III l. myrrhæ drach. III l. scammonie drach. III l. omnia trita cum aceto in pastillos redigito, eosq; in umbra resiccato; usus autem tempore aceto dilutos fronti illinito, à tempore altero initio sumpto & usque ad alterum tempus progrediento, In febricitantibus ex aqua illinito. Quo Alexander usus est sic habet: Peucedani radices aut succi drach. l. croci drach. i. myrrhæ drach. i. opij drach. unam, aceto excipe ac redige in pastillos: usu uero exigente, aceto dissolutos locis sensum doloris perceptantibus illinito. Aliud Antigoni qui in castris exercitus insignis medicus fuit. Baccarum lauri siccarum purgatarum tritarum drachmas III l. scammonie drachmas III l. succi papaueris drachmas III l. seminis apij drachmas V III l. croci drachmas V III l. myrrhæ drachmas III l. omphacij drach. III l. serpylli drach. V III l. aceti quod satis est, præpara ac utere ut dictum est.

Ad inueteratum capitis dolorem Epithema, quo

Charicles usus est.

Retrimentorum quæ ab expresso irino ungento supersunt, peucedani, castorij, singulorum partem unam, baccarum lauri partes II. seminis uiticis partes II. rosarum siccarum partes II. ramulorum rutæ partes III l. aceto dissoluta cerato ex rosaceo appurato excipito, deinde linteolo impacta præteritis capillis per omne caput imposito, & fasciola obligato, atque usque in sequentem diem obligata custodito, rursusq; imposito. Aliud ualde bonum. Amygdalarum amararum, floris uiticis, peucedani radices, mentæ uiridis, ramulorum rutæ, baccarum lauri, serpylli, sphondylii, castorij singulorum partem unam, rosarum partes duas, appara & utere ut dictum est. Post hæc præscripta pharmaca Archigenes & Apollonius, itemq; Asclepiades, pharmaca conscripserunt, quorum aliqua per os, aliqua per nares caput purgant. Cæterum quæ Archigenes tradidit hæc sunt iuxta illius ipsius dictionem.

Archigenis de Apophlegmatismis, & quæ naribus infunduntur.

Post hæc uero Apophlegmatismi ex sinapi aut hyssopo cū passo cocto, aut ex staphide syluestri cū pipere trita, aut ex melle oleo ammixto, aut ex staphide syluestri per se, & cum melle trita. Hæc quidem Archigenes inter remedia doloris capitis scripsit, Apollonius uero de his quæ ad dentium dolores, in primo parabiliū tradidit, hæc uerba scripsit. Quæ naribus infundantur in dentium dolore. Radicis betæ succum per se in nasum infundito, & dolores dentium soluet. Aliud. Cumini quantū tribus digitis apprehendi potest, & myrrhæ ad magnitudinem fabæ, medullæ cucumeris syluestris duplum, trita & lacte muliebri iuncta in collyria redigito, eaque in utranque narē indito, Deinde quandū quis quinque stadia percurrere possit adtrahere, & postea emungere iubeto. Hoc pharacū & ad aurium dolores facit. Asclepiades autem in primo exteriorum ita scripsit. Asclepiades de his quæ naribus infunduntur, & de sternutatorijs, & apophlegmatismis pituitam e capite detrahentibus. Errhina quæ naribus indita caput purgant, commodant etiam ueteri lippitudine oculorum infestatis, faciunt & ad comitiales morbo apprehensos. Ducuntque multam humiditatem. Melanthij drachmas V III l. salis ammoniaci drach. unam, elaterij drach. i. trita & quam tenuissime leuigata, sic oportet uti.

nio oleo, aut irino ungēto, aut cyprino excipe quo ad cerati liquidi crassitudinē perducantur, & reconditis in cornea pyxide utitor, subtilis inde naribus, atque aëris attrahere iussis. Aliud, Citra molestiam purgans, doloremq; eue stigio sedās. Cyclamini siccae drach. vii. Iridis siccae drach. ii. Nitri rubri drach.

unani Ego elaterio usus sum diligenter trito & per arundinem insufflato, ægro ipsum attrahere iussio, atque deinde deorsum pronuere, quo uidelicet coactus sit quor destillet. Post hæc uero Asclepiades in hæc uerba scripsit. De ster

nutatorijs. Sternutatoria caput purgātia Heraclidæ Tarentini, Cumini æthiopiçi, piperis albi, struthij, castorij, singulorū æquales partes contusas & cribratas in aëre pyxide reponito. Vsu uero exigente, pyxidem cōcutito, & apertam naribus admoſuero, aut cum digito adhibeto, aut etiam per arundinem insufflato.

Aliud, Zingiberis drach. ii. struthij drach. ii. piperis albi drach. i. cassiæ drach. mam. Lutere ut dictum est. Ad ueterem capitis dolorem sternutatoria Pto

lemæi. Facit ad uertiginē & comitiali affectos. Veratri albi drach. iiii. Alij unam habent, radicis cucumeris syluestris drach. unam, struthij drach. unam, nitri rubri drach. i. castorij drach. i. piperis albi drach. i. Vtere ut dictum est.

Aliud, Veratri albi, radicis cucumeris syluestris, struthij, singulorum partes duas, castorij, acori, nitri rubri, cumini æthiopiçi, singulorum partem unam, euphorbij partem unam, tritis ut dictum est utere. At uero post dictorum ster

nutatoriorum descriptionem Asclepiades in hunc modum scripsit. Quæ mansa caput purgent, & multam humiditatem ducant. Piperis albi drach.

ii. staphidis syluestris drach. ii. cassiæ drach. ii. Excipe uuarum passarum exacinarum, aut sicuum pinguium carne, & mandenda præbe. Mandentes uero deorsum pronuere oportet, & per interualla hiare, quo collectus humor destillet. Post uero etiam aqua calida in ore continenda, quæ etiam ubi multam per

ceperint mordacitatem eis exhibenda est. Aliud, Staphidis syluestris, pyrethri, piperis albi, hyssopi, cardamomi, singulorum æquales partes, polen

tæ duplum, aqua subigito ac utitor ut dictum est. Porro ex subscriptis pharmacis quibusdam præceptores meos usus scio, quibusdam amicos, aliqua etiam ipse in usum adsumpsi, ut ex multo usu fidem suam mihi probauerint. Sunt autem hæc, Foliorum cucumeris syluestris succus naribus infunditur tum per se

solus, tum betæ addito decocto aut succo. Aliud, Myrrham melle coram naribus infundito. Aliud, Aloes, nitri, melanthij, parem mēsuram

cum oleo ueteri ad strigmentorū crassitudinem redacta. Aliud quod manditur. Nitri sexuncem, anisi trientem, staphidis syluestris quadrantem, foliorum lauri uiridinē, & uuæ passæ exacinatæ pari mēsurā excipe, & ex hac mixtura pastillos trium drachmarum coque, & singulos usu expetente mandendos præbe.

Aliud quod naribus inditur. Euphorbij drach. dimidiā, thapsiæ drach. unam, iridis drach. i. mellis cocti sesquidrachmam, succi radicis betæ quantum sufficit. Ex hoc ad milij magnitudinem accipe, & aqua dilutum specillo exceptum naribus infunde. Aliud quod naribus infunditur. Suc

ci cyclamini cyathos i. i. succi foliorum hederæ cyathum i. peucedani obolum unū, elaterij obolum unū. In uitreo uase recondito, usu uero exoptulante lacie muliebri dissoluta naribus infundito.

Aliud, Myrrhæ trientem, euphorbij trientem, piperis albi grana xxv. Myrrham aqua prius dissoluito, unāque ipsum euphorbium, deinde piper tritum addito, & adiecto olei gleucini sexuncē utitor. Aliud, Quod naribus infusum multam pituitam

per os detrahit. Olei communis sextarios duos, saponis libram unam, resinæ friciæ sesquilibram, opopanax unciam unam per anchusam colorato ac utitor, ore prius

ore prius aqua expleto. Aliud quod in os illinitur. Saponē betæ succo dilutum iuxta palatū illinito, atq; (tūdem iuxta oris columellam. Idem etiam naribus infundi potest.

Quæ Crito in primo de pharmacis scripsit his verbis. Apophlegmatismi.

Staphis sylvestris per se & cum pulegio mansa. Aliud, Staphidis sylvestris & origani utriusq; acetabulum, nitri drach. i. trita cochlearij mensura manducanda præbeto, donec os pituita repleatur, deinde aperto ore effluere sinito. Aliud, Origani trientem, hyssopi drach. iiii. staphidis sylvestris drach. iiii. spumæ nitri drach. ii. sinapis drach. ii. pyrethri drach. iii. tritis utere. Aliud, sinapis partem unam, staphidis sylvestris partem unam conuulsis utere, hoc pharmacopœæ utuntur. Aliud, Hyssopo, thymo, origano, tum per se tum simul mixtis utere. Aliud, Medullæ colocynthidis in aceto ad multum tempus coctæ, aut etiam per longum tempus in uino maceratæ, liquorem in ore contineto. Aliud, Allia cum crucæ semine & nitro. Aliud, Staphidis sylvestris drachmas vii. pyrethri drach. iiii. hyssopi drach. i. Conuulsa in orbiculares pastillos cogito, eosq; drachmæ pondere formatos manducandos exhibeto.

Quæ pharmaca naribus indenda Crito ictericis seu atquato infestatis conscripsit.

Pharmacon quod naribus infunditur, & tum per nares, tum per os excernit, Ob id ipsum uero ne consterneris, si palatum calefaciat aut exasperet. Ex alto enim auocat ac transfert humores. Staphidis sylvestris drach. i. melanthij drach. iiii. Cum aceto trita ad formam strigmento liquidiores redigito, & per dies quinque in nares infundito donec expurgetur æger. Id autem alternis diebus facito. Aliud, Hederæ folia decem, lauri folia decem, cum oleo terendo ad strigmenti crassitudinem redigito, & naribus similiter instillato. Aliud, Egregie facit & elaterium insufflatum in ipsorum nares. Ceterum si quis hoc citra detrimentum facere uelit, in calidæ solium agrum immittet, atque ita toto corpore præter faciem in eo immerso, elaterium insufflabit. Large enim bilem per nares educti. Aliud, Elaterium ad magnitudinem erui, in lacte muliebri dilutū naribus infundito, atq; ubi purgatio prodierit, in calidæ labrum demittito ac lauato, & per dietam reficito.

Quæ Aeneas per experientiam pituitam detraherentia tradidit.

Quorum experientiam per Aeneasum habeo, à quo etiam descriptiones accepi. Pharmacon quod naribus inditur atq; pituitam detrahit. Saponis lib. vi. adipis caprini lib. i. ceræ lib. iiii. picis aridæ trientē, quidā uero quadrantem habent, nitri tantūdem, lixiuij acris cyathos ii. Vnus tempore aqua diluta per specillum infundito, attrahereq; iubeto. Caput uero irino prærigato, & post usum aquam musam sæpe gargarissandam præbeto. Aliud, Euphorbij drach. vi. lycij indici drach. iiii. succo betæ excipe ac melle addito coque. Vnus tempore aqua aut lacte dilue. Aliud, Succu cyclamini cyath. ii. succu cacuminum hederæ cyath. i. succu peucedani obolum. i. elaterij obolum i. Vtere in balneo cum lacte muliebri. Aliud, Pyrethri, piperis, hyssopi, staphidis sylvestris, partem mensuram in pastillos drachmæ pondere cogito, quorum unum manducandū præbeto, & post factam ab ipso purgationem, sale & melle curato. Sternutatorium, Piperis albi, neratri albi, castorei, euphorbij, struthij, succu cyclamini aridi, æquali mensura, penna præirritatis insufflato.

De usu omnium fortium pharmacorum.

QVam utendi rationem de prædictis pharmacis dixerò, eam ad omnia alia quæcumq; fortem uim habent transferre oportet. Non enim statim à principio efficacissima adhibere conuenit, sed à debilibus auspiciari. Quin & ipsa fortia pharmaca mitigatoriorum ammissione lenita, moderata fiunt. Et ob id ego quædam ex his muliebri lacte recenti & aqua diluo. & post hoc oleo dulci, deinde de betæ succo, & anagallidis quæ ceruleum florem habet eisdem succo, atque ita sensim in usu eorum progredior, donec postremum etiam per opobalsamum talia dissoluo. Ac primum quidem lacte ammixto adhibeo, quod ubi leuiter feruit ægri, etiam citralactis adiectionem admoueo. Porro parabili sæpe pharmaco usus sum, quod naribus infunditur Melanthio, aliquando quidem aceto acris rigato ac pridie macerato, deinde sequenti rursus cum aceto urito, & naribus infuso, aut ægro ipsum absorbere in nares iussu. Aliquâdo uero oleo ueteri idem melanthii cõmisti, atq; ita usus sum, quo modo etiam Archigenes eo utitur in narium obturatione. Eo uero quod cum aceto infunditur, Crito uiuitur ad arquatimorbû,

De hemicrania, hoc est, dimidiæ partis capitis affectione.

Cap. III

Affectio dolorosa circa dimidiam capitis partem, aliquâdo dexteram, aliquando sinistram contingit, quæ iuxta suturam secundum longitudinem eius extensam terminatur, & ut plurimum per circuitum exacerbatur, influxu uaporum aut humorum siue multorum, siue calidorum siue frigidorum, causam dolori suggerente. Quidam igitur ipsorum circa temporum musculos uehementer doliant, & plerq; sanè ipsorum pars hoc modo affligitur. Quidam uero dolorem longe uulsius progredientem habent. Et Quidam adeo uehementer dolent, ut neq; manuum contactum facile ferant, in quibus palam est pelliculam caluam ambientem esse affectam, & neque cutem ipsam omnino ab affectione immunem existere. Manifestum igitur est uaporum, aut humorum, aut utrorumq; influxum siue per uenas, siue per arterias, siue per utraq; contingeret; quum interdum ea sola quæ intra caluam continentur, hoc est, cerebrum eiusq; membranæ, quod in ipsis redundat foras protrudant; interdum uero corpus infra caput positum uitiatos uapores aut humores sursum mittat. Quapropter ubi quis hemicrasiã curare aggreditur, prius quali purgatione aut uenæ sectione æger opus habeat, consideret atq; ita deinde ad capitis auxilia progrediendo, tum per digitos suæ manus, tum per linteum dimidiam frontis partem, & eam maxime quæ circa temporum musculum est, confricando excalfacta, atq; id ante irritationis tempus faciendum est. Post exacerbationem uero pharmacis hemicranicis à medicis appellatis utendum, siquidem multa caliditas in doloribus percipiatur, his quæ refrigerans quippiam habent; citra uero hanc, his quæ multum excalfactant. Vtriusque uero aliquid ex his quæ firmitatem ac robur addunt misceatur, quod adstringentem uidelicet habeat facultatem. Demiror autem quod neque Apollonius, neque Archigenes, neque Asclepiades quicquam de hemicranicis pharmacis, quæ merito post doloris capitis totius pharmaca subiicienda erant, conscripserunt. Decebat enim ipsos, tametsi nihil priuatim in se habest, propterea quod inter ea quæ totius capitis dolori destina ta sunt, cõtineantur, id ipsum saltem annotare. Similiter autè & ab Hera & Critone, uberior de hac affectione tractatio neglecta est. Cæterum per quæ phar maca inueterato capitis dolori medentur, per eadem cõstat eos etiam hemicranicis affectionibus auxiliari. Heras itaq; in medicamentario libro, statim à principio in hæc uerba ad capitis dolorem pharmaca conscripsit:

Pharmaca ex libris Heræ ad capitis dolorem.

Crocomagmatis partem I. gallæ partē I. trita ex uino fronti ac temporibus illinito. Pastillus, ad capitis dolorem egregie faciens, à tempore ad tēpus hīs aut ter illius, Croci drach. XV. atramēti futorij drach. X. aluminis scissi drach. XIII. myrrhæ drach. III. opij drach. III. omphacij drach. III. chalcitidis drach. III. gummi drach. XV. tritis uini falerni austeri quod satis est affunde, & ut collyriū tere, indeq; in pastillos omnia redige. Vſu uero expecte, poſca aut aceto dilutis utere. Malagma, ad capitis dolorē, Aeruginis rasilis drach. III. æriſti drach. II. ſquamæ ſtomomatis ferri drach. II. cimoliæ drach. III. chalcitidis drach. III. pumicis crudi drach. III. terebinthine unciam unam. cere drach. XXXVII. & dimidiū. olei ueteris cyathos II. Aridis tenuiſſime tritis; liqueſcibilia liquefacta affunde, emolli ac utere. Quod ſi durius uideatur pharmacum, oleo amygdaliſino emolliſito. Hæc quidem pharmaca Heras ad capitis dolorem ſcripſit. Vtuntur autem eis quidam etiam ad hemicranicos dolores, quemadmodum etiam alijs medicamentis quæ prædicti uiri ad inueteratos capitis dolores deſtinauerunt. Non tamen per omnem frontem pharmacum extendunt, ſed per affectam ſolum partem. Cæterum ex præceptoribus noſtris quiſpiam hoc pharmacum ad inueteratas hemicranias in uſu habebat. Piperis albi drach. II. crocomagmatis drach. I. I. euphorbij drach. dimidiū utere. Porro de euphorbij facultate tam mihi relatum eſt, quod cito exoluatur, Quare in eiſmodi pharmaca non uetus conſicere oportet. dictum etiam recens albidius eſſe, quod uero inueteratum eſt, ſtauioris aut pallidioris coloris reddi. Verum ſi non ualde uetus ſit euphorbium, ſed duorum aut trium annorum, duplum eiſ adſicies, hoc eſt, drach. I. Quemadmodum autem euphorbium recens conſiciendum eſt, Sic itidem ſtercoris columbini drachmæ dimidiū, ex columbis montanis quas in turribus nutriunt ſibiſſis uicium quærentes, non uelut quæ in urbibus intradomos nutriuntur. At uero & atramēti ſcriptorij æqua portio, hoc eſt, drachmæ dimidiū ad columbinum ſtercus inſicitur, atq; ad hanc rem noſtrum pergamenum præſtat, eo enim ſemper præceptor noſter utebatur. Aut igitur illud ipſum ex Pergamo atramentum inſicere oportet, aut aliquod aliud optime præparatum: atq; ita omnibus hijs mixtis & probe ſubactis, acetoq; acerrimo imbutis ac dilutis temporis muſculus, & dimidiū frontis, & affecta capitis pars illinenda eſt. Aliud pharmacum. Quod non ſolum in hemicrania, ſed & in omni inueterata capitis affectione illinitur, in capitis quidem dolore per omnem frontem, In hemicrania uero per mediā capitis partem affectam. Croci drachmas XV. atramenti futorij drach. X. aluminis ſcilli drach. XIII. myrrhæ drach. III. opij drach. III. omphacij drach. III. gummi drachmas XV. Omnibus tritis uinum falernum adſice; & ruruſ ut collyrium tere, deindeque in pastillos redige, Vſus uero tempore poſca dilutas aut aceto illine. Aliud, ad eaſdem affectiones. Scammonia drachmas VII. croci drach. II. comæ hederæ drach. VI. ſulphuris uiui drach. III. ſeminis aniſi drach. VIII. ſeminis apij drach. VIII. diſcigenter trita cum ocymī ſucco in pastillos cogito. Hoc pharmacum multo roſaceo diſſolutum capitibus letargicorum rigandis ſit cōmodum. Aliud pharmacum. Non iſſdem ſolum conueniens, ſed & uertiginosis auxiliare. Radicis peucedani drach. III. iris illyricæ drach. II. æruginis drach. I. acori drach. I. ſphondylii drach. III. piperis nigri drach. II. & dimidiū, caſtorij drach. II. & dimidiū, ſerpylli drach. III. & dimidiū, myrrhæ drach. II. baccarum ſauri numero XXXV. rutæ uiridis drach. VIII. mentæ uiridis drach. III. opij drachman. I. Aceto excipe & in pastillos redige. Vſu exigēte aceto & roſaceo dilutis illine

illine. Verum cerato rosaceo exceptum hoc pharmacum ut Malagma imponi-
tur. Pastillus. Non solum Hemierania laborantibus commodus, sed &

coxendicij morbo affectis auxiliarius. Thapsiæ drach. iiii. euphorbii drach. iiii.
laseris siue succi Medici drach. iiii. myrrhæ drach. i. opopanax drach. i. Simul
contusa in pastillos cogito, quos deinde usus tempore aceto trito illinis. Hæc
quidem cõposita sunt pharmaca. Sæpe uero & extempore ac improviso phar-
maca præparare coactus, simpliciter euphorbii illitione usus sum, modica cera
compagis acquirendæ gratia adiecta. Sufficit autem in libram olei siue Sabini,
siue alterius ei propinqui, ceræ quadrantem iniungere, & euphorbii unc. i. atq; ex
hoc dimidiam frontis partem illinere, unâ cum temporis uidelicet musculo. Cæ-
terum in quibus suspicionem habueris, à calidis uaporibus aut humoribus, di-
midie capitis partis fieri dolorem, in his ne admoueris hoc pharmacum. His uer-
o qui ob frigidas causas infestantur, commodissimum adeo est, ut sæpe semel
ante balneum illitum, quàm citissime affectionem persanet, ut à balneo omnino
sani ægri euadât. Iuuat etiam hos si oleum tepidum in aurem instilletur, modico
euphorbio ad oleum iniecto. Nimirum ad libram olei unam euphorbii uncia di-
midia, si ualidum euphorbium existat. Si uero non, etiam amplius iniungere cõuer-
nit. Verû in corporibus molli ac tenero sensu præditis, etiâ si minus quàm dimi-
diam unciam inieceris, melius res procedet.

Finis secundi Libri.

CAPITA TERTII LIBRI.

De aurium affectionibus, & ob quot causas aures dolore affligan-
tur. Cap. i

De parotidibus. Cap. ii

De affectionibus narium. Cap. iiii

Heraclidæ ad eruptiones sanguinis e naribus. Cap. iiii

CLAVDII GALENI PERGAMENI

DE COMPOSITIONE PHARMACORVM SE-

cundum locos Liber iiii Iano Cornario Medico interprete.

De aurium affectionibus, & ob quot causas aures do-
lore affligantur. Cap. i



PRIMUM dolores aliqui ex frigiditate fiunt, quos sanè in pe-
reginationibus à frigidis uentis perflati habent. Aliqui uer-
o ex balneis frigidis, & quibusdam medicatis aquis ob-
oriuntur, in quibus quidam ob delicias lauant, quanquam
sint qui & ob corporis commoditatem id faciant. Fiunt &
auris dolores ex inflammatione, interdû quidem solius cir-
ca meatum cutis, interdum uero in profundum progressa,
quando uidelicet neruus auditorius, ad inflammatâ affectio-
nem peruenit. Qua uero ratione inflâmatio, partes inflâmatas distendens, dolor
rem producit iuxta eundem modum etiâ flatus uentosus, transirû nō habens, dolore
excitat. At uero cõsimilis dolor est ex serosis & saniosis humoribus in corpore
auri generatis, ei qui ex mordacis humorum illapsu forinsecus factus, contingit.

De dolore

De dolore auris ex frigiditate.

Dolores quidem (igitur) a sola frigiditate obortos calfacientia quam celeriter me curant: atque in hunc usum quosdam rurales homines magnas cepas exsculpere uidi, deinde oleo eas explere, & in feruente cinere moderate calefacere, atque ita auribus infundere. quosdam uero non cepas tantum, sed & allium in oleo feruere facere atque ita infundere uidi. Ego uero euphorbio omnino modico, ad multum uetus oleum amixto utor, uelut etiam pipere exquisitissime trito. Aurium enim dolores à frigiditate inductos eiusmodi calfacientia magnopere iuuant. Prodest etiam Amaracinum oleum eis infundi, & optimum nardum. Et quod apud Romanos foliatum itemque quod Spicatum appellatur, prodest eis & Commagenum: atque si rutam quoque oleo non adstringenti ampliusque tenuium partium incoxeris, uelut est Sabinum, magnopere iuueris. Quum uero ex aqua medicata quippiam circa auditorium meatum contineatur, oleum assidue infundere conuenit, quo ipsum eluamus, deinde lana molli extergere, rursusque infundere. Magnifice autem eos mitigat oui cadidum, quo etiam ad lippitudines utimur, itemque fac muliebre. Manifestum uero est, quicquid adhibetur medio critere calidum esse oportere. Plurimum iuuantur quoque ex adipe anserino, atque item uulpino.

De dolore auris ex inflammatione oborto.

Quod si inflammatio addit, optimum ad eam pharmacum unguentum nardinum cum modico basilico appellato pharmaco infunditur, idem etiam terapharmacum appellatur, Et Commagenum quoque aptum est, & ex adipibus pharmacum, cuius compositionem paulo post describam. Cogente uero dolore, necessarium est etiam his quae sensum stupefaciunt uti, quemadmodum etiam in his qui colum, aut renes, aut quancunque tandem partem affecti, uehementi dolore affliguntur, facere consueuimus. Miscetur autem opium muliebris lacti & oui candido, quae ipsa & per se saepe aurium inflammationibus profuere. Miscetur & castorio opium, Verum multo ante usum tempore, siue pari pondere, siue duplo castorio ammiscetur, praeparatum id esse conuenit: & miscetur quidem in uehementissimis doloribus pari, in minoribus uero duplo: Liquor uero quo haec diluantur ex musto sapa sit. multo enim magis quam dulcia uina, dolorem haec sedat. Statim itaque in principio praedicta pharmaca diligenter trita cum sapa misceantur, castorium quidem diligenter prius tritum & leuigatum, papaueris uero succus ipsa sapa dissolutus, atque ita haec tria mixta probe leuigentur. Deinde uero usu postulante rursus sapa diluantur, in eiusmodi compagem, ut per auris foras specilla ad lucernam tepescientia infundi possint. Verum ego nullum pharmacum dolore uexatis infundo, neque etiam per lanam instillo, utpote qui experientia edoctus sum, quod praestat neque omnino contingere doloris tempore auditorium meatum: sed per auriculare specillum lana mollissima obuolutum dolore uexatos foueo, pharmacumque ita moderato tepore in auris foris specillo praeparatum iniicio, ut interrogato per nos aegro, num tepidum ei uideatur, & num calidius ipsum ferre possit, ad tantam caliditatem procedam, ut nihil amplius offendat. Tinctum itaque in hoc modo praeparato pharmaco specillum, ad principium meatus moderate imponito, & in altum desuere ex eo pharmacum permittito, & postea iterum iterumque & saepius tincto idemque facito, nullo tempore intermisso. Palam est autem quum hoc fit etiam foris omnino aliquid effluxurum esse, expleto nimirum toto auditorio meatu: hoc igitur quantum possibile est moderate excipe, nec aurem contingas. Postquam uero probe foueris, meatum pharmaco expletum sinito, & mollem lanam forinsecus tum meatus osculo, cum uniuersae auri imponito: atque ubi rursus fomenta adhibere oportebit, incumbentem foris lanam leniter tollito: rur-

susq; similiter foueto, quātum possibile fuerit diligenter cauens, ne aliquid aliud graue aūrem cōtingat. Ad hoc uero praeceptū maxime animum aduertas, ut po-
te quod omnium potissimum sit in aurium curatione. Fomenta uero fiant per
ea quae uelut dictum est, dolorem sedant, Quale est optimū Nardinū ungen-
tum paucissimū in eo tetrapharmaco dissoluto, Deinde etiā Commagenū &
Suisinū, & pretiosa diuītum muliercularum ungeta, quae ipsae spicata & soliatā
appellant. Sunt autem spissiora quā ut infundi queant. Quapropter per nardi-
nū ungentū ea dissoluere oportet, & aestatis tempore, & si calor is sensus agrū
circa inflammatā aūrem infestet, per rosaceū bonū, aut si hoc non adsit, amygd-
alinū. Memineris autem quod bonum semper rosaceum dico, in quo pluri-
mā rosae maceratae sunt: uerum oleum in quo haec macerantur omphacinū sit,
ex crassis oliuis & necdū penitus maturis expressum, citra salis additionem prae-
paratum. Imò neq; etiā aliud quicquam ad rosas cōiiciatur, quemadmodum
illi faciūt qui spissamenta stymmata Graecis appellata addunt, quo uidelicet per
multum tempus ipsum rosaceum odoratum permaneat.

De dolore auris ex flatu uentoso, aut crassis & uiscosis humoribus.

SI uero flatum uētosum, aut crassum aliquem & uiscosum humorē, qui tran-
situm non habeat, inclusum esse cōieceris, etiā ex pharmacis ab obturatio-
ne liberantibus quippiam ammisce. Artificiosa enī coniectura causarum hu-
iuscem odī doloris tibi continget, si tum praegressa, tum praesentia percunctatus
fueris. frigiditate enī antegressa flatu uentoso congregatur: grauitate uero ca-
pitis, cibisq; pituitosis & mali succi, frigidi & crassi humores. His enī si frigidi-
tas accedat, dolores contingunt, eis nimirum quae prius dissilabatur propter den-
sitate inclusis & retentis. In his igitur spuma nitri, & nitru ipsum molle, eius-
modiq; aphroditru, & oleum amygdalinū appellatum rationabiliter in auricu-
laria pharmaca miscentur. Ex hoc genere album item ac nigrum ueratrum est,
& struthium, ac amygdalae amarae, & ex tribus aristolochiis quaecunq; fuerit ad-
manū, & iris illyrica, Inijcies autem & cinnamomū si habueris, aut cassiam illo
non praesente, tum eam quae Zigeres, tum quae Motodes appellatur. Item car-
pestū, quod plurimū in Sida Pamphyliae nascitur, & ob id uilissimū pretio uen-
ditur. Quintus sanē quum cinamomi inopia esset, carpestum pro ipso insecti du-
plo pondere, uelut aliqui eius loco cassiam exhibere solent. Caterum aurium
meatus ab obturatione liberant etiā quae lapides in renibus atterunt, omniaq;
insuper tenuiū partium citra mordacitatem, ut ne dolorem exacerben. Ex quo-
rum numero est etiā cucumeris syluestris radix, itemq; bryoniae & Ari, & dra-
cunculi ac centaureae & polij, & omnino omnium amarorum, Citra mordacita-
tem namq; & absq; molestia expurgāt haec meatus, dissejuntq; & dissecant ob-
turata. Verum ob id multa eiusmodi exempla scribo, quamuis sanē omnia in li-
bris de simpliciu pharmacorum facultatibus retulerim, quod uidelicet omnibus
terrae locis remedijs uos abundare uolo, ut ipsorum memoriam in promptu ha-
beatis. Alia enī in alijs regionibus abundant, & meliora his quae alibi nascun-
tur existunt. Alioqui sanē ex adipibus compositum pharmacum tibi sufficiet, &
ex simplicibus quaecunq; paulo antē recensui doloris mitigatiua. Mirari porro
subit medicos qui citra distinctionem ad aurium dolores pharmaca quaedā con-
scripserunt. Quae etenim à frigiditate dolent, per calfacientia celerrime curantur:
si uero à mordaci acredine, aut à pulsatile inflammatione dolor fiat, maximū de-
trimentum continget, si eiusmodi pharmaca adhibeantur. Atqui moderatae in-
flammationes & non pulsatiles, etiā per eiusmodi pharmaca curantur, Quale
est acetum cum rosaceo tepefactum, utrisq; diligēter simul commissis. Sic etiā

Glaucium

Glaciū in cote medica cum aceto tritum, breuibz inflammationis doloribz, prodest. præstet autē pastillum ex glaciō multē sanē utilitatis pharmacū, prius præparatū habere, quī sit ex glaciō probe cum aqua pluuiāli trito, deinde in pastillum redactō & exsiccato. Si uero fragilius uideatur glaciū quā ut in pastillo formari possit, parum gūmi ei addes. Sufficit autem id duodecimā aut quin, tam & decimā glaciū paritē esse. Quin & collyria ex glaciō eodē modo cum aceto trita, eis profunt auribz instillata, atque his nihil minus collyria ex croco. Hæc quidem igitur sunt doloris & inflammationis remedia. Cæterum de alijs affectionibz quæ in auribz oboriuntur, ubi pharmaca quæ per experientiā cognoui recēsuero, ita deinde ad ea quæ à prioribz medicis scripta sunt transibo.

De ulceribz aurium.

Vlcera aurium recentia, cum glaciū solum cum aceto tritum, ut iam dictum est, curat, tum collyria ex eo omnia, & collyria ex croco, & ex rosis, medicis appellata, uelut etiā quod Nilo inscribitur. Curat item ea Damocratis collyrium ex myrrha. Quæ uero pure manant citra dolorē, atq; id moderate patiuntur, per eadem curantur: uerum quæ fortiter assurgunt, per eiusmodi quæ, his est pastillus Andronius, & pastillus Musæ cum sapa & modico aceto dilutus. In quibz componēdis uarietas rursus dicitur. Vbi uero & hæc à malo uincantur, Scoriatine recremento ferri ad plurimos dies in sole cum acerrimo aceto trita & leuigata, confidenter utere. Etiam si præter rationē uideatur, aurē acerrima pharmaca sustinere posse, quā paulō ante dixi neq; mollissimorū insusorū admotionē & allapsum circa molestiā sustinere, sed & hæc ipsa offendere ipsam uidet.

De audiendi difficultate, & de sonitu aurium.

Restat itaq; adhuc de audiendi difficultate, & de sono aurium disserere, quæ nihil est doloribz & ulceribz commune habent. De quibz deinceps dicam, Vbi prius compositiones auriculares à celerrimis medicis magnifice laudatas recēsuero, iuxta quam rationem eas composuerint tandem illi, Injicio ab ea quam Heras scripsit sumpto.

Compositio auricularis, Hera.

Heras quidem igitur ita scripsit. Compositio auricularis ad omnem dolorem, omneq; ulcus, hac in febriente quodam usus sum, & ob dolores delirante, & feliciter successit. Myrrhæ drach. i. thuris drach. iii. alij. vii. spumæ natri drach. iii. croci drach. iiii. alij. i. succi papaueris drach. iii. galbani drach. ii. amygdalas amaras delibratas. xx. aceto excipito. Vfus uero tēpore, si quidem dolor adsit, rosaceo diluta instillato: si uero audiendi difficultas adsit, aceto. Heras itaq; unum hoc pharmacum scribere contentus fuit, ad omnem dolorem, ac aurium exulcerationem remedium. Ego uero dolores per pharmacum ex adipibus constans, & per nardinum ungentum tetrapharmaco ammixto leniri dico, unaq; & affectiones ipsas iuuari, uelut etiā oui candido, & lacte muliebri: per papaueris uero succum mitigari solum dolores, nihilq; iuuari affectiones: uerū per accidens, non primariō etiā affectiones inde opem sentire quis dicere possit. Sedato enim dolore, & somno consequente, Natura affectiones dolorem efficiētes concoquit. Cæterum ulcera in auribz omnino cum glaciō ex aceto curauī, Quemadmodum etiā quæ cum fluxione aut purulentiā consistūt, per pastillos, à mitioribus auspiciat, qualis est polydæ, & post eum Andronius, & ab illo Bithynus appellatus, cui similis est meus, hoc est, ex charta usta cōstans, & uelut ego iudico, eo etiā præstantior. Minime uero semper omniū usū opus habemus, sed sufficit omnino unus, si quis ipso uti norit, aliquando quidem per saram diluto, si quidem mihi reddere pharmacum uelit, & rursus per uinū dul-

ee, deinde per acetū non acre, deinde etiam per acre, ac postremo per longe acerrimum. Quapropter quum per eiusmodi mixturam aliās aliter parabilem, huiusmodi pharmaci uehementiam exoluere possis, fortissimū tantum præparatum habere poteris. Verum mirari rite, uelut dixi, licet plerisque medicos, qui citra discrimen omnigena aurium doloris pharmaca cōscripserunt, eaq; cōmiscuerunt in unum ordinem redacta quæ uel maxime cōtrarias habent uires. Quemadmodū statim (à ueteribus enim auspicari præstat) Apollonius Herophilis sciatior, in parabilem pharmacorum descriptione, in principio quidem libri, capitulis doloris remedia scribens, primum omnium ea quæ ex ardore oborto conueniunt, locauit, deinde cōsequenter ea quæ dolori congruunt ex frigiditate. Deinde ea quæ ex ebrietate & meri potu oborto medentur, sic enim ipse appellauit. Quarto loco ea quæ plaggæ aut casui dolores capitis inducētib; adhibenda sunt subiecit. Et postremū iuxta illius præscriptum, ea quæ ad temporū & totius capitis dolores citra manifestam causam obortos conducunt. Verum in aurium dolore nullam omnino apposuit distinctionem, sed simpliciter Ad aurium dolores, titulo præscripto, deinceps pharmaca recenset, aliqua calefacientia, aliqua refrigerantia, quædam humectantia, quædam resiccantia, & iuxta secundas facultates ac qualitates, austera, acerbæ, amara, acra, acida, falsa, & ad hæc insuper alia discutientia, alia adstringentia & cogentia, ac repellentia influxiones, alia extrahentia è profundo corporis. Alia ab oburationibus liberantia, alia repurgantia & extergentia, alia sensum stupefacientia. Si quidem igitur una affectio dolorū est causa, rationabile est etiam unam esse remediorū ipsius facultatem. Si uero multæ, tantum remediorum numerum esse oportet, quātus est efficientium causarum. Quum itaq; Herophilus distinctiones in tantum, ut haud sciam si quis alijs, laudet; seq; Apollonius capitis doloris pharmaca distincte scripserit; magis utiq; miror, quod circa auris dolores ita indiscriminatim omnia tractauit. Et quintū, insuper pharmacorū genus penitus indistinctum reliquit, illud scilicet quod postremum ad capitis dolores citra manifestam causam obortos descripsit. Quamquam et huiusmodi capitis dolores necesse sit primum communibus generibus causarū dolores efficientium subiectos esse, solutioni uidelicet continuitatis, aut intemperiei, quemadmodum à nobis est demonstratum, deinde etiam his quæ has ipsas operantur. Quæ omnia à me proprio huic rei & tractationis loco sunt determinata: nunc autem eorū quæ ad aurium dolores pertinent solum mentionem faciam; quum omnium postrema uelut sæpe in methodi medendi libris dictum est, hæc tractatio existat. Etenim curandi methodos illic tradens, unum atq; alterum particulare exemplum apposui, multitudine pharmacorū quæ ex multis cōpono, in præsentem tractationem reieci. Quare medendi methodum de simplicium pharmacorum facultate libri XI. meritis præcedunt; post hos uero XIII. de medendi methodo rite consequuntur, his demum de cōpositione pharmacorū libri, quos nunc in manibus habemus succedunt.

Quæ Apollonius ad aurium dolores scripsit.

QUod uero Apollonium deliquisse dixi, in eo quod non distinxit in quælibet aurium dolore unumquodq; eorum quæ describit pharmacorū utile existat, ne falso uirum reprehendisse coarguar, ex paucis exemplis demonstrabo. Quū enim præscripsisset ut dixi, ad aurium dolorem infundenda, inter eaq; scripsisset, Anserinū aut gallinaceti adipem liquefactum sensim instilla. Rursus deinceps scribit, Fel taurinum aut caprinū cum porri succo instilla. Adeps quidem igitur horum quæ dixit animalium maxime mitigat omnes affectiones dolores inducētes, simul q; ipsarum aliquibus magnifice auxiliatur; fel uero ipsum cum porro

porro, tum ex inflammatione, tum ex acerbis & mordacibus humoribus obortos dolores auget. Solos autem iuuant ob obtusationem, aut frigiditatem indurctos, siue ob nodum intemperiem frigiditatis solidæ partes dolore uexentur, siue propiæ quod in eiusmodi affectionibus uentosi flatus, & frigidi humores generentur: excerni autem prohibeantur, propter cōtinentis corporis cōdensationem, citra inflammationem factam. Vbi enim ab huiusmodi acerbis & calidis pharmacis dolorum causæ fuerint exclusæ, curatio simul & doloris sedatio contingit. Gallinaceus itaq; & anserinus adeps si quidem euacuatum corpus inuenierint, & humorem qui inflammata affectionem excitat, non amplius influentem; duabus rationibus tum mitigandi, tum curandi profuerint. Si uero influente adhuc causa adhibeantur, affectioni quidem nihil auxiliantur, leniunt tamen doloris accessionem siue symptoma, quemadmodum etiã si ob humorum accedentem moriācitias contingat. Verum si cum porri succo nunquam in eiusmodi affectionibus quicquam commodum efficere potest. Quemadmodum neq; piper, & tamen eo etiã medicum quēdā usum scio, in mulsercula ex calidarum nature sponte aquarum usu, aurem dolente. Quum enim per omnia parabilissimum pharmacorum Apollonijs libris fidem haberet, & iam ante feliciter sæpe ex pipere remedio usus esset, etiã tunc sperauit se in auris dolore opitulaturū; uerum adeo ab ipso exacerbata est mulsercula, ut parum abesset quin seipsam strangularet. Scribit itaq; Apollonius in hunc modum: Pipet in uino seruesfactum terito, & medio cri crassitudine instillato. Scribit autem consequenter post hoc etiã hæc: Lycio & papaueris succo, pari pōdere la. te muliebri dilutis uiere. Er post hoc rursum aliud hoc scilicet: Castorij & papaueris succi par pōdus in testa Attica aut, si haberi nequeat, Romana torrefacito, et trita passo diluta instillato. Pharmacā igitur ex papaueris succo omnia sensum stupefaciunt, & ob id sanē necessario cogimur ipsis uti, ubi nullum aliud mitigatiuū opem tulit. Aduero ex pipere pharmacum alterius generis est, Quemadmodum etiã quod ex adipibus constat. Et uelut id quod deinceps scriptū est hoc modo: Galbanum susino ungento diluito, & mel ac rosaceū ammisceto, atq; lanam sordidam auriculario specillo obuolutam in eis agitādo imbuito, & tepescata instillato. Discussorium est citra molestiam hoc pharmacū, inflammationibus conducent in quas nihil amplius influit, probe etiã fegerit in his qui ex frigiditate dolore uexantur. Ceterum quæret fortassis aliquis quam ob causam, quum non solum Apollonius, sed alij etiã quidam celebres utri papaueris succum & castorium torrefacere iussuerint, quo uidelicet uehēmētia uirium ipsorū minueretur; ego ad priorem meum sermonem id apponere reliqui, nimirum supra quum auris doloris curandi rationem scribebam. Huic ego respondebo in hunc modum. Castorium quidem igitur neq; omnino terrore operæpretium existimo; neq; enim tanquam sensus stupefactiuum ad papaueris succum ammiscemus, sed ob contrariam omnino rationem, ut uidelicet uehementiam refrigerandi facultatis in eo obtundat. Quare qui papaueris quidem succum terrore iubent non simpliciter id faciunt. In castorio uero omnino absurde id præcipiunt: ipsum enim per se cōcoctoriā agere solubilem & in scirrhum induratarum affectionum uim habet. Sufficiens itaq; est etiã papaueris succi facultas, si ex eo quod eorum compositio diu ante præparata & iam inueterata sit, ipsius uires leniantur: torrefactus enim efficaciam perdit. Si uero castorio mixtus ad tempus aliquod inueterascet, manebit quidē adhuc in eo multa efficacia ipsius facultatis: malignitas uero ipsius extinguetur, ex qua etiã aliqui læduntur ut obscurius uideant per multos omnino dies, & capitis grauitatem sentiant, & neq; probe concoquant cibos; & ob hanc

sanè eius malignitatē pleriq; medici ad torrefactionem cōfugerunt. Verū quum rursus in torrefaciēdo, efficacia ipsius pessundari uideatur, id quod saepe sum expertus, melius esse existimaui intotū quidem misceri, sed post tempus aliquod, inueterata iam compositione, in usum adsumi. Hæc itaq; extra rem dicta sunt, sed quæ tamen uisita existant. Cæterum ut ad id quod propositum erat reuertamur, non parum noxæ inserūt illi qui indefinitis pharmacorum descriptionibus fidem per omnia habent. Porro multi alij iuxta eundem modum in plerisq; tum locis, tum affectionibus, indefinita pharmaca scripserunt, neq; cognouerūt quam tam uisū habeat certa distinctio ad artis constitutionem: in quibus sanè nihil miror quod omnia indiscriminatim confuderunt, quemadmodum in Apollonio Herophili sectatore mihi accidit: utpote qui norit quod iubeat Herophilus, Medicum omnino anniti debere ut sciat, quæ & qualis, & quanta sit morbi causa, & ubi maxime ea dominetur, quo uidelicet & curationem unicuique conuenientem faciat. Magis uero adhuc Archigenem quis miretur, qui & ipse non pauca indefinitè & indistinctè scripsit, quum in alijs curationibus, tum in eis præsertim quæ ad aurium dolores destinauit. Vna enim tantum in ipsis distinctio usus est: à uehementia nimirum & mediocritate doloris. Atqui & ipsius totā tibi adscribam distinctionem.

Quæ pharmaca Archigenes ad aurium dolores conscripsit.

IN priore de pharmacis secundum genus libro, Archigenes in hunc modum hæc uerba scripsit. In aurium dolore, præcedēte aliā diætā quam ad capitis dolorem ordinauimus. Si quidem moderatus fuerit, simplicita unguēta tepida instilla, uelut crocinum, aut irinum, aut rosaceum, aut nucum amararum succū, aut cassiæ unguētum, aut simplicem nardum, aut susinum, aut amygdalinum, aut rosarum, aut mali punici, aut papaueris succum cum oleo calido, aut porri semen tritum. Aut ueratrum album cum rosaceo tritum, tepidum per strigilem infunde. Aut opij parū cum lacte muliebri. Aut opij succū eliquatū cū lacte eodem modo. At uero ubi uehemens sit dolor, Alius per clysterem ualide subducatur, & sanguis à subito detrahatur, & quæcunque similia adhibeantur. Inde q; fomentum ex decocto lauri aut simili quopiam fiat, aut ex sulphure utuo in aquam insperso. Exprimantur autem uehementer spongiæ, auribusq; apponantur, facillime enim ab humore frigescunt: quapropter fomenta sicca longe commodiora eis existunt, ex sale uidelicet aut melle, aut simpliciter lana conuoluta, aut tenuibus mappis. Aut ruram seruescito, etusq; decoctum in angustis oris uasculum transfundito, lanaq; os eius obturato, & auriculæ admooueto, quo uapor inde per lanam ad aurem penetrare possit. Quidam in posca & modico oleo ruram coquunt, atq; ita liquorem in uasculum infundunt, ex eoq; fomentum parant. Post fomenta uero aurem scalpito, & balsamum cum rosaceo dilutum infundito, aut aliquod ex prædictis unguētis tepidum. Aut aliquod aliud conueniens ad auris dolorem, ex his quæ mox describentur imposito. Aut papaueris calicem tenuem farina ammixta, & in aqua mulla coctū. Aut papaueris calicem tenuem cum ordeacea farina in uino coctum, Aut fœnum græcum aqua mulla coctum. Aut semen lini eodem modo. Summe auxiliatur spongia ocularis melle coctā atq; adhuc calido imbura, & imposita. Aut ceratum ex irino, styrace ad ipsum ammixto. Egrege facit ad aurium dolorem aloe rosaceo permixta, & mellis crassitudine infusa. Aut chalcitis uino diluta. Aut perdiciij succus tepidus instillatus per se, & cum melle. Aut nitrum modica aqua diluito, ammixtoq; oleo tepidum instillato. Aut aristolochiæ radicem cum oleo. Aut ueratrum album cum rosaceo tritum tepidum per strigilem instillato. Probe facit opium

opium in testa torrefactum, similiterq; castorium, pari pondere, cum rosaceo & passo ad mellis spissitudinem redacta. In quibus deinde post fomentum, specillum lana obuolutum intingitur & imponitur. Aut succu foeniculi cum aliquo ex prædictis ungentis in principio instilla. Aut anguis fenecliam cum calicibus papaueris coquito & infundito, aut cum quopiam ex prædictis ungentis. Aut garum hispani calefactum per strigilem instillato. Facit & acopon fortidum tepidum infusum. Aut papaueris succus rosaceo, & modico crocino dilutus. Omnibus tamen præstat Hiera aromatica cum quopiam ex ungentis. Egregie facit & ueratri album tritum cum melle & rosaceo infusum, meatu per purpuram lanam oburato. Præclare facit & ueratrum cum irino ungento. Facit & cedria cum nardino ungento infusa. Seuerus autem Asellos in aquarijs uasis nascentes: Millepedas Latini uocant, cum ungentis tritos ulceratis infundebat. Quidam uero frigidam aquam dolenti auriculæ infundunt, & confestim quidem longe magis dolitant, paulo post uero perfecte à dolore liberantur. Alij melius faciunt, & in alteram non dolentem aurem frigidam infundunt quemadmodum Lucius solet. Præclare faciunt & aloë & crocinum cum ungento amygdalino infusa. Aut æs tritum cum aceto & aliquo ungento. Summe prodest Silphium cum rosaceo, si exulceratio adsit. Mirabiliter confert in excellenti aurium dolore, porri succus, & caprina urina, & rosaceum, cum modica myrrha infusa. Aut Sciuri adeps in strigili tepefactus instillatus. Aut alumen scissum & mentæ succum cum passo instilla. Aut piper album & sale, pari pondere, cum sapia, sinistra manu, ter aut septies infunde. Aut cochleam siue limacem aphricanam putridam cōpungito, & rosaceo impleto, & feruesfactum calidiùs per strigilem infundito. Quod si ex plaga, externa pars auriculæ doleat, ad micam thuris lac affundito, semelq; atque iterum diffundito, ac tertio macerari in eo finito, & agitatum infundito: statim enim dolorem sedat. Hæc quidem Archigenes ualde indistincte scripsit, possit autem quispiam mente præditus, reuocatis in memoriâ his quæ prius dixi, facile animo concipere quale tandem ex prædictis pharmacis, singulis relatis aurium doloribus cōueniat. Nimirum si memor sit facultatis eorû: de qua in simplicium pharmacorû libris mentionem feci. Verum ego iam ad auriculares compositiones ab Andromacho scriptas transibo.

Auriculares compositiones Andromachi numero XXXIII.

Quatuor & uiginti compositiones auriculares ex ordine Andromachus cōscripsit, quarum aliquibus distinctionem quandam, aliquibus nullam apposuit. Et prima quidem ex eis hoc modo scripta est. Compositio auricularis ex libris Galli qua utor. Myrrhæ drach. i. salis drach. iiii. thuris drach. iiii. spumæ niri drach. iiii. croci drach. iiii. succi papaueris drach. iiii. amygdalæ amaræ xx. galbani drach. ii. aceti boni quantum satis est. Descriptio hæc ad Menemachum refertur. Multi usus hanc compositionem auricularem Andromachus scripsit, multis simul affectionibus aurium destinatam. Verû antea à me dictum quod huiusmodi compositiones nihil magnopere corrigunt, necq; etiam error ex earum usu nobis contingit. Quæ uero uni affectioni congruunt, illam ipsam optime curant, alias uero aliquando, ultra hoc quod nihil iuuant, amplius etiam exacerbant. Secundam deinceps compositionem post prædictam scripsit hanc. Cōpositio auricularis Aesij Galli ad inflammationem, & intensos dolores. Galbani drach. viii. cinnamomi drach. ii. myrrhæ drach. viii. croci drach. iiii. thuris drach. iiii. spumæ niri drach. iiii. succi papaueris drach. iiii. aceti ut mellis accipiat spissitudinem. Oportet autem niro prius præparare ne pingue quicquam adsit, deinde pharmacum ipsum infundere. Et hic rur-

fus ab obturatione liberantia, & cōcoctoria, & laxatoria & discussoria pharmaca
 mixta sunt, quæ uehementes dolores sanare nō possunt, & ob hoc ipsi papauē
 ris succus ammixtus est. Tertiā auricularem huiusmodi conscripsit. Au
 ricularis cōpositio Laodici regis, quæ assiduè utor. Castorij drach. II. succi pa
 paueris drach. III. opopanacis drach. II. spumę lycij drach. I. passo excipe, et re
 factis utere. Hæc euidenter intensis doloribus conuenit, non tamen alijs affectio
 nibus. Ego uero quemadmodum dixi, in unaquaq; affectione proprio pharma
 co utor, semperq; papaueris succum fugio, neque nisi urgēte necessitate, ad eius
 usum peruenio. Quartā deinceps auricularem sic scripsit. Alia ad inflam
 mationem & purulentas ac ueteres affectiones. Fabæ Aegyptiæ internæ ama
 ræ, aluminis scissi, piperis albi, spumæ nitri, croci, opij, malicorij, myrrhæ, thuris,
 nardi, singulorum drach. II. castorij drach. I. aceti & mellis quantum sufficit. Alij
 mellis drach. V. coniungunt. In hac compositione, pharmaca alia discussoria, & re
 siccantia, & obturatione liberantia sunt, & quædā etiam concoctoria, uelut myr
 rha & thus existūt. Alumen autem scissile fortiter adstringens pharmacum, ad
 resiccandum purulenta ammixtum est. Adiectum est & opium doloris sedan
 digrana, oppositumq; est ei castorium uelut antea dixi. Sed in eiusmodi affectio
 nibus non solum ut oppositum, sed & ut concoctorium earum, & tanquam re
 siccantium meritò iniicitur. Quintā deinde auricularem Andromachus scri
 psit his uerbis. Alia Xenocratis quæ sæpe usus sum. Spumæ lycij drach.
 II. myrrhæ drach. I. thuris drach. I. aluminis scissi obolos III. spumæ nitri obolos
 II. trita cum aceto reponito. Vtere cum aceto. Et hæc muli usus est, non tamen
 in dolore forti conuenit, ut quæ neque opium neq; castorium habeat, neq; quip
 piam ex adipibus sedantibus dolorē, neq; galbanū. Sexta cōpositio auricularis
 cōsequenter hac uerborū serie scripta est. Alia Prytanidis cōcordat cū Har
 pali compositione. Myrrhę obolos III. nardi obolos III. croci obol. III. aris usti
 obolos V. opij obol. II. castorij obol. III. aluminis scissi drach. I. & rotūdi drach. I.
 Excipe passo ubi fluxus fuerit, quū dolor rosaceo. Vbi uero uermiculi generen
 tur, ueratri nigri drach. II. ammisceto. Probe fecit quod in fine usum eius adie
 cit, quem nos sanè dixissemus, si ipse adscribere neglexisset. Septimā similis
 præscriptæ, in hunc modum descripta est. Alia Vgæi compositioni conso
 na. Veratri nigri obol. II. myrrhæ obolū I. & dimidiū. opij obol. III. aris usti,
 obolos III. aluminis scissi obolos II. castorij obolū I. croci obolos III. cum passo
 utere. Octaua præscriptis omnino similis est. De nona uero hoc modo ipse scri
 psit. Alia quæ utor in doloris uexatione & sonitu. Nitri drach. I. myrrhæ
 drach. I. rosacę cyathū I. aceti cyath. I. simul tritis utere. Hoc pharmacū non ad
 dolorem in inflammatione cōuenit, sed ad eos dolores qui ex obturatione, & fla
 tu frigido ac uaporoso, similiterq; ex humore oboriuntur. Decimā deinde hoc
 modo scripsit. Ad aures purulentas Harpocratonis. Florū mali puncti,
 malicorij, aristolochiæ, chalcitidis, misyos cyprij, gallę, squamæ aris, singulorum
 drach. I. myrrhæ, thuris, utriusq; obolos III. atramenti sutorij assati, aluminis scis
 silis, utriusq; obol. III. cum passo pastillos formato ac unitor. Quod si etiam ipse
 pharmaci promissionem non præscripsisset, facillimū tamen erat nobis eam an
 imo assequi, memoria repetētib; ea quæ in principio præfatus sum. Est enim au
 rium purulentarū ressecatiū hoc pharmacū quod ipsum malū ex fluxione quæ
 piā ex capite delabēte cōtingit, ob quā etiā exulcerationes diuurnas accidere ui
 demus. Vnde etiam auriculare sic scripsit. Auricularis cōpositio in mulis cōso
 na. Croci drach. I. myrrhę drach. I. castorij, drach. II. aluminis scissi drach. III. thu
 ris drach. I. cū passo ad mellis crassitudinē redigito, deinde etiā sic dilutis unitor.
 Et hæc

Ethæ moderatas affectiones sanat, quemadmodum etiam ea quæ hanc sequitur. Cæterum quæ deinceps post hanc ab Andromachio adscriptæ sunt auriculares compositiones, eas citra meam expositionem adscribam, quum ipsas per se cognoscere possint, qui prædicta memoria tenent. Verum quarum ipse cum distinctione fecit descriptionem, earum nulla amplius nostra interpretatione opus habet. Deinceps igitur omnes describentur. Ne uidelicet amplius alicuius alterius auricularis compositionis, ab aliquo alio medico conscriptæ, mentionem facere opus habeam. In his enim uarietas omnium ipsarum comprehensa est. Auricularis ut Solon diætaris. Myrrhæ drach. III. aluminis scissi drach. III. castorij drach. II. thuris drach. I. croci drach. I. opij drach. I. cū cretico aut uino mulso ad mellis crassitudinem redige. Auricularis compositio Antipatri ad doloris uexationes. Croci sextantem, alij unc. I. myrrhæ unc. I. salis ammoniaci unc. I. aluminis scissi, ammoniaci thymiamatis, utriusq; uncie dimidiū, sectis ungenti irini aut Syriaci sextantē, cum uino mulso aut cretico ad mellis tenuis spissitudinem redige ac utere. Auricularis alia ualde commoda. Opopanacis drach. II. succi papaueris drach. III. spumæ lycij drach. III. castorij drach. II. aluminis scissilis obolos III. croci obolos III. myrrhæ drach. I. Vfus eius est cum lacte muliebri. Ad aures purulentas compositio Spondusæ. Fellis porci castrati partes II. mellis Attici partē I. Vase uitreo simul indita in feruido cinere usque ad dimidiū calcacito, atq; ita utitor. Auricularis Harpocratis ad affectiones & dolores. Spicæ nardij drach. VI. myrrhæ drach. VI. pipēris drach. VI. spumæ niri drach. VI. floris salis drach. VI. croci drach. XII. nuce amaras X. succi papaueris drach. X. uini ueteris quantum sufficit, stanneo uasi pharmacū infundito. Ad grauitatem auditus & sonitus. Veratri albi drach. I. castorij obolum I. spumæ niri sesquibolum. cum aceto optimo utere. Alia. Struthij drach. I. croci cilicij drach. I. castorij drach. I. ueratri albi drach. III. niri drach. I. redigito in pastillum, & usu expetente uino dilutis utere. Ad aures purulentas. Alumenustum & myrrham cum melle terito, & prælota auricula pharmacum lana exceptum imposito. Auricularis Chrysanthi Gratiani, ad inflammationes & exulcerationes. Blatras detractis pennis XII. uini ueteris & mellis utriusq; sexuncem, mali punici putamen unū, succi porri sesquicyathum. In olla noua donec mali punici putamen flaccidū fiat coquito, deinde terito, & ungenti Syriaci unc. unam adijcito, picis liquidæ sesquiumciam, ceparum III. succum expressum, & contrita simul reposito: usu uero expetente tepesacta lana excepta indito. Auricularis compositio ad inflammata & purulentā. Nardi indicæ drach. I. aluminis scissi drach. II. opij drach. III. malicorij drach. III. croci drach. III. myrrhæ drach. III. thuris drach. III. mellis attici drach. III. spumæ niri drach. III. castorij drach. II. amygdalarum amararum drach. VIII. pipēris albi grana XXX. aceti cyath. I. urinæ suis syluestris tantundem, fabæ Aegyptiæ utridis internæ amaræ drach. III. trita simul in stanneo uase reposito. Vfus tempore cum rosaceo instillato, & lanæ purpura infectæ tomentum indito. Auricularis ad desperata uelut Zoilus ophthalmicus tradidit. Seminis hyoscyami obolos III. aluminis scissi oboli dimidium, myrrhæ drach. I. castorij obolos III. succi papaueris obolos III. gallæ obolos III. croci obolos III. cinamomi obolos III. thuris obol. II. spumæ niri obol. II. sandarachæ obol. II. uini recentis cochlearia III. urinæ suis feræ masculæ cochlearia tria, sanguinis conchylij obol. III. succi mædragoræ obol. I. mellis Attici quantum sufficit. cochylis aurē obturato. Auricularis alia ad inflāmata & purulenta mirabilis. Rutæ obol. III. myrrhæ obol. III. succi hyoscyami drach. I. opij drach. I. croci drach. I. Cum lacte muliebri utere

utere & tepidum infunde. Auricularis compositio ualde bona & probata ex Apollonij libris. Myrrhæ drach. II. thuris drach. II. qucū amararū drach. I. spumæ niri drach. II. aluminis scissilis drach. I. malicorij drach. unā. spicæ nardī drach. II. aloes drach. III. uini mulsi ueteris cyath. III. Arida tria usno mulso amasce, & cocta in stanneo uase reponere, usu uero exigente tepido utere.

Compositiones auriculares ab Asclepiade in primo externorum scriptæ.

Auriculares compositiones ad dolores aurium recētes, quibus Niceranus usus est. Inter eas optima hæc est. Asellorum domesticorum, Est autem animal multipes in aquarijs uasis & sterquilinijs enascēs, quod ad digitorū contactum in orbem se contrahit, horum tres aut quatuor in oleo seruefacto, & expressum oleum auribus infundito. Facit & cucurbitæ succus cum rosaceo, aut nardino mixtus & tepesfactus. Et perdicij herbæ succus cū oleo coctus. Et centaureæ succus aqua multa dilutus. Et hyoscyami succus rosaceo mixtus. Facit & papaueris succi parum lacte muliebri dissolutum. Et serosus cruor qui a carnibus bubulis dum torrentur defuallat. Has itaq; crudas recentes prunis imponere oportet, & crudas adhuc exprimere, & expressum liquorem calidum infundere. Facit etiam nucum putrefactarum internarum liquor, aceto dilutus addito rosaceo. Facit & Aphricana limaca in propria testa, cum oleo nardino aut rosaceo seruefacta. Facit & suis quæ nō peperit fel, pari melle Attico ammixtū. Aliud, Succi papaueris, castorij, utriusque obolos II. passo diluito, & modico rosaceo adiecto tepida infundito. Aliud, Succi papaueris & succi pewcedaniæ quales partes dissolutas infundito.

Ad inflammationes cum exulceratione Charixeni.

MYrrhæ, opij, castorij, singulorum æquales partes, passo dilutas tepidas infunde. Aliud, Hyoscyami succi, succi papaueris, myrrhæ, castorij, singulorum drach. III. piperis drach. I. passi protropi quantum satis est. Ad siccas non humentes ulcerationes. Optime conuenit & in pello appositum. Oesypi drach. III. medullæ ceruinæ drach. III. butyri drach. III. adipis anserini drach. III. ceræ tyrrenicæ drach. III. terebinthinæ drach. I. olei cicini cyath. II. olei amygdalini cyath. II. olei cyprini cyath. II. pissidai cyath. I. Composito & uictor quantum sufficit oleo nardino diluto, & ad mellis crassitudinem redactio. Aliud ualde commodum & ad neruorum affectiones. Olei cyprini cyath. II. trini, rosacei, amygdalini, olei ueteris singulorum cyath. II. pissidai cyath. I. ceræ sextantem, terebinthinæ unc. I. adipis anserini unc. unam composito & uictor. Aliud ad abscessus in profundo, Antonij Musæ. Croci drachmas II. myrrhæ drach. II. bdellij drach. III. nucum amararum drach. VIII. succi marrubij, heminae dimidium. passi protropi, heminae dimidium. Liqueores coquito, & ammixtis reliquis reponito. Vtere in passo dissoluens quantum sufficit. Aliud, Croci, myrrhæ, castorij, centaureæ, singulorum drach. II. spumæ niri drach. I. amygdalarum amararum depuratorum drach. VIII. succi helxines sesquiseptarium. passi protropi sesquiseptarium. Composito ac uictor ut dictum est. Aliud,

Ad inflammationes cum fluxu, quo usus est Cleon.

Myrrhæ, aloes, thuris, succi papaueris singulorū drach. II. Misios crudi drach. I. aceto excipe, & usu expetente passo diluta infunde. Aliud Arj Tarsensis. Myrrhæ drach. III. thuris drach. III. Misios crudi drach. II. lycij indici drach. III. aceto excipe. Vfus iam indicatus est. Quod si multus fluxus oborietur sub scriptis cōpositionibus utendum est, croci, thuris, myrrhæ, opij, seminis uiticis, singulorum drachmam unam. lycij indici, florum mali punici, florum rosarum singulorum drach. II. acetū heminam unam. Viticis semen, mali punici flores, rosarum

rosarū flores, in aceto coquito, & ubi dissoluta fuerint reliquis adijcito, & excepta reponito. Vfus tēpore passo diluta infundito. Aliud ad purulentas verrēs cum dolore, quo usus est Crimon. Castorij drach. II. aluminis scissi, croci, myrrhæ, thuris singulorū drach. I. passo aut uino Myrritē excipe, ac utere ad recens malum cum uino mello, ad inueteratum cum aceto. Aliud Claudij Damonici ad purulenta & inueteratas affectiones. Croci drach. III. myrrhæ drach. I. nuces amaras depuratas numero XXX. spumæ nitrī, nardi syriacæ, aluminis scissi, singulorum drach. I. thuris obolos III. Aceto acerrimo excipitur, & per acetum diluuntur.

Ad fœtorem & nomen siue ulcus depascendo proserpens, compositio Hispanorum appellata. Garinigrī quod Romani Sociorū appellant, sexta. I. aceri scillitici sextarium I. mellis Attici sesquiseptarium. Ad compagem coquito, & in uineo uase repositis utitor. In alijs descriptionibus sic legere est. Succū cūrbitæ sextarium I. composito facit ad fœtorem cum inflammatione.

Charixeni ad corruptiones & fœtores. Aluminis Melij drach. VIII. atramenti sutorij drach. VIII. aloes drach. VIII. crocomagmatis drach. VIII. myrrhæ drach. VIII. uini myrritæ sextariū dimidium. Alumen & uinum ipsum coquito, atq; ubi in cōpagem coierint, reliqua aceto dissoluta inijcito, & repositis utitor.

Ad carniū incrementum, quo usus est Heraclides Tarentinus. Aeruginis rase drach. VIII. squamæ aris drach. VIII. In alio exemplari drach. III. mellis hemina dimidium. Arida trita ac melle excepta donec rubescant coquito, & ablatis utitor. Aliud. Aeruginis drach. III. atramenti sutorij drach. III. myrrhæ drach. III. succi marrubij cyath. III. mellis quantum sufficit, præpara ut dictum est. Chalcedonia ad inueteratas affectiones.

Veratri albi drach. III. croci drach. III. myrrhæ drach. III. castorij drach. III. thuris drach. III. opij drach. III. atramenti sutorij drach. XV. I. piperis drach. II. myrrham, opium, thus, castorium, in aceto cui malicorū incoctum est, usq; ad dissolutionem macerato, deinde ueratrū, crocū, piper, atramentum sutorium, conuulsa inijcito, atq; omnia simul diligenter terito: quod ubi probe factum fuerit, uinum multū quantum satis est affundito, ut ad dilutū mellis crassitudinem redigatur. Vsu uero expetite tepefacta infundito. Ex huius pharmaci usu sæpe egregie mihi successit, uerū tēporis progressu omphacij drach. I. ad hanc descriptionē adieci.

Aegyptia ad easdem affectiones etiam si sint connata. Amygdalarum amararum depuratarum drach. II. fabarum ægyptiarū interioris partis amara, piperis albi, croci, myrrhæ, opij, singulorum drachmas II. thuris drach. II. omphacij drach. III. aluminis scissi drach. III. castorij drach. II. atramenti sutorij drach. III. spumæ nitrī drach. II. Aceto in quo malicorū incoctum est excepta, ad limi crassitudinem redigito. Vfus uero tempore quantum suffecerit ex pharmaco acceptum, ac nardino ungento dissolutum infundito. Ad sanguinis ex auribus eruptiones. Heraclidæ Tarentini, facit ut ne in grumos coeat. Marrubij succum coquito & ammixto aceto infundito. Aut mali punici in aceto cocti succum exprimito & infundito. Aut polygoni succum cum modico aceto. Aut acaciā, aut amurcam, aut lyciū cum aceto. Aliud Botryos sistit sanguinis eruptiones. Succum rubi, & succum gallarum in aceto coctarum, simul mixtos infundito.

Quæ pharmaca Archigenes post prius scripta subiecerit. **P**harmaca ad aurium dolores ab Archigene scripta supra relata sunt. Nunc uero etiam ea quæ ad alias affectiones cōscripsit apponam. Humentibus uero polygoni succum cum pari rosarum succo infundito. Aut crocū & myrrham

rhā cum passo & rosaceo tepescācta infundito. Purulentis autem prodest quidē polygonum cum rosaceo infusum, Verū egregie cōuenit eis uinum, in quo conizā tenuia folia habentis folia sint incocta, instillatum. Quidam etiā thus ad uinum ammiscēt. Aut lycium rosaceo dilutū instillato. Aut marrubij syluestris semen cum aceto & rosaceo eodem modo. Aut cumini & croci æquale pondus cum uino austero. Aut croci & myrrhæ utriusq; drach. ii. nuces amaras decorticas numero ꝥ ꝥ ꝥ v. nuces tritas cum mellis hemina dimidia, & porri succi hemina dimidia commisceto, & reliqua item probe trita iisdem liquoribus diluito, ac simul deinde contrita instillato.

De auribus exulceratis.

Cæterū exulceratis auribus & cruētis ac dolentibus, galbanum & opium cum passo & rosaceo, mellis crassitudine instilla, aut pro galbano peucedanī succum ammiscē, & magis succedet. Aut spodium assatum cum rosaceo tritum infundito. Aut lyciū cum lacte muliebri. Magnifice opitulatur etiā ipsū mel per se tepidum infusum, præsertim si foetores simul adsint. Quidam asellos Millepedas appellatos, qui in aquarijs uasis reperiūtur, cum ungento quopiam, instillant, & eximie opem sentiūt. Aut blattas domesticas cū rosaceo instillato. Probe facit ad omnem auris affectionē, adeps uulpinus inueteratus liquatus & instillatus. Aut sphondylii interiorē uelut medullam cum melle & rosaceo infunde. Aut elota & conscalpta auricula porri aut marrubij succum cum melle infunde. Aut lxiuium figularium cum melle seruēfactū. Aut thus cum aceto in mali punici putamine seruēfactum infunde. Aut gallam tritam linteolo illigatam in uino coquito, & ex hoc instillato, statim à dolore liberat.

De uermibus aurium.

Porro in quibus uermes sunt, ueratrū album cum melle immitte, aut arīdum insuffla, aut rubi succū infunde. Quod si uero auriculæ os corrosū sit, fissura retro aurem impacta, ipsū scalpito, deinde urito, ac citra molestiam cicatricem inducito.

De sonitu in auribus.

Sonus audiendi subtilitatem fiunt, quemadmodum in oculis imaginariæ suffusiones, propter uapores ex ore uentris exhalantes. Cæterum neutrius affectio nis certa cognitio in principio haberi potest. Nō cōuenit tamen citra artem, aut cognitionem, aut curationem auspicari. Dictū enim iam sæpe est atq; etiā demonstratum, nō unum coniecturalis spei genus esse: atq; artificialem quandam coniecturam ex causis forissecus lacessentibus, procatacicis à Græcis appellatis, facere licet, si quis ipsarū uires norit, quā alia affectio ex frigidityte, alia ex ardore fiat. Quemadmodum etiā ex prægressā plaga, aut tali uel talimorbo: uelut & ex cruditate, aut largo uisipotu, aut uiolento & multo uisumtali quando & ob pharmacorū auricularium usum, sonitus quidam fiunt. Quin & si uel paulatim congregetur, uel coaceruatim irruat sonitus, id ipsū quoq; ad inuentionē affectionis conducit. Insuperq; si per interualla repetat, uel continenter hoc symptomā perseueret. Verum certa cognitio tempore contingit, post usum pharmacorum artificiali coniectura exhibitorum. Si quidem igitur in febribus sonitus fiant, minime inturbandi sunt: ut plurimum enim statim sedantur. Si uero ob flatū uentosum, cui transitus interclusus sit, sonitus fieri suspicatus quispiā fuerit, & ob hanc rem dissēcātib; & attenuatorijs ac discussorijs pharmacis admotis, nihil profecerit, simulq; apophlegmatismis usus sit, & toto capiti prospexerit: huic merito in hanc suspensionem inclinatus animus erit, sensus audiendi uide licet

licet subtilitate sonitus causam esse, præsertim, si acuto audiendi sensu æger præditus appareat. In eiusmodi itaq; quendam, qui prædictis pharmacis usus erat, neq; quicquam opis senserat, quum ego forte incidissem, ex stupefactionibus sensum quippam ammisit, uelut est mandragoræ succus, & papaueris succus, ex eisd; à sonitus symptomate liber euasit. Quæ igitur à prioribus medicis ad huiusmodi symptomata & accessoria mala cõscriptæ sunt auriculares compositiones ex discussorijs & incidentibus pharmacis constant. Suprà itaq; in Catalogo & enumeratione cõpositionum auricularium ab Andromacho descriptarũ, ex eiusmodi materia composita quædam recensebantur, quas ipse ad sonitus cõuenire scripsit. Nunc uero eas quas Archigenes ad hanc rem cõscripsit recensibo.

Compositiones ab Archigene ad sonitus cõscriptæ.

IN sonitibus repentinis acetum cum rosaceo instilla. Aut cuminũ & oleum crassitudine mellis. Aut radicis cucumeris syluestris succum. Aut ipsam radicem oleo incoctam. Si uero ad multum tempus perseuerent, omnibus amaris & acris, attenuatorijsq; & discussorijs, quæ ad dolorem ex crassis humoribus abortũ descripta sunt, utaris, singulis in aceto coctis & admixto melle. Aut reclinato ægro, & nitro crudo trito in aurem insperfo, ac acetũ tepidum infunde, ac postquam feruere desierit, lana scalpẽdo exterge, & nucum amaranũ succum infunde, & lana obtura. Aut nitrũ & myrrham probe unita, cum rosaceo & aceto, ac atramẽto scriptorio crasso instilla, aut penna in eis immerfa bis in die inde. Aut castorio ac nardino pari mensura cum aceto & rosaceo utere. Aut aceto ac nitro melleq; mixtis collue. Cæterum quibus ob multam sensus subtilitatem sonitus oboritur, castorium & cicutæ semen cum aceto trita instilla. Ex morbo uero abortis sonitibus, ubi fomentum ex decoctione absynthij adhibueris, acetum & rosacẽ instilla. Aut raphani succũ cum rosaceo, aut aloen optimam cum uino mulso dilutam. Si uero perdurẽt, ueratrum nigrum aceto decoctum adhibe. Huiusmodi quidem Archigenes ad sonitus aurũ cõscripsit; uerum Apollonius in primo parabiliũ subscripta habet.

Quæ Apollonius ad sonitus & surculos sibilosq; ac inflationes aurium cõscripsit.

ACetum acre tepidum instilla. Mel Atticum calidũ instilla. Laurinũ oleum eodem modo. Porri succum cum lacte muliebri aut rosaceo infunde. Cuius cucumeris syluestris foliorum aut fructus succum per linteolum instilla. Cucurbitæ syluestris medullam oleo dilutam infunde. Cuminum tritum cum medulla uittulina instilla. Cucumeris syluestris medullam oleo dilutam infunde. Glandem ungentariam terito, & adipe anserino ac resina pari mensura ammixtis instillato. Semen lini tritum & ungento Arabico dilutum instilla. Misy terito & ungento rosaceo dilutum instillato. Rutam & cuminum pari mensura trita & aceto diluta, ammixto melle infunde. Hyssopum tritam & cedrino oleo dilutam instilla. Amygdalarũ amaranum oleum melle mixtum eodem modo. Quod si efficacius reddere uelis hoc cum priore committito. Viticem & stellionis caput pari pondere trita ammixto oleo instilla. Nitrum & resinam & adspem anserinũ, æquis partibus cum oleo ammixto dissoluta instilla. Cepas & allium & adipem anserinum pari mensura trita & excolata infunde. Et aqua collutis prius calida, nitrum tritum infusilla.

Ad aures exulceratas & purulentas eiusdem.

Primum quidem collutiones Apollonius scripsit. Secundum deinde locum infusilla habent. Tertium resicatoria, & quartum quæ insufflantur, iuxta subscriptam ipsius dictionẽ. Aqua calida assidue collue, Lenticulæ decocto co-

dem modo. Aqua mufa calida fimiliter. Hederae cremore aut decoctio cum uino utitur. Malicorij cremore aut decoctio fimiliter cum uino. Gallae plenae decoctio cum uino. Myrto in uino decocta elue. Vrina cum modico alumine trito utere. Stoebeae femine in uino coctio elue. Vrina et uino mixtis ac calfactis elue. Infusilia: picis serum infunde. Oleae folia exsuccato, & ammixto melle coquito ac utitor. Papaueris succum passo dilutum infilla. Cepartu succo cum melle utere. Rutae fyluestris succum, cum uino & oleo rosaceo in mali punici putamine calfactis infilla. Cardamomi tritum cum melle infilla. Peucedani succum rosaceo dilutum infilla. Aloen & crocomagma diluta infilla. Absinthio cum melle trito utere. Myrrham & resinam a canserinum adipem cum oleo trita infunde. Pinguitudinem caseo in figulinum uas recens coactio superstantem tepescant infillato. Diphryges tritum cum melle infillato. Alumē scissum tritum cum passo & aceto, ad mellis crassitudinem coquito, ac utitor. Resicatoria. Cedriam melle mixtam infilla. Piperis albi grana tria ungento Aegypto diluta, & in parua concha trita infilla. Crocum & cerusam pari mensura trita, & rosaceo diluta infunde. Melanthii & sulfur pari pondere terito & rosaceo diluito, & ungento irino, adipeq; anserino pari mensura additis rursus terito ac utitor. Myrrham & sulfur aequis partibus, trita & oleo mixta infillato. Myrrham & putamen mali punici dulcis, aequis partibus, trita ac melle diluta infundito. Animalcula ex arboribus, ueluti rubri uermes, trita & oleo diluta infilla. Animalculum quod Intestinum terrae appellatur, coctum & excolatum infilla. Resinam & mel ac oleum pari mensura mixta ac dissoluta infilla. Malum punici dulce accipito, & excoctio eius umbilico acinos ejicito, deinde passi cyathum unum infundito, & atramenti sutorij triti obolos duos infarcito, & ad mediocrem crassitudinem coquendo redigito, ac tepido utitor. Quae insufflantur. Gallam tritam infilla. Piper rotundum cum uino contritum insperge. Eodem etiam magis diluto pro infusili utendum est. Omphacii & gallam torrefactam aequis partibus trita infilla. Utendum etiam deambulationibus, & uentris euacuationibus, & ciborum subtractione, & purgatione aurium diligentiore. Ad aures humectas. Caeterum ad aures humore madidas, ita enim Apollonius appellat, subscripta pharmaca commoda existunt. Misy linteolo illigatum urito, & cum ipso tritum infusilato. Galla uista ac trita similiter utitor. Spodio trito eodem modo. Alumen in testa torrefactum & affuso oleo tritum infusillato. Caeterum eadem diligentia circa dietam utitor.

Ad auditus grauitatem.

Porro in subfurdis, siue grauitate & difficulter audientibus, aut etiam surditatibus appellatis, utpote qui exiguas uoces penitus non audiunt, magnas aut uix percipiunt, hoc ipsum symptoma ualde suspectum habere oportet: paulatim enim augescens temporis progressu perfectam surditatem inducit. Quapropter per hieram purgandi sunt, et per catapotia ex colocynthide, pituitaq; eis per apophlegmatismos detrahenda, ac caput resiccandum est, omniq; modo curandum ut robur ei addatur, quemadmodum iam saepe est demonstratum. Utendum etiam attenuatoria dieta. Atq; in ipsam auriculam pharmaca conspicienda sunt, quae crassos & uiscosos humores findunt ac diducunt. Quorum sylua eiusmodi est.

Quae Apollonius in primo parabilem ad auditus grauitatem pharmaca conscripsit, in haec uerba.

Ad auditus grauitatem repentinam, & ex dolore capitis obortam, Absinthii cum aqua decoquito, & per stipulam fomentum inde facto, quo modo alias per arundinem id fieri demonstrauimus. Bacis lauri aut folijs eiusdem in aqua decoctis

decoctis similiter utitor. Similiter etiā origāno, atq; item hyssopo. Aqua quoq; marina & aceto eodem modo. Eisdem autem & in olla coctis utendum est, for-
mētum uero per ollam quomodo fiat iam demonstratū est. Aceto albo & aqua
pari mensura cum nitro trito seruefactis, ad plures dies eluito, atq; inde aqua sim-
pliciter calida eluito, & sic ea quæ ad hanc rem descripta sunt infundito. Marru-
bii succum & irinum unguentum mixta instillato. Fel tauri & capræ ac ungen-
tum rosaceum mixta instillato. Ceparum succo & resina oleo dilutis æqualiter
utitor. Oleo nucum & resina mixtis pariter utitor. Alumen aceto dilutum in-
stillato. Myrrham & alumen pari pondere trita & aceto diluta infundito. Ad-
ipem anserinū & fel bouis, ac laurinū pari mensura mixta instillato. Hederæ syl-
uestris baccarum succum per linteolum expressum instillato. Veratrū nigrum
aceto tritum, mellis multum cocto exceptū, in parua collyria ad formam glan-
dis redigito, eaq; meatui indito, ac per dies quinque finito. Senecam angustū ace-
to tritum instillato. Eadem & cum felle bubulo, aut caprino, aut testudinis mari-
næ, aut callionymi diluta utitor. Nasturcij quantum sufficit, & niri parum, cap-
ne fic reiectis granis excipito, indeq; collyrum auditorio meatui congruū for-
mato ac infundito. Per triduum autem ipsum eximito. Hoc multas sordes educit,
& confestim leuisus malum reddit. Cæterū reliqui corporis quoq; cura habenda
est. Deambulationibus itaq; pro utribus multis utendum est, & capitis reli-
quorumq; membrorum frictione. Insuper & apoplegmatismis & collutioni-
bus quæ pituitam extrahere possunt. Cibis utendum est copia moderatis, & ex
genere eorum quæ facile exoluantur & facile concocta excernuntur. Plurimum
autem auxiliatur in huiusmodi affectione constitutis, spongia tenuissime contri-
ta & auriculæ indita. Idem remedium commodum est & ad carnem in audito-
rio meatu enascentem. Post hæc uero inquit, utendū esse ollæ fomento iam an-
te à se indicato. Indicauit autem hoc ipse inter reliqua auditus præsidia, uetum
ego ipsum uelut à me condemnatum reliqui, propterea quod ad elotionem qui-
dem præstet in aurium dolore, utilitatem autem de se omnino nullam præbeat.
Quapropter nūc ipsum apponam: uerisimile est enim surdastros inde iuuari, ut
potest qui contrarijs præsidijs opus habeant his qui aurium doloribus uexantur.
In doloribus enim affectæ partes exquisita quiete opus habent. Surdastri uero
uehementi motu, & ferè dixerim trāsmutatione in contrariam ei quæ iam adest
affectionem indigent.

Fomenta ad aurium dolorem ab Apollonio his uerbis conscripta.

Fomentis porro utendum est per spongas aqua calida imbutas ac sufficien-
ter expressas. Itemq; per cucurbitas affixas. Amplius uero & per uaporem
ex arundinibus perforatis allatum. Oportet autem alterum arundinis extremum
concauitati auriculæ congruens esse, alterum uero in ollam perforatum opercu-
lum habentem, & undiq; obturatam incumbere. Sit autem in olla absinthium in
aqua seruefactum, quo uapor inde sublarus ad auditorium meatum perferatur.
Similiter & per fermentum in ueru assatum fomentum adhibendum est. Vhe-
menter etiā subscriptus fomenti modus cōuenit. Urinam tauri maxime, aut
certe bouis uetustissimā, in ollam nouam angustis oris infundito, & a ceti tertiam
urinae partē, ac myrrū contusam ammisceto, deinde testas pro olla magnitudine
fatis multas, igni candefactas in ollam cōjicio, posteaq; hominem inclinātū ap-
posita ad ollam aure, fomentum admittere iubeto. Circum aurem uero fascicu-
lum ex lana in orbem circumponito, ne uidelicet circumsitæ partes exurantur.
Utendum & farina ordeacea ac triticea in uino cocta, itemq; unguento irino cal-
do, gratia fomenti. Superne uero auriculæ imponendæ sunt lanæ molles ac puræ

uino & oleo imbuta, ordea cea itidē & triticea farina, aliquando quidē per se cocta, cum uino & ungento irino, aliquando uero columbino stercore, & aristolochia tenui, æquis partibus ammixtis. Consert autem & cibi abstinētia, & diætā tenuis, & alui euacuatio larga & memorabilis. Insuper & quies, ocium, capitis uelamen, In potu aqua calida, aqua mulsæ, pisanæ succus cum melle, donec remiserint dolores.

Quæ Archigenēs ad auditus grauitatem, ac surditatem his uerbis conscripsit.

IN auditus grauitate succū corticis raphani cum rosaceo aut cyprino tepescitum instilla. Aut galbanum cum aceto & melle seruefactum. Quod si surditas succedat, Veratrū nigrum erui magnitudine in cocto melle indito, ac donec quod impedit erodat finito. Aut ubi absinthij decocto elueris, mel & oleum instillato. Aut collyrio ex nitro, ficu, & sinapi immisso, per tridū id non extrahimus. Postea uero acutis uocibus assidue & uicissim grauibz inclamamus, & per tubam sonitu immisso malum depellere conamur. Post hæc & asphodeli radicis oleo ueteri incoctas utiliter infundimus, caprinæq; urina assidue eluimus. Cæterum surditate ex capitis dolore oborta, raphani succū cum rosaceo infudi. Aut foliorū cucumeris syluestris succū. Aut castoriū cum baccis lauri & aceto.

Eiusdem de corpusculis quæ auribus illabuntur.

QUOD si aqua in aurem illa batur, Auxiliatur acetū, & cum altero pede affectæ auriculæ propinquo exilire, aliquantulum seipsum reclinando. hoc enim modo facile excernitur. Quin & exuctio simplex per os, aut etiā per stipulam, egregie aquam extrahit: quod ubi factum fuerit, conscalpra per lanam auriculæ, ex prædictis ungentis aliquod instilla. Si uero calculus, aut faba, aut consimile quippiam, in auditorium meatum illapsum fuerit, eluito, aut lana circa auriculæ rium specillum obuoluta, & resina tincta extrahito. Idem & per glutinosum aliquid pharmacum fieri potest. Quod si neq; sic sequatur, sternutatorio in nares iniecto, os ac nares obturato: facta enim spiritus, sternutatorio, id quod incidit effluat: idq; assidue donec excidat facito. Si enim intrus mæserit, aure inflata cōuulsiones inducet. Optime etiam consert ad eorum quæ illapsa sunt eiectionem, concussio. Si itaq; puer fuerit, pede comprehensum & in caput eleuatū, cum concussione vibrabis, Si uero perfectæ ætatis quispiam ita fuerit affectus, ipsum in tabulam secundum affectam aurem reclinatum, caput ad tabulam firmare iubeto, deinde leuata tabulæ circa caput parte, deferri finito, idq; sæpe repetito. Mouebitur enim quod incidit, & ad expeditiores meatus partes progrediatur, atq; ita angusta & cōcaua specilli parte immissa scite extrahito. Si uero faba aut consimile quippiam in aurem illapsum, in ea maneat, madefactūq; & tumefactum, dolores inducat, impossibile quidem est ipsum integrum eximere. Quare per specilli concauum industriè partiri ac diuidere id ipsum oportet, atq; ita particularim extrahere, deinde sapam aut uinum dulce calidum infundere, ac lenire meatum ex lincinatione offensum. At uero si animal aliquod illapsum sit, scammoniam aceto dilutam, aut absinthij succū, aut peucedani succū, nitrumq; ac sulphur cum raphani succo instillato.

Apollonij de iisdem.

APOLLONIUS autem de iisdem sic scripsit. Ad pulices & uermiculos in auribus, reliquaq; earū poro illapsa, acetum & oleum instilla. Aut capparis succum instilla. Aut amygdalas amaras terito, & oleosum ab ipsis expressum instillato. Veratrum album tritum inspergito. Aut Aristolochiam tritam inspergito. Aut calaminthæ succū infundito. Aut cinnabarim uiridē instillato.

Aut

Aut ueratrum album cum uino infundito. Aut aluminis & seminis cucurbitæ syluestris. siue medullæ eius, æquas partes tritas cum oleo cedrino instilla. Aut cepam tritam & cespiti æquis partibus in uino diluito ac infundito. Aut myrrham tritam, acetoq; ac melle pariter dilutam adhibe. Aut chalcitidem crudam tritam ac melle dilutam infunde. In uniuersum uero eximendum est quicquid in meatum incidit hoc modo. Per auris calpium nimirum aut uolsellam, aut lanam mollem specillo obuolutam & resinatâ, aut etiam quæ uncinum habeat reuem appensum. Nitrum etiam affatû tritum auriculæ inspergito, & acetum instillato, ac lana apposita per noctem finito. Sequenti uero die aqua & oleo calido eluito. Cæterum ad aquam in aurem acceptam, cepæ succum & adipem asferinum tepescitum instilla. Aut mali punici nucleo carentis dulcis & acidi, succum in æreo uase donec duæ partes supersint coquito, indeq; duas guttas instillato. Aut myrrham ex aceto & melle tritam infundito.

Auricularia pharmaca à Critone conscripta his uerbis.

AD sonitus aurium à morbis. Absinthii in aqua decoctum pro fomento adhibe, & rosaceû cum melle instilla. Aut raphani corticis succû cum rosaceo instilla. Aut aloen cum uino & melle. Aut thus cum aceto & rosaceo in malicoriso ad mellis spissitudinem coquendo redactum. Aut hyoscyami succum cum rosaceo repidum. Aut radicû calami uiridis succum cum lacte. Aut rhæmini succum cum celtica nardo. Aut gallam nigram cum pari myrrha ex melle. Aut lycium cum uino mulso instilla. Aut uulpis adipem. Ad dolores aurium cum humiditate & purulentiâ. Vini ueteris sesquiunciam, mellis corsici unciam. Nitri rubri uncie dimidium. Lycij indicij unc. Lycium cum uino & nitro tritû leuigatû, ac mel ammisceto, & in uitreo uase reposita infundito, hyeme quidam his in die, æstate uero sæpius, & tomentum lanæ conchylio infectæ indito. Ad aures purulentas. Alumen scissile teritû, & affuso aceto ad liquidiores frimento compagem redactû lana cõuoluta excipito, & resiccata lana, ex ipsa in aurem indito, aut hoc ipsum pharmacû liquidum per lanam specillo obuolutam in aurem demittito, eamq; ex eo quotidie illinito. Expediit & modicû passum adfundere ne pharmacum exareseat.

Archigenes ad aurium affectiones extra meatum.

CAeterum ad affectiones aurium extra meatum auditoriû Archigenes hæc conscripsit. Ad aures contusas, myrrham, thus, terram nigram, qua aliqui se tanquam in tegmine confricant: cum acri aceto probe unita cerati crassitudine imponito, & nequaquam amplius irritato. Aut cerusam & apij semen pariter accepta cum melle obline. Quidam absinthii pro cerusa scribunt. Aut sulphur uiuum, myrrham, & thus cum pice liquida in splenio imponito. Aut glutinum fabrilis & asphaltum siue bitumen eodem modo. Quidâ etiam mannam, hoc est, thuris micæ ammiscunt. Aut cephalico Asclepiadeo emplastro utere. Aut pastillis pudendis destinatis illine. Porro in quibus contusæ sunt aures, intrinsecam expeditiorem concavitatem cartilagineam, sigulinâ terra expleto: & sequenti die ubi exaruerit, solanum cum cerusa illinito, usquequo in in integrum restituantur. Verum in aurium uulneribus & fissuris, cartilagine probe coapta fibulas imponito, deinde inflammationem arcetibus & reliquo glutinatorio ductu uititor. At uero inflammata in aurium puerorum pulsus foramina oleum, quod in area lucerna æruginè contraxerit, illinendo persanabis. Cæterû Asclepiades huiuscemodi ad contusas & fractas aures compositione usus est. Aloes partem unam, glutinis fabrilis cum aceto cocti partem unam, mixta imponito. Aliqui mannam siue micæ thuris ammiscunt.

Epithemata ad contusas aures. Coryledonis herbe drach. viii. amygdalarum, amararum depuratarum drach. ii. tragacanthi drach. ii. aceto dilue & uisco quercino excepta, & linteolo infarta, impone. Aut ceræ drach. viii. galbani drach. viii. nucum amararum drach. viii. uisci quercini drach. xvi. thuris drach. viii. misyos affati drach. viii. composito ac unito. Apollonius autem hoc modum aurium inflammationes in superficie cutis ex humorum impressione aut plaga obortas, tum tumores ac rubores curauit. Butyrū recens excolatū instilla. Aut adipem anserinū & lac muliebre mixta instilla. Aut glandis ungētariæ succum & resinam liquidam tepidam affunde. Aut adipem bubulum ac anserinū, aequis partibus liquefactos instilla. Aliud quod illini potest. Papaueris succū aqua dilutū, penna illinito. Aut crocum tritum & muliebris lacte dilutum illinito. Aut argenti spumam cum aqua & nardo tenui tritam illinito. Aut cerusam coriandri aut polygoni aut solani succo dilutā illine. Cataplasmata. Absinthii tritum ex aqua pro cataplasmate impone. Aut sesamū aqua tritum impone. Lentem aqua tritam cum melle impone. Aut mali punici dulcis putamina cocta & trita in uino hoc ualde cōmodum pharmacū existit. Aut myrrhā & adipem anserinū, uel butyrum, uel resinam, & cōchylij partem internā aequis partibus trita super aurem & propinqua tempora impone. Conuenit autem ad hæc ciborum abstinētia, alui euacuatio, in super quies, & capitis ac reliqui item corporis uelamen. Longe uero remota esse debent, ardor, frigiditas, balneum, uomitus, clamor, & omnis distēdo.

Ad exulceratas ex plaga & fractas aures.

Panem calidum internum cum melle tritum impone. Myrrham cum uino ueteri tritam illine. Cochlearum colla unā cum testis terito, & dimidiam myrrhæ partē addito ac imposito. Absinthij & apij seminis aequales partes tritas cum melle imposito. Picem circumline & sulphur tritum aut thuris micæ insperge. Verum ne obliges ista, neq; frequenter repetito epithematū detractioes.

De Parotidibus.

Cap. II

Parotides è genere quidem sunt inflammationū, fiunt autem glandulis circa aures affectis: nō tamen prima parte curationis partiū inflammationarum in eis utimur. in illis enim ut plurimum curatione reprimēte ac repulsoria à medicis appellata uti cōuenit, atq; id maxime quum neq; malignum sit, neq; multum quod influit, neq; corpus humoribus ex æquo redundet. Sic namq; spongia sola ex posca imposita incipiētes inflammationes repressit, neq; quicquā ex eo totum corpus fuit offensum: Verū in parotidibus ipsum contrariū facimus, pharmaca attractoria adhibentes, atq; si hæc nihil memorabile efficiant, etiam cucurbitam affigentes, a ut fomenta assidua adhibentes. Annitimur enim ut affligens humor ex profundo ad cutem adtrahatur, præsertim si in capite affectio sit firmata, humoribus uidelicet in ipso obfirmatis. Quin & quā circa capitis affectionem, in febribus acutis natura superfluos humores ex uasis effundēs, ad regionem inter cutem & subiecta corpora deponit, quando sanē & glandulæ ex effusis humoribus participant: melius utiq; etiam tunc uidetur naturam adiuuare, per humorum ex loco in locum impetuofum il lapsum, febres curātem. At uero quum uehementi impetu fluxus illabatur, nihil nos curiosius agentes, omnia naturæ permittimus. Si enim siue cucurbitam, siue aliud pharmacū humores ex alto ad cutem adtrahens admouerimus, uehemens dolor hominē apprehendit, unde & uigiliæ & febres inducuntur, ac uires exoluantur. Mitigare itaq; tunc & non humorum influxui opitulari cōuenit, per cataplasmatū maxime lenientium usum, uelut est quod ex frumēti, aut hordei, aut

seminis

feminis lini farina, cum aqua mulla, aut foeni græci, aut althææ, aut chamæmelo-
rum decoctio coquitur, & quæcunq; ad hoc quod moderate humectâ habent ca-
liditatem, per quâ mitigare dolores ualent, etiam influentes humores concoque-
re possunt ac suppurare, quemadmodum de his in cataplasmatum tractatu ser-
monem fecimus. Quod si etiam sanguis redundare uideatur, per uenæ sectio-
nem ipsum euacuabimus, præsertim si id uires permittant. Nunc uero ad phar-
macorum compositionem progredientes, quam etiam à principio nos tractaui-
ros recepimus, qua ratione tum cõpositio ipsorû, tum usus constet docebimus.
Si itaq; tumor non discutiarur, suppurantibus pharmacis utendum est, uelut est
frumenti farina cum caricarû decoctio & oleo. Item quod ex polline, & quod ex
fermento constat pharmaci. Si uero suppurata fuerint parotides, tunc aut per
sectionem pus elicere oportet, ulcusq; uelut in eiusmodi fieri moris est ac omni-
bus notû curare, aut sane per pharmaci abscessum rumpere, Quale est Smilium
appellatum, & quod ex alijs cõstit; aut tentare ut ipsum per medicamenta attra-
ctoria & tenuium partû uim habentia discutiamus, his per diem q̃sdem ablatris,
& fomētis admoris donec remiserint & laxati fuerint dolores. Quâdo uero iam
plurimû puris fuerit discussum, tunc iam primû semel soluere ea medicamenta,
& fomenta adhibere oportet: deinde uero neq; ex re est id facere, sed ipsis phar-
macis permittere, ut si quid reliquum in profundo hæreat, id ipsum discutiant.
Quod si duricies adsit, ea ipsa quoq; mollienda est, quare hoc tempore ex mixta
pharmacorû facultate compositio parabitur, emollientibus uidelicet ad attractio-
ria amixtis. Postquam uero omnis purulentia fuerit euacuata, & adhuc duri-
cies aliqua relinquatur, emollientibus pharmacis utendum est, quorû syluæ siue
materiæ itemq; compositionis uarietatem, in malagmatum sermone demonstra-
ui. Manifestum autem est, quod moderatas parotidas, in quibus neque humo-
rum multitudo redundans in particulas, irruit, in tantum ut uehementes dolo-
res excitet, neque caliditas cum humore adest, facile per hæc sanare possimus.
Neque enim ad suppuratorem festinant, neque uehementem dolorem indu-
cunt. Verum licet etiam fomētis ex muria uitæ, & cataplasmata magis calefacien-
tiaq; & discutientia adhibere, & medicamenta eandem facultatem prope atin-
gentia. Quum uero pleriq; medici & parotidû pharmaca indistincte conscripse-
rint, Si quis prædictis in memoriam reuocatis ad eorum usum accesserit, facile
intelliget quibus tandem ad singulas parotidas utendum sit. Verum præexerci-
tabo etiam ego uos ad hanc rem per exempla, quæ Archigenes in primo phar-
macorum secundum genus his uerbis scripsit.

Archigenis ad parotidas. Parotidas dissoluere uolentes, plantaginem cum sa-
le tritam assidue pro cataplasmate imponimus. Aut caprinum stercus ex aceto,
Aut rumicis syluestris radices coctas in uino, aut sicum tritam cum atramento
sutorio. Aut ficum coctam, cum absinthio & uino tritis. Aut buccina marina,
aut purpuras uistas, melle aut axungia exceptas imponito, & confestim discui-
tuentur. Idem etiam ostreorum testa usta & cum melle imposita facit. Aut ce-
ratum rosaceum siue cyprinum, ruta ammissa, aut sulphure uiuo addito, emolli-
tum, aut cimolia cum aceto. Discutit maxime ficus aqua marina aut muria co-
cta, ac trita imposita. Idem facit & marrubium tritum cum sale, & lana buty-
ro imbuta ac imposita, inchoantibus parotidibus opitulatur. Quemadmo-
dum huic postremo loco ab eo relato, recte Archigenes discrimen apposuit, in-
cipientes parotidas è butyro opem sentire testatus: Sic cõueniebat ipsum etiam
circa alia medicamēta utendi rēpus adijcere, uelut ego paulo ante feci. Quin &
circa hoc (ipsum butyrû, non satis est ex solo parotidû principio facere discrimen

nisi apponatur num uehementer aut molliter concitentur, & num dolenter uelut cum pulsationibus & uigilijs infestet, an cum moderato dolore. Deinde qui sit morbi status, Num magna omnino laxitate opus habeat, an per minorem iudicari ac finiri possit: tali namq; suffecerit butyrum, in corporibus præsertim mollioribus cunuchorum, puerorum, & mulierum, & eorum qui teneram habent carnem. Si uero cum uehementi dolore fiat, cataplasmate dolorem sedante opus habet, simulq; assiduo fomento uel per solam aquam, uel etiam modico iniecto ad eam sale. Quandoquidem uero primum omnium pharmacum cōscripsit, plantaginem cum sale, ab illo sanè etiam nos rursus initium faciemus, plantaginis naturam recordantes ex mixtis facultatibus discussoriaque & repulsoria compositam esse. Ego uero nūquam pharmacis ad parotidas destinatis repulsoria ammisceri operapretium existimo, præterquam si aliquando, raro tamen, ad multam discussoriorum copiam parum quiddam ex eis addatur, atq; id tum demum ubi citra uehementem dolorem parotides irruant. Quod uero deinceps scriptum est, Stercus caprinū ex aceto, inueterata ac indurata, nullumq; amplius memorabilem dolorem habentis parotidis pharmacum esse possit, uelut etiam lientis in scirrhum indurati. Tertio deinde loco cōsequenter, Radices rumicis syluestris in uino coctas tradidit. Si sanè & qualitatem & ætatem uini apposuisse, fortassis & ego tentassem de eo iudiciū ferre. Quū uero non adiecerit, multumq; differat acerbum, aut austerū, aut acre, aut dulce, aut recēs, aut uetus, aut crassum, aut tenue, aut fuluū, aut albū, aut nigrū uinū esse, ob id etiam ego nihil habeo quod de hoc pharmaco dicam. At quū uobis hoc cognitum sit, quodd maiori discutienti ui prædictum sit uetus, præsertim si ex genere natura calidiorum sit, uelut sunt in totum fulua, contraria uero huic secundum uires tum austerum, tum acerbū, huiusmodi quidem uinum uitare oportet. In fuluo uero & mediocriter uetusto, & tenuium partium, rumicis radices coquetis, & in parotidibus citra uehementem dolorem obortis adhibebitis. Scribit deinceps, ficum tritam cum atramentō futorio. Discussoria quidē igitur & attenuatoria facultatis est ficus, præsertim arida: recens uero discutienti quidē uim habet, uerū cōcoquere non potest. Verum atramentū futoriū nemo ignorat utrasq; facultates fortes cōplecti, quæ propter etiā uehementia eius uitanda est. Cocta deinde sico nimirū arida, cum absinthio & uino tritis, uti iubet. His sanè etiam uos uremini in tēpore, ad medias magnitudine ac tēpore inflammationes. Quemadmodū etiam buccinis, & purpuris, & ostreis uistis, in durecentibus ac uetustis. Est enim pharmacū quod omnem afflictionē & acrimoniam mitigat & discutit, nō solū si melle quis eorū cinerem imbuat, sed & multo magis si adipē uetustū à fibris depurastis ammisceat. Citra omnem enim molestiā omnes inueteratas inflammationes discutit, etiā si ex infusione materia sint obortæ. Deinceps cerato rosaceo & cyprino cū ruta uti iubet, quod discussoriū quidem pharmacū est, uerū nihil uehemēs neq; uiolenti in se habet. Paulō uerō efficaciaior sit cōpositio, si sulphur uiuū pro ruta ammisceamus. Quæ sequit deinde cimolia cū aceto, neq; fortē, neq; dolorosam, neq; magnam parotidē curare potest. Ficus uero aqua marina cocta, in inueteratis iam cōmoda fuerit, utpote discussoria ut prædita, uelut etiā si aquæ marinæ penuria, muria quis utat. Simile huic est, quæadmodū etiā ipse Archigenes dixit, Marrubii cum sale. Post hæc uero de butyro scripsit, cuius ut ultimi circa illius dictio nis ordinē, paulō ante mentionē feci, post quod rursus ad generosum pharmacū transit. Pyrethrū tritū sico excipi iubens. Deinde calce uiuā cum melle trita uti præcipit. Et post hoc, mustelæ sanguinis illinendi inueniunt. At uero talia tanquam curiosa & superuacanea, & quæ magnam rei medicamentariæ egestatem indicent

inducunt, si per alia auxilia, citra sanguinis mustelæ adhibitionem, parotidas curare nequeat, neq; in usum adsumpti, neq; eorum experimentum habeo. Sed neque ex amicis nostris quispiam alius uir tentauit. Verû cerebrum illinire quodcumq; tandem, mediocrium parotidum medela existit. Post hoc uero hæc uerba scribit. Aceto seruenti perfundito, aut spongiam in acida muria imbutam imposito. Fossorum ac messorum fortassis ea fuerit medela, non hominum urbanorum. Deinceps acris mentionem facit pharmaci ex mustela uista, cusus cinerem cerato irino excipii iussit. Verum eiusmodi pharmacis, quando diu durant & in scirrhum indurantur utendū est; pleraq; enim ab eo scripta ueterascunt & ægre solubilia parotidum remedia existunt, quapropter etiam ipse ad phar maci hoc adiecit, quod etiam Strumas probe sanare possit. Post hoc uero eiusmodi dictio inordinate inserta est, tum assidua calidæ adpersio, tum assidua crudæ ordeaceæ farinæ impositio. Quod ipsum siue quis per se legat, siue prioris distinctionis finem, huius distinctionis principium faciat, utrunq; male dictum est. Manifestū uero hoc erit ubi præcedentis distinctionis finem præposuerimus, ut totus sermo eiusmodi fiat. Mirabiliter discutiit & strumas, sæpe etiā parotidas, tum assidua calidæ adpersio, tum assidua crudæ ordeaceæ farinæ impositio. Si uero de parotidibus solum dicatur, certa distinctio aberit, quæ doceat nos in quibus & qualibus parotidibus aquæ calidæ adpersio, & assidua crudæ ordeaceæ farinæ adhibitio conueniat. Non enim in omni, sed quam citissime uelimus suppurari, hæc facienda sunt, quemadmodum in superiori sermone est indicatum. hoc itaq; uisiose, ut dixi, interfertū est. Cæterū Archigenes ad consequentia transgressus rursum pharmaca scribit, non apponens quod induratis & inueteratis salutaria existant, quum nos ex materia ipsorum, ipsa talia esse cognoscamus. Adscribam autem iam uobis ipsius Archigenis distinctionem, Quæ sic habet. Proprie uero lupinorū amarorū farinam cum melle coctam, modica calce uisua addita, pro cataplasmate imposito. Egregie discutiit & hoc. Picis brutiæ, mannæ siue micarū thuris æquales partes, terebinthinæ, palmarū Syriacarum non uetustarum pinguium carnis puræ, utriusq; dupli, galbani dimidiū mannæ. probe unitis utitor. Si uero dura sit resina expectato. Aut nitrū & rubricæ sinopidis tertiā partem cum ungento cyprino ad strigmentitiā crassitudinem redacta, ac linteolo infarta imposito. Aut calcem uiuam cum strigmentis eodem modo. Aut caricas, galbanū, nitrū parī mēsurā, sulphuris tertiā partē, terebinthinę, opopanacis utriusq; parū quiddā, unitis utere. Aut calcem uiuā cum aceto tritā impone. Quod si neq; per hæc discutiantur, adiuuabimus permutationē in suppurationē per largam & frequenē decocti lauri aut baccarū eius perfusionē, aut sulphure uel cōsiliū quopiā in aquā insperso, & per frequētia ex calida crudaq; ordeacea farinā cataplasmata, siue nitro, siue colūbino stercore in ea ammixto. Aut etiā cucurbita cū scarificatione affixa. Deinde ad chirurgiā perueniendū est & crudi abscessus sectionē. Optimū enim in his ut q̄ celerrime fluxio foras euellat. Hęc quidē Archigenes scripsit. Sunt autē & multa emplastra quæ parotidas discutiunt, aliqua quidē iam inueteratas & induratas; aliqua uero eas in quibus sedato dolore, nulla amplius puris suspicio est. Quæadmodū etiā aliqua quæ iam supūratas curare possunt: alia uero inter discussoria emplastra, singula cū uisui suarū profusione cōscripta sunt, uelut etiā ea quæ simplices parotidas curant laxatoria appellata, omnibus nota sunt. Exēpla ipsorū sunt. Emplastrū Mnaeæ, & quod ex succis cōstat, & quod ex ptisana. His adhuc molliora sunt cerati forma, tum ex butyro, tum ex cęsypo cōfiata, ostreis aut buccinis, aut purpuris uistis additis, adipeq; porcino, singulis quadratīs pōdere. Præstat & hoc. Butyri unc. i. ceræ sextantiē & uncia

& unciae dimidium, ostreorum ustorum quàm tenuissime tritorum sextanctim. liquefabilia liquefacito, ostreaq; infarcito, ac unitis utitor confidenter. Efficacissimum hoc ad parotidas existit.

De affectionibus narium.

Cap. III

IX genere tumorū præter naturam, polypodes in naribus generantur. Ex genere uero ulcerum ozana, Secundum genus autem excretionum præter naturam, Sanguinis eruptiones sunt in morbis acutis, iuxta rationem earū quas recentiores Medici priuatim Superexcretionem appellant. Nimirum in quibus natura ad iudicatorium auxilium concitata, modū excessit. Primum itaq; de ozanis sermonem faciam, quæ ex humorū acrium & putrescibilū influxu generantur: ita ut si acres solum sint, ægre curabilia ulcera producere consueuerint, non tamen graueolentia. Cæterum cura cōmunis ambobus his est, itēq; polypī, ut uidelicet primum caput siccet, & firmetur, quum palam sit obuiuatorū humorum redundantia defluxū ex eo in nares provenire. Quō modo uero caput totū corroborare oporteat, quo nullum recrementū ex eo ad inferas partes delegetur, sæpē iam dictū est. Quum igitur per illa caput ualidū reddideris, ad naris progredieris curationem, Scopo in ozanis proposito, ut affecta pars per mixtæ facultatis pharmaca tum repellentia, tum discutientia, resiccet. Repellunt itaq; tum austera, tum acerbā, quæ communem adstringentium appellationem habent. Discutunt autem calida & sicca facultate prædita, quorū sylua talis est. Archigenis pharmaca ad ozanas,

Quum ozana in naribus fuerit, calaminthæ succum infunde. Aut ipsam calaminthē aridam per fistulam insuffla. Aut ueratrum album cum seminis nasturtij chema quotidie insuffla: post hoc uero caput perfunde. Oblinē autē eos uel chalcitide, aut atramēto sutorio, aut psorico cum melle. Aut instillato in narem melle, & per sternutatorium facta concussione, tectoria ulceti obducta excutito, deinde præscriptum ex nasturtio & ueratro pharmacū, per narem adtrahere quàm plurimum iubeto, & postea amurcam cum melle ilinito. Aut ranunculi succum cum alumine liquido in narem infunde, ægrumq; resupinatum donec ad os penetret adtrahere iube, atque id usq; quo percuraueris identidem repetere. Si uero uetera sint ulcera, etiam acetū uetus ammiscce, aut sulphur tritum. Acre item acetū in uasculum angustī oris fufum, ad multū tempus ad respirationem ipsorum appone, deinde Misſy cyprium, & dimidium eius nardi indicæ, cum uino chio ad mellis crassitudinem redige, ex eoq; meatus obline, & per lanam obtura.

Ad ulcera in naso. Ulcera in naso, ex malorum puniceorum succo in æreo uase ad medietatem cocto perlīne. Aut malum puniceum dulce integrum in uino coctum terito, & forinsecus imposito. Aut uiolam albam ex aqua affricato. Aut rubi succum & alumen Melium cum aqua diluta eodem modo. Si uero uetus sit ulcus cum aceto diluito. Aut iridem & sandaracham cum melle oblinito. Aut adipem uitulinum & resinam ilinito.

De polypo narium.

Polypus tumor est qui præter naturā in naribus generatur, polypodis carni assimilis iuxta substantiæ proprietatem. Manifestū itaque est affectionem hanc ex crassis & uiscosis humoribus generari, atque ob id mixta materia medicamentaria opus habet, ut uidelicet partim adstringat, partim secet & attenuet, partim etiam discutiat & condenset. Archigenis ad polypodas,

In polypode nasturtij tenuis chema, siue drachmam dimidiam, cum ueratralbi obolis duobus, nare adtrahere iube. Vbi uero exciderit linamentis cum anthera siue florido emplastro ex melle utere, aut lycio eodem modo.

Asclepiades

Aſclepiadæ ad Ozanas & polypos. Aſclepiades in quinto exteriorũ ſic ſcripſit. Aridum ad Ozanas, Aluminis ſciſſi drach. iiii. myrrhæ drach. iiii. ſandarachæ drach. iiii. gallæ drach. i. atramenti ſutorij uſti drach. i. tritis utere. naribus prius uino odorato elotis, & pharmaco per ſpecilli extremum ſiue nucleum admo-

moto. Aliud, Seminis ericæ drach. viii. myrrhæ drach. viii. nĩtri rubri drach. viii. malicorij drach. viii. ſeminis tamaricis drach. unam. crocomagmarũ drach. ii. tritis utere. Aliud, Soreos ægyptij friabilis drach. ii. chalcitidis uſtæ drach. ii. ſeminis tamaricis drach. i. croci drach. i. myrrhæ drach. i. tritis utere.

Aliud, Chalcitidis uſtæ drach. ii. atramenti ſutorij aſſati drach. ii. Miſyos drach. ii. amomi drach. i. myrrhæ drach. iiii. croci drach. i. tritis utere. Alia compositio quæ ſtaueſcens appellatur. Aluminis ſciſſi drach. viii. chalcitidis crudæ drach. vi. ſandarachæ drach. iiii. putaminis mali punici drach. ii. atramenti ſutorij uſti drachmas ii. miſyos aſſati drach. ii. tritis utere.

Alia, Atramenti ſutorij uſti drach. iiii. diphrygis drach. ii. calcis uiuæ drach. ii. ſandarachæ drach. ii. Arida admoue, aut linamentum tortum aqua madefactum æ pharmaco imbutum inde. Aliud, Miſyos aſſati drach. ii. mannæ thuris drach. ii. chalcitidis aſſatæ drach. ii. ſquamæ aeris ſeſquidrachmam. æruginis drach. i. arida adhibe.

Lamponis ad Ozanas, ægilopas, polypodas & multa alia.

AD ozanas & ægilopas ac polipos, & quęcũq; uelis citra ſectionẽ ac uſtionem ſubmouere. Dirimit etiam oſſa corrupta, facit & ad ulcera ſerpentia ac putrida inſperſa, & ad ſordida ulcera linamento excepta ac indita cum mel'e. Scobis aeris rubri unc. i. ſalis ammoniaci ſextantem, ammoniaci thymiamaris ſextantẽ, aluminis rotundi quadrantẽ, aceti acerrimi heminas. v. i. Arida terito, & aſuſo aceto, omnia in uas aeris rubri tranſferito, in eoq; ad ſolẽ ſub caniculæ ardore cum aeris rubri radio agitato donec pharmacũ exareſcat, deinde in mortariũ tranſlatum diligẽter terito, & in ſiculi recondito. Vſu uero exigente, aquam abſorbendam dato, deinde etiam in ore continendam, pharmacum uero per ſiſtulam inſuſſato.

Scribonij largi facit ad omnia extuberantia. Miſyos uſti, chalcitidis uſtæ, atramenti ſutorij uſti, ſoreos, ſquamæ aeris, ſingulorum drach. viii. Arida admoueto. Oportet autem præcedẽti die quieſcere, deinde ſequenti pharmacum poſt cibum indere. Illinendũ etiam nares antea cum birumine aut liquida pice, aut myrrha ſtaſte.

Philoxeni chirurgi ad polypodas, ozanas, omnem excreſcentem carnem, hæmorrhoidas, & quibuſcunq; cruſtam inducere uelis.

Aeris uſti, auripigmenti torrefacti miſyos aſſati, ſingulorum drachmas ii. diphrygis drach. iiii. chalcitidis uſtæ, atramenti ſutorij uſti, ſquamæ aeris, ſingulorum drach. iiii. tritis utere. Cæterum poſt pharmacorum adhibitionem, etiam ſternutatorijs utimur, quo uidelicet teſtoria ulceri obducta excutiamus, quæ tribus aut quatuor diebus ſerẽ excidere conſueuerunt. Vbi uero exciderint adipe anſerino ac butyro cum roſaceo cerato curantur. Verum Aſclepiades in primo pharmacorum exteriorum ſic ſcripſit.

Aſclepiadæ ad ozanas, quo uſus eſt Meges. Seminis ericæ drachmas iiii. myrrhæ drach. iiii. nĩtri rubri drach. iiii. putaminis mali punici drach. iiii. croci drach. ii. coſti drach. ii. trita inſuſſato.

Aliud, Aluminis ſciſſi drach. iiii. myrrhæ drach. iiii. ſandarachæ drach. ii. rhois rubri drach. ii. ſalis ſoſſilis drach. ii. coſti drach. ii. croci drach. ii. trita inſuſſato. Ante curam uero nares uino odorato & optimo melle eluere conamur.

Ad narium polypos quo uſus eſt Antipater. Aeris uſti drach. iiii. mini ſinopici drach. i. trita per harundinem inſuſſato. Quin & per ſpecilli nucleum admoneto.

Aliud

Aliud Antonij Musæ. Atramenti sutorij partem i. sandarachæ partem i. trita infusilla. Aliud Charixenis post chirurgiam. Cornu cerui usti drach. iiii. squamæ æris rubri drach. iiii. auripigmenti drach. i. trita infusilla. Aliud, Bryoniz radicis ustæ drach. iiii. atramenti sutorij drach. iiii. spumæ nitri drach. iiii. elaterij drach. iiii. trita infusilla. Ad ulcera in naribus. Recrementi plumbi, uini ueteris, olei myrtei, singulorum æquales partes plumbi recrementi ut quàm leuissimum fiat terito, & adfuso uino rursus leuigato, deinde myrteum addito, omniaq; simul misce to ac conuassato, & in sigillinum uas coniecta prunis imposito, assidueq; agitato, atq; ubi strigmentiosum redditum fuerit pharmaci sublatum in pyxide plumbæ seruato. Aliud, Plumbi usti & loti drach. viii. uini rosati quantum sufficit, olei myrtei quod satis est, apparato & utitur ut dictum est. Aliud, Spumæ argenti drach. vi. cerusæ drach. viii. malicorij drach. iiii. aluminis scissilis drach. iiii. uini aminæ quantum sufficit, olei myrtei quod satis est. Ari da tusa & cribrata in mortarij cōiecta cū uino ad strigmentitā crassitudinē redi gito, postea uero myrteo oleo affuso conuassato, & ablatis in pyxide plumbea reconditis ut dictum est utitur. Sint aut myrtei heminae quatuor, uini cyathi. iiii. Diogenis pharmacum accommodatum. Adipis anserini drach. iiii. cæsyphi fesi quidrachmam, medullæ ceruinæ drach. ii. ceræ Tyrenicæ drach. viii. plumbi usti & loti drach. iiii. subij usti & loti drach. viii. ladani drach. ii. adipis utulini drach. ii. terebinthinæ drach. iiii. cerusæ drach. ii. spumæ argenti drach. i. rosacei quantum sufficit. Liquida cum aridis commistito & repositis utitur. Vfu autem expetente quantum satis fuerit tollito, & rosaceo dilutum naribus sublinito. Ex primo de parabilibus Apollonij. Ad affectiones in naribus. Ad na rium exulcerationes, & putredines ac foetores, mali punici nucleo carentis dulcis itemq; acidi succum, in aereo uase donec duæ partes supersint coquito, ac uti tor quàm penitissime illinendo. Facit & malum punici dulce cum uino coctum & forinsecus impositum, atq; intro illitum. Ad excrecentē carnem & polypum. Diphryges tritum admoeto, & linamēto nares disparato. Aliud, Veratrum terito, eiq; origani par pondus tritum addito, ac naribus bis in die in fusillato. Aliud, Veratrum nigrum cum pari sandaracha terito, & ammix to oleo, lana excipito, eodq; narem expleto. Aliud, Florem aris, & aru ginem, ac sulphij suc cum pari mensura oleo ammixto terito, & ungenti crassitu dine ad dies quinq; naribus sublinito; deinde per uolsellam eximito. Aliud, Auripigmentum & calcem trita cum specillo large adhibeto. Vbi uero intumue rit & eleuatus fuerit polypus, ueratro nigro arido trito moderate utitur. Ut plu rimū enim in diebus septem nasus uacuis redditur. Deinde diphrygis cū melle usu expurgato. Aliud, Auripigmentū & calcem ac ueratrum album trita cum specillo admoeto. Ad ea quæ naribus illabuntur. Quæ naribus il labuntur, auriscalpio aut uolsella extrahito, aut sternutatorio admo to, os adpre hendito, atq; alteram narem comprimito, siquidem non in utraq; nare adfectio existat. Hæc quidem Apollonius quibus ipse usus est tradidit. Verum ut ego usus sum, & in polypis ac ozenis nariū, probatissima reperisubscripta. Ac pri mum quidem quod ex malis punicis constat pharmacum. Sint autem parinū mero ac magnitudine ex tribus eorum differentiis accepta. Aliqua enim ex his sunt austera, aliqua dulcia, & quædam acida. Contundenda itaq; sunt recentia & matura, atq; integra diligenter cōfringenda, quo succus ex eis exprimi possit, quem in uase stanneo depositum adseruare oportet, modice coctum siquidem li quidi or quàm oporteat uideatur. Quod uero ab eo reliquum est solidum et cras sum, rursus diligenter contundendum est, ut à contusione rursus in pilā attri ac leuigari

leuigari possit, indeq; collyriorū formæ effingi, quæ congruâ ad ægrinares portionem habeant. Induntur enim hæc in narīs quam polypus obſedit meatū, quo citra mordacitatem & consensum, qualem acia pharmaca excitare solent, per longiorem moram ipsum expurgent. Quod si humectior & mollior tibi appareat polypus, plus ex austeris malis punicis cōijcies: si durior, ex acidis. Quandoquidem uero perpetuo tolerare collyrium moleſtum est, ab eius usu interquieſcere conuenit, atq; eo tempore quo ipsum non indīs, per expreſſum succū ægrū curare, & sanē orīs diductio rictu hīant, etiam circa illas partes iuxta quas naſus ad palatum perforatus est, liquidum ipsum expreſſum pharmacum illinere, uel cum penna, uel cum lana specillo duos nucleos siue cuſpides habenti obuoluta. Cæterum ex aridis pharmacis diphrygē, citra mordacitatem aliquando per multum tempus consumptum polypum noui. probatur etiam in ipsis prædictis collyrium ex malis punicis effictum, si ubi exaruerit probe cōtundatur, cribreturq; ac leuigetur, indeq; insuffletur, aut etiam per specilli nucleum indetur. Omnia autem hæc assidue facere oportet, ut nunquam ab affecta parte pharmacum absit, quum facile ab humiditate eluatur. Quemadmodum igitur in lippientibus, sic & in his semper si possibile est, pharmacum adhibere oportet: abluatur enim facili, ut dixi, ab influente humiditate. Porro quū eunuchus quidam nullus pharmaci ferre posset adhibitionem, sed ab omnibus irritaretur, rosas aridas contulis ac probe tritis atque inditis, mirum quā uiderim hominem magnopere citra omnem mordacitatem adiūtū. Quare in corporibus mollibus & humidis, aut quibus ægre ulcera ipsa sanescunt, rursus eodem pharmaco usus sum, contigitq; ex duobus alterum, aut ut nihil noceret, aut omnino citra moleſtiam opus suum perficeret. Pleraq; enim eorum quæ polypodas exterunt, eos exacerbant ubi à scopo aberrant. Cæterum ulcera in narium meatibus semper per passillos curauī, andronium uidelicet, & passionis, & polyidæ, & bythinum, & per eum quem ego cōposui, his ipsis aliquando uino dulci dissolutis, aliquādo austero, & quandoq; moderatæ ætatis, quandoq; ueteri. Interdum etiam aceto dilui uel uinoso, uel simpliciter acido, uel etiam acri ualde & uetusto, iuxta prædictas indicationes, usu pharmacorum secundū symptomata affectionum reperto. In diſſuē uero quopiam qui odoratum pharmacum sibi adhiberi expetebat in ozæne curatione, hedychroi usum excogitauī, ipsumq; uino ſalerno ueteri dissolui, & mirū quā breui affectio ipsa est curata. Relata est hedychroi cōpositio circa theriacces antidoti descriptionem.

Heracidae ad eruptiones sanguinis ē naribus, ad Antiochidē. Cap. III.



Vfficienter quidem de sanguinis eruptionibus in curandi Methodiſbris dictū est, uerū nunc quæ ex ſylua uſu cognita conſtant, & à prædeceſſoribus noſtris approbata ſunt referētur. Vbi grumōs sanguinis eduxeris, ſanam ſpecillo obuoluiſto, eamq; in lycio aqua diluto imbuto, & ſanguine manante locū illinſto. Aut linamentum longū lycio imbutum indito, deinde forinſecus cum digitis apprehenſum naſum comprimito, donec conſtiterit ſanguis. Aut chalcidē mediocriter leuigato; & linamentum ex ellychnio contortum in frigidam aquam demittito, deinde in chalcide obuoluiſto. Aut linamentum priapici ſuæ pudendī forma naribus indito. Aut linamento rafiſi uitor, quā penſiſſime inſuſo. Præſtat autem digitum ad palatum immittere, ne eò linamentum raſile deferatur. Aut thus confringito, & polygoni aut ſeminis porri ſucco diluto, in eodē linamentum raſile, aut ex ellychnio obuolurū indito. Aut mentam tritam indito. Aut ſpongiam ſiccā immittito. Aut ſpongiam in acre & feruidum acētū conſectā forinſecus ad ſanguine manantem

nantem nares apponito, atq; specillo donec impellatur apprimito. Præstare ite
 spongiæ principii filo per acū transmitti, quo facile extrahi possit, extrahito aut
 quum opus suum perfecisse existimaueris. Si uero inarescat spongia, intusq; ag
 glutinetur, per auriculare clysterem frigidā aquam immixtito, ac infundendo hu
 meclato, atq; ita extrahito. Vtere etiā cōpositionibus uulnerarijs & sanguinem
 sistentibus quæ describentur. Accōmodatum est & frontē spongijs refrigerare,
 itemq; capitis partes sublimes facere. Brachia autem & manū iuncturas, scemo
 raq; & inguina, atq; genua cōstringere, in his qui mœsto ac deiectione sunt animo,
 quemadmodū in uenarū sectionibus facere moris est, Iubendiq; sunt ut ea mem
 bra moueant, manus quidē confricando, pedes uero ambulando. Expletis enim
 sanguine quæ in eis sunt uenis, nares sanguine manare cessant. In potu amplius
 exhibenda sunt ea quæ ad sanguinis reiectionem cōscribentur. Aures quoque
 contentæ per linteola ac ceram obturentur, & in ore aqua pluuiæ frigida con
 tineatur. Quod si quid ex sanguine deglutitū esse uideatur, etiam idipsum ubi
 multa eius sit copia, per eua cuatiū educito. In uentre enim & intestinis in grū
 mos coactum incensionem facit.

Pharmaca Asclepiadæ in quinto externorum ad sanguinis narium eruptiones
 scripta. Quæ Marcellæ inscribit. Plarani pilulas collectas in umbra exsiccav
 to, & desiccatas super pannum asperum in discum diffundito, easq; aspera ipsius
 panni siue tunicæ parte confricato, aut in panno ex pilis siue setis composito ob
 uolutotac semen quidem pilularū abijcito, tomenta uero collecta in testaceū uas
 nouum reponito. Vsu aut expetente, ea ipsa lanuginea tomenta in harūdinem
 culus geniculi recisi sunt indito, & qua parte excauata est harundo, naribus im
 ponito ac insufflato, compendit hoc uincit sanguinis eruptionem. Aliud,
 Atramentū sutotiū diligenter tritum reponito. Vsu uero postulante, rasuram
 quampiam linteolorū in pharmacū immerfam indito. Aliud, Spongiam
 cruda pice imbutam exurito, & linamēto torto exceptā indito. Aliud, Pu
 raminis oui partem unam, gallæ omphacitidis partem unā, trita linamēto torto
 aqua aut aceto madefactio excipito, & indito. Frontem uero & nasum gypso aut
 luto figulino integito. Aures autem contente obtusare iubeto. Quidam spon
 giam aphricanam aceto acerrimo incoquit, deinde exprimunt, eamq; in ignito
 lapide frequenter obuoluunt, atq; ita suffrium & uaporem excitant, quem nari
 bus attrahere iubent. Quæ Andromachus scripsit, Ad sanguinis quī
 dem ex naribus eruptiones nihil priuatum Andromachus scripsit, Verum inter
 ea quæ sanguinem cohibent, plerq; etiam hæmorrhagias narium sistunt, quæ
 propter etiā ego adscribā etiusmodi pharmaca quomodo ab ipso descripta sunt.
 Cōpositio ischamos, id est, sanguinem sistens, quæ uitor. Chalcitidis, misyos,
 mannae thuris, singulorum drach. iiii. tritis uitor. Aliud, Chalcitidis
 drachmas centum, atramenti sutorij drach. l. misyos assati drach. xxv. aris ussi
 drach. xli. & dimidiā, tritis utere. Ischamos magna. Misyos cyprij drach.
 vij. atramenti sutorij drach. vij. corticis pini drach. iiii. squamæ aris drach. iiii.
 mannae siue micarum thuris drach. iiii. Alij drach. xv. habent, aris ussi drach
 mas xv. chalcitidis drach. xv. calcis uiuæ drach. xv. alij xl. gypsi torrefacti
 drach. iiii. alij viii. tritis utere. Ischamos Aphrodæ. Chalcitidis drach.
 vi. mannae thuris drach. ii. resinae terebinthinæ frictæ drach. iiii. alij tres accipitū
 tritis uitor.

Finis tertij libri.

CAPITA QVARTI LIBRI

Doctrina affectionū quæ in oculis fiunt, inter quas etiam de pharmacis acrimonia carentibus, & meatus obducētibz, & de alijs omnibus. Cap. I
 De lippitudine siue ophthalmia. Cap. II
 De ulceribus oculorum. Cap. III
 De ocularium pharmacorum vitibus. Cap. IV
 De aridis medicamentis oculis conducentibus. Cap. V
 Arida pharmaca ad oculos ab Asclepiade conscripta. Cap. VI
 Remedia ad affectus oculos ab Archigene in primo pharmacorum secundum genus conscripta. Cap. VII

CLAVDII GALENI PERGAMENI

DE COMPOSITIONE PHARMACORVM SE-

cundum locos Liber IIII. Iano Cornario Medico interprete.

Doctrina affectionum quæ in oculis fiunt, inter quas etiam de pharmacis acrimonia carētibz, & meatus obducētibz, & de alijs omnibus. Cap. I



ON equidem alia est componendi, alia utendi Methodus in his pharmacis. Ipsa enim cōpositio uelut ad usum relata cōficiatur, ita ut hi qui pharmaca cōponunt scopū habeant utilitatem ex usu ipsorum emergentem. Verum quemadmodum in alijs, sic etiam in his affectionibus quidā indefinire pharmacorum usus scripserūt. Verbi gratia. Ad dolorem accommodatum est hoc pharmacum, nō apponentes affectionem in qua dolor sit obortus. Quidam uero etiam affectiones ad-

scripserunt, alij quidem magis iuxta experientiam: alij autem magis secundū rationem. Iuxta experientiam quidem magis, quicūq; ex conspicuis circa oculos signis discrimen fecerūt. Secundū rationem uero magis qui ex obscure apparentibus, aut neq; in totū apparētibz idem fecerūt. Cōspicue itaq; apparet fluxus multus & modicus, mordacitas & lenitas, ruborq; plus aut minus, uelutitidē uenæ paucæ & multo sanguine plene; & inflammationis tumor minor aut maior, Quemadmodū etiā colores præter naturam uarietati, & oculorū sordes siue leuæ plures aut pauciores, aut minores aut maiores progredientes. Apparet item nobis manifeste asperitates in palpebris oculorum, Quid uero attinet dicere, qd & ulcera & pustulæ, tum secundum locos, tum magnitudine, non paruiam differentiam habent, itemq; quæcūq; eius generis alia existunt, Quin iuxta aliu sanē modū, ex eorum quæ conspicue apparent numero, sunt etiam ipsi adeo dolores, Nihil enim interest siue nobis siue ægris appareāt, Etenim quod dolent, & quomodo dolent manifestū est: quod enim cum cōpressionē, aut tensionē, aut obturationē, aut corrosione, aut quibusdā pulsationibus dolent, nobis aperte indicatur. Cæterum eiusmodi discrimina non apparent (uelut aliqui scribūt) ad fluxum qui ab his quæ intra cranium sunt, aut ad fluxum qui ab his quæ extra cranium sunt, aut etiam per Iouē ad eum qui ex arterijs, aut ex uenis affertur: & quum quidam dicant diffensionem aut obturationem in profundo oculorū esse, humoribus uidelicet crassis, aut uiscosīs, aut multis impactis, nullum ex his symptomata agros grauat, uelut uehemens dolor circa quodcūq; tandem membrum,

non sanè circa oculos solos, adeò ut mortem aliqui ultro elegerint, melius fore rati hanc semel obire, quàm totos dies dolores perferre. Ego uerò cū in alijs quibūdam, cum duodecimo de cūrandis morbis Methodi, in uniuersum manifeste scripsit, tum de differentia affectionū in quibus uehementer dolent, tum quæ causa uniuscuiusque ipsarum exsistat. Scripsi item in decimo tertio eiusdem operis omnia, quæ necesse est medicū de oculorum affectionibus nosse, & quæ ad ipsarum curationes requiruntur. Referam nihilominus tamen & nunc breuibus capitulis tantū repetitis eorū, quæ ad præsentem tractationem utilia sunt, hoc est eorū quæ cū materiæ medicæ doctrina coherēt. Nam & liquores, & succi, & semina, & fructus, & plantarū particule ocularibus cōpositionibus induntur, ueluti etiam non pauca ex his quæ Metallica appellantur, aliqua quidem extrême aspera & acerbæ atq; acris, aliqua uero his moderatiora, & tamē fortia, Quæ ad modū itē aliqua omnis mordacitatis expertia ac lenissima per lotionem reddita.

De pharmacis mordacitatis expertibus, ac lenibus.

Pompholyx igitur lota nulli pharmacorū mordacitatis experitium inferior est, atq; ob id ea utimur ad tenues & acres fluxiones, capite uidelicet prius simulq; uniuerso corpore euacuato. At uero manifestum est quod per uenæ sectionem ac purgationem totum corpus euacuemus: per apophlegmatissimos uero, caput à p̄uicis uindicamus. Potest enim pompholyx lota, quemadmodū etiā spōdit, atq; amyllum, simul & moderate humores resiccare, simulq; ne per tuni- culas euacuentur ea quæ in magnis ipsorū uenis superflua humiditas continetur, prohibere. Quare si quis prius quàm caput ab humoribus ad oculos defluentibus expurget, obturantibus pharmacis utatur, uehementem dolorem ex disten- tis tunicis efficiet, & ex multitudine influentium humorum, aliquādo rupturam aut erosionem ipsorū inducet. Eiusdem generis cum prædictis pharmacis, subte- nuis ouorū liquor exsistit, ex redundanti potens humiditates abluere, & exasperata oblinere. Verū obturandi meatus uim cum illis æqualiter non habet, sicut neq; uim resiccandi. Atqui sceni græci succus quod ad uiscositatem attinet, simi- lis est albo ouorū liquori, discussoriam autem habet facultatem, & moderate cal- facioriam, atq; ob id multos dolores mitigare consueuit.

De pharmacis acris.

Prædictorum pharmacorum sylua secundū genus maxime cōtraria acrium liquorū materia est, ueluti liquoris cyrenæici & Medici, & sagapeni, & eu- phorbi, atq; simpliciter loquendo, omnium uehementer calfacientium citra ex- asperationem: atq; hæc ipsa sylua non solum in liquoribus, sed & in succis, & se- minibus, & floribus, & plantarum fructibus continetur.

De extergentibus siue repurgantibus.

Tertio consequenter post prædictas, fortis facultas est extergentū pharma- corum qualis squamæ aris est, & chalcitidis ustæ, & aris uisti, itemq; floris eius, & misyos, ac foreos, itemq; sibi.

De erodentibus.

His adhuc aliud genus adiacet erodentium uidelicet, quale est auripigmen- tum & sandaracha, & Asie petre flos, participat & misy paululum eiusmo- di facultate.

De astringentibus.

Et & aliud genus pharmacorū quod in oculares compositiones inijcitur, eorum uidelicet quæ natura astringūt. Quæ igitur mediocriter hanc uim habent, influxiones repellunt. Quæ uero uehementer, ampliorem dolorem in- fligunt, tunicas exasperando, quàm inueniunt influxionū imperum repellendo. Mō

fecit autem aliquando utiliter ex eis parū quid in cōpositiones oculorū aciem exacuentes, utpote quæ oculorū substantiam cōgant & adstringant. Verum quæ mediocriter adstringunt lippitudinibus cōmodissima existunt: cōferunt autem & reliquis fere omnibus adfectionibus ulcerū, pustularū & fluxionū. Sunt uero eiusmodi. Folia rosarum & flores & succus, ericæq; fructus, & nardī spica, am-
pliusq; & malabathri foliū, & crocus, & lycium, & quæ hypocisthis appellatur. Porro uehementiorem his adstringendū uim Acacia habet & omphacium, quæ & ipsa in succorum genere numerantur. Item balauitium, & cytini, & gallæ om-
phacitides ex genere eorum sunt quæ multum adstringunt.

De concoquentibus.

Inflammationes itemq; alias adfectiones concoquūt hæc, myrrha, crocus, ca-
storium, & thus, & foenigræci codi succus, quæ etiam discussoria ui prædita
sunt, & præsertim, ex eis myrrha. Atq; hæc quidē est oculariū medicamentorū
sylvæ, & quicumq; sanè naturali intelligentia præstant, ratiocinationeq; exercita-
ti sunt, nihil amplius opus habent mea instructione, potentes nimirū ad singulas
oculorū adfectiones aptum cōponere pharmacum. Quando quidē uero pauca
les existunt, & multorū utilitatis potiorē rationem habere cōuenit, præstabilius
mihī uisum est cōpositionis ipsorum rationem integre recensere, ubi repeti uero
prius per spicacitatis grātia, cōmunem in genere uim singulorum quorum men-
tionem feci pharmacorū, Quæ uniuersim quidē in quinto de simplicū pharma-
corum tractatione, cōmentario à me relata est, & per cōsequentes sex libros par-
ticulātim usq; ad extremū. Ut autē appellationibus facultatū in pharmacis, ipsi-
dem quas in prædicta tractatione posui, uelut exēpli clarioris grātia. Quædam
substantia terrestri dico, citra refrigerationē manifestam aut caliditatē, in medio
quodāmodo utriusq; cōsistentia: atq; ex his aliqua quidem parum quid ex frigidi-
tate aut caliditate cōplectuntur: aliqua uero in totum nullam eiusmodi faculta-
tem ex se ostendunt. Totū autem hoc genus pharmacorū emplasticum, hoc est,
meatus obducens & obturans appellatur, cōtrariā uim habens his quæ ab ob-
turatione liberantia, Ephractica sunt appellata, qualis est Samius Aster magis te-
nuium partiū existens q; quæ simpliciter Samia terra appellatur. Et pompholyx
lota, uelut etiam cinis eius lotus, & cadmia usta ac lota. Videtur autem mihī pa-
rum quid exterioriū in ipsa cadmia inesse, siue post uestionem, siue citra eam laue-
tur. Pompholygi uero & spodio parū quid adstringēs inest, Quemadmodū etiā
plumbo, post uestionē & lotionem, Nam & hoc pharmacū omnis acrimoniæ ex-
pers est, parum quid astringens habēs. Neq; refert siue masculino siue muliebri
genere pompholygem dicere uelis. Eodē modo etiam amyllum habet, quod &
ipsū lotū exquisitè, mordacitatis expers est, et mediū, ut neq; a dstrictionē neq;
acredinē habeat, hoc est, neq; frigiditate neq; caliditate participet. Quin & ceru-
sa lota proxime ad facultatē usti ac loti plumbi accedit, manifestūq; signū per ad-
strictionē exhibetur, quod penitus qualitatis omnis expers sit, & quantū ex gu-
stu ac odore apparet, amyliq; est & samij asteris naturæ. Vniuersum igitur huius-
modi pharmacorū genus, siue modicū in gustu aut odore qualitatē exhibeat, si-
ue penitus nullā ostendat, cōsimiliter ut purissima aqua, Qualitatis expers nomi-
natur, & per solā terrestre substantiam moderate à natura resiccat. Quapropter
etiā lōgiori tēpore cōmoditatē ex se proficiscentē sensui perceptibilē faciūt, ut-
pote quæ per primos dies nihil inuisse putētur. Adhibētur tamē à medicis tanq;
acrimoniæ expertia, circa ægre curabiles adfectiones, in quibus ulcus est siue so-
lū, siue cū erosionē corniformis tunicę, & prolapsu uuniformis appellatæ, serosis
humoribus lōge mordacissimis asiluetibus, In his enim nullū aliud pharmacum

cōuenire potest, utpote quum adstringentia cohibeant effluentes humores, atq; per hoc dolorem ex mordacitate ipsorū obortum intendant. Acria uero affectio nem simul adaugeant, siue in solis oculis affectio sit, in eiusmodi malum habitum partibus perductis, ut quod influit corrumpant: siue etiam ipsum quod influit uitiatum sit, aut propter solum caput, aut etiam ob totum corpus tale existens. Vnde etiam affectā partem quo ad curationē apta fiat præparamus, tum totius corporis purgationibus, tum reuulsionibus, primū quidem ad infernā corporis partem, deinde etiā ad occiput, & capitis cutem. Vimur etiam sectionibus articularum, quādoq; retro caput porrectas circa aures arterias incidētes. Excindimus quoq; partem arteriarū in temporibus, tantum ut curemus in tunica oculorū factam affectionē, ob quam etiā bonus sanguis per uenas ad ipsas tunicas delatus corrūpitur. Ad has igitur affectiones solas conuenire uidetur prædictorū medicamentorū genus, cura mordacitatē resiccans in affecta parte uitiatos humores, quæ ut dictū est id quod influit corrūpit. Adstringentiū enim facultas neq; resiccet talem affectionē, cohibetq; mordaciū humorū serosorū effluxus, Calidorum uero & acriū facultas nō solum nihil iuuat, sed etiam simul auget mordaciū humorū qualitātē. At uero relaxantiū & discussiorū pharmacorū uis euacuare quidē potest quod generat, Verū ulceratum neq; renutrire aut ad cicatricē perducere potest, neq; quod procidit retrudere & cōcludere. Quemadmodū etiam neq; concoquentiū facultas id præstare potest, etiā si cōcoquere affectiones non paruū cōmodum cōplectatur. Ex eorū uero genere sunt crocus, myrrha, et thus, quemadmodū dixi. Quid porro dicere refert, de his pharmacis, quæ acidas aut amaras habent uires, quōd mordacia & exacerbatiua eiusmodi affectionū existant? Verū his adhuc ampliore malicia prædita sunt, quæ nitrosam, aut fassam, aut austerā uim habēt. Reliquū igitur est genus id quod ulcera cum acri fluxione curare potest, eorū uidelicet quæ paulo antè mordacitatis expertia pharmaca dixi, quæ longiori tēpore affectæ partis uitiatū humorē consumūt. Appellantur talia à Medicis collyria libiana & cygni. Ob colorē quidem albū qualem etiam cygni habēt, præualente in ipsis amylo, & terra Samia ac cerula Rhodiaca. Nam & alias optima hæc est, & colore albidior ac leuior, magisq; tenuium partium quæ in alio quopiam loco cōficiantur. Cæterum in quibus alia pharmaca prædominantur, colorem iuxta sui ipsorum substantiam efficiunt, ueluti si quis albo colorī modicum cæruleum ammisceret. Hæc ipsa uero collyria quidam in cotibus terunt, boni succi lacte ex nutritū uberibus instillato, ut obducentiora meatuum uim quæ in ipsis oculis est euiant, quum in lacte serosa quædam exterioria uis contineatur, cuius usus congruens est ad propositam curationem. Relatum enim in tertio curandi Methodi est, Quod ulcera explenda, cura acrimoniæ extergeribus medicamentis opus habeant. Quod si huiusmodi lac haberi nequeat, per foeni græci decoctū collyria terere præstiteris, utpote quod exterioriā quandam uim habet, qua oua ipsa in totum carent.

De aspritudinibus palpebrarum.

QUum ægre curabiles prædictæ affectiones existāt, adhuc molestius se extendunt, ubi accesserint aspritudines palpebrarum, à quibus etiam in lipitudinibus oculorum tunica incisa, dolore affliguntur. uerum in illis audemus ad inflammationi propria pharmaca, miscere parum quid de extergentibus, uelut est collyrium ex uino aspritudinibus accommodatum, quo primum ea quæ ad palpebras delata sunt, deprimant, ubi uero inflammatio reliquit, ea quæ aspritudines repurgare possunt adhibemus. In his uero qui ulcus habent cum mordaci fluxione, impossibile est eiusmodi uti pharmaco: corniformis enim tunica amplius

amplius erodetur, & uniformis magis procidet, & uehemens dolor hominem apprehendet, augebiturq; malignitas fluxionis. In huiusmodi itaq; affectionum, complexu Medici ad consiliū inopiam redacti, solum remedium uelut in desperatis repererunt, ut extensis atq; uersis palpebris, ipsa citra pharmacorum ulum repurgent & abstergant, Aliqui quidem specilli concauo superficiem deradentes, deinde molli spongia id quod defluit excipiētes, & de cætero palpebrarum aspritudinem moderatiorem reddētes. Aliqui uero etiam marinorum quorundam animalium coria in superficie aspera, in eiusmodi usum congrue adsumūt. Quidam ex præceptoribus meis etiam ex pumice collyrium fecit, cum eoq; extensis ac uersis palpebris aspritudines deradebat. Manifestum est autem pumicem exquisitè leuigatum esse oportere, atque ubi id factum fuerit cum tragacantha aut gummi in collyrium formari. Cæterū ubi temporis progressu per prædicta collyria fluxio fuerit sedata, audemus iam ea quæ palpebras extergent adhibere, patum tamen quiddam ex eis in principio ammiscendo, quod ubi homo perpeti posse uidebitur, paulatim copiam augebimus. Postquam uero fluxus fuerit resiccatus & palpebræ moderate habuerint, caua ulcera collyrio ex thure explere oportet, ita ut in principio pauxillum ex collyrio ex uino ei ammiscamus, & paulatim eius copiam extendamus, ut ne palpebræ amplius tunicas oculorū infestent, & ulcera mūda reddita exacè impleantur, & ad cicatricem perducantur. De his itaq; sufficienter dictū est. Transeundi enim iam tempus ad reliquas oculorum tum affectiones, tum pharmacorū ad easdem cōpositiones.

De lippitudine siue ophthalmia.

Cap. II



Xordium autem à frequentissima oculorum affectione sumam, quam proprie ophthalmiā, hoc est, lippitudinem appellant. Est autem uelut didicistis, inflammatio tunicæ os capitis & caluariam ambientis, neq; refert si pelliculam quis, aut quocunq; tandem nomine appellare uelit.

Vocāt autem & membranam agnatā, propterea quod alijs quæ oculum ipsum constituunt tunicis, forissecus agnata sit, ligamentum existens toti oculo ad circumscripta ossa, & ob id omnia quæ circūcirca oculos sita sunt usq; ad malas quādoq; in uehementi lippitudine simul attolluntur. In propatulo itaq; est, omnia pharmaca huiusmodi affectionem curātia, sub communem omnium inflammationum curationem cadere, assumereq; necessario quippiam pro partis ipsius natura, quæ excellentem molliciem & ad hoc ut lædatur aptitudinē, super omnem totius corporis cutem nata est, propter sensus subtilitatem, & substantiæ raritatem. Adhibenda sunt autem pharmaca repulsoria nō exasperantia, hoc est, non uehementem sortita adstrictionem, sed quæ tum propria sua substantia sunt moderatiora, tum sensui liquoris ammissione adhuc magis talia fiant, Lenitiuos autem liquores dixi oui candidum, & sceni graeci decoctum, & ad hæc amplius ipsum lac: in quo proutidum esse conuenit, ut iuueniculæ simulq; boni succi fœminæ existat, uberibus ipsius in cotem in qua collyrium teritur expressis, quo calidum adhuc oculis infundatur. Cæterum hoc in uehementi dolore afflictis, aut propter inflammationis magnitudinē, aut ob influētium humorū acritudinē, facere cogimur. Vt plurimum uero albus oui liquor cum accommodatis pharmacis, lippitudines curare sufficit, per collyria uidelicet Monohemera, hoc est, unius diei, appellata. Ad eodē enim hæc non parum sæpe magnas inflammationes mitigauerunt, ut in uesperam quidem homo in balneo uteretur, Insequenti uero die nardino collyrio ad instaurationem & corroborationē inungeretur. Admiscere autem ei circa primam inunctionem, minimū quiddam acrium & fistensium medicamentorū oportet, & circa secundam paulo amplius quiddā priore,

Sufficiunt enim hæ duæ pharmaci adhibitiones, & deambulatione cula aliqua non multa ante balneū. Porro collyria Monohemera appellata, quædam priuatim seculenta dicta; multam in se habent Acaciam. Quædam siue omnino modicam, siue neq; in totum habent. cōplectuntur autem alia quidem æris squamam, alia uero æsustum modicū, additis multis alijs quæ mediocriter adstringunt, & concoquunt, & discutunt. Talia autem sunt, crocus, myrrha, lycium indicum. castorium etiam & thus citra adstrictionē concoquunt simulq; discutiūt. In quibus igitur adstringentia prædominantur, plurimū oī liquorē, & modicissimū pharmacum esse oportet, præsertim si quid ex metallicis pharmaci in se cōplectatur. In quibus uero crocus, & myrrha, castoriūq; ac thus, & lyciū perualent, paulo crassiore pharmaco utendum est. Fomentum præterea omnino adhibendū est ipsū per spongiam, siquidē mediocris sit dolor, semel aut bis in die. Si uero uehementior dolor urgeat, præstat ter aut quater, & sæpius uti, in longis præsertim æstibus diebus. Fiat autem fomentum per meliloti & sceni græci decoctum. De lipitudine itaq; satis dictum est, deinceps de ulceribus dicam.

De ulceribus oculorum.

Cap. III



Ulcera oculorū eandem secundum genus curationem requirunt, quam alia ulcera, eam uidelicet quam per longum in tertio & quarto curaturæ Methodi recensui: uerum ob partis naturam quā lenissima adhibenda sunt, ex quorum numero id quod ex pompholyge lota cōstat esse dixi. Ammiscentur eis etiam succi quidam non solum omnino mordacitatis expertes, sed qui etiam uehementis. dolores mitigare possunt, uelut est mandragoræ succus. Quidam etiam polygoni succum ammiscuerunt; quemadmodum alij ipsorum etiam odorū candidum. Manifestum uero est, quod ubi iam propemodum instat tempus præparandi pharmacum, tum demum huiusmodi ammiscentur, propterea quod facile acescant. Eodem tempore etiam rosarum additur succus. Cæterum sylua medicamentorum quæ proprie ad oculorum ulcera pertinet, eundem scopum habet, ut ulcus mundum seruetur, Vipere partium natura ipsum expleat & ad cicatricem perducant, quemadmodum in alijs ulceribus est prædictū. Si itaq; inflammatio adhuc circa oculum existat, aut quispiam etiam dolor, collyria ex thure, & metallicis lotis, & succis mordacitatis expertibus adhibentur: ubi uero sordida reddita ex eorum usu ulcera fuerint, de reputantibus quippiam ammiscere oportet. Quale est paccianum ex uino croceum, quo utimur, minimum quid ex eo prædictis pharmacis addentes. Habet autem hoc plurimum in se crocum, unde etiam croceum appellatur. Habet etiam ex repurgantibus metallicis aliqua, quapropter etiam aspritudines extirpat non paruas modo, sed magnas quas sycosēis Græci à granorum ficus similitudine appellant. Auenuat item pterygia, hoc est, oculorum unguēs. De his itaque medicamentis paulo post dicetur. At uero ulcera quæ per erosionem tunice corniformis sunt, ut etiam ex uniformi quid pronuat, manifestum est quod tum propter seipsa, tum ob prolapsionem, repellentibus & adstringentibus pharmacis opus habent. Conandum est autem ut ex ipsis eligamus quæ nullam aspritudinem faciūt. Verum his contraria pharmaca, hoc est, discussoria pustulae expetūt, & pars quod intra corniformem est generatum. Recentia igitur & adhuc inflammata, pharmacis ex myrrha, thure, et croco sedantur, Vetusiora etiam ex discussorijs quid deponunt, quemadmodum item induratae inflammationes tunicarum. In his enim & per acres liquores hæ ipsa pharmaca in collyriorū formam redacta proficiunt, & quæ priuatim à Medicis in unctiles liquidæ compositiones appellantur, quales etiam in his qui suffusionis principiū sentiant, apparant. In pterygia

In pterygijs uero & sycosi repurgantia, ut dixi, pharmaca adhibentur, partim in collyriorum formam reducta, partim atida citra alicuius figuræ inductionem, in quibus aliqui etiā ex erodentibus pharmacis aliquid addiderūt. His uicina sunt quæ scabras in palpebris affectiones persanant, æque ob id pforica appellantur. Fortissima uero omnium sunt quæ antiquos callos consumunt, & quæ pterygia dicta curant, ex repurgantibus & erodentibus medicamentis conflata.

De ocularium pharmacorum uiribus. Cap. IIII

Porro quum iam omniū fere in oculis affectionū, pharmacotumq; eorundem secundū genus expositionē fecerim, relataq; sint à me pharmaca secundum genus mordacitatis expertia, qualia ex lotis metallicis cōponi dixi: melius fore mihi uidetur si etiā aliorū oculariū pharmacorū uites exponā. Ex hoc enim existimo ad cōponendum promptiores futuros, & de iam cōpositis felicius iudicaturos, eos qui in ipsis fuerint exercitati. Quū igitur mordacitatis maxime expertia sint pharmaca quæ dixi, Sintq; acrimonia omnis expertes tres liquores, quorū primus fœni graci decoctum erat, alter lac, tertius tenuis ouorum liquor, In hoc genere esse existimandū est, tum gummi, tum tragacanthæ: & nisi prædicta tria copiasq; & usu prompta & experta essent, possumus parum gummi aut tragacanthæ in multa aqua maceratum in eandē usum uelut illa assumeret: ita ut per ipsa in medica cote collyria tereremus, & per sola etiā infusa serosos in affectus oculis generatos humores elueremus. Sed tamen etiā nūc ipsis circa omnia fere collyria utimur, paucissimis enim demptis, omnia postq; trita sunt, moderate his ipsis pharmacis madefacta excipiuntur. Vnum sanè hoc genus ocularium pharmacorū numeretur, in tribus liquoribus, tragacanthaq; ac gummi, & lotis metallicis cōtentum. Alterū uero genus eorum est quæ modicam habent mordacitatem, propterea quod quædā eis amixta sunt quæ parum adstringunt & extergent. Qualia pharmaca sunt rosæ & thus, rosas quidem paucam habētib; adstrictionē, thure uero modicā uim extergendi. Et quum thus mediocriter calida uel præditū existat, eam ob rem habet quid cōcoctiorum & quod dolorē sedat. Ex eodē genere cū ipso, quantū ad cōcoctionē & disculsiōnē attinet, cōsensus est crocus & myrrha: quæ inter se in eo differūt quod crocus moderate adstringat, myrrha uero citra adstrictionē nō in genere discutat & resiccat humiditates. Sūtq; sanè hæc uiribus præstiora thure, & ob id etiā maiore discutiendū uim habent: uerū exterioria uel carētia, ad ulcerum curationē thure inferiora existūt. Huius generis medicamentorū, concoctorum inquam & discussorū, Lyciū quoq; est & castoriū. neq; obscurū esse puto, Iudiciū lyciū à me dici, nō hoc quod apud nostros populos prowenit, proxime uero ad horū facultatē accedit sarcocolla dicta, quæ concoctoriū & discussoriū est medicamentū, atq; ipsa adhuc magis galbanū prædictas uires habet. Meliloti uero decoctū ad concoctoriā facultatē adsump sit etiā quid adstrictoriū, eiusdē fere generis cū croco existēs. Inijcitur etiā in oculares cōpositiones lapis Hamatites appellatus, humores resiccandi uim habens, uelut & Cadmia. Mirius autē pharmacum lapis ipse q̃ Cadmia existit, utpote ex humida substantia, non terrestri, uelut Cadmia, generationē adeptus. Hanc enim eius naturā indicat solutio, quæ fit in medica cote, quum per attritionem cum liquore quopiam in succum resoluitur. Quin & quum solus per se citra liquoris alicuius affusionem teritur, nō in terrea fragmenta dissoluitur uelut Cadmia, sed in æqualium partium & cohærens corpus. Consimilis ei est & lapis Schistus appellatus, sed fortiorem facultatem habet. Quod uero stibium appellatur illotū quidem fortē ex se ostendat ad stringēdi facultatem: lotū uero exoluitur, ut prope ad mordacitatis expertum uim

uim accedat. Vehementē autem exterioriā facultatem res uisum habet, itemq; squama eius & flos, Neque minus efficax, sed minus mordacitatis expers chalcitis uita est. Quod si lauentur talia pharmaca, exterioria quidē adhuc manent, tanto autem efficacia imbecilliora, quantum mordacitatis magis expertia fiunt. Huius generis sunt etiam Misy & Aerugo, fortissima pharmaca his quæ sycosi & callis cōueniunt ammixta. Quidam uero ipsis etiā gallas iniecerūt, uehementē adstringens pharmacū; quemadmodum aliqui chalcanthum neutro genere appellatum, atq; etiam ut aliqui usurpant chalcantibus, tum masculino tum muliebri genere, quod ad adstringendū unā cum acredine uehementissimum inier hęc omnia pharmacum existit. Manifestum est autem quod multo moderatius redditur uisū & lotum, ad hanc sylvam pertinere etiam stomomatis squama. Arthuris cortex adstringit quidem & ipse non ingenerose, uerum prædictis omnibus longe inferior est. Atqui & Misy ipsum tum ad easdem affectiones, tum amplius ad scabras palpebras quidam in collyria miscuerunt. Quandoquidem uero et Mannæ quidam menionem fecerunt, & uidetur aliquibus nihil à thure nro ac leuigato differre, Cognosse operapretium est, quod Mannam proprie appellant id, quod excussum est à thure circa magna onera confrecto, Auferuntur enim simul ab ipso fragmenta quædam parua corticis Thuris, quare à thure differt tale pharmacum in hoc quod parum quid adstrictoriū adsumpsit. Quæcumque igitur ex adstringētib; multā terreā compagem habent, aspritudines & sycoseis ac callos consumunt. Cæterum quæ ex succorū genere sunt, uelut omphacium & hypocisthis, eluuntur facile in subliptionibus diffuentia simul cum la chrymis. Ex hoc genere est & glaucium & acaciā. Citra mordacitatem uero extergit cerui cornu uisum, uelut etiam caprarum, Dictum est autem & thius ex tali genere esse, uerum hoc uelut dictum est, omnino exigua participat extergendi facultate, doloris sedatiuum & concoctoriū existens. Cornua uero prædictorum animalū extergendi quidem uim habent, sed neq; dolorem sedant, neq; concoctoria facultate prædita sunt, frigidi nimirum & siccī temperamentī existentia. Habet autem & quod Armenium uocatur, extergendi uim, quemadmodum & atramentum Indicum appellatum, & ob id sanē ulceribus inflammatorie carentibus citra molestiam adhibetur, Mixta uero quodammodo facultatis est aloë, uelut etiam rosa. Habet enim quid in se amarum, quod extergendi à natura aptitudinem habet: inest autem ei etiam quid adstrictorium, ut committat & ad cicatricem ulcera perducatur.

Quæ ad scabras affectiones conueniant.

EX pharmacorū ad scabras in palpebris affectiones conuenientū numero, sunt sales ammoniaci, & lapis Alius tum ipse, tum flos ipsius, & quod pſoricum appellatur, non simplex, neq; sponte naturæ productū, sed præparationis modū quendam habens, quem etiam Dioscorides cōscripsit, & alij fere omnes, qui de Medicā materia commentati sunt. Ammiscetur his & misy uisum, & sandarachia, & quod à uetērib; Græcis Arrhenicum, nostro uero æuo Arsenicum appellatur. Ex medicamentis uero aromaticis cassia, & malabathi folium, quin & amomum & cinamomum quidam ocularibus compositionibus ammicuerunt, quum discussoriam quidem uim habeat cinamomum, reliqua uero etiam adstringendi facultate participant. In cōmuni porro de omnibus repurgantibus siue extergentibus & rypicis à Græcis appellatis, medicamentis id nosse oportet, tum eis quæ moderata sunt, tum his quæ sycoseis & callos cōsumunt, quod hęc omnia etiam ad cicatrices crassas conueniant, Attenuant enim ipsarū crassitudinem, & substantiam superficiēi deradunt ac remouent.

Quæ

Quæ induratis auxiliantur.

Compositiones quæ ad induratas oculorum tunicas conueniunt, ex succis constant & ammoniaco thymiamate, quemadmodum etiam antea dixi, Miscentur autem eis moderatiora quædam, quæ uiribus eorum tamen non oblucentur, myrrha uidelicet & thus, & galbanum, aliaque consimilia.

Quæ suffusis conueniant.

Ad suffusos uero quidam Medici liquida pharmaca composuerunt. Ac prima serè omnium compositionum est quæ ex fœniculi succo, & hyænz felle, ac melle Attico constat: quidam uero etiam caprinum sel addiderunt. Verum postea alius aliud sel ammisit, alius galli, alius uiperæ, alius testudinis mariniæ, alius callionymi piscis. Nunc uero in pretio est pharmacum ex felle scarorum. Quemadmodum & quod ex myrrha stacte constat. Promissiones itaque omnium horum pharmacorum magnæ sunt. Verum effectus aliquando nullus, aliquando ualde exiguus.

De Aridis medicamentis oculis conducentibus. Cap. v

IX præscripta materie medicæ sylua composita sunt à Medicis pharmaca arida, quæ priuatim ab ipsis arida collyria appellantur, Quorum aliqua quidem callos & Sycoseis consumunt, excrecentem item iuxta nasi angulum carnem, encanthida appellatam, & pterygia quæ etiam ungues dicuntur. Aliqua uero scabris palpebris conueniunt, & ad palpebrarum defluuia quæ Mithæ appellantur conducunt: uerum alia ab acerbis collyrijs facultatem habent, unde etiam à quibusdam medicis Apodacrytica, id est, delachrymatia & repulsoria appellantur, uelut etiam ipsa collyria. Ex his autem pleraque etiam obtuse cernentibus, siue per ætatē, siue crassitudinē, aut frigiditatem humorum in oculis, aut etiam flatus caligine nosi redundantia id contingat, non parum profunt. Aliqua deinde ex aridis pharmacis affectionē in oculis congregari prohibent, impediendo uidelicet influxiones humorum, ex quibus oculi ladi consueuerunt. Præstantissimum uero horum apparuit, & experientia iudicatum est quod ego composui, & ob id apud multos in usu est, ac serè per omnes gentes, quibus imperat Romani. Ac primum sanè ipsius compositionē scribam, quā præstantius putem esse, nullis omnino affectionibus corripit, quæ eas quæ iam præoccuparunt optime sanare. Quando uero etiam Asclepiades plurimamque & optimam tum aridorum, tum liquidorum collyriorum conscripsit syluam, ab aridis primum initio factis: & ego sanè mihi recte facturus uideor, si consimili scribendi ordine utar. Quare ubi meum aridum descripsero, deinceps omnia quæ Asclepiades habet in primo externorum quem Marcellus inscribit, iuxta ipsius ordinem subiungam. Et post hæc cataplasmata oculis accommoda, agglutinatoriaque & inunctilia pharmaca ab Asclepiade descripta adijciam. Præstabilius enim mihi uidentur & istorum ordinem in scribendo seruare, atque ita ad collyria ac liquida pharmaca transire, omnibus appositis, uelut Asclepiades ipse recensuit, illius ipsius uerbis.

Pharmacum Aridum ad tuendam oculorum ualitudinem à me compositum.

Vtilissimum sanis oculis præseruatiuum ego composui pharmacum, quod omnes iam in usu habent. Vritur lapis phrygius in minutas partes confractus, ut maior tamen sit nucē quæ pondica à quibusdam uocatur, ab alijs nux parua. Modus urendi idē qui in alijs est, lapide in ollula noua coiecto, deindeque ollula forinsecus luto obturata, operculum perforatum uel in solo uertice, uel quod melius est, etiam circa alias plures partes imponimus, quo per ipsa foramina fuliginosæ & fumosæ eorum quæ utuntur exhalationes facilius efferantur. Postquam uero totus lapis ignitus factus fuerit, tunc sanè ollulam in purum quoddam uasculum euacuare oportet, buryrumque infundere non uetustum, & circumagitare usque lapidis partes, donec omnes exinguant, atque ita cessare, & sic rursus easdem in ollulam coiectas urere, rursusque pru-

nis cādefactis ab igne ollulam imponēdo, ut nihil fumosum in se habeant: uentilatione etiā eadē excitare cōuenit, quo citius uisio perficiatur. Deinde quū iam igniti facti fuerint lapides, & nulla amplius fuligo effertur, rursus eosdem eximere oportet, & uino phalerno extinguere, aut aliquo suluo & odorato, uelut est Tmolites, Aruistūq; & Lesbū. Deinde rursus in ollulam cōiectos, tertio urere, & postquam ignitus fuerit lapis, rursus extinguere melle Attico nō multo. Reddetur enim pharmacum non aridum, sed uiscositate aliqua præditum. Cæterum pluribus diebus trita & præleuigata in prōptu habere oportet, ita ut in tenuissimum puluerem redacta sint, subscripta. æris usti unciam I. quod est drachmas VIII. piperis albi tantundem, folij malabathri tantundem, stibij hemiolum quod est drach. XII. his ammisce lapidis usti lib. I. Et postquam omnia probe fuerint leuigata, & reponere medicamentū uelis, adijce opobalsami Syriaci sesquiunciam quod totum drach. XII. facit. Sit uero opobalsamum tenue & pellucens compage, non crassum quemadmodum solet in uasis circa fundum considerare ac spissari: quod enim ita crassum est, ariditatem pharmaci impedit. Porro usus ipsius ad solas palpebras competit cum specillo inducti, citra tunicarū ipsius oculi contactum. Ut plurimum itaq; sufficit circa solam infernam palpebram specillum inducere. Nihil uero uetat etiam supernam palpebrā similiter illinere, ubi presertim pharmaco opus fuerit, hoc est, ubi iam manifeste perturbationem quandam perceperit oculus: non tamen expectare conuenit donec id fiat. Versū præoccurpare oportet circa primum affectionis sensum, in omni tēpore diei, etiam si quis biberit & coenauerit. Et planē frequens eius competit usus, cum cautione, ut dixi, ne tunicæ oculorum eo contingantur. Oportet autē & cum cui inducitur pharmacum palpebras exertas & extētas exhibere, & quum inungitur nequaquam cum ipsis nictare. Hoc sanē pharmacum à me cōpositum est, nō permittens eum qui ipso recte utatur oculorum lippitudine apprehendi. Deinceps uero quæ ad affectiones commoda sunt medicamenta cōscribam, initio ab his quæ Asclepiades scripsit facto.

Arida pharmaca ad oculos ab Asclepiade conscripta. Cap. VI

IN primo libro pharmacorum externorum quæ Marcellæ inscribit, in hunc modum hæc uerba scribuntur, Aridū ex psoricis Heraclidæ, ad circumfrosos oculorū angulos. Spodij cyprij, drach. III. omphacij aridi drach. II. nardi obol. III. piperis fricti grana XV. tritis utere. Psoricum Aelij. Cadmiæ drach. III. æris usti drach. II. cum aceto in sole terito & resiccato, rursusq; leuigatis & repositis utitor. Aliud, Cadmiæ drach. I. æris usti drach. I. nardi indicæ drachmā. I. piperis fricti obol. II. tritis utere ut pharmaco uehementer commodo. Aliud, Chalcitidis partes II. cadmiæ partem I. trita & cribrata terito in sole, adiecto uino sufficienti, deinde resiccato, & leuigatis repositis utitor. Ex libris Philoxeni aridū Achariston. Cadmiæ drach. II. chalcitidis drach. VIII. aloes obol. II. æruginis obol. II. piperis grana. X. florum rosarum drach. I. tritis utitor. Eiusdem ad lippitudinē siccam & sycosin, putrescentiā, & excrecentem carnem. Cadmiæ drach. X. chalcitidis drach. VIII. piperis grana XV. nardi celticæ drach. I. Cadmiā & chalcitidem cum uino terito, atq; ubi exaruerint nardū & piper inijcito, ac in puluillum redactis utitor. Aliud, Cadmiæ drach. XX. chalcitidis drach. XI. nardi indicæ drach. II. myrrhæ torrefactæ drach. II. piperis grana XXXV. cum aceto acerrimo apparato. Capitonis ad lippitudines siccas, et oculos humectos, ac angulos circufrosos & palpebras ficosas. Cadmiā cypriam ad potentiam magnitudinem confringimus, deinde Attico melle subactam in uasculum sicile cōijci-

mus, huc usq; ore obturato, ac luto circūlito, foramen iuxta mediū oris facimus, quo id quod assatur inde transpiret. Ipsum uero uasculum intra prunas erectum statuentes succēsis prunis urimus, atq; ubi exiguitum fuerit, exhalationum per foramen elatarum animaduersionem habemus, quæ si nigriores efferantur, amplius urimus. Quū uero albidiores apparuerint, assationem sufficientem factam puramus, ablatoq; uasculo & dempto operculo, cadmiā uino Italico exstinguimus, & in pilam translata m terimus, resiccata mq; ad pharmaci cōfectionem reponimus. Quæ hoc modo habet, Cadmiæ drach. viii. aeris usti drach. viii. stibij drach. viii. tritis & ablatiis utere, cum specilli extremo palpebris mane & uespe re ex eo sublitis.

Aliud, Cadmiæ uistæ uelut prædictum est drach. viii. aeris usti drach. viii. stibij drach. iiii. armenij drach. ii. tritis & repositis utitor. Nos cadmiā & reliqua adipe uipere excepta assauimus, deinde uino extinctis ac tritis usti sumus.

Pharmaca ex lapide Hamatitæ ad scabras palpebras accommodata. Capitonis ophthalmici, Cadmiæ cypriæ drach. xxiiii. lapidis hamatitæ drach. vi. in alio exemplari drach. xvi. aeris usti drach. xxiiii. arida ad potentæ magnitudinem contunduntur, melleq; excepta uelut prædictum est assantur ac uino extinguuntur, deinde resiccata leuigantur. Vñus demonstratus est.

Aliud, Cadmiæ drach. xx. aeris usti drach. x. lapidis hamatitæ drach. x. tomentorum purpuræ laconicæ drach. viii. melle excepta & uista composito ut dictum est.

Sofandri ad palpebrarum defluia, & inueteratas affectiones, facit & ad excresecētem iuxta nasi angulum carnem.

Cadmiæ, stibij, chalcitidis crudæ, misyos peregrini, singulorum drach. viii. confusa & melle excepta uelut dictum est assato, deinde uino extincta tritaq; & resiccata reposito, utitor.

Aliud, Chalcitidis crudæ cadmiæ, stibij, misyos peregrini, singulorū drach. viii. nardi indicæ drach. ii. croci torrefacti drach. ii. piperis drach. unam. Metallica melle subiguntur ac uruntur ut dictū est, deinde uino extinguunt & teruntur, adijciturq; his nardus & crocus torrefactus, itemq; piper, postea uero simul leuigatis ac repositis utimur.

Pharmacū calliblepharon exornandis palpebris accommodatum. Facit & ad inueteratas lippitudines. Subij usti ac uino extincti drach. xvi. plumbi usti & loti drach. viii. fuliginis thuris, spicæ nardi, myrrhæ torrefactæ, croci, squamæ aeris, singulorū drach. i. Omnibus tritis ac repositis utitor.

Aliud ex croco, Croci unc. i. glaucij unc. i. sarco collæ unc. i. Lego etiam opij unc. i. adiect. Aliud Severianum, Cadmiæ uistæ & lotæ sextantem, salis ammoniaci, piperis albi utriusq; sextantem. Solij drach. ii. probe tritis utitor.

Aliud pueris maxime cōmodum, Stibij drach. xvi. plumbi drach. viii. squamæ aeris drach. i. croci drach. i. florum rosarū drach. i. myrrhæ drach. i. nardi indicæ, thuris masculi, piperis albi, singulorū drach. i. palmularum officula decem, omnia in sigulini uas cōiecta diligenter assato, Deinde in pilam translatis ac tritis opobalsami cochlearia duo adijcto, conuassato, resiccato, & utitor.

Aridū Philoxeni ad pruriginosos ac circūrosos augulos, Facit & ad obtusum usum, Cadmiæ drach. iiii. salis ammoniaci drachmas ii. piperis albi drach. i. tritis utere. Ego hæc ita adparo, Cadmiæ drach. viii. croci drach. ii. piperis albi drach. unā. salis ammoniaci drach. ii. nardi indicæ drach. i. tritis utitor.

Liquidæ oculares compositiones ad ficosas eminentias, ac omnem extuberantiam carnis facit & ad carnem circa nasi angulum excre-

scētem, & ad incipientem lippitudinem. Cap. viii

Compositio qua usus est Philippus in Cæsaria, Misyos assati drach. viii. myrrhæ drach. iiii. cadmiæ drach. viii. croci drach. ii. salis ammoniaci drach. ii. nardi indicæ, piperis albi utriusq; drach. i. mellis Attici

k cyathum



cyathum unum. Aliud, Miffios affati drach. vi. atramenti futorij drach. iij. myrrhæ drach. iij. aris ufti drach. i. mellis atticij cyath. i. Panchrestos Erasilfrati. Ad afpretudines ac omnes lippitudines, auresq; purulentas, & ad ulcera ægre recipiētia cicatricē, & ad nomas, hoc est, ulcera serpentia oris. Aeris ufti drach. ii. myrrhæ drach. i. piperis obolos ii. mifyos affati drach. i. croci obolos iii. uini chij heminam unam, paffi cretici hemina dimidium, Arida terito affuso uino, atq; ubi imbibitum fuerit uinum, affunde etiam paffum, & conquaffata in æreum uafculum transferto, ac ad lentum ignem coquito, deinde in pyxide æream reponito. Ad callos & omnem eminentiā. Aeris ufti drach. ii. mifyos ufti drach. i. myrrhæ drach. i. croci drach. i. omphacij drach. i. uini chij cyathos ii. mellis atticij libram dimidiam. utitor. Philoxeni liquida uifum

exacuēs, cicatrices & callos exterit. Ammoniaci thymiamatis drach. iij. æruginis drach. ii. uino diluta & contrita melle attico excipito. Aliud, Ammoniaci thymiamatis drach. xii. æruginis drach. vi. myrrhæ drach. ii. composito ut dictum est.

Aliud Phædri Rhinion, id est limula. Ammoniaci thymiamatis drach. iij. æruginis drach. i. alcyonij torrefacti drach. i. floris lapidis Afij obolos iii. componito ac utitor ut dictum est.

Aliud, Ammoniaci thymiamatis drach. viii. æruginis drach. viii. floris lapidis Afij drach. ii. obol. ii. alcyonij drach. i. obol. ii. opij fefquidrachmam, myrrhæ fefquidrachmam, composito ac utitor ut dictum est.

Aegyptia ad callos & albugines, aufert etiam pelliculas confestim. Aeruginis Corinthiæ drach. vi. ammoniaci thymiamatis drach. vi. obol. iij. falis foſſilis drach. iij. medullæ colocynthidis drach. iij. fellis taurini drach. ii. nitri nigri fefquidrachmam, piperis albi grana xl. mellis atticij cyathos vi. componito ut dictum est, & in pyxide ſilicea reposito utitor.

Alia Aegyptia ad callos & albugines, ac inueteratas affectiones. Aeruginis drach. vi. ammoniaci thymiamatis drach. vi. medullæ colocynthidis drach. iij. fellis taurini drach. ii. nitri nigri drach. ii. excipe mellis atticij cyathis vi. & utere.

Compoſitio exacuens uifum, faciens & ad glaucedinem. Antonij Muſæ.

Fellis perdicis fylueſtris partem unam. In alio exemplari, fucci herbæ perdicij, Aliqui fucci centaureæ partes iij. mellis atticij tantundem.

Aliud, Felis gallinæ ueteris partem unam. fucci centaureæ partem unam. mellis atticij partes tres. facit ad glaucedines.

Compoſitio Largi exacuens uifum. Succij foeniculi radicis partem unā. mellis tantundem. Reponito in pyxidem æream ac utitor.

Aliud, Succij radicis foeniculi partem unam. fucci chelidoniz tantundem. mellis atticij tantundem.

Aelij Galli ad ſuffuſiones. Fellis taurini drachmas ii. croci drach. ii. opobalfami drach. ii. contuſis utere.

Caſſij ad ſuffuſiones. Fel taurinum in æream pyxidem euacuatam per dies decem ſinito, deinde myrrhæ; croci, utriuſque drach. ii. opopanacis drach. ii. opobalfami drach. ii. piperis grana xii. mellis atticij duplum omnium accipito, omniaq; cum ſelle miſceto,

& in æreo uafe coquito, deinde in ærea pyxide repositis utitor.

Liquida Baſilis, hoc est regina, hanc reparatricē appellamus. Omphacij drachmas ii. myrrhæ drach. ii. fellis aquilæ drach. ii. opobalfami drach. ii. lachrymæ oleæ drach. ii. ammoniaci thymiamatis drach. i. fellis hyænæ drachmas ii. excipe melle.

Antonij Muſæ. Fellis hyænæ drach. i. fellis urſi drach. ii. opobalfami drach. ii. falis foſſilis drach. i. croci drach. unam. myrrhæ drach. i. mellis atticij cyathos ii. fucci foeniculi cyathos. ii.

Philoxeni. Fellis hyænæ ſefquidrachmā adipis uiperæ ſefquidrachmam, croci drach. i. omphacij drach. i. myrrhæ drachmæ dimidium, opobalfami drach. i. mellis atticij drach. vii.

Tincturæ albuginum. Gallam tritam ac leuigatam in prompto repositam seruato, usu uero expetente cum specilli nucleo calfactio adhibeto, deinde atramentum sutorium aqua dilutum admoüeto. Aliud, Malicorium tritum adhibeto, indeq; atramentum sutorium aqua dilutum admoüeto. Aliud, Misyos, atramenti sutorij, gallarum omphacinarum, singulorū æquales partes coniusas & cribratas reponito. Vfus uero tempore aridum adhibeto.

Ad glaucos oculos quo pupillæ nigræ reddantur. Malicorij dulcis succū infundito, deinde post temporis interititium hyoscyami florem cum uisno aut hyoscyami succo tritum instillato. Verum hæc oportuno tempore colligere & reponere conuenit. Aliud, Acaciæ fructum & gallarum parum quid diligenter trita fremij succo excipito, & ad mellis crassitudinē redigito. Deinde expressum per linteolum liquorem seruato ac uitior ut dictum est.

Ad pilos pungētes in palpebris enascentes, Trichiasin appellant Græci. Antonij Musæ. Fel auticulæ quæ cinædus appellatur, & aconiti dimidium eius, mixta reponito. Vfu uero exigente, euulso pilo locum ex pharmaco illinito. Aliud, Fel piscis pagri, & aconiti dimidium, cum squama ferri lota, a dipe subigito, atq; his amygdalini olei parum adiecto, & sanguinis uespertilionis quantum suffecerit. Deinde mixtis & repositis uitior ut dictum est.

Agglutinatoria pilorū. Heracidæ Tarentini. Cerae drach. i. picis drach. i. litho collæ drach. i. simul liquefacta reponito. Vfu uero postulante, specilli summum candefacito, & quod ex pharmaco dissoluto adhæserit adhibeto, eoq; pilos agglutinato. Aliud, Resinæ siccæ, picis siccæ utriusq; drach. i. sulphuris uiui drach. i. bituminis drach. unam. cerae drach. ii. liquefactis uitior.

Ad paruos instar hordei oblongos circa pilos palpebrarum abscissus, Crithas & Posthîas Græci appellant. Antonij Musæ.

Galbani partem unam cum modico nitro mixtam imposito, aut etiam misyos crudi parum ammisceto. Faciunt & ficus aridæ in uino mulso coctæ & tritæ, modico simul galbano contrito. Facit & farina hordeacea in uino mulso cocta ac trita, iudem modico galbano simul contrito.

Dionysij Milesij ad pilos palpebrarum pungentes. Leporem marinum in figulino nouo urito, & cinerem tritum ricinorum sanguine excipito, et reposito in cornea pyxi de uitior, euulsis antea pilis.

Aliud, Salamandræ uisæ cinerem, terrestriū herinaceorum felle excipito, ac uitior ut dictum est. Quidam castorio usi sunt cum melle mixto. Aut castorio & hirudinis uisæ cinere, Aut cicutæ semen tritum ac Thunnæ sanguine exceptum, præeuulsis pilis illeuerunt.

Ad crithas & chalazia, hoc est, instar grandinis in palpebris tubercula. Sagapeno cum aceto trito uitior. Aliud ad Aegylopos. Succus illecebræ, succus solani, utriusq; libræ dimidium. thuris drach. viii. mastiches quadrantem. galbanū libram dimidiam. Succos cum thure coquito, atq; ubi dissolutum fuerit galbanū inijceto: mastichen enim improbamus.

Aliud, Thuris drach. viii. ladanū drach. iiii. aluminis scissilis drach. iiii. myrrhæ drach. viii. ceræ drach. iiii. spumæ nistri drach. iiii. coaguli leporis drach. iiii. Cōfunditur hoc pharmacum & cum ungenti irini sece mollitur.

Cataplasmata in eodem libro primo externorū ab Asclepiade ad oculos descripta, itemq; agglutinatoria, & inunctilia.

Cataplasmata lippientium, ad doloris uexationes ac maximas Epiphoras, quibus usus est Heracidus Tarentinus. Rosarum uiridiū aut siccarum drach. iiii. croci drach. i. opij drach. unam. excipe melloti decocto aut passo.

Aliud, Rosarum, uolarum albarum, meliloti, capium papaueris, singulorum drach. ii. croci drach. unam. opij drach. unam. myrrhæ drachmam unā. oui assati

uitellum

uitellum, tritis & passo subactis utere ut dictum est. Illitiones ad dolores, quibus usus est Glaucus. Aloes, lycij indicij, rosarū uiridium, croci, opij, myrrhæ, singulorum æquales partes uino subactas in pastillos formato, eosq; in umbra siccato, Vsu uero exigente passo dilutos oculis illinito, itemq; fronti ac temporibus. Philoxeni ad fluxionem multam & dolores. Foliorū rosarum recentium drach. II. seminis hyoscyami drach. VII. thuris drachmas III. myrrhæ drach. IIII. farinæ polenrarum acetabulum, oui affati unus luteū, succi mandragoræ drach. IIII. croci drach. II. opij drach. IIII. uini austeri quantum sufficit. In pastillos redigito ac utitor ueluti dictum est.

Illitio Anthera eadem hora utans. Croci drach. IIII. thuris drach. II. cinnabaris drach. IIII. gummi drach. II. uino excipito. Vsu tempore terito & ad solidum modicum mellis adijcito. Aliud Lychnium inscriptum. Croci drach. I. thuris drach. II. opij drach. II. gummi drach. II. cinnabaris drach. II. aqua pluuiæ excipito. Alij habent, croci rosas specie referentis drach. IIII. cinnabaris drach. II. myrrhæ, opij, utriusq; drach. II. aqua pluuiæ excipito.

Illitiones mordaces quæ euestigio fluxionem cohibent, faciunt & ad lippitudinem scabram ac aridam. Aeris uisti, drach. IIII. croci drach. IIII. piperis albi drach. II. opij drach. II. gummi drach. IIII. cum aqua pluuiæ forinfecus illinuntur, Relidit hoc pharmacum maximas Epiphoras. Cæterum cauere oportet ne quid ex eo in oculis præterlabatur. Aliud philoginum, hoc est flammæum inscriptum. Aeris uisti & loti drach. XII. croci drach. VI. piperis albi drach. IIII. myrrhæ drach. III. opij drach. III. gummi drach. XII. uino Amineo excipito.

Agglutinatoria quæ fluxiones cohibent. Polinis partem unam, myrrhæ partem unam, mannæ thuris partem I. candido oui excipe, deinde in linteolum impacta impone temporibus ac fronti. Aliud, Seminis hyoscyami drach. II. opij drach. I. croci drach. I. pollinis drach. IIII. ouorum affatorum uitellos duos, castorij drach. I. omnibus simul coactis utitor.

Collyrium ad Epiphorā, & dolores, ac fluxionem multam, quo Moschio famularis usus est. Glaucij drach. XVI. sarcocollæ drach. VII. croci drach. IIII. gummi drach. II. tragacanthæ drach. II. succi mandragoræ drach. II. opij drach. I. aqua pluuiæ excipito ac utitor cum ouo. Heronis ophthalmici psittacus, ad dolores & fluxum largum, euestigio somnum inducit. Glaucij drach. XVI. croci drach. VII. sarcocollæ drach. VIII. opij drach. IIII. succi mandragoræ drach. II. tragacanthæ drach. VIII. aqua pluuiæ excipe.

Ad prædictas affectiones Neapolitæ. Glaucij drach. XLVIII. sarcocollæ drach. XXIII. croci drach. XXIII. lapidis hæmatitæ drach. XII. opij drach. XIX. succi mādragoræ drach. VIII. gummi drach. XVI. tragacanthæ drach. XII. excipe aqua pluuiæ.

Sergij ophthalmici Babylonij. Glaucij drach. XXIII. sarcocollæ drachmas XVI. croci drach. XII. opij drach. IIII. lapidis hæmatitæ drach. VI. gummi drach. XII. excipito aqua pluuiæ. Illinito per unum atq; alterum diem, atq; ubi affectio non soluitur ad insequentes illitiones transimus.

Aliud diasmyrnum glaucidanum inscriptum. Glaucij drach. XLVIII. sarcocollæ drach. XLVIII. croci drach. XXIII. opij drach. VI. myrrhæ drach. VI. hæmatitæ drach. VI. tragacanthæ drach, XLVIII. aqua pluuiæ excipe ac utere cum ouo.

Diasmyrnum ex hæmatite. Glaucij drach. LXIII. sarcocollæ drach. XXXII. croci drachmas XII. opij drach. VIII. myrrhæ drach. VI. hæmatitæ drach. XVI. tragacanthæ drach. XLVIII. gummi drach. XVI. In alio exemplari drach. XLVIII. Excipiuntur aqua pluuiæ, usus eius est cum ouo.

Phosphorus ad doloris uexationem, omnemq; inflammationē & intensas Epiphoras. Glaucij drach. XXIII. sarcocollæ drach. VIII. croci, opij, utriusq; drach. VIII. myrrhæ drach. VIII. misyos uisti, drach. VIII. gummi

gummi drach. XIX. excipe aqua pluua, utere cum ouo. Euchrum excellen-
tis & mirabilis efficaciz. Glaucij drach. XX. sarcocollæ drach. VII. croci drach.
VII. myrrhæ drach. VII. opij drach. VII. misyos usti drach. VII. gummi drach. XII.
excipe aqua pluualis, utere cum ouo.

Pharmacum ex succis, dolorem fe-
dans, facit ad omnem doloris uexationem, somnum euestigio inducit. Glau-
cij drach. XLVIII. sarcocollæ, tragacanthæ utriusq; drach. XVI. croci drach. VIII.
opij drach. III. succi rosarum drach. III. lycij indicij drach. III. hyoscyami drach.
III. succi mandragoræ drach. III. gummi drach. VII. Excipiuntur meliloti deco-
cto: componuntur autem hoc modo, Meliloti libram unā. & aquæ pluualis her-
minas XII. ad tertias coquito, & excolato liquore ad pharmaci compositionem
utor.

Aliud, Glaucij drach. XLVIII. sarcocollæ drach. XXIII. croci
drach. XXIII. opij drach. XII. lycij indicij drach. XII. succi hyoscyami drach. XII.
succu cicutzæ drach. XII. rosarum uiridium resectis extremitatibus drach. XLVIII.
gummi drach. XXVIII. aqua pluualis excipe, utere cum ouo.

Pharmacum
Phæon, id est fuscum inscriptum, accommodatum ad doloris molestias. Cad-
miæ drach. XII. aut XVI. æris usti drach. VI. myrrhæ drach. III. opij drach. III. ac-
ciæ drach. VII. excipito aqua pluua uelut demonstratum est.

Aliud Phæoni,
Ad omnem fluxum & omnem lippitudinem. In alio padicon, id est puerile legi-
tur. Aëris usti drach. XII. cadmiæ drach. XXXII. gummi drach. XXXII. ac-
ciæ drach. XXXII. myrrhæ drach. III. opij drach. III. aqua pluua excipe.

Aliud ex libris Phloxeni. Spodij cyprij, drach. XII. æris usti drach. III. opij,
myrrhæ, utriusq; drach. III. acaciæ, gummi, utriusq; drach. VII. aqua pluualis ex-
cepta cum ouo in usum ueniunt, ut dictum est.

Pharmacum Berytium in-
scriptum, quo usus est Berytius ad maximas epiphoras. euestigio auxiliatur.
Aëris usti & loti drach. XVI. acaciæ drach. XVI. spodij pompholygis drach. XVI.
opij drach. XVI. gummi drach. XVI. croci drach. XII. myrrhæ drach. II. aqua plu-
uali excipe, utere cum ouo. Oportet hoc assidue infundere.

Aliud ad eas-
dem affectiones. Spodij pompholygis drach. XVI. opij drach. XII. myrrhæ
drach. XII. gummi drach. XVI. æris usti & loti drach. XVI. aqua excipito pluua
II. ac utitor cum ouo.

Pharmacū Acharistum inscriptum, ad maximas epi-
phoras huius solius usu Medici Aegyptij feliciter medicantur, in agrestioribus
præsertim corporibus. Cadmiæ drach. XVI. acaciæ drach. VIII. æris usti & lo-
ti drach. VIII. opij drach. III. fructus ericæ drach. III. myrrhæ drach. III. gummi
drach. XVI. aqua excipito, ac utitor cum lacte muliebri, Temperatura media est,

ubi uero circa oculos affectio sit, ab hoc collyrio abstinere oportet. Quo
ipse usus sum sic habet. Cadmiæ drach. XVI. fructus ericæ drach. II. æris usti
drach. III. opij drach. II. myrrhæ drach. unam. acaciæ drach. VI. gūmi drach. VIII.
aqua excipito, usus indicatus est.

Aliud, Cadmiæ drach. VI. fructus eri-
cæ drach. III. opij drach. VI. æris usti & loti drach. III. gummi drach. XX. compo-
nito ac utitor ut dictum est.

Nectarium Marci, facit ad incipientem lippitu-
dinem, facit ad illationem fluxus tenuis, ad chemoseis, tumores, pellicularū emi-
nencias, & ferè ad omnem lippitudinem facit, & ad palpebras crassas. Oportet
autem præ omnibus fomentum adhibere, deinde ipsum infundere, in principio
quidem fluxionis cum aquoso uel liquore: ubi uero successerit hæc curatio, pau-
latim hanc temperaturam extendere & augere oportet. Cæterum ad palpebras
asperas collyrio cum aqua utimur, apud alios Sphragis appellatur. Aëris usti
& loti drach. III. cadmiæ drach. III. croci drach. II. opij drach. II. gummi drach.
VI. aqua excipe ac utere ut indicatum est.

Sergij ophthalmici Monoheme-
rum inscriptum, hoc est una die efficaciam suam comonsirans. Cadmiæ uste
k 3 & lotæ

& lotæ drach. iiii. spodij pompholygis loti drach. iiii. æris usti & loti drachmas iiii. croci drachmas ii. acaciæ drach. vi. gummi drachmas vi. aqua pluuiali excipe, ac utere cum ouo. Temperatura est aquosa. Postquam lachrymæ proleciæ fuerint, candidum oui infundere oportet, & rursum sublinere. Vbi uero morsus consequeretur, fomentum adhibendum est, rursumq; oui candidum infundendum: postea uero collyrio nigro inscripto illinito.

Sphragis Neapolitæ. Cadmiæ drachmas viii. æris usti & loti drach. viii. acaciæ drachmas viii. spodij cyprij drachmas iiii. croci drach. iiii. opij drach. iiii. gummi drach. xii. aqua excipe usus indicatus est.

Paccijs Sphragis. Cadmiæ ustæ & lacte caprino siue muliebri extinctæ ac lotæ, & in umbra siccatæ drach. x. æris usti & loti drach. x. acaciæ drach. x. opij drach. vi. croci drach. vi. gummi drach. xv. aqua pluuiali excipito. Zosii sphragis cum Paccijs concordat. Philotæ Aphroditarium inscriptum. Cadmiæ lotæ drach. xxiiii. acaciæ drach. xxvi. æris usti & loti drach. xii. croci drach. xii. opij drach. xii. spodij cyprij loti drach. xii. gūmi drach. xlvi. excipe aqua pluuiali, ac utere cum ouo assidue infundendo. Post curationem uero lauari iubeto, hoc assidue usus sum in maximis epiphoris.

Aliud Neapolitæ. Facit ad maximas epiphoras, maxime in his qui ægre riganur & subalbicant circa inflammationes, ut simile quiddam chemosi appareat. Hoc nos uisum sumus, post illisiones ægris lauare iussis. Lapidis schisti drachmas viii. thuris drach. vii. æris usti & loti drach. vii. opij drach. viii. myrrhæ drach. iiii. gummi drach. viii. excipe uino ac utere cum ouo. Temperamentum est aquosum. Sæpe uero hoc infundere oportet, & post interuallum ab illusione lauari iubere.

Fusei Olympionico inscriptū. Facit ad maximos dolores, facit & ad chemosis & omnino ex accommodatissimis collyrijs est: nam statim liberat. Cadmiæ ustæ & lotæ drachmas viii. acaciæ drach. viii. stibij usti & loti drachmas viii. aloes indicæ drach. viii. croci drach. iiii. myrrhæ drach. iiii. opij drachmas iiii. gummi drachmas viii. aqua excipe ac utere cum ouo. Temperamentum est crassum. Ego etiam pompholygis ac thuris utriusq; drach. iiii. adieci.

Aliud Zosimo inscriptum odorum. Facit ad dolores & recentes affectiones. Cadmiæ ustæ & lotæ uino Italico, hoc est extinctæ, drachmas viii. aloes drach. viii. stibij drachmas viii. æris usti & loti drachmas viii. aut ii. croci drachmas ii. myrrhæ drachmam unam. nardi indicæ drachmam unam. opij drachmā unā. acaciæ drachmas xix. gummi drach. xii. aqua pluuiali excipe.

Hermiæ ophthalmici Lutron, id est balneum appellatum. Ad maximos dolores eadem die ad summū auxilians, facit & ad inueteratas lippitudines. Aloes drach. viii. æris usti & loti drach. xvi. opij drach. xvi. myrrhæ drach. xii. croci drach. viii. cadmiæ drach. iiii. thuris drach. iiii. gummi drach. xvi. uino Mendessio excipe, ac utere cum ouo. Temperatura est aquosa. Oportet hoc per interualla trium aut quatuor horarum infundere, & usq; ad mali depulsionem sinere, atque tunc lauari iubere.

Theodotion Phlactanum, Harpocratium inscriptum. Ad maximas epiphoras & dolores, liberat citra uenæ sectionem. Sueci acaciæ drach. xxiiii. cadmiæ drach. viii. æris usti & loti drachmas viii. stibij drach. xvi. aloes drach. iiii. croci drach. iiii. myrrhæ drach. ii. lycij indici drach. ii. castorij drach. i. opij drach. ii. gummi drach. xxiiii. aqua pluuiali excipe, ac utere cum ouo. Temperatura est crassior. Hoc collyriū tumorem palpebris inducit. Scylaciū pharmacū accommodatum eadē die curans. Euestigio soluit inflammationes. Stibij drach. xl. acaciæ drach. xl. cadmiæ drachmas xvi. æris usti & loti drach. xiiii. cerusæ drach. viii. myrrhæ drach. iiii. nardi indicæ drachmas

drachmas IIII. croci drachmas II. lycij indicij drach. IIII. castorij drach. II. aloes drachmas II. opij drach. II. chalcitidis assae drach. II. gummi drachmas II. excipe rosarum decoctio ac utere cum ouo. Temperatura est crassior.

Neapolitæ Phanton, id est lampas seu facula. Ad maximas epiphoras & doloris molestias, facit & ad affectiones. Cadmiæ lotæ drachmas VIII. acaciæ drachmas VIII. aris usti & loti drachmas VI. stibij loti drachmas XX. plummy thij drachmas VI. myrrhæ drach. II. aloes drachmas II. nardi celicæ sesquidrachmam. opij sesquidrachmam. croci drachmam unam. castorij drachmæ dimidiâ. gummi drachmas XX. aqua pluuiæ excipe, utere illineñdo.

Aliud Phanton Serapiacum inscriptum. Acaciæ drach. XL. stibij drach. XL. cadmiæ drach. XVI. aris usti & loti drach. XII. aloes drach. III. myrrhæ drach. IIII. cerusæ drachmas XII. opij drach. II. croci drach. II. nardi indicæ sesquidrachmam. gummi drachmas XXV. aqua pluuiali excepta illineño.

Malabathrinum nostrum, Facit ad doloris uexationes, & ad affectiones in declinatione. Cadmiæ drachmas XVI. acaciæ drach. XL. aris usti & loti drach. XIII. opij drachmas II. lycij indicij drach. II. myrrhæ drach. IIII. malabathri drach. II. nardi indicæ drachmas. II. castorij drach. II. aloes drachmas II. cerusæ drach. VIII. stibij loti drachmas VIII. gummi drachmas XL. aqua excipe & utere cum ouo in principio affectionum, & in declinatione facta ab illatione pharmaci panchrestii appellati, descriptum hoc inter mordacia collyria habetur.

Aliud Philadelphium inscriptum. Facit ad declinationes inflammationum, & ulcera sordida, & pustularum eruptiones, euestigio auxiliatur. Stibij usti & loti drach. XX. plumbi usti & loti drachmas X. cadmiæ drach. VIII. aris usti & loti drach. III. aloes drach. III. lycij indicij drach. II. & dimidiâ. myrrhæ drach. II. & dimidiâ. nardi indicæ drachmas II. croci drach. II. castorij drach. unâ. opij drach. I. gūmi drachmas VIII. aquam & ad exceptionem candidum ouorum. X.

Collyrium album, ad epiphoras & affectiones inscribitur Trypherum, id est delicatum. Cadmiæ lotæ drachmas XVI. cerusæ drachmas VIII. amyli drach. IIII. gummi drachmas IIII. tragacanthæ drachmas IIII. opij drachmas duas. excolpe aqua pluuiæ. Vtus est cum ouo.

Collyrium ex terra Samia Terennum inscriptum, ad epiphoras & affectiones. Cadmiæ lotæ drachmas XII. cerusæ drach. XII. terræ Samiæ drach. XII. opij drachmam unam. gummi drach. III. aqua excipe ac utere cum ouo.

Aliud dolorem sedans, ad fluxum omnis generis, ulcera, dolores, papulas & tubercula, prolapsus, chemoseis, & omnigenas affectiones. Cerusæ drach. V. III. terræ Samiæ drach. VIII. spodij pompholygis drach. XII. tragacanthæ drach. II. opij drach. II. gummi drach. III. aqua pluuiæ excipe ac utere cum ouo.

Aliud Diocleum inscriptum, ad doloris molestias, & epiphoras, ad suppuratos oculos, pustulas, ulcera. Hoc pharmacum delicatius existit. Tragacanthæ drach. VIII. gūmi drach. III. amyli drach. III. spodij pompholygis drach. XVI. cerusæ drach. VIII. opij torrefacti drach. II. aqua pluuiæ excepta admoue cū ouo.

Pharmacum ex thure. Accommodatum ad fluxiones & chemoseis. Cadmiæ drachmam unam. thuris drachmam unam. cerusæ drachmas XL. opij drachmas VI. gummi drachmas VI. aqua pluuiali excipito. Caeterum nos sic apparamus. Cadmiæ drachmas X. pompholygis drachmas X. thuris drachmas X. cerusæ drachmas XL. opij drachmas VI. gummi drachmas VI. aqua pluuiæ excepta admoue cum ouo.

Aliud Trypheron, id est delicatū inscriptū. Ad inustiones epicaumata Græcis dictas, pustulas, chemoseis, maxime in his qui uisulam mordacitatē perferre possunt

possunt. Cadmiæ lotæ drach. viii. amyli drach. viii. thuris drach. viii. cerusæ drach. xl. viii. opij drach. vi. gūmi drach. xvi. aqua pluuiæ excipe, usus indicatus est. Cygnus inscriptus Reginae, ad maximos dolores & affectiones.

Cadmiæ drach. xvi. cerusæ lotæ drach. viii. amyli drach. ii. tragacanthæ drach. ii. acaciæ drach. ii. opij drach. ii. gūmi drach. xii. excipe aqua pluuiali, & ad excipiendum adijce ouorum crudorū recentiss̃ candida iiii. Aërianum Diomedii inscriptum, collyrium accommodatum ad epiphoras, & ueteres affectiones itemq; recentes. Spodij pompholygis drach. viii. cerusæ drach. xx. aeruginis drach. iiii. myrrhæ drach. xiiii. thuris drach. iii. opij drach. iii. gummi drachmas viii. excipe aqua pluuiali ac utere cum ouo. Cygnus ex terra Samia.

Ad ulcera omnis generis, ad epiphoras, dolores circum circa molestantes, suppuratosq; oculos. Spodij loti drach. xvi. cerusæ lotæ drach. viii. terræ Samiæ drach. iiii. amyli drach. iiii. acaciæ drach. iiii. opij drach. iiii. gummi drach. iiii. tragacanthæ drachmas duas. aqua pluuiali excipe ac utere cum ouo.

Aliud Dionysio inscriptum. Cerusæ drach. xxxviii. aeruginis uermiculatæ drach. xvi. succi papaueris drach. viii. gummi drach. iiii. excipe aqua pluuiæ, ac utere cum lacte. Aërianum pharmacum nostrum, ad ueteres ac recentes affectiones accommodatum. Cerusæ drach. xxiiii. cadmiæ ustæ & lotæ drach. x. stibij usti & loti drach. x. thuris drach. x. squamæ æris drach. v. opij drach. iii. myrrhæ drach. iii. gummi drachmas xii. excipe aqua pluuiali, ac utere cum ouo.

Collyrium Gennadij. Cerusæ drach. xviii. stibij drach. xii. myrrhæ drach. xii. squamæ æris drach. xii. opij drach. vi. gūmi drach. xxiiii. excipe aqua pluuiali.

Collyrium ex terra Samia, Pacci ophthalmici, ad affectiones intensas. Cadmiæ drach. xvi. cerusæ drach. xvi. terræ Samiæ drach. iiii. opij drach. ii. thuris drach. ii. stibij drach. v. gummi drach. v. excipe aqua, ac utere cum ouo.

Therium, id est æstium inscriptum. Cadmiæ ustæ & lotæ drach. xx. acaciæ drach. ii. squamæ æris ustæ & lotæ drach. xii. corticis thuris drach. ii. tragacanthi drach. v. gummi drach. xvi. aqua pluuiali excipe, utere cum ouo.

Collyrium Hygidion appellatum. Cadmiæ drach. viii. myrrhæ drach. viii. acaciæ drach. vi. opij drach. ii. æris usti & loti drach. ii. gummi drach. vi. fructus ericæ drachmam unam. aqua pluuiali excipito.

Aster anicetus, hoc est inexuperabilis. Ad doloris uexationes, pustulas, staphyломата, ulcera sordida & serpentina. Facit & ad inueteratas affectiones, & cicatrices exterie. Cadmiæ ustæ & lotæ drach. xvi. cerusæ lotæ drach. xvi. amyli drach. xii. stibij usti drach. xii. spodij drach. viii. plumbi usti ac loti drach. viii. terræ Samiæ drach. viii. myrrhæ drach. ii. opij drach. ii. tragacanthæ drach. viii. excipe aqua pluuiali.

Libanum. Ad pustulas, inuersiones, rupturas, concauitates, oculos purulentos, chemoseis, staphyломата. Facit & ad circum molestantem dolorem, & affectiones, & cicatrices exterie. Cadmiæ ustæ & lotæ drach. xvi. cerusæ lotæ drach. xvi. stibij usti & loti drachmas xvi. plumbi usti & loti drach. viii. amyli drach. xii. spodij pompholygis drach. viii. myrrhæ drach. viii. terræ asteris drach. viii. tragacanthæ drach. viii. opij drach. ii. & ad exceptionem ouorum albumina decem.

Aliud Libanum. Pompholygis drach. viii. cadmiæ ustæ & lotæ drach. xvi. stibij usti & loti drach. xii. cerusæ lotæ drach. xvi. amyli drach. xii. terræ Samiæ drach. viii. plumbi usti & loti drach. viii. myrrhæ drach. ii. opij drach. ii. tragacanthæ drach. ii. excipe aqua pluuiali.

Collyrium ex cornu ceruino. Ad ulcera, pustulas, cicatrices exterie. Cornu ceruini usti & loti drach. iiii. thuris drach. iiii. plumbi usti & loti drach. iiii. squamæ æris lotæ drach. ii. opij drach. i. gummi drach. iiii. excipe aqua pluuiæ.

Aliud

Aliud ex cornu ceruino, Neapolitæ. Plumbi usti & loti drach. XVI. cornu cer-
 ui usti drach. XVI. thuris drach. VIII. acaciæ drach. VIII. spodij cyprij drach. VIII.
 amyli drach. III. opij drach. II. squamæ æris drach. II. croci drach. VIII. myrrhæ
 drach. III. tragacanthæ drach. I. gummi drach. VIII. hyoscyami cremore excipito.
 Viride ad affectiones. Spodij cyprij drach. XVI. amyli drach. XVI. croci drach.
 VIII. stibij drach. VII. opij drach. III. gummi drach. III. excipe aqua pluuiali ac
 utere cum ouo. Aliud uiride Zoili ophthalmici. Spodij cyprij drach.
 VIII. croci drach. VIII. amyli drach. VII. opij drach. II. stibij drachmas VIII. gūmē
 drach. III. Anagallidis succo excipito. Aliud, Alia exemplaria ita habent
 Zoili uiride. Cadmæ suffræ ac lotæ & uino Italico extinctæ drachmas VIII. croci
 drach. III. stibij usti & lacte extincti drach. III. amyli drach. I. gummi drach. II.
 excipito succo anagallidis quæ cæruleum habet florem. Ex libris Scribo-
 nij Largi, Pisticinum inscriptum. Ad doloris molestias, pustulas, inuersiones, et
 catrices resolutas, prolapsus, confusiones, & ubi multus sanguis ætate suffundi-
 tur. Commodat etiam ad alias affectiones, & præsertim in oculis mollis sensu præ-
 ditis, in quibus tenuis lachryma profluit. Compositio hoc modo habet. Cad-
 mæ drach. VIII. croci drach. VIII. stibij drach. VIII. amyli recētis drach. VIII. opij
 drach. III. gummi drachmas III. aqua pluuiali excipito, utitor cum ouo.
 Naukratitæ pharmacum affectionibus accommodatum. Cadmæ drach. XII.
 croci drach. XII. opij drach. VI. squamæ stomomatis purgata drach. V. squamæ
 æris drach. VI. succi rosarū drach. XVI. plumbi usti & loti drach. V. myrrhæ drach.
 III. nardi drach. II. acaciæ drach. II. gummi drach. XII. excipito aqua pluuiali.
 Antæ uiride. Cadmæ drach. XL. VIII. myrrhæ drach. XXIII. croci drach. XL.
 VII. opij drach. XXIII. plumbi usti & loti drach. VIII. squamæ æris drach. VI. nar-
 di indicæ drach. VI. acaciæ drach. VI. gūmē drach. XXIII. aqua pluuiali excipito.
 Pharmacum ex Galbano quo usus est Nicetes. Ad dolores & lippitudines.
 Cadmæ drach. VIII. spodij cyprij drach. VIII. æris usti & loti drach. VIII. opij
 drach. VIII. myrrhæ drach. VIII. galbani drach. VIII. aqua excipito, hoc pharma-
 cum ex ualde approbatis est, recipitq; amplius gummi item drach. VIII. Alia ex-
 emplaria spodium non habent. Aliud, Cadmæ drach. XVI. æris usti &
 loti drach. VIII. myrrhæ galbani singulorum drach. VII. opij drach. VIII. atramen-
 ti futuri drach. VI. gūmē drach. VI. aqua pluuiali excipito. Collyrium diaro-
 don Nili ex rosis, uelut Andreas tradit, Ad doloris molestias, fluxū uberē, & te-
 nuem, pustulas, prolapsus. Foliorū rosarū resectis extremitatibus drach. III.
 croci drach. II. opij obol. I. nardi indicæ obol. I. gūmē drach. III. aliij drach. I. habēt
 aqua pluuiā excipe, ac utere cū ouo. tēperatura dissoluta est. Aliud ex rosis
 Nili, quo usus est Gallio ophthalmicus. Rosarū drach. III. croci drach. II. ac-
 ciæ drach. I. opij obol. I. nardi indicæ obol. I. gūmē drach. III. aqua pluuiā excipe,
 uiere cum ouo. temperatura est diluta. Aliud ex rosis horæum appellatum,
 ad easdem affectiones. Rosarū resectis unguibus drach. XXIII. croci drach.
 XII. amyli drach. VI. balauftij drach. III. opij drach. III. tragacanthæ drach. VIII.
 hyoscyami foliorum succo excipe. Aliud, Rosarum drachmas VIII. cro-
 ci drach. III. æris usti & loti drach. I. gummi drach. I. aqua pluuiā excipe, ac uter-
 e, cum ouo. Aliud diarodon ex rosis Terentij constans ex pompholyge.
 Rosarum recentium drachmas XII. spodij cyprij drach. III. croci drachmas III.
 opij drach. III. nardi drach. III. gummi drachmas III. excipito aqua pluuiali.
 Aliud diarodon. Rosarum recentium drachmas II. croci drachmas VI. spo-
 dij cyprij drachmas II. amyli drachmas II. acaciæ drachmā I. nardi indicæ drach.
 unam. gummi drach. II. tragacanthæ drachmas II. excipito aqua pluuiali.

Diarodon Eupledion dīa smymū appellatū. Rosarū drach. c. croci drach. l. opij drach. v. iij. myrrhæ sesquidrach. gūmī drach. l. uino odoro excipe, ac utere cū ouo. Aliud diarodon. Rosarū drach. c. croci drach. l. opij drach. viij. myrrhæ drach. viij. gūmī drach. l. uino odorato excipe ac utere cum ouo. Ego hoc apparui pro folijs rosarum, florum earundem drachmas centum iniiciens, atq; feliciter successit. Diarodon ex rosarum lxxii. drach. Magnum appellatum. Hoc usus est Lucius præceptor ad doloris molestias, pustulas, inuisiones, staphylomata, prolapsus, ad oculos putulentos, ad fluxiones antiquas, inueteratas lippitudines & affectiones ægre cedentes. Rosarum uirgidium resectis unguibus drach. lxxii. cadmiæ ustæ ac lotæ drach. xxiii. croci drach. lx. opij drach. iij. stibij drach. iij. Alij drach. vi. æruginis drach. ii. Alij iij. squamæ æris drach. ii. hardi indicæ drach. ii. myrrhæ drach. vi. Alij iij. gummi drach. xxiii. excipito aqua pluuiali. Aliud ex drachmis lxxii. Rosarum drachmas lxxii. cadmiæ ustæ & lotæ drach. xxiii. croci drach. vi. Alij viij. opij drach. iij. stibij drach. iij. myrrhæ drach. iij. squamæ æris drach. ii. æruginis drach. ii. hardi drach. i. aliq. ii. gūmī drach. xxiii. excipe aqua pluuiali, ac utere cū lacte. Pharmacū ex uiolis albis, accommodatum ad Epiphoras & affectiones. Acaciæ drach. xlviij. succi uiolarum albarum drach. xlviij. spodij cyprij drach. xxiii. croci drach. xxiii. myrrhæ drach. iij. opij drach. iij. aliq. vi. succi hyoscyami drach. iij. æris usti & loti drach. iij. gūmī drach. iij. excipe uino falerno. Collyrium quo usus est Florus in Antonia Drusi matre, quæ parum abfuit ut ab alijs medicis excigaretur. Acaciæ drach. xlviij. rosarum siccaturum drachmas xlviij. melilotorū. drach. xlviij. spodij cyprij drach. xxiii. malorum mandragoræ drach. ii. croci drach. xxiii. opij drach. vi. seminis hyoscyami acetabula. ii. aliq. drach. xxiii. myrrhæ drach. iij. æris usti & loti drach. iij. gūmī drach. xl. uini falerni, aquæ pluuialis, utriusq; heminas iij. Vinum & aquam misceto, eisq; rosas, melilotū, semen hyoscyami, mandragoræ mala, aut si hæc non adsint, corticem iniicito, & ad dies iii. aut v. macerari sinito, deinde expresso liquore ad pharmaci compositionem uitior, probatissimum hoc existit. Melinum delicatum. Commodum his qui nullam penitus pharmacorum mordacitatem perferre possunt. facit ad pustulas, prolapsus, fluxum acrem & uberem, inuisionesq; & ad recentes affectiones. Cadmiæ ustæ ac lacte extinctæ drach. xvi. cerusæ lotæ drach. viij. croci drach. iij. opij drach. i. tragacanthæ drach. ii. aqua pluuiali excipito ac utitor cum ouo. Aliud ad inuisiones, pustulas, prolapsus, dolores. Cerusæ drach. xxiii. amyli drach. xii. cadmiæ lotæ drach. x. thuris drach. x. croci drach. viij. opij drach. viij. gummi drach. x. tragacanthæ drach. ii. excipe aqua pluuiali & utere cum ouo. Diarodon Inculpabile. Cadmiæ ustæ & lotæ drach. xxiii. cerusæ drach. xii. opij drach. vi. florum rosarum drach. vi. croci drach. v. lapidis schisti drach. xii. gūmī drach. x. excipe aqua pluuiæ, ac utere ad ulcera sordida cū lacte, ad munda cum ouo. Aliud. Cadmiæ ustæ & lotæ drach. xxiii. cerusæ drach. xii. lapidis schisti drach. iij. florum rosarū drach. vi. excipe aqua pluuiali, ac utere ad sordida ulcera cum lacte, ad repurgata cum ouo. Croceum pædicon, id est puerile inscriptum ex pompholyge. Ad epiphoras & molestias doloris, & ad affectiones ex plagis. Spodij pompholygis drach. xvi. croci drach. xvi. opij drach. xvi. tragacanthæ drach. viij. excipe aqua pluuiæ adhibitis simul albuminibus quorum quatuor. Collyrium Gaij ophthalmici. Spodij cyprij drach. iij. amyli recentis. drach. xii. croci drachmas ii. myrrhæ drachmam unam, succi mandragoræ drachmam unam, gummi drach. iij. excipe aqua pluuiali, ac utere cum ouo.

Atimeti Lysiponion, hoc est, soluens dolorē. Atramenti sutorij crudi drach.
 XL. pompholygis crudæ drach. XL. cerusæ drach. XXIII. opij drach. II. croci
 drach. III. Crocus in aquam conijcitur ac maceratur, & ex cremore hoc collyriū
 apparatur. Quod uero reliquum est ex croco teritur, reliquisq; ammiscetur, addi
 tis item gummi drach. XXXII. Diomedis Lysiponion ad dolores. Atra
 menti sutorij crudi drach. XXXII. cerussæ drachmas XXXI. spodij pompholygis
 drach. XVI. croci drach. XVI. thuris drach. VIII. myrrhæ drach. II. gummi drach.
 XVI. Aqua pluuiāli excipito, ac utitor cum ouo: prædarium est hoc collyrium.
 Zoili pharmacum faciens ad lippsitudines antiquas, mycephalos, staphyloma
 ta, & fluxiones antiquas. Cadmiæ drach. VIII. æris usti drach. VIII. cerusæ
 drach. III. aloes sesquidrachmam, foliorum croci, chalcitidis assæ, atramenti su
 torij, opij, lycij, singulorū drach. I. myrrhæ drach. II. acaciæ drach. XX. spicæ nar
 di sesquidrachmam. gummi drach. XX. castorij drach. III. stibij usti drach. VIII.
 excipe aqua pluuiāli. Asclepiadeum Pacci. Ad dolores uexationes, flu
 xum tenuem & multū, inuersionem, pustulas, pellicularum eminentias, aspretu
 dines, inueteratas affectiones, & eos qui à multis illitionibus læsi sunt, confestim
 opitatur. Cōpositio sic habet. Cadmiæ drach. XII. æris usti drach. XII. croci
 drach. XII. squamæ æris drach. XI. myrrhæ drach. III. nardi indicæ drach. III.
 rosarum siccarum drach. III. opij drach. III. lapidis hæmatitæ drach. III. piperis
 albi grana XXIII. gummi darch. XII. uini chij quantum sufficit, utere cum ouo.
 Aliud exemplar habet rosarum drach. III. piperis grana XXV. Pharma
 cum accommodum Nectarium inscriptum. Cadmiæ drach. XII. squamæ æris
 cypriæ lotæ drach. XII. croci drach. XII. opij drach. III. æris usti & loti drachmas
 XII. myrrhæ drach. III. lapidis hæmatitæ drach. III. rosarum siccarum drach.
 III. spicæ nardi drach. III. misyos assi drach. III. cassiæ fistulæ drach. III. piperis
 albi grana XXV. gummi drach. XII. uino exceptis utere.
 Antigonī Croceum Leontariū, hoc est, leunculus appellatum, propterea quod
 Leonis imago ei imprimeretur. Facit ad Epiphoras, molestiam doloris, inuete
 ratas affectiones. Est & aspretudinibus commodum. cicatrices & callos exterit
 maxime uero pueris cōmodum est. Spodij cyprij drach. XLVIII. croci drach.
 XXIII. myrrhæ drach. XII. lapidis hæmatitæ drach. VIII. opij drach. XII. piper
 is albi grana XXXVI. gummi drach. LXXX. uino falerno excipito. Aliud,
 Spodij cyprij drach. LXXX. croci drach. XL. myrrhæ drach. XX. opij drach.
 XX. lapidis hæmatitæ drach. XII. piperis grana LX. gummi drach. LXXX. uini
 falerni quantum sufficit. Ex libris Scribonij Largi, Asclepios Machaonis.
 Ad ueteres affectiones, & oculos suppuratos. Spodij pompholygis drach.
 XXXII. æris usti drach. XXXII. croci siculi drach. XVI. myrrhæ drach. VI. lapi
 dis hæmatitæ drach. X. nardi indicæ drach. VI. opij drachmas VI. piperis grana
 XL. uino chio excipito. In libro de Athenippis Asclepijs, opij drachmæ VIII. ha
 bentur. Euemerid ad dolores & affectiones. Aeris usti & loti drachmas
 XXXII. spodij pompholygis drach. XVI. croci drach. XVI. myrrhæ drach. VIII.
 lapidis hæmatitæ usti & loti drach. VIII. spicæ nardi drach. III. misyos usti drach.
 III. opij torrefacti drach. III. gummi drach. XVI. uini Italici quod satis est.
 Diaphmynū odorū Synerotis, pharmacum accommodatum ad inueteratas affe
 ctiones. Facit & ad Rhœadas, hoc est, angulos antrofos, & Aegilopas. Cad
 miæ lotæ drach. XXVIII. lapidis hæmatitæ usti & loti drach. XXV. spodij cyprij
 drach. XXXIII. myrrhæ drach. XLVIII. croci drach. III. opij hispani drach. VIII. pi
 peris albi grana XXX. gummi drach. VI. uino Italico excipito. Vitor cum ouo in
 recubus affectionibus. Tēperatura aquosa est. Aliqui croci drach. XII. inijciūt.
 Hematitinum

Hæmatitimum Syncrotis aspretudinibus cōmodum. Facit ad ueteres affectiōnes, ad ficosā, & ad omnem extuberantiā si cum odore Synerotis comisceatur. Aeris usti & loti drach. XXIII. lapidis hæmatitæ drach. I. croci drach. III. opij drach. III. gummi drach. XII. Excipe aceto acerrimo. Aliud, Aeris usti drach. XI. VII. croci drach. XXIII. opij drach. III. gummi Thebaici drachmas XXIII. pōpholygis drach. XVIII. myrrhæ drach. XVIII. salis ammoniaci drach. XII. lapidis hæmatitæ drach. I. æruginis drach. III. uino excipito. Hieracis ad aspretudines. Misyos usti drach. VIII. croci drach. VIII. opij drach. VIII. lapidis hæmatitæ loti drach. VIII. aris usti & loti drach. XII. myrrhæ drach. XII. gummi drach. XII. uino acerrimo excipito. Apollonij Phoenix collyrium Hieracium ad aspretudines. Per hoc catulo egregie medicatus est. Facit & ad palpebrarū deflūia & inueteratas affectiōes. Lapidis hæmatitæ usti & loti drach. XXXII. aris usti & loti drach. XVI. æruginis rasilis drach. XVI. opij drach. VIII. Alij VI. cadmiæ botrytidis drach. III. chalcitidis assatæ drach. III. gūmi drach. XVI. Excipe aqua pluiali. Phoenix Apollonij aliter, uelut Arius Asclepiades inscripsit, in libro quo propria pharmaca coaceruauit. Lapidis hæmatitæ drach. XXIII. lapidis schisti usti & loti drach. XXIII. cadmiæ drach. XII. aris usti drach. XII. opij drach. VIII. chalcitidis assatæ drach. III. ali j drach. VIII. In alio exemplari etiā æruginis drach. XII. gummi drach. XVI. excipe aqua pluiali. Aliud collyrium ad aspretudines. Chalcitidis ustæ drach. XII. misyos usti & loti drach. VIII. croci, opij, utriusq; drach. VI. lapidis hæmatitæ drach. VIII. gummi drach. XII. acerrimo aceto excipito. Collyriū ad crassitudines. Aeris usti & loti drach. XXIII. spodij pompholygis drach. XVI. myrrhæ drach. XVI. salis ammoniaci drach. XII. lapidis hæmatitæ drach. III. opij drach. III. piperis grana XII. ali j XVI. gummi drach. VIII. uino excipito ac utitor. Euemerici cicatrices & callos exterit. facit & ad inueteratas affectiōes. Cadmiæ drach. LX. croci drach. I. spicæ nardi drach. XX. squamæ aris torrefactæ drach. I. myrrhæ drach. I. opij drach. XXX. aris usti, drach. LX. misyos crudi drach. I. gummi drach. LXX. excipe uino chio. Aliud Pyrami. Cicatrices & callos exterens, deprimit omnem extuberantiā. Cadmiæ cypriæ drachmas XL. lapidis hæmatitæ drach. XL. aris usti drach. XL. misyos usti drach. XX. croci drachmas XX. ammoniaci thymiamatis drach. XX. squamæ aris ustæ & lotæ drach. XX. opij drach. XX. gummi libram I. cum acerrimo aceto utere. Aliud Euemerici, ad easdem affectiōes. Aeris usti & loti drach. XXIII. spodij pompholygis drach. XII. myrrhæ drach. VIII. salis ammoniaci drachmas XII. lapidis hæmatitæ drach. III. piperis drach. XII. gummi drach. VIII. uini chij quod satis est. Lynceus, ad affectiōes callosas, exacuit usum, cicatrices & callos exterit. Cadmiæ drach. XII. aris usti & loti drach. XII. ammoniaci thymiamatis drach. XII. myrrhæ drach. XVI. lapidis hæmatitæ drach. VI. opij drach. VI. aloes drach. III. fellis taurini drach. III. galbani drach. III. æruginis drach. I. opopanax drach. III. salis ammoniaci drach. II. gummi drach. VI. ali j II. aqua pluiali excipito. Collyrium Rinema, hoc est, lima inscriptum. Facit ad callosas affectiōes, cicatrices exterit, facit & ad suffusiōes. Cadmiæ drach. XLVIII. ammoniaci thymiamatis drach. XLVIII. aris usti, drach. XLVIII. opij drach. XVI. æruginis cyprij drach. XVI. myrrhæ drach. XVI. lapidis hæmatitæ drachmas XXIII. galbani drach. XVI. opopanax drach. XVIII. fellis taurini drach. VIII. salis ammoniaci drach. III. gummi drach. I. X. aqua pluiali excipe. Temperatura aquosa est. Collyrium Harmatum, id est, currus inscriptum. Quod usus est Ptolemæus rex exteriusa facultate præditū, Exerit cicatrices, acuit usum, est & aspretudinibus commodum.

cōmodum. Aeris usti & loti drach. viii. ammoniaci thymiamatis drach. viii. lapidis hæmatitæ drach. viii. corticis thuris drach. viii. gummi drach. viii. excipe aqua pluuiali ac utere cū aqua. Alia exēplaria etiā æruginis drach. ii. habēt.

Collyriū oxydorcicum. hoc est uisum exacuēs, ex hæmatite, cicatrices & callos extērit. Ammoniaci thymiamatis drach. xxiiii. aeris usti & loti drachmas xxiiii. lapidis hæmatitæ drach. xxiiii. gummi drach. xxiiii. æruginis drach. viii. excipe aqua pluuiali.

Collyrium Artemonium inscriptum, quo Basilius sodalis meus usus est. Facit ad fluxiones antiquas, & aspretudines palpebrarum, ad humore putrescentes & erosos angulos, ad oculos humectos, & membranarum extuberantias, cicatrices, & callos extērit. Et quod maximum in eo est, post illitiones, oculos imperturbatos conseruat. Subij drach. iiii. aeris usti drach. ii. cerusæ drach. ii. croci drach. i. myrrhæ drach. i. corticis thuris drach. i. æruginis uermiculatæ drach. i. gallarū omphacinarum drach. unam. piperis albi drachmam unam gummi drachmam unam uino excipe, utere cum aqua.

Aliud pharmacum accommodatum. Cadmiæ drach. viii. stibij drach. viii. cerusæ drach. viii. aeris usti drach. iiii. corticis thuris drach. ii. croci drach. ii. myrrhæ drach. ii. æruginis uermiculatæ drach. ii. gallarum omphacinarum drach. ii. piperis albi drachmam unam gummi drachmas iiii. excipe uino.

Collyrium Indicum Aërianum inscriptum, præoccupat ac præripit omnes lipitudines. Facit ad obtusum uisum, & scabras affectiones, ad erosos angulos, cicatrices extērit. Et quod maximū est, post illitionem oculos imperturbatos conseruat. Cerusæ Rhodiacæ drach. xlviii. cadmiæ cypriæ drach. xxiiii. atramenti indici drach. viii. opij drach. viii. piperis albi drach. viii. aut vi. opobalsami drach. viii. aut vi. gūmi drach. xvi. cinamomi drach. ii. Alij xii. drach. aqua pluuiā excipito.

Hermophili collyrium Thalassærum, accommodatum ad suffusiones, & ad omnem hebetudinē uisus, facit & ad incipientem suffusionem. Estq; odoratissimum pharmacū. Cadmiæ drach. xvi. atramenti indici drach. xvi. piperis albi drach. viii. æruginis drach. iiii. succi Medici drach. iiii. opobalsami drach. iiii. gūmi drach. xii. aqua excipe, utere cum aqua. Temperatura diuersa est iuxta affectiones.

Pomponij Bassi. Facit ad incipientem suffusionem. Cadmiæ drach. xxvii. atramenti indici drach. xvi. piperis albi drach. xii. succi Cyrenæici drach. v. opobalsami drachmas vii. spicæ nardi drach. vi. sagapeni drach. v. opopanis drach. v. opij drach. iiii. Euphorbij drach. i. cinamomi drachmam unam. gummi drachmas xxx. fœniculi succo excipito.

Indicum basilicon, id est, regium inscriptum. Facit ad incipientem suffusionē, & omnem uisus hebetudinē, cicatrices extērit. Cadmiæ uisæ & lotæ libram unam & trientem, atramenti indici drach. vi. cerusæ trientem piperis albi sexuncem, fel hyanæ integrum quanticūq; ponderis, fel scarorum decem, fel perdicum quatuor, succi papaueris unciam. opobalsami sextantem. opopanis sextantem. sagapeni sextantem. gūmi libram. i. excipe succo fœniculi aut herba Heracleæ appellatæ.

Entacton, id est insillatitum Pacci ut Themison. Cadmiæ drach. lxxiiii. misyos drach. xxxii. atramenti sutorij drach. xxxii. stibij drach. xxxii. piperis albi drach. xxxii. opij drach. xvi. æruginis drach. xvi. opobalsami drach. xvi. gummi drach. lxxiiii. excipe aqua pluuiali.

Collyrium Chelidonium inscriptum. Cadmiæ drach. xlviii. stibij drach. xii. misyos drach. viii. piperis drach. xxxvi. atramenti sutorij drach. v. opij drach. v. opobalsami drach. iiii. gummi drach. xxiiii. excipe aqua pluuiali.

Hieracium. Ad obtusum uisum, & scabras affectiones. Cerusæ drach. xvi. cadmiæ drach. vii. opij drach. ii. gummi drach. vi. excipe aqua pluuiali ac utere

cum aqua. Aliud, Cicatrices & callos exterit. Cadmiæ drach. XVI. ceru-
fæ drach. VIII. piperis albi drach. III. æruginis drach. II. opobalsami drach. II. om-
phacij drach. II. gummi drach. III. excipe aqua pluuiali. Collyrium fuluum

panchrestum, ab omnimoda utilitate inscriptum, accommo datum ad scabros et
circūfros angulos, ac intensos pruritus, & palpebras ficosas. Cadmiæ drach.
LXXX. chalcididis ustæ drach. XL. piperis albi drach. XL. gūmi drach. XL. aqua
pluuiali excipito. In alio exemplari æqualis omnium apponderatio habetur.

Aliud, Cadmiæ drach. LXXX. chalcididis ustæ drach. XL. piperis albi drach. XL.
croci drach. XII. myrrhæ drach. XII. gummi drach. XL. aquæ pluuialis q̄ satis est.

Tryphonis orbiculare Sphæricum dictum. Cadmiæ drach. XLVIII. squa-
mæ æris drach. XXXII. æris usti & loti drach. XXXII. piperis albi drach. XXX
II. opij drach. VIII. myrrhæ drach. VII. opobalsami drachmas III. gummi drach.
XXXII. excipe aqua pluuiali. Collyrium Galli oxydoreicum. Cadmiæ

drach. XLVIII. chalcididis ustæ drach. XXIII. piperis albi drach. VI. squamæ æris
drach. VIII. opij drach. VI. omphacij drach. III. myrrhæ drachmas II. opobalsami
drach. III. gūmi drach. XII. piperis albi grana X. aquæ pluuialis quantum
sufficit.

Collyriū aromaticū appellatū. Aeris usti & loti drach. XVI. æruginis drach.
III. myrrhæ drach. III. opij drach. III. piperis albi drach. III. nardi drach. II. cro-
ci drach. III. opobalsami drach. III. gummi drach. III. aqua pluuiali excipito.

Heraclidæ aromaticum croceum ex hæmatite. Aeris usti & loti drach. XL
VIII. cadmiæ drach. XXIII. croci drach. XXIII. lapidis hæmatitæ drach. XX
III. opij drach. XII. piperis albi drach. XII. gummi drach. XXIII. uino salerno
excipito. Croceum Asclepium oxydoreicum. Aeris usti drach. XLVIII.

croci drach. XII. omphacij drach. III. opij drach. XII. myrrhæ drach. II. opobalsa-
mi drach. III. gummi drach. XII. piperis albi grana X. aquæ pluuialis quantum
satis est.

Collyriū Isochryson, hoc est auro compar, ad corrosos angulos,
scabras affectiones, inueteratas lippitudines, aspretudines, ficosas eminentias, ci-
catrices & callos exterit. Cadmiæ drach. VI. lapidis hæmatitæ drach. XVI. myr-
rhæ drach. XVI. croci drach. XXIII. piperis longi drach. XII. piperis albi drach.
XXIII. gummi drachmas LXIII. uini Italici quantum satis est.

Collyrium Cinnabarium, celebris ophthalmici Stoli Britannici. Ad corrosos
angulos, lippitudines ad malum habitum perductas, intensos pruritus, & inuete-
ratas affectiones. Psorici drach. XXIII. cadmiæ drach. XXIII. croci drach.
XVI. piperis drach. XVI. cinnabaris drach. XVI. opij drach. XII. gummi drach.
XXIII. aquæ pluuiæ quod satis est.

Aliud, Psorici drach. XXIII. piperis drach. XXIII. cadmiæ drach. XXIII. croci drach. XXIII. sandarachæ drach.
VIII. opij drach. VIII. cinnabaris drach. VIII. gūmi drach. VIII. aqua pluuiali ex-
cipito.

Melinū atarachū à perturbationibus amolliēdis appellatū. Facit ad
omnē oculorū hebetudinē, & ad affectiōes antiquas, cicatrices & callos exterit.
Cadmiæ drach. XXIII. omphacij drach. XII. salis ammoniaci drach. III. ammo-
niaci thymiamatis drach. XII. opij drach. VIII. gūmi drach. XXIII. cerusæ drach.
XXIII. croci drach. XVI. piperis albi drach. XXIII. aquæ pluuialis quantum
sufficit.

Lucij præceptoris Melinum, ad scabros & corrosos angulos, interi-
sos pruritus, oculos humectos, ad omnem uisus hebetudinem, cicatrices & cal-
los exterit. Cerusæ drach. XXIII. croci drach. XXIII. ammoniaci thymia-
tis drach. VI. salis ammoniaci drach. VI. nardi indicæ drach. VI. opij drach. VI. myr-
rhæ drach. VI. omphacij drach. VI. gummi drach. XXIII. excipe aqua pluuiæ.

Aliud collyriū Proteus cui nullum cōferri potest. Facit ad incipientem suffu-
sionem, & ad omnem uisus obtusitatem, cicatrices & callos exterit. Cadmiæ
drach.

drach. XX. chalcitidis crudæ drach. XL. cerusæ drach. XL. piperis albi drachmas
XXX. succi cyrenæici drach. XX. croci drach. XVI. opij drachmas XII. sagapeni
drach. XII. lachrymæ okæ drach. XII. auripigmenti drach. VIII. myrrhæ drach.
XII. gummi drach. XX. opopanax drach. XX. opobalsami drach. XII. Appara
to cum aqua pluuiali ac utitur cum aqua Hygieni collyrium aureum.

Ad corrosos angulos & scabras affectiones. Sandarachæ drach. XXIII. pi
peris albi grana XII. myrrhæ drach. VI. croci drach. VI. gūmi drach. XII. cū aqua
pluuiali apparato. Aliter aureum collyrium. Sandarachæ drach. XVI.
croci drach. XVI. piperis drach. XVI. myrrhæ drach. III. gummi drach. XII. usus
ostensus est. Aliter, Sandarachæ drach. XXIII. piperis albi drach. XII.
myrrhæ drach. VI. croci drach. VI. gummi drach. XII. aqua pluuiali excipito.

Euemerii psoricum. Facit ad corrosos angulos, & scabras cicatrices ac callos
exteris. Facit & ad inueteratas affectiones, & lipitudines ad malū habitū perdy
ctas, itemq; ad aspretudines. Psorici drach. XXIII. croci drach. XII. opij, ceru
sæ, utriusq; drach. III. piperis albi drach. III. omphacij drach. III. uino falerno
excipito. Basilidion, hoc est regineum psoricū. Psorici drach. XLVIII.
croci drach. XXIII. opij drach. VIII. floris lapidis asij drach. VIII. cerusæ drach.

VIII. piperis drach. VI. opobalsami drach. III. omphacij drach. III. gūmi drach.
XVI. uino falerno excipe. Panchrestum Athenipion. Psorici drachmas
LXIII. croci drach. XVI. chalcitidis ustæ drach. XVI. sandarachæ drachmas XX.

myrrhæ drach. VIII. piperis albi drach. XVI. cassiæ fistulæ drach. VIII. foliorū ma
labathri drach. III. opij drach. XVI. omphacij drach. III. misyos usti drach. II.
gummi drach. XXIII. excipe aqua pluuiali. Ptolemæi familiaris pharma

cum a cōmodatum ad scabros & corrosos angulos, intensos pruritus, defluuia
palpebrarū, hebetem uisum. Psorici drach. LX. sandarachæ drach. XXX. chal
citidis ustæ drach. XXIII. croci drach. XXIII. myrrhæ drach. XII. opij drach. II.
cassiæ fistulæ drach. XII. piperis drach. III. piperis albi drachmas VII. omphacij
drach. VI. misyos usti drach. III. foliorum malabathri drach. I. gūmi drach. XXX
VI. aquæ pluuiæ quantum sufficit. Collyriū Malabathri oxydorei cum. facit

ad corrosos angulos. Subij drach. XXIII. acaciæ drach. XXIII. piperis albi
drach. XXIII. nardi indicæ drach. XII. opij drach. VI. croci drach. VI. omphacij
drach. VI. gummi drach. XXXVI. aqua pluuiali excipito. Aliud, Subij

usti & loti drach. XL. acaciæ drach. XL. VI. nardi celticæ drach. VI. myrrhæ drach.
VIII. croci drach. VIII. omphacij drach. VI. opij drach. VI. cadmiæ drach. XXXVI.
gummi drach. XXII. aquæ pluuialis quod satis est.

Remedia ad affectos oculos ab Archigene in primo pharmaco
rum secundum genus conscripta. Cap. VIII.

IN fluxionibus circa oculos in principio conuenit cibi ac potus parci
tas, aquæ potus, et maxime omnium rei Venereæ abstinentia. Alius ipsa
subducatur, & facies assidue primū multa frigida, deinde etiam aceto
ammixto proluatur. Quidā atramentū sutorium aqua dilutū proluen
dum exhibent. Fugiant odores acres, & pulueres, sumumq; & tum solis tum lu
cinarum splendorem ad noctem lanæ puras ex uino, aut sordidas ex aqua fri
gida imponāt, maneq; uelut dictum est se proluant. Quod si augeat fluxio, ac
cedatq; dolor, uenæ sectio cōgrua est, & perfecta cibi abstinentia ac sitis, nisi exu
rannur, & malum inde augeat. Conuenit & solutio uentris ualida, siue per pur
gatorium conueniens medicamentum, siue per clysteres robustos. Post hæc
uero circa frontem imposita assidue, Vitis folia uiridia auxiliantur. Aut myrri,
aut lentisci, aut rubi succus, aut brassicæ aut uitis folia cum flore farinæ polentæ.

Aut cupressus, samolus, ocymū, sisymbrium, cēnāthe, crocus hortensis, itemq; agrestis, portulaca, mali punici sativi flores, cytini appellati, vitex, folia recentia mali cotoneæ, singula cum uino & flore farinæ polentæ. Super ipsos uero oculos lana pura oui candido madefacta imponatur, aut oui assi luteum. Aut melilotum in passo coctū. Aut asphodeli radix cum uino & flore farinæ polentæ. Aut iris confusa cum uino & flore farinæ polentæ. Aut mali punici succus cum flore farinæ polentæ. Aut ipsum malum in uino maris experte coctum. Aut iuni peribaccæ tritæ cum uino & flore farinæ polentæ fronti imponantur, aut etiam super ipsos oculos adhibeantur. Ad hæc uero eryngij & scēniculi syluestris radix trita ex aqua, & cicutæ semen eodem modo apparatus, opitulantur. Caseus item mollis & nuper salus eum apij folijs cataplasmatibus modo impositus. Aut papauer syluestre passo coctum ac tritum impositū. Similiter & melilotū passo coctum, modico croco & papaueris succo ammixtis. Panis item ex uino, rosaceo ammixto mirabiliter auxiliatur. Aut tribulum recentem per se impositot, imò & polenta ammixta egregie opitulatur. Et ut summam dicā omnia ex adstringentium genere & repulsoria in principijs profunt, uelut est cicuta, & psyllium, apium, solanū, lentes palustres, serpyllum, samolus, folia uitis, coriandrū, portulaca, semperuium, folia papaueris, urtica. Quæ singula ex uino trita imponantur; psyllium uero ex aqua, eodemq; modo palustris lenticula.

Ad fluxionem calidam.

B Rassica trita cum polentæ flore ex aqua imposito. Aut ocymi folia eodem modo. Aut rutæ folia cum adipe anserino, aut samolici folia. Aut hīlīacabum trita. Cæterū largum fluxum sistunt papaueris capita, & hyoscyamus cum polentæ flore ex uino. Oportet autem fomētum prius adhibere, atq; ita imponere. Postquam uero status & uigor præterierit, & quum non amplius oportunum est adstringentibus uti, non incommodum fuerit, tum oculorum, tum capitis fomenta adhibere. Magnifice uero auxiliatur, inflammationesq; soluit, & si qua distensio adsit eam laxat, linteolum molle butyro madefactum ac oculis superpositum.

De chemosi, hoc est utriusq; palpebræ distortionem ex inflammatione oborta.

IN quibus uero chemosis fortis contingit, Oui luteum cum muscæ carne terito, atq; ubi ad cerati formam deducta fuerint, linteolo excepta impone, confestim sedant.

Oblitiones oculorum.

Panis purus uisus acacia & hedera cum aqua permixtus. Verum ad doloris uexationes rosas uirides aut aridas passo maceratas terito, & ammixto oui assi uitello, ac croco sufficiens, cum passo utitur. Aut crudam hordeaceam uel triticeam farinam passo coctam adhibeto. Si uero maior dolor fuerit papaueris folia recētia ammisceto, aut corticem papaueris capitum. Aut hyoscyami folia drachmarum iiii. pondere cum oui uitello. Aut sisymbrium aqua coctum terito sufficiens affuso uino, & imposito. Aut papaueris albi capita passo cocta ac trita imposito. Aut opij recētis coma itemq; pulegij recētis similiter utitur. Aut peponis aut cucumeris carne. Aut oui assi luteum cum modico croco ac uino tritum imposito. Cæterum dolentes ex inflammatione oculos cum panace & pulegio uino subactis integro. Præclare facit & pini cortex & polenta cum uino. Aut hyoscyami folia & opii trita imposito. Aut papaueris cortices terito, rosisq; ac melilotō myrrhæq; ammixtis, albumine oui diluto, atq; ita imposito. Aut aloen ac opium cum aqua diluta linteoloq; excepta imposito, utando ne quid in oculum præterlabatur. Cæterū in his qui dolore uexantur crocum

bonum

Bonum cum lacte instillato. Verū ad uehementes doloris molestias, Coriandri succus cum muliebri lacte oculis instillatus, Similiterq; papaueris succus torrefactus, auxiliatur. Folia item platani trita cū farinæ polentæ flore oculis superne imposita. Cataplasmata uero in fluxionibus conueniunt, Cupressus uiridis cum uino, aut pasciuri folia, Aut portulaca trita cū adipe aserino & croco. Aut iris sicca cum melle. Aut micas thuris & myrrham cum oui candido lana excepta fronti impositio. Aut apium cum polenta, aut seselis flores uino maceratos imposito. Aut papaueris folia recentia adglutinato. Quod si uigiliae insint, Mandragoræ radicem & succum, papaueris folia, & polentam aquis paruib; in massam cõgito, eamq; odorandam exhibeto, & obdormiscant. Porro in magnis fluxionibus pulegij recentis semen, & maxime succi, cum aceto ad malagmatis formam redigito, ac sincipiti imposito, sanis superne additis, ac leni uinctu lo constrictis, Aliqui etiam papauer recens ei ammiscant, aut opij minimum quid, aut rosas, aut melilotum coctum. Aut amylo ex uino cum oui candido oculos ipsos integito. Præclare faciunt ad fluxionem uberē, tenuem, ac uetustā, itemq; ulcera, pompholygis drach. iiii, opij torrefacti obol. iiii. gummi drach. iiii. aqua pluuiali aut fontana excepta. Agglutinatorum ad fluxionem.

Similaginem & manne thuris dimidium eius, cum oui albumine ad emplastri formam redigito, & in principio fronti in linteolo imposito. Aut oui tenuis uittellum cum thure. Aut cochleam cum testa sua & oui candido ad strigmentitiam formam redactam in splenio à tempore altero ad alterum extendendo imposito. Sua sponte decedit, ubi restiterit fluxus. Aut Moschi malagma, aut barbarum emplastrum, aut uiride, aut aliquod aliud eorum quæ aceto constant, splenio inditum fronti imposito.

Ad hæmalopas & hypospagmata, id est cruentatos oculos, & sugillatos.

AD plagas oculis illatas, & ad oboriētes ex eis cruentas suffusiones, statim in principio tum ad inflammationem, tum ad dolorem cõpescendum, facit columbinus sanguis instillatus, & præsertim is qui ex teneris pēnis exprimitur: Candidum etiam oui eodem modo in oculum instillatum, atq; amplius pura lana exceptum & superne impositum. Prodest etiam oui assiluteum cum uino impositum, aut melilotum coctum cum uino eodem modo. Insuper & folia rosarū ac flos per se & cum uino trita, itemq; cum flore farinæ polentæ. Aut brassicæ folia in cataplasmate. Vbi uero diutius cruentatio persistit, cum thure & bitumine aquis portionibus acceptis ac mixtis oculum suffito. Aut hyssopi comam tritam lineo panniculo illigatā in feruentem aquam demittito, oculoq; admoueto. Sequitur enim cruor, adeo ut ex linteolo cõpresso exprimi queat. Aut nitri & terram Aethiopicam, ac myrrham pari pondere cum aqua illinito. Aut foliorum oleæ uiridum succum sublinito. Aut ammiū & hyssopū cum lacte bubulo terito, agitato, ac sublinito. Aut semen lini tritū cum butyro per linteolum exprimito ac sublinito. Caput uero frigida perfundito.

Curatio tumorum.

AD tumores ex plaga circa oculos obortos, ualde conuenit fomentum per mollem spongiam assidue factum, Ita ut spongia postea aceto diluto madefacta imponatur. Conuenit insuper sinapi uetustum ex aqua tritū, assidue circumpositum & ablatum. Similiter & nasturtium, si post eorum ablationem loci assidue calida aqua foueantur.

Ad oculos scabros.

AD oculos propter solem aut omnino puluerē scabros atq; aridos facios, aqua multa aestate quidem frigida, hyeme uero calida affusa commodat.

Conuenit & spongiæ calida, aut lentis decoctio, imbutæ somenti. Ipsis uero oculorum angulis rubi, lentis, myrti, rosarum succum, unumquemque per se cum aqua adhibeto. Aut rosas aridas tritas cum uino, aut earum florem. Aut uinum maris expertis ac olei uetus maxime ubi dormire uoluerint admoveo. Cōducit præterea his ut à falsis, acerbis, ampliusque acidis omnibus abstineant. Porro ad inueteratas & callosas circa palpebras affectiones, amurcæ coctâ cum oleo trita illinito.

Ad eos qui crassas, callosas, ac rubras, glabrasque & pilis nudatas genas habent, pilos græcis dictos.

IN his qui crassas callosas, ac rubras. & glabras palpebras siue genas habent, quæ pilis exuta sunt, egregie facit, ac pilos producit hoc medicamentum. Acciæ drach. ii. atramenti librarij aridi, aut si fieri potest memphitici drach. v. succi porri heminas. iiii. Vini maris expertis heminas. iiii. Coquito donec strigmentum formam induant, & repositis in pyxide utitor. Aut muscerdas & caprarum stercorea uista pari mensura, cineris calami græci duplum, cum melle amico illinito. Hoc uero etiam palpebrarum defluuia emendat. Aeruginis trita partem unam, ammoniaci thymiamatis tantundem, trita adhibeto, facit idem & egregie ad scabros oculos. Aut cadmiam tritam melle subactam in ollula urito ac aluto, deinde artis uisti tandundem ammisceto, ac tritis utitor.

Ad pilos inutiles & pungentes in palpebris enascentes, Trichiastin hoc malum græci appellant.

Pilos inutiliter in palpebris supernascentes euellito, & sanguinem cimicis illinito, & non enascentur. Papias Laodicensis Autolyçi medicus multa in his tentabat, euellebat primum ipsos pilos, deinde locum diligenter cum dropace tritabat, & cum chamaeleone albo trito uiridiū ranarum sanguine permixto. (Sunt autem rariæ quæ in hærudinibus degunt) illinebat. Neque enim postea enascuntur. Potes & euulsis prius pilis cedriam cum Tellinarum cinere mixtam ac tritam illinere. Ad eandem quoque rem auiculæ Cinedi appellatæ felle utitor. Aut pagri marini piscis itidem felle. Aut ricini à cane foemina adempti sanguine. Egregie facit hoc, Fellis & sanguinis herinacei terrestris pares partes, fellis chamaeleonis tantundem, castorij parum. Ad formam squamularum piscium reductio, & pilis radicitus euulsis utitor, squamulam unam oris salina matutina diluâ illinendo, locumque ad dimidium horæ obligando. Dolitant equidem ex medicamento huius usus, sed pilus amplius non enascitur. Aut felle hyænæ foeminae mox ab euulsione illinito. Aut tellinarum tenuissimam puluerem oblitto. Aut euulsis pilis, cicutæ folium, & cedriam æqualibus partibus cum uespertilionis sanguine illinens, illitumque donec exarescat tene. Si enim hoc oculum contingat eius humorem corrumpit. Aut ab euulsione, capræ fel cum brassicæ succo illinito. Aut capni siue fumarie herbarum succo palpebrarum alam siue summitatem illinito: deinde pilos euellito rursusque illinito. Testatus est & Hermias spumam aquæ post dropacum adhibitionem illitam summe conducere.

De staphylomatis siue uuis, & albuginibus.

STaphylomata tolles cantharidum succo illito. Albugines uero cito sanat nitrum cum oleo ueteri diligenter tritum & illitum. Aut lacertæ sterces illine & tolles. Aut Nyctioracis ouum illine, & tinges ipsas. Aut croci, piperis, æqualis partes cum felis felle in collyria formato ac illinito. Aut sepiæ testam tritam melle subigito ac urito, & leuigato postea pharmaco hoc sublitto.

Curatio obfuscationis uisus & suffusionis.

Obfuscationem omnem aut etiam incipientem suffusionem per sanat omne fel cum marrubij succo ac melle Attico. Aut myrti & piperis partes æquales cum

les cum melle. Aut solanū nigrū illine. facit & Cyprus in aerea pyxide reposita. Aut fœniculi succum, & fel taurinū liquidum paribus partibus, mellis Attici duplum illinito. Aut croci & piperis æquas portiones felle taurino excipito, atq; in collyria redigito, ac illinito. Aut populi nigræ succum cum duplo mellis Attici illinito.

De humorum suffusionibus.

Fellis testudinis marinæ partem unā. mellis Attici quadruplum illinito. Fel ipsum etiam per se sufficit cum aqua illitum.

Ad Pterygia.

In pterygijs oculorū atramenti sutorij, salis aminoniaci, æquales partes, gummi dimidium, cum aceto in collyria formato ac illinito. Aut populi nigræ succum, cum duplo mellis Attici mixtum ac tritum illinito.

Ad glaucos oculos & Nyctalopas, hoc est lusciosos.

Solanū assato, ipsumq; inter assandū destillantē cruorē illinito, Atq; id quidem de illinendo dictum sit, ipsum uero hepar edendum præbeto. Auxiliatur & columbinus sanguis illitus, & fel capræ. Aut hepar caprinum coquito, eosq; obueatos in ollam intendere iubeto, quo elatū inde uaporem oculis susceptū. Ipsum uero hepar assidue edendum dato, Ex hoc enim cito auxilium sentient. Aut elaterij obolum, seminis portulacæ drachmam. i. cum melle inunge. Aut sterus Asini recens exsuccato ac illinito. Vescatur ager beta, uulturis fœcore assato, eijsq; felle illinatur.

Ad Crithas instar hordei oblongos circa palpebrarum pilos abscissus, qui item polthiæ Græcis appellantur.

Abscissus circa palpebrarum cilia crithas ab hordei similitudine Græcis appellantas, ceræ albæ fomento discuties. Aut muscæ caput auellito, ac reliquo corpore abscissum ipsum confricato.

Finis libri quarti.

CAPITA QVINTI LIBRI.

De suffillatione sub oculis, hypopion Græci dicunt.	Cap. I
De Aeglyope.	Cap. II
De Varis.	Cap. III
De ficolis tumoribus.	Cap. IIII
De lichenosis (in mento tumoribus).	Cap. V
De menti eruptionibus.	Cap. VI
De furunculis.	Cap. VII
De dentium affectionibus.	Cap. VIII
De gingivarum curatione.	Cap. IX

CLAVDII GALENI PERGAMENI

DE COMPOSITIONE PHARMACORVM SECUNDUM LOCOS Liber v. Iano Cornario Medico interprete.

De sugillatione sub oculis hypopion Græci dicunt. Cap. I.



VOD hypopion sub oculis fiat, nomē ipsum indicat. Idē enim est uelut si quis hypophthalmiū dicat, quod ipsum sub oculis sonat. Est autē ex genere effusionū, ecchymomatū appellatū, Appellat ita Hippocrates & alij multi Medici circa curē affectionē, quā tenuibus in ipsa uenis cōtusis, sanguis per fissuras effundit, non uno loco acruatim ac statim ita excretus in grumos coitēs, sed postq̃ per persultationē, hoc est diapedesin, ut

ipsi appellat, effusio ipsa facta est, contingit sane aliquādo ubi ita coierit, tēporis progressu liuescere & denigrari, paruis nimirū grumulis ex disperso in multis cutis partes sanguine coactis, Quare merito ad eius curationē statim festināt medici priusq̃ denigrescat, scopū mēdendi habētes ut sanguis discutiat, quū sciant id quod in grumos coierit ex sanguine, ægerime discuti posse. Quū uero tuni- cula uenarū ex quibus sanguis exiit rūpatur, parū quiddā ex adstringētibus ad discutiētia ammiscetur. Si enim ex sola simplici facultate discussoria pharmacū a principio adhibeatur, nō solū quod effusum est discutiet, Sed & per fissuras ali- quid attrahet ex sanguine in contusis uenis cōtento. Postq̃ uero in suam naturā redierint uenule, ad discussoria pharmaca citra adstringentiū ammixtionē oportune transimus. Quoadmodū autē in alijs affectibus pleriq̃ medicorū indistin- ctie auxilia cōscripserunt, Ita etiā in his citra eas quas iam recensui distinctiones, simpliciter Sugillatorū remedia prodiderunt. Porro si uos eorū quæ in libris de simpliciū pharmacorū facultate didicistis, memores fueritis, facile discernere poteritis, Quas nam sugillationes sola discussione digerere oporteat absq̃ adstrictio- ne, & in quibus ammiscere cōueniat quippiā ex modice adstringentibus. Quia & ex ipsis discussorijs imbecilliora primū adhibēda esse manifestū est: fortiora uero inueteratis & denigratis admouenda. Exēplū itaq̃ loco primum ea quibus ipse uitor indicabo, Inde ad ea quæ probati medici tradiderūt progressurus. Ap- pellatur autē collyrium Nist ex rosīs diarodon, multis iam annis præclarū & cele- bratū, cuius cōpositionē proximo libro tradidi, hoc ipsum in oculariorū coticu- la ex aqua cōtero, atq̃ sugillationē illino, fertula campanē ac sceni græci decocto prius pro fomēto admoto, deinde etiā collyrio ex eo decocto dissoluto: postea etiā ex ipsius solius sceni græci decocto. Quod si reliquæ quæptā affectionis res- stāt, in sceni græci decocto collyria ex myrrha, diasmyrna appellata, soluo ac illi- no. Cōducia autē bis in die pharmacū hoc illinere, simulq̃ fomentū decoctorum calidorū per mollem spongiā prius admouere, ita ut primū ex ambobus sceno græco & mieliloto decoctū fiat, inueterato autē mālō, ex solo sceno græco: Hic curandi mōdus ut plurimū perfecte sugillata per sanat, paucis omnino subterfu- giētibus eumq̃ respuentibus, in quibus collyrium ex sandice cōmodius est, & ex pharmacis ad sugillata a medicis descriptis ea quæ generose discutiendi uim habent, Initium autem faciam ab eis quæ Archigenēs in primo pharmacorū secundum genus conscripsit, præpositurus quidem ipsius uerba: postea uero si quid ab eo ad distinctionem pertinens relictum est, appositurus.

Archigenis pharmaca ad sugillata, iuxta ipsius dictionem.

SVgillata euestigio sanat raphanus impositus, auferes aut ipsum postq̃ mor- dere incōepetit. Recte fecit in eo quod adscripsit, tollēdū esse ubi mordere cōepetit

corperit: si enim diutius maneat, uenulas contusas cōmordendo, oscula ipsarum aperiet, quapropter & à principio eo utendum non est. Vbi uero inueteratæ fuerint sugillationes & iam dentigratæ, etiā si quis longiori tempore incubere ipsum sinat, magis iuuabit.

Facit & caseus recens salus impositus. Ipse quidem caseus uim obstruendi meatus habet, uerum recens salus & nondum inueteratus, mixtam facultatē habet, obductricem ex seipso, discussoriā uero & aliquantulum adstringentem ex sale, quare nihil absurdū est eo etiam in principio uti. Aut ceratum cum absinthio uel raphani succo subactum. Aut hyssopi coma leuigata eodem modo. Siue cum absinthij coma trita, siue cum succo cerassi subactum adhibeas, eandem uim demonstrabit; Verum ad tactum mollius reddetur pbar macum si succus cum cerato comminatur. At uero raphani succus, aut byssopum cerato addita, efficacius reddūt pharmacū, quā ut à principio statim adhiberi cōueniat, nisi iam planē liuida aut nigra facta sit sugillatio, quod etiam ipse deinceps dicet.

Summe facit ad recētia & liuida sugillata, Spongia muria tincta & assidue imposita ac ablata: postea uero fomentum assiduū ex calida aqua prodest. Quemadmodum raphano in principio uti minime tutum est, ob eam quam dixi causam, Sic etiam muria: quapropter etiam post eius usum, calida fomentum probat, quo uidelicet acrimonia ex muria inducta cōpescatur. Neq; uero in omnibus sugillatis fomento ex muria uti consuluat, sed in his quæ statim liuescunt. Modico itaq; tempore in his muria utendum est, in quibus uero cruentus, aut subflauus, aut subpallidus est color, fugere muriam oportet.

Cataplasmate autē utere faba fresa cōtrita, absinthio, byssopo, origano, raphani cortice, uua passa exacinata, unoquoq; per se cum melle, aut aceto, aut aqua. Imperfecte primum hæc remedia conscripsit, quum non apponat ad sermonem, cōtis ne an crudis uti iubeat faba fresa, & absinthio, & hyssopo. Videtur autem crudorum usum præcipere. Porro ad finem ubi dicit, cum melle, aut aceto, aut aqua, singulis prædictis utendum esse, neq; tum quidem coctis addidit. Quin & eo ipso sermone tria inæqualia medicamēta tradens, minime recte mihi uidetur, cum hoc uel illo utendum esse præcipere. Aqua enim acrimoniæ omnis experitissima est, non in cute tantū, sed ipsis etiam ulceribus mordax est, cutem autem non offendit. Acetum uero utrisq; mordax existit. Neque uero raphani cortex uuæ passæ utribus par est. Sicut neq; absinthium, ac hyssopum & origanum. Fortia enim hæc sunt & discussoria ui prædita. Moderata autem est uua passa & omnis acrimoniæ experta.

Et bulbus albus cum ouo & melle. Bulbum flauum ut acriorem in principio statim adhibere recusat. Scimus autem mel discussoriæ facultatis esse, quapropter ouum ipsis ammiscere uideatur, quod mitigandi facultate ualeum præstat. Cyclaminus per se, & cum uua passa. Neque hic modicum est quod interest inter cyclaminum & quam passam, Quare haud scio qua ratione per se cyclamino utatur, & ammixta uua passa tantum auferat eius facultatis, quanta fuerit ammixtæ uuæ passæ moles.

Aut nitrum cum hyssopo & uua passa, melle exceptū. Hic sermo priore rectior est, in quo etiam solius cyclamini usum permittebat, Nam si etiam nunc hyssopum ipsum per se adhibere consuluisset, non apponendo inueteratis sugillationibus id conuenire, similiter utique deliquisset. Myrtum cum sale & aqua.

Dictum etiam antea à me est, quod ex discussorijs medicamentis in principio præstantiora sunt, quæ modicam adstringendi uim complectuntur, Qualia sunt rosæ, & melilotum, & crocus. Non tamen ex eiusmodi pharmacorum numero est myrtus, utpote uehementer adstringens, quapropter ego nunquam ipsa uti audeam, præsertim si iam liuidus sit color sugillationum.

Sinapi cum adipe ouillo. Inueteratis & nigrefactis sugillationibus solum, hoc medicamentū conuenient, & maxime si non omnino modicū sit sinapi adipi ammixtum. Myricæ folia & fructus trita cum aqua, per se & simul mixta. Et hoc pharmacum non solum discussorium, sed & cōcoctorium quandam uim habet, quare inueteratis & nigrefactis sugillationibus non conducit. Facit & spongia, & linteolum, aceto ac melle imbura, & apposita. Hoc remedium in principio adhibitum, non ualde acri aceto opus habet, in progressu autem temporis liuescētia aut denigrata sugillatione, nihil profuerit absque acerrimo aceto præparatū. Aut fabam frescam cōmanducatam imposito cū melle. Quin & fabæ lomentum, etiam citra manducationem, cum melle subactum liuida discutit. Ex manducatione autem summe discussorium redditur, nimirum uiribus à salua adsumptis. Oui uitellum eodem modo. Si mel ad oui uitellum trisauerimus, uelut ante dixi de faba fresca, simile faciemus prædicto medicamento, tum in apparatu, tum in facultate. Aut porci pulmonem calidū imposito. Hoc remedium non tolerarit uir mundiciem amans. Aut myricæ decoctio prolue. Non ita longē ante de myricæ facultate dictū est. Aut cardamomum cum myrrha impone. Discussorium quidem pharmacū est myrrha, uerum acre cardamomū. Hæc sanè sufficere uidentur mihi ex Archigenis scriptis exempli gratia prolata, ostenso simul modo examinandi pharmaca, Qualia scilicet in principio conueniant, antequam liuida aut nigra sugillatio fiat, & qualia liuidis, aut iam nigrefactis, & inueteratis sint adhibenda. Quare quæ consequantur apud eum deinceps, ea sola per se adscribā, ipsius Archigenis uerbis. Aut cerusā & spumæ argenti æquales partes cum melle terito, & ammixta faba fresca ad cerati formā reducto, ac unitor. Aut anguiū senectam cum aqua marina tritam illine. Aut cuminū linteo illigatū in feruenti aqua tinctū pro somēto adhibe. Aut sinapi cū cerato impone. Aut foeniculū tritū impone. Aut thus & thapsiam æquis portionibus cum rosaceo cerato. Aut mentam & argenti spumam pari pondere impone. Aut ordeaceam farinam cum aceto mulso coctam. Aut fabam uino maceratā donec dissoluatur, tritā splenij modo impone. Aut cicer eruinū uocatū eodem modo. Aut furnotū fuliginē cum pari cerusa ex uino odorato illine. Aut thapsiam & eruinæ farinæ tertiam partem eodem modo. Aut fallam thunni carnem, omotarihon Græci uocant, exprimito; deinde in uino odore tritā imposito. Cæterū ad uetustiores sugillationes Smilacis fructus cum uua nigra tritus facit. Aut thapsiæ radix trita, & succo eius adipe excepto, ac assidue apposito. In uetustis exemplaribus non uetustiores cōparatiue scriptum est, sed uetustissimas superlatiue. Dictum est porro à me statim in principio, quod in eiusmodi sugillationibus, pharmaca fortit discussoria ui prædictis uti oporteat, qualia sunt sanè ab eo his uerbis descripta, & quædam item ex superioribus uelut est indicatū. Atque hæc quidē Archigenes prodidit. Verū Apollonius diligētius et cū pluribus distinctionibus in primo parabiliū in hūc modū scripsit.

Pharmaca ab Apollonio conscripta, ad sugillata recentia ac liuida.

Spongiam in aqua marina feruente tinctā assidue locis pro somēto adhibeto. Aut spōgia in acri muria tincta similiter foueto. Idē facit si feruenti aceto, & uino imbuatur. Imponendū est & spleniū melle & aceto madefactū, aut lana, aut spongia. Cataplasmate aut utere, Absinthio trito cum melle, faba fresca eodē modo. Origano similiter. raphani cortice cum melle, Bulbis tritis per se, aut cū melle & oui uitello, Silphio trito cum oleo et uino, Samfucio trito cum melle, Myrto & fale tritis cum aceto, foeniculo trito cū cerato, hyssopo & nitro cum melle & aceto, calce utua cum cerato, Sinapi trito cum adipe uinulino, aut cum cerato.

Ad sugillata

Ad fugillata inueterata.

Ari radicē rasam ac melle subactā in linteolum illtam imposito, utere etiā discussorijs facultatibus & compositionibus, quæ ex descriptionibus commentariorum apparantur.

Ad fugillata cum tumore.

Spongiā aceto imbutā imposito, & præmonstratis fomētis frequētius uitior, cataplasmati loco farinā ordeaceā ex aceto mulso coctam imposito, donec locus fugillatus humilior reddat: de cætero uero subscriptis cataplasmati utitor.

Ad fugillata cum inflammatione.

Aqua calida foue, & pro cataplasmate lenticulam coctā tritam cum melle impone. Aut cochleam ægyptiam contusam impone, Vbi uero inflammatio remiserit, tunc etiam alijs pharmacis utere.

Ad fugillata cum pertusione.

In ipsam quidem pertusionis fissuram ex medicamentis quæ cruentis uulneribus cōueniunt indet circumscitis uero partibus cataplasma ex medicamentis ad fugillata citra pertusionem cōscriptis impone. Præstabat fortassis hīc etiam sermonem de fugillatis desinere, Verū quum ea quæ ex consentiente experimento iudicata sunt, alijs stabiliora existant, usum est mihi etiā ea quæ Crito in tertio de Ornatu scripsit apponere, quæ sanè iuxta illius dictionem ita habent.

Quæ Crito ad fugillata recentia medicamenta scripsit.

Cicutam tritam ex aqua impone. Absinthiū tritum ex aqua, & in linteolum infarctū imposito: quod si tenera sit cutis, parum mellis adijcito. Hyssopum cilicium ex aqua tritū, & in linteolū ligatū, in globulos cogito, cumq; his in feruente aquam tinctis sensim foueto. Bryoniæ radicē tritam cum melle imposito, aut rosaceo cerato exceptam adhibeto. Muriā acrem facito, spongijsq; in ea madefactis foueto. Et post hæc raphani corticē tritū cum melle, & linteolo infarctum imposito. Aut linapi triti cerato exceptū, & modico adipe uulicino addito, in lineū infarctū imposito. Et de his quidē intantū. Quod si inueterata sint fugillationes, aut etiam appellati liuores, subscriptis cōpositionibus utendū est.

Ad liuores & fugillationes profundas.

Tordylj partes ii. terræ famiæ partē i. aceto excipito, modicūq; mellis simul conquassato. Animaduertere autem oportet diligenter ne cutis exulceretur.

Medicamentū deterens fugillata, Aristarchi. Hyssopi cilicij drach. i. radicis thapsiæ tantundem. thuris integri non secti tantundē. ceræ tyrrenicæ drach. ii. resinæ terebinthinæ drach. i. arida cum liquecibilibus cōmixto, deinde linteolo infarcta imposito, animaduersione habita ne locus exulceretur, & ob hoc sanè frequēter tollere oportet. Aliud, Radicis thapsiæ drach. xii. aut succi drach. vi. thuris infecti drach. vii. ueratri albi drach. ii. absinthij drach. i. cerati rosacei drach. xvi. mollita repone, ac linteolo infarctis utere. Oportet etiā hoc assidue amouere. Aliud, Viticis albæ obol. iii. struthij tantundē glandis Ægyptiæ tantundem. pulmonis caprini usti tantundem. radicis asparagi tantundem. bdellij tantundem. succi thapsiæ tantundem. aceto mulso exceptis utitor. Aliud. Seminis uiticis albæ drach. iii. radicis struthij tantundem. niri rubri tantundem. succi raphani tantundē. hyssopi cilicij tantundem. farinæ fabarum tantundem. glandis ungētariæ drach. xl. myricæ drach. xl. pulmonis caprini usti drach. xl. bulborū rubrorum drach. xl. radicis thapsiæ drach. xl. thuris drach. xii. excipe cerato rosaceo, ac utere ut dictum est.

Medicamentum ab Hera conscriptum ad fugillata.

A Vfert, ut inquit Hēras, tribus horis: quod si inflammatio fiat, cataplasma ex uiridi caseo probat, & fomentum ex pane. Succicicutæ obolos ii. croci

croci drach. II. myrrhæ drach. I. acaciæ drach. I. opij drach. II. succi thapsiæ drach. II. gummi drach. I. cum aqua cõgito. Hoc equidem Heras scripsit. Ego uero nucem per etatē iam oleosam factā expertus sum aliquādo ad cruētos facientē. Opor. tet autē ipsam nucem diligēter terere, atq; ita imponere hominī supine reclinato, quo ad horas duas & tres pharmacū adhæreat: ubi enim sic fecerit, etiā si postea surgat, ad multū tēpus adhæret, oportetq; priore delapso aliud statim imponere.

Eiusdem Heræ ad ægilopas.

Maluæ folia cū sale & melle trita imposito, destruit hoc ac extirpat ægilopas. Alicam etiā in aceto coctam incipienti ægilopi imposito. Aut myrti recentis-
simas baccas cataplasmati modo adhibe, ubi uidelicet fluxio infestaperit. Simi-
liter facti & lemnia terra si illinatur.

De Aegilope.

Cap. II



Nter nasi os & magnum iuxta oculum angulum, paruum quoddam abscessui simile tuberculū oriri solet, & rūpiur sane sepe in angulum, ut ægre curabile reddatur, nisi mature occurratur. Mederi igitur opor. tet ipsi cum discussorijs medicamentis quæ citra mordacitatem effica-
cia sunt. Coafficitur enim oculus ab acribus, atq; ita etiā affectæ partis inflam-
matio augetur. Verū affectio ipsa non ob id solum ægre curabilis est, sed & pro-
pterea quod quā multa liquida pharmaca in experimentum adsumi possint, ea non tolerat locus ipse, ne cessario enim ex eis in oculum quid influit. Neq; uero
adhærere eiusmodi queant citra obligationem quæ totum oculum cõplectatur, quam impossibile est tot diebus aliquem perfere posse, quot ad malī curationē
requiritur. Ob hanc igitur causam Apollonius nulla pharmaca ad Aegilopas
scripsit, Archigenes uero paucis enumeratis, deinceps ad curationē ipsorū per
chirurgiā progredi, quāq; res ipsa nō manuarū opera, sed pharmacis secun-
dum genus sit subiecta. Itaq; totā ipsius dictionē adscribā hoc modo habentem.

Quæ Archigenes ad Aegilopas scripsit, in primo phar-
macorum secundum genus.

A Egilopas qui circa oculorum angulos oriūtur eruo cum melle integimus, aut cinere uitis cum aceto subactio. Probe facit & thus cum columbino stercore recenti impositum. Aut succum herbæ ægilopis, auenam nostri dicūt, cum melle illine. Cæterum in nondum perforatis staphidem syluestrem, & am-
moniacū thymiatam cum melle ueluti splenium impone. At alumen scissile cum
terebinthina splenij forma impone. Aut lanæ tomentum sanguine marini lepor-
is tinctum inde. Aut melanteriam tritam adhibe. Quod si neq; sic sanentur, di-
uiso angulo, & cum tenui perforato terebello continuis foraminibus incussis di-
sparato, capitale emplastrum adhibeto, discedent enim squamæ, & sanabuntur,
Aut osse denudato cauterium admoue, & sic squamulæ discedunt ac sanantur.
Quidam diuidentes angulum ossi qua parte perforatum est angustum infundib-
ulum admovent, ac plumbum liquefactum infundentes urunt, atq; hoc modo
optime sanant. Hæc quidem Archigenes scripsit.

Quæ Asclepiades ad Aegilopas conscripsit.

P Orrò Asclepiades in primo exteriorū hæc prodidit. Succu illecebræ libram
dimidiam, succi solani lib. dimidiam, thuris drach. VII. mastiches drach. III.
galbani libræ dimidium, succos cum thure coquito, & ubi dissolutū fuerit, gal-
banum injecto: mastichen uero improbamus. Aliud, Thuris drach. VII.
myrrhæ drach. VII. ladani drach. III. ceræ drach. III. aluminis scissi, coaguli lepo-
ris, utriusque drachmas III. spumæ nitri drachmas III. pharmacum contundito
& emollito cum irini ungenti sece.

De quæis

De Varis.

Cap. III

Vmor paruus & durus in faciei cute oritur Varus Latinis, Græcis Ionthos appellatus, à crasso uidelicet succo congregatus, demonstransq; suis ipsius curationem rationabiliter per pharmaca emollientia & discussoria futuram. Etenim duricies ipsius emollientibus, Tumor uero præter naturam discutientibus opus habet, Quæ igitur iam sæpe tum in superioribus libris, tum in de simplicium pharmacorum facultate commentarijs, prædictæ sint mihi materiae tum discussoriorum, tum emollientium medicamentorum, Compositio sanè ipsorum particularis per experientiam iudicata, utilis erit ad rectum retractorum usum, quæ uidelicet paulo post referentur, ubi saltem prius determinauero, Quæ similes sint Varis affectiones, & aliqua parte ab ipsis differetes.

De ficosis tumoribus.

Cap. IIII

Na quædā hæc affectio est ex his quæ in mento enascuntur, differens à Varis in eo quod non solum crassus sit qui hos tumores efficiat humor, sed & serosa tenuitate participet, ob quam etiam cito exulcerantur, si non ut debent curentur, & ob id magis resiccantibus pharmacis quàm Vari opus habent.

De lichenosis in mento tumoribus.

Cap. V

Hæc affectio ex mixto quopiam generatur humore, serosis nimirum ac tenuibus & acris succis cum crassis permixtis, quapropter etiam facile in psoꝝ ac leprā trāsit, indigetq; etiam ipsa pharmacis fortiter resiccantibus. Postquā uero in psoꝝ aut leprā transferit, ultra hoc quod resiccantibus indiget pharmacis, etiam repurgantia & exterforia exposulat.

De menti eruptionibus.

Cap. VI

Hoc eruptionum, siue ut Græci dicunt exanthematū, nomen quidam in communi usurpāt, de affectionibus uidelicet ulcerosis & asperis in mento sua sponte proueniētib; quemadmodū etiam Archigenes facit. Indiget autē & hæc ipsa affectio resiccantibus medicamentis.

De furunculis,

Cap. VII

Furunculi Dothienes Græcis dicti ex similibus humoribus ueluti Vari generantur, per uniuersum corpus duplices existentes, Aliqui quidem ut ita dixerim Varosi, duri, & agre concoctiles. Aliqui uero inflammati, in quibus aliquādo etiam febres consistunt, & tumor in magnitudinem excrescit, & in pus trāsmutatur. Vnde curatio ipsorum ut plurimum eadem quæ inflammationis existit.

Ex Critone ad Varos.

CRito in tertio de ornatu hæc uerba scripsit. Ad Varos in facie, Mellis atticcyathū unum, siue drach. XII. aceti acerrimi tantundem. misceto diligenter eodē Varos illinito cum digito affricādo. Aliud, Spuma argenti chemam siue drach. III. terebinthinae purae, fabae Aegyptiae magnitudinem, addito olei albi parum, atq; ubi prius faciem deterferis, ex medicamento hoc parum digito excipe, deinde ambabus manibus terendo uaros obline. hoc pharmacū etiā à rugis liberam & mūdā faciem conseruat. Aliud, Amygdala samaras aceto dilutas ac probe tritas faciei obline. Aliud, Alumen scissum probe leuigatum terebinthina excipe, & emollitū impone. Aliud, Costum Indicum tufum & tenuissimo cribro cretum felle caprino excipe, ac ad ceratū crassitudinem redactum Varis circa uesperam illine, Mane uero ubi surrexerit lacte agrum faciem proluere iube. Inueteratis porro Varis subscriptis compositionibus utendum est.

Ad Varos callosos.

SAponis gallici drach. iiii. ammoniaci thymiamatis drach. i. thuris drach. j. Aqua dissoluito, & cerati spissitudinē facito, eosq; illinito, & post horę interstītiū calida abluere iubeto.

Aliud. Nitri rubri, hyssopi, pulegij, salis fossilis, æquales partes tridito & per tenuissimū cribrū cribrato, exceptisq; cerato rosaceo unitor.

Aliud. Seminis ocymī, nitri rubri, pulegij uiridis, aluminis scissi, costi indici, singulorum æquales partes iustas & cribratas, adipe anserino seu gallinaceo excipe, ut cerati fiat crassitudo, ex eo uero in linteo lū infarcito & inponito donec penitus perfrascant.

Aliud. Salis assati, pulegij, hyssopi, ammoniaci thymiamatis, Rhois coriarij, singulorum par pondus rosaceo cerato exceptum donec perfrascantur inponito.

Ad affectiones eminentiores, & in facie pruritū, ac principii elephātiasis.

GUmmi albi, spumæ nitri, thuris, sulphuris uiui, singulorum æquales partes aceto dilutas ac probe tritas in pastillos redige, eosq; in umbra exsiccata, usu uero expetente aceto dilutos illine, atq; ubi resiccati fuerint, subscripta cōpositiōne deterge. Saponis gallici libram i. ammoniaci thymiamatis tantūdem, thuris quadrantē, mastiches quadrantē, spumę nitri quadrantem. Saponem & ammoniacum in uas fictile coniecta, & aquę sextarijs duobus affusis coquito, atq; ubi dissoluta fuerint, arida cōtusa & cribrata adijcito, deinde in mortariū trāsata ac probe cōquassata, uase uitreo reponito, Vsu uero postulante faciem ex eo smegetate inquinato, & post modicū temporis spaciū larga aqua molliter perfricando abluito. Utendum est hoc smegetate per omnem Varorum curationem.

Ad ficosas menti papularum eruptiones.

CRito in tertio de ornatu in hunc modum de eis scripsit. Ad ficosas in mento eruptiones, uelut Lucius præceptor tradit. Spumæ argenti, misyos erudi, æquas partes tritas insperge.

Aliud. Thuris drach. ii. spumæ argenti drach. iiii. salis fossilis drach. viii. sandarachæ drach. ii. trita insperge.

Aliud. Atramenti sutorij drach. ii. sulphuris uiui drach. ii. æruginis drach. i. nitri rubri drach. ii. trita insperge.

Aliud. Elaterij drach. iiii. salis fossilis drach. iiii. atramenti sutorij drach. ii. mixta insperge, & cū specilli humecti extremo admoue, quo uidelicet pharmaci ipsum adhareat.

Cæteri post pharmaci impositionē, semine lini ex aqua trito utēdum est. Porro ubi humidiora fuerint ulcera, ut ab ipsis aqua pura uelut à fonte defluat, subscriptis compositionibus utendum erit.

Pastillus ad ficosas menti papulas. Vius est eo Artemidorus, reprimit omnes tumores, qui accidunt his quibus cicatrix male inducta est, uelut in his qui sutura usi sunt contingit.

Compositio hæc est. Squamæ aris drach. iiii. atramenti sutorij drach. ii. aluminis scissi drach. ii. glutini fabrilis perlucidi drach. ii. Arida tunduntur & cribrantur, Glutinū uero aceto maceratur, & tritis affunditur, rursumq; leuigatur, & formatur pastilli, quos usus tempore aceto dilutos illinitus.

Hoc medicamentū etiam fistularum callos extirpat.

Alius Magni Clinici. Aluminis scissi, æruginis corinthiæ, rubricæ sinopidis, chalcitidis, glutinis fabrilis, singulorum æquas portiones, composito ac unitor ut dictum est.

Alius. Arii Asclepiades. Milti siue rubricæ sinopidis, æruginis corinthiæ, aluminis scissi, gallæ omphacitidis, malicorij, æquas singulorū partes, gūmi duplum, aceto excipito ac utere ut dictum est.

Alius Apollonij, ut Charixenus tradit. Squamæ aris, misyos assati, auripigmenti, singulorum drachmas ii. diphrygiæ drach. iiii. aris usi drach. iiii. chalcitidis usiæ drach. iiii. glutinis fabrilis drach. iiii. aceto diluito, & pastillos formato, quibus uelut superioribus unitor.

Andronis pharmaci accommodatum. Atramenti sutorij drach. ii. myrrhæ drach.

drach. II. thuris drach. III. alumini scissi drach. III. malicorij drach. VIII. gallarũ drach. VIII. aristolochiæ drach. VIII. Vino austero exceptis ut prædictis utere.

Critonis, ad lichenas in mento.

Consequenter uero Crito ad lichenas menti scripsit hoc modo. Ad menti lichenas quæ inuicibilissima est affectio. Nam & pruriginem inducit, & affectuum partium circūtensionem, & periculum non modicum: proserp̃t enim aliquando per totam faciẽ, oculo sc̃q; cõtingit, & feruẽ extremæ foeditatis causa existit. quapropter diligentiore cura utendum est. Inspiciendo tum irritationes, tum interualla & remissiones. Ita ut etiam ab inueteratis recentes disparemus. In quibus conueniet uti resiccantibus medicamentis. Quũ uero in psoram aut lepram transferint, supra resiccantia etiam exterfiorum & repurgantium erit usus, & postea sanẽ subscriptarum item compositionum.

Crispi amici ad recentes in mento, siue alia faciei parte lichenas.

Triticæ grana multa in incudem imposito, deinde laminam æris igni candefactam tritico superposito, & resolutũ ab eo liquorem calidũ adhuc aufertur, ac super lichenas linito. Hoc solo multos curatos scimus. Aliud, Maluæ agrestis semen tenerũ adhuc colligito, mũdato ac tũdito, succumq; reposito, atq; eo assidue illinito. Aliud, Portulacę succũ assidue illinito. Aliud, Oleæ æthiopicæ lachrymã cum aqua terito, & modico adiectione syræ misceto, & imposito. Aliud, Viti lachrymam aqua dissolutam imposito. Quod si inueterati sint lichenes, sequentes compositiones adhibendæ sũt. Albuci radicem aceto coctã & tritam illinito. Viticis folia trita cum aceto imposito. Caparis folia trita cum aceto imposito. Rumicis hortenensis radicis corticem ex aceto tritũ, loco prius cum nitro præparatũ imposito. Chamæleonis radicem aceto coctã & tritã imposito. Cæterũ quũ ad lichenum curationem multa & uaria medicamina existant, particulatim de singulis transigã, incipio à pastillis sumpto.

Pastilli Lichenici Glutinis fabrilis drach. III. alij duas habent, sulphuris uiui drach. II. chamæleonis drach. III. thuris drach. II. aceti heminæ dimidiũ. Glutiniũ aceto dissoluitur, deinde aridis adijcitur, Vfus tempore quantũ satis est aceto dissoluo calidumq; impono. In alijs exemplaribus singulorũ par pondus continetur. Alius, Chamæleonis, sulphuris uiui, utriusq; drach. III. lachrymæ oleæ æthiopicæ drach. II. thuris drach. I. aceti quantum satis est. Alius, Aleyonij drach. II. chamæleonis nigri drach. III. pyrethri drach. II. sulphuris uiui drach. III. thuris drachmas III. glutini drach. III. aceti acerrimi heminas. III.

Alius, Lachrymæ oleæ æthiopicæ drach. III. sulphuris uiui drach. III. aleyonij drach. VIII. spumæ nitri drach. VIII. alicæ aceto coctæ drach. VIII. aceti quod satis est. Alius, Aleyonij uisti drach. II. chamæleonis nigri drach. III. radicis albuci drach. III. sulphuris uiui drach. II. thuris drach. I. pyrethri drach. II. spumæ nitri drach. II. glutinis drach. III. Aceti quod satis est. Porro extẽta iam affectione & callosa reddita sequentibus utendum est medicamentis. Misys peregrini, thuris, myrrhæ, alumini scissi, singulorum drach. VIII. aloes, sulphuris uiui, utriusq; drach. III. Excipe passo ut strigmentia spissitudinem accipiat, & bis aut ter in die præfrictis illine: forinsecus autem cõseruandi pharmaci gratia, uesicæ pelliculam, aut oui testam, aut uiridia folia quantũ satis est impone.

Aliud, Misys drach. III. acaciæ drach. II. squamæ æris drach. III. sulphuris uiui drach. VI. chalcitidis drach. VIII. gummi drach. VIII. aceti quod satis est. In quo ubi gũmi dissolueris, reliquaq; ammiscueris, amurcam inijce, & probe cõquassata reconde, ac utere ut dictum est. Aliud, Sulphuris uiui, thuris, myrrhæ, atramenti sutorij, misys crudi, singulorum drach. II. gummi drachmas III. ace

to & cedrino oleo quod satis est dissoluito, eodemq; utere modo. Ex scriptis Zeuxidis, Aliud, Chalcitidis crudæ, misyos crudi, myrrhæ Minnææ, sulphuris uiui, singulorum æquales partes, gummi duplum aceto dissolutum, Ex oleo cedrino, Verum cedrinum prius coquere oportet usq; ad mellis crassitudinem. Aliud Diodori, Lachrymæ oleæ æthiopice drach. x. x. gummi drach. xl. atramenti futuri drach. xvi. sulphuris uiui drach. x. thuris drach. x. æruginis drach. x. acaciæ drach. x. myrrhæ Minnææ drach. x. aceti quod satis est. Et ubi dissoluta fuerint singula, ac leuissima reddita excipe amurca condensata, & repositis utere. Annectantur porro & aliæ compositiones. Illitio cocta ad lichenas inueteratos, quæ citra ulcerationem persanant. Atramenti futuri, sceni graeci moliti, cardamomi, singulorum drach. iiii. melanthii sesquidrachmæ, foliorum caprifici sesquidrachmam, aceti acerrimi quod satis est, leuigata ad mellis spissitudinē reducto, deinde coquito, & postquam nigrū factū fuerit & condensatum pharmaci tollito, illin'to, in superq; lichenas abluito. Heraclidæ

Tarentini illitio lichenica. Sanat citra ulcerationem. Polentarum drach. viii. glutini drach. vi. atramenti futuri drach. iiii. chalcitidis drach. iiii. sulphuris uiui drach. iiii. spumæ niri drach. vi. alcyonij drach. iiii. myrrhæ Minnææ drach. ii. aceti heminas iii. Dionysij condiscipuli, Sanat citra ulcerationem. Farinæ ordeaceæ sextarium i. atramenti futuri unc. i. corticum radicū rumicis sylue stris drach. i. sulphuris uiui drach. i. myrrhæ sesquonciam, gummi unc. i. aceti heminas vi. Rumicis radices coquito, & ubi dissoluta fuerit extractam terito, Ordeaceam uero farinā in residuum liquorem coniectam coquito, atq; ubi recte habuerit reliqua injicito, & ablatis uitior. Illitio Socratonis cocta. Farinæ alicæ sextarios vi. sulphuris uiui drach. xvi. misyos peregrini drach. xvi. cimoliz drach. xvi. chalcitidis drach. xvi. spumæ niri drach. viii. alcyonij drach. viii. aluminis scissi drach. viii. radicis albus drach. viii. myrrhæ drach. viii. thuris drach. viii. lachrymæ oleæ drach. viii. ammoniaci thymiamatis drach. viii. aceti heminas tres. Alcyonij & albus in aceto coquito, ubi uero ad dimidias reductū fuerit percolato, & in colamento ammoniacū, myrrham, thus, olea lachrymam, dissoluito, deinde terito, aridaq; injicito, Alicæ uero in residuo liquore coquito, & dissoluta reliquis adijcito, simulq; terito ac utitor. In alijs collectiones sic habet. Sulphuris uiui, misyos peregrini, chalcitidis singulorum drach. xvi. niri, aluminis scissi, alcyonij, radicis albus, thuris, lachrymæ oleæ, terræ cimoliz, ammoniaci thymiamatis, singulorum drach. viii. aceti heminam unam.

Alia ualde efficax, Aceti acerrimi sextarios vi. farine ordi sextarios ii. manne sextarii i. radicis rumicis agrestis drach. v. ueratri albi drach. x. alcyonij drach. xv. cardamomi drach. i. terræ cimoliz drach. viii. glutinis drach. xvi. spumæ niri drach. xvi. halicabai uirgultorum uiridū manipuli. Cōposito. Quandoquidem uero multi pharmacorum quæ illin'tur cōpositiones recusant, amatq; magis emplastrorū impositiones, utpote quæ neq; sudoribus obortis diffusiū, neq; resiccata cutem circūtendunt, merito etiam ipsorū præparationes subiungimus.

Emplastra lichenica quæ citra exulcerationem liberant.

CEra, picis coctæ, thuris, terebinthinæ, sulphuris uiui, singulorum libræ dimidiū. Liquida cum aridis committito. Aliud, Thuris drach. viii. aluminis drach. viii. atramenti futuri drach. viii. sulphuris uiui drach. iiii. glutinis drach. iiii. radicis chamæleonis drach. iiii. ceræ drach. viii. picis crudæ heminas ii. Picem & glutinū coquito, atq; ubi condensata fuerint ceram injicito, aridiseq; affundito, ac repositis utitor. Aliud, Facit ad lichenas eleuatos, adeo ut reprimat ea quæ residua putantur. Mannæ thuris, picis, utriusq; drach. viii.

bituminis

bituminis drach. viii. ceræ drach. viii. resinæ pinus drach. viii. sulphuris uiri drach. viii. olei cyprini parti. Coquito ut dictū est, & sublati uisor in linteolum aut pelliculā tenuem infartis.

Aliud citra ulcerationē remouet. Picis brutæ liquide sextar. i. māng lib. i. sulphuris uiri lib. i. farinæ lupinorū lib. i. pro cōsuetudine cōponito, deinde galbani sextantem adijcito. Est hoc ex ualde probatis. Alia exemplaria farinā non habent, neq; galbanū.

Emplastrū lichenicum Philotæ, citra ulcerationē sanat. Exhibitū est à Philota sodali, per uersus scriptū. Chalcitidis crudæ, chrysocollæ, misyos assati, squamæ æris, diphrygis, salis amoniaci, terræ eretrix, singulorū drach. iiii. sulphuris uiri drach. xii. atramenti sutorij, floris lapidis asij, æris usti, singulorū drach. vi. foreos drach. v. aluminis liquidi drach. iiii. Hæc omnia terito, deinde aceti heminis xii. assutis, per dies v. sub caniculæ ortū soli exposita itidē probe terito, donec pharmacū redditū fuerit gruginosum. Porro in alio mortario thuris uncia i. myrrhæ sextās, aloes unc. i. ladanū quadrans, opopanax quadrans, aceto dissoluta ad strigimentū crassitudinem præparentur, atq; ubi recte habuerint, ad ea quæ in sole leuigata sunt adijciantur, rursusq; terantur, addaturq; aristolochiæ rotundæ & longæ, utriusq; tussæ & tenui cribro excussæ drach. una. Postq; uero iam trita emplastri formā acciperint, liquefabilia prius liquefacta & frige facta inijcito. Sūt aut hæc. Ceræ drach. cx. terebinthinæ drach. xx. galbani drach. ix. olei hemin. i. & probe emollitis ac repositis uisor. Hoc pharmacū duplicem aspectū uidentibus exhibet. Cæterum si affectio pertinacius perseveret, & pharmacorū impositionē respuat, excoriatij appellatis remedijs utendum erit: prompte enim superficiem auellunt.

De excoriatijis Lichenum.

EXcoriatorij Lichenum, quo Pamphilus Romæ usus plurima designauit, quum in urbe Mentagra appellatus morbus inualesceret. Squamæ æris drach. vi. auripigmenti drach. iiii. sandarachæ drach. iiii. æris usti sesquidrach. u. ratri albi sesquidrachmā, uentriū cātharidum sesquidrach. Singula per se terito, deinde simul mixta, cedria excipito, & ad strigimenti densitudinem reducta pyxi de æris cyprij reponito. Vsu autē expetente, nitro & aceto modico perfrictis lichenibus, pharmacū hoc cum spathula illine, ac affrica: deinde interiecto spacio derade, rursusq; pharmacū impone: deinde ubi bis uel ter hoc feceris, quo facile deradi possit, rursus imponere tenta, illitis locis cum uessicæ bubulæ aut alterius cuiusdā animalis pelliculis iniectis. Hæc enim pharmacū ne defluat cōseruat, & alias leuis est: post pelliculæ autē impositionē, fasciola leuiter obligatum finito. Prestitit quidē pernoctē adhærere, aut saltem ad aliquot horas, usquequo bulas excitet sanient cōplectentes crassam & glutinosam. Deinde uero lauare præcipimus, & in balneo mortariæ nam & hoc ad hanc curationē auxiliatur. Sit autem calidius balneum, Quo si quid uti prohibeat, fomentū aquæ multæ calidæ adhibendum est, quo deterso, panis ex aqua mulsā subactus cataplasmatris modo imponatur. Porro ubi sordida iam facta fuerint ulcera, splenium ex emplastro uiri di imposito, modica parte de excoriatiorio adfecta. Cæterū sanie exclusa & nulla crustula ulceri incūbente, splenium album imposito, atq; hac curandi ratione donec cicatrix penitus inducatur uisor, singulis diebus fōmētum adhibens, & nouum splenium imponens. Post cicatricem plenē inductam, si qua suspitio reliqua sit, eodem curationis ductu utendum est. Antequam uero excoriatioria imponantur, circumscitas & utcinas lieheni partes pharmaco aliquo inflammatio/nem arcente in splenio excepto, integere ac tueri oportet. Nimirum lichene sua extrema linea semper parū quiddā ex sanis corporibus affricante & inuadente. Hæc communis Mentagræ cūratio est.

Aliud excoriatiorum Axiotij.

Squamæ æris drach. VI. atramenti futorij drach. III. cantharidū sesquidrach. uel rari albi sesquidrach. sandarachæ drach. I. Excipe cedria. Aliud Apij phasci. Ad mentagras quod citra cicatricis uestigiū sanat, facit & ad alopecias inueteratas, Cæteris alopecias in solē aut ad ignē illinito, & bulla excitata eam acu peripungito, ac humore excluso cū ceratis curationē perficito. Post inductā enim cicatricē enascuntur pilī, atq; hæc quidē in alopecijs. In lichenibus uero uelut prædictū est uisitor, pharmacū ipsum hoc modo habet. Sandarachæ drach. II. auripigmenti drach. II. Squamæ æris drach. II. ueratri nigri drach. I. elaterij drach. I. nentium cantharidū drach. I. Excipe cedria. Aliud, Cantharidū drach. I. & dimidiū. ueratri albi tantundē. auripigmenti drach. II. squamæ æris tantundē. atramenti futorij drach. I. scāmōniæ drach. II. Excipe cedria. Aliud, Auripigmenti uisti drach. II. Squamæ æris cyprij drach. VI. chryso collæ drach. I. atramenti futorij drach. I. ueratri nigri drach. I. aluminis scissi drach. I. succi thapsiæ drach. I. scāmōnij drach. I. cantharidū drach. I. cedrigū d fatis est. Emplastra uiridia lichenicā. Post excoctioriorū usum emplastra uiridia & alba imponere oportet, quare rationabile est & illorū præparationes adscribere. Emplastrū uiride Paphili. Hoc usus est Pamphilus in mentagra post rupturā bullarū. Cerae lib. I. æruginis rasæ sexuncē. resine frictæ lib. II. olei cyathi. III. aceti acerrimi quantū sufficit. Aeruginē cum aceto in sole terere oportet, liquecibilia aut liquant & refrigerantur, ac frigefacta liquidis adiunguntur. Viride Demosthenis, Cerae lib. II. resinæ frictæ lib. I. æruginis rasæ trientem. olei æstare cyathi. III. hyeme cyathos VI. aceti quantū sufficit. Viride Herophili. Aeruginis drach. II. mānæ drach. III. adipis uirulini drach. XII. galbani drach. III. cere drach. I. XXX. resine drach. XX. aceti qd fatis est. Tryphonis antiqui emplastrū Euchrum à bono colore dictū. Aeris uisti trientē, aluminis rotundi sextantē, æruginis rasæ sextantē, salis ammoniaci sextantē, mannæ sextantē, cerae lib. II. resinæ frictæ lib. II. olei dextantē, aceti quod fatis est. Antonini emplastrū. Hoc Timocrates post lichenas excoctas imponit. Cerae drach. C. colophonis drach. C. C. squamæ cypriæ drach. XII. aluminis rotundi drach. XII. æruginis drach. XII. mānæ drach. XII. galbani drach. XII. olei heminā I. aceti quod fatis est. Annectendæ his etiā emplastrorū alborum præparationes: nam his post uiridia utendū est, mundis iam factis ab excoctatione ulceribus. Etenim cura habēda est ut citra callū cicatrix inducatur, atq; ea gratia eiusmodi pharmaca in usum ueniūt, quæ multā ad tactū lenitatē inducūt. Emplastrū album Aquosum appellatū. Hoc Magnus circulator usus est post lichenas excoctas. Spumæ argenti lib. I. ceræ tyrrhenicæ lib. I. olei sextantiū. I. cerusæ lib. I. aquæ sextar. I. Spumā argenti, cerusam, & aquā terito, atq; ubi leuigata reddita fuerint, paulatim oleū adstillato, assidueq; terito: & postq; unita fuerint, in uas fictile trās lata igni imposito, assidueq; agitato, & absorpta iam aqua ceram inficito, qua dissoluta in mortariū transferto, & emollitis repositis uisitor. Emplastrū Pancratiastarū siue athletarū Trypherum, id est delicatū appellatum. Facigambustis item, ut citra cicatricis uestigiū sanentur. Spumæ argenti drach. XXV. cerusæ drach. XXV. plumbaginis drach. XXV. ceræ drach. XVI. terebinthinæ drach. XVI. olei heminam I. aquæ tantūdem. cōponito ut dictum est. Megetis chirurgi. Cerusæ lib. II. ceræ lib. I. terebinthinæ unc. I. spumæ argenti lib. I. olei lib. III. aquæ sextarios II. cōponito. Diosphanti ad ambusta & intertrigines. Conseruat faciem rosaceo dissolutum. Spumæ argenti torrefactæ drach. II. medullæ ceruinæ drach. XVI. cerusæ torrefactæ drach. XII. ceræ drach. VII. terebinthinæ drach. VII. thuris drach. VII. olei heminas III. pro more composito. Manna emplastrum, medicamentum accōmodatum, Spumæ argenti

genti drach. c. cerusæ drach. c. ceræ drach. l. terebinthinæ drach. xxv. mannae drach. xvi. aluminis scissi drach. xl. olei heminas ii. & dimidiam. composito & reposito utitur. Affrictis porro & extritis lichenibus à quocunq; tandem medicamento, præsertim uero ab excoriatorijs, subscriptis utendum est.

Compositio Menecratis quæ proteus excoriatorium appellatur.

Picis brutiæ pellucidæ siccæ & electæ drach. ii. & dimidiâ, resinæ pinus pellucidæ lib. i. & quadrantē, ceræ ponticæ tantundem, galbani quadrantē, aceti heminâ i. liquefcebilia ad splendidū ignem donec non inquinent coquito, dein de galbanum adjicito, atq; ubi dissolutū fuerit, ab igne ablatis, acetum paulatim instillato, assidueq; moueto animaduersione habita ne ebulliat, & insumpto iam a ceto, pharmacum in magnum mortarium transferto ac diligenter terito, donec ad melinum colorem reducatur, deinde in pelliculam albam inspissatam repositum seruato. Vsu uero exigente, in pelliculas quantū ad integendos affectus locos satis est infarctū imponito, & tertio quoq; die soluito, nōnunq; usq; in diem duodecimū imponito, ita ut quatuor fiant solutiones. Hoc pharmaci squamas discedere facit, et corpora attenuat, ac solida facit ad cōuenientes excoriationes.

Quæ Archigenes in secundo pharmacorū secundū genus pharmaca scripsit, ad papularū in mento eruptiones, & ad ficosas eminentias. Papularū in mento eruptiones, ex myrti baccis, malicorio, argenti spuma, æris flore, paribus partibus exceptis, cum uino obline. In ficosis uero menti papulis, mentagris appellatis, & ab aliquibus lichenibus agrestibus siue seris, faciūt quidē robustiora ex his quæ ad lichenas relata sunt. Amplius autē & quæ ad pforas & lepras describentur. Mirabiliter uero hæc cōpositio cōuenit. Atramēti sutorij drach. l. ueratri nigri drach. i. auripigmenti drach. l. uentriū cantharidū drach. ii. Quidam etiā obol. iii. insuper addūt, tritis utitur cum oleo, aut cedriā, aut rosaceo, præfrictio prius loco: sunt enim bullæ, quibus per specilli cuspidē ruptis, rursus affricato, quo penetrare pharmacum possit & mordere: deinde post horam fomento adhibito, ceratum rosaceum imponito. Hoc usq; quo ad cicatricem perueniat facit, Quod si primū nō exuperet, iterum iterumq; illinito, facit & ad lepras & leucas, alopectiasq; & pforas excellenter.

Heraclidæ Tarentini, ex libris ad Antiochidem, ad capitis & menti ficosos tumores, atq; etiā alijs partibus eminentia ulcuscula.

Elaterij & salis pares partes misceto ac utitur, Superne uero lini semē crudū, ex aqua imponito, aut ficus paruas tritas, Eodē etiā ad tubercula utendum est.

De dentium affectionibus.

Cap. VIII



X dentium affectionibus, aliquæ sanè omnibus euidenter apparent, Quemadmodū quum perforati sunt, aut denigrati, aut detriti, aut neque frigida ferunt, neq; calida, sed ex utrisq; , aut altero solo dolor eis contingit. Quædam uero non manifeste apparent in ipsis affectiones, uelut quum ipse æger se sentire dicit circa corpus dentis dolorem in profundo obortum. Quidam enim contradicunt asserentes, quum os sit dens, eum citra dolorem affici, uelut quum aliquando prominentiores per limulam deterere cogimur, aut etiā ob aliam quamplam cusam, de quibus paulo post mentionem faciam. Nunc enim citra rationalem & naturalem demonstrationem, testimonium his perhibere uolo, qui ipsum dentem dolere aiunt, Etenim quum ego aliquando dolerem, diligenter super meipso animaduersionē habui, utpote qui tam audieram de hac dubitatione, perceptiq; manifeste non dolenrem modo, sed etiā pulsantē dentē, quemadmodū carnosæ partes in inflammatione uexatæ cōsueuerūt. Quare mirū mihi uidebatur quod & hæc affectio quā phlegmonē siue inflam-

m + mationem

mationem appellamus, in dente oriri posset, qui lapideam & durā substantiam habet. At qui quū etiam alio tēpore dentem dolerem, manifeste sensi nō ipsius dentis, sed gingivarū dolore eum esse, inflammatis uidelicet ipsis ut etiā citra coartationem dolerent, quin & ob uicinatē dentium natura durorū, aucto dolore ob coartationē, Quapropter utriusq; doloris sensum expertus, aliū quidē in gingivā, aliū in ipsius dentis substantia esse dare scio, & id asserentibus testimonium præbeo, Quod ipsi aliquādo dentes dolent. At uero & nervi, qui ad radicē dentis enatus & substratus est, dolorē aliquando fieri, nervo imaginationē cōfusam & indiscriminatā apud plerosq; exhibente, tanq̃ ipse dens doleat, cōsentaneum rationi est: nam & huius rei manifestū periculum in me ipso feci, & sanē remanet adhuc parua doloris portio, exempto dente, in nervi inflammatione, quō dolor nervi leuior tantū reddatur, ex eo quod cōcretio nō amplius tendat ad officulū tensionē operante, & quod liber factus respiratiōe quandā habeat, eumq; remedia quæ adhibētur cōtingere possint, Neq; enim per contactū, neq; per distributionem, possibile fuerit inflammatū nervū curare, utrinq; à dētiū locellis coartatum, & ab anteriori parte ab ipso dente. Si uero liuidi per omnē suam substantiā facti appareant dentes, nihil mirū est ipsos quid inflammationi simile pati, Cui rei ex eo quis amplius fidem habeat, quod ex nutrimentō ferē per omnem animantis ætatem incrementū accipiant. Id quod euidenter sæpenumero apparet in his dētib; qui exemptis oppositi sunt, utpote qui semper augeſcūt, Quam uero augeſcūt, tantū in ciborū mansu deteruntur. Quū uero impossibile sit incrementū accipere citra nutrimentū, omnino duabus affectionibus & his contrarijs obnoxij erunt, inopiæ uidelicet & redūdantiæ alimentī quod eis suppediatur, Inopia igitur aridiores & macriores alimentumq; non sentientes, & ob id renuiiores eos reddit, Redundantia uero cōsimilem in eis affectionē excitare potest, qualis est circa carnosas partes inflammatiō, Eius igitur curatio fiet iuxta eundem scopū quem habent propositū qui inflammationes curāt, qui sanē est ut redundantiā euacuet, partim discutiēdo, partim eam repellendo. Cæterū tenuitatis dentium ob alimentū inopiā remediū nullum est: laxari enim tunc & moueri ipsos necessariū est, cōpage ipsorū laxiore facta, quom non solum ipsi dentes, sed & locelli eos cōplecipientes sunt attenuati. Hæc itaq; affectio senibus a cedit citius aut ferius, uelut etiā magis aut minus, Quæ uero proportionē ad inflammationē habet, magis iuuenes corripit. Auxiliari tamen etiam senibus oportet, auxilio gingiuis exhibitō ita autem appellantur carnes quæ dentes cōprehendunt, ubi primum à locellis emergunt. Ipsas itaq; adstringentibus medicamentis robustiores, & magis citra dentē adstrictas facere oportet, tanq̃ quæ & ipsæ aliquid ad hoc faciāt ut stabiles & ægre mobiles sint dentes, quod ipsum aliās ob exactā cōpagis ipsorū cōglutinationem contingit. At uero foramina dentium ex humorum actum & erodentū influxu perficiuntur, uelut ulcera in cute citra externam causam, Verū in cute id assidue & multis, In ossibus raro cōtingit, quanto uidelicet minus quā cutis noxæ exposita sunt ob duritiā naturalem. Manifestū igitur quod erosorum corporū medela erit per resiccationē uitiatī influentis humoris, qui si paucus fuerit, localibus auxilijs ex resiccantibus pharmacis cōtingere medela potest; eorum uero materiam paulo post dicemus, Si uero multus influens humor fuerit, uniuersi capitis ratio ac prouidentia habenda est, atque si ipsum quādoq; propter totū corpus affectū sit, etiā reliqui corporis cura habenda erit. Porro erosos dētes qui id malī præ mollicie perpeſsi sunt, reddere oportet duriores & affectioni minus obnoxios, atque id per austerā & acerbā medicamenta. Cæterum liuidos redditos per resiccantiā curare oportet, ut qui ex humorum uitiatōrum

tiatorum influxu id patiuntur, Simili igitur curatione indigent cum perforatis.

De gingivarum curatione.

Cap. IX.

Gingivis ex inflammatione dolentibus optimū pharma cū est oleum len-
tiscinum caliditate temperatū ore retentū, Sit autem recens, nam uen-
tius tanto recētiore peius est, quantō aetate antecellit. Imponatur autē
uasculū in quo calescit lentiscinū, in aliud maius uas quod aquam cali-
dam multam complectatur. Maximopere itaq; inflammationi gingivarum hoc
conducit, Nec uero minus etiam si iuxta aliam quandam partem, tum pelliculā
linguam ambientis cum succingentis totū os, aliquis dolor ob inflammationem
oriatur, dolorē sedat lentiscinū. Repellit enim citra molestiā & absq; asperitate,
quam pleraq; austerorū habent, discutitq; citra mordacitatē, cuius rei inflāmati-
s præcipuus usus existit. Quidā uero medici cōmuni errore inducū inflāmata læ-
dunt, quare ea re semel perpensa de cætero uitare oportet. Existimāt enim, si ad-
stringentia solū id quod influit repellendo, inflāmati profunt, atq; aliquādo etiā
quid ex cōtento circa inflāmata partē, ad uenas membrū ipsū nutriendes expri-
mēdo, Verisimile ob id esse id quod amplius adstringit amplius prodesse. Eodē
modo etiā id quod magis digerēdo discutit, magis auxiliari opinātur, q̄ ea quæ
moderate idem præstant, nō animaduertentes quoddā alterutrū ipsorū intentum
inflāmati dolorosum existit, A uehementer adstringentibus enim partes simi-
le quiddam contusioni perpetuntur, nimirū quū substantia ipsarum uiolenter
cōdensetur. Ab acris uero erosioni quiddā cōtingit, Merito igitur mode-
ratum in utraq; facultate immoderatis præfertur. Hæc igitur sufficienter mihi
præfatus uideor. Cæterū de affectionibus circa dolores deinceps narrabo. In
dolore dentium citra gingivarū inflammationem, aliquādo in ipso proprio den-
tium, ueluti dixi, corpore, aliquando uero in neruo dolorem fieri cōtingit. Vhe-
mentissimis igitur opus est medicamētis, siue quis repellere, siue discutere uelit
doloris causam, siue humor sit, siue status uentosus. Et propterea sanē pleraque
ipsorum ex acerrimo aceto præparantur. Adscribam autem ex ordine quæ alio-
rum relatione nobis tradita sunt, initio ab his quæ Archigenes tradidit sumpto.

Quæ Archigenes ad dentium dolores conscripsit.

Dolentes dentes colluāt acris aceto calido cum galla. Aut halicacabi radice
cum aceto & galla. Aut pinguibus tedīs in aceto seruēfactis. Aut myrti
ramulis cum pice in aceto tepēfactis. Aut hyoscyami semine & folijs cū aceto.
Aut cedria, uel propolis, uel nardo, uel solano, aut succo eius, uel cappari, uel al-
lijs, uel myrti ramulis siue in aceto, siue uini fece calida seruēfactis. Aut polij fo-
lijs uel ipsa herba, uel agrestis cucumeris radice, uel marrubio, singulis cū aceto,
pipere, & nitro. Aut radice chamæleonis eodē modo. Aut hyssopo uel staphi-
de syluestri, uel ruta cū uino. Aut pulegio cū aceto mulso. Aut platani pilulas,
uel rosas aridas, in uino albo ad tertias coquito, & uinū in fictili seruatō, eoq; assi-
due dentes colluito. Eodē modo utere pentaphylli siue quinquefolij, quæ ab ali-
quibus eupatoriū dicitur, radice cocta ex uino, aut pulegij large cocti decocto.
Aut cornu cerui in posca coctū colluito. Aut brassicæ cauliculos tres, & foreos
drach. ii. in aceti sextario uno ad tertias coquito, & colluito. Egregiē uero facere
fertur ranæ in aqua & aceto probe coctæ decoctū, diutius ore retentū. Mirifice
facit dens caninus ustus & tritus: deinde cum aceto coctus et ore retentus. Aut
malicorio & galla aceto incoctis utitor. Aut squilla ex aceto calido. Aut squil-
læ medullā in minutas partes dissectā, & in seruēs aceti iniectā, in uase fictili con-
dito acinueterari finito, uase in asinino stercore ad dies xxx. defosso, & utitor.
Aut asinino lacte colluito. Hoc & eos qui mobiles sunt corroborat. Aut halicacabi

cabi corticis, & tedæ aceto feruefactæ decoctio large incoctio colluito. Aut cornu cerui in aceto & garo incoctum colluito. Aut idem ex aceto colluito. Aut tithymalli radicē in uino ad dimidias coctam colluito. Aut hyoscyami radicē aceto mulso coctam colluito. Aut tedarum ramenta, malicoriū, alumien rotundum, siue scissum, in aceto ad tertias coquito, ac tepidū colluito. Aut hebxines radicem in aceto ad tertias coctam in ore detineto, atq; ubi os salua refertum fuerit, eo aperto effluere finito. Aut allium & harundinem alexādrinam acerrimo aceto feruefacta colluito. Aut hyssopum, aut thymum, aut origanū, per se & simul aceto cocta colluito. Aut pyrethrū cum hyssopo, & colocynthidis medulla, similiter in aceto coquito, liquoremq; ex eis longo tēporis spacio in ore contineto. Aut colocynthidē uino calido macerato, & diutius ore teneto. Multam enim pituitā ducit & dolorem leuat. Aut alliorū & erucæ seminis, ac nitri decoctio collue. Aut ranunculum in uino coquito & præmundato prius dentē colluito. Aut sycamini, hoc est mori arboris lac in uinum infunde, simulq; lanas succidas in ipsum exprime, tepefac, & per lanas sordidas molæ infunde, Extrahit pituitam & dolorem tollit. In his omnibus Archigenes catalogum fecit pharmacorū incidendi, discutiendi ac calefaciendi ui prædicatorū, raro aliquid ex acerbis admiscens, quale est ipsa galla. Porro quū semel tantū solanum posuerit, miratus sum cur id ammisceri uelit, quum nulla ratione iuuare possit, præterquam ea iuxta quam colica pharmaca profunt, stupefaciēdo uidelicet doloris sensum. Quid igitur amplius parabiliū Apollonij relationem faciam, quum parum absit quin omnia cōprehenderit Archigenes? Quādoquidem uero Apollonius ipse quibusdam à se traditis testimonium præbet, tanquam euestigiō sedantibus dentium dolores, Visum etiam mihi est illa ipsa adscribere secundum ipsius Apollonij uerba, quæ hoc modo habent.

Apollonij, euestigiō dolores dentium sedat.

Alliorū nucleos ꝑ. thuris masculi obolos ꝑ. myrti ramulos longitudinis duorum palmorum duos; ex his folia decerpta per se terito, similiter & alium & thus, deinde simul omnia in nouā ollam cōiicito, & acetī heminiam unam superfundito, ac coquito spatula ex teda agitando donec ad dimidias redigatur, atq; ita tepido utitor. Oportet autem liquore hunc in dolente parte ad multum tempus tenere, donec liquor ipse consumatur. Commo dum est & ante hoc balsami succum colluere, aut corticem imponere super dolentem dentem. Qui si non adsit, panacis succo contuso, inde defluentem liquorem instillare.

Post prædicta Archigenes remedia perforatorum dentium cum dolore & absq; dolore conscripsit, in hæc uerba.

Oblitionibus porro & epithematis eiusmodi utitor. Sory a gyptium resina terebinthina exceptum obline, idemq; cauernæ inde. Aut cōpositionem ex duobus piperis generibus inde, nardino aut rosaceo dissolutam & maxime amygdalino. Quin & in aurē eiusdē patris instilla. summe facit. Aut sulphur uinum lycio exceptum in cauernam inde, aut præmundato denti obline. Aut piglij comam tritam denti indito. Cæterū in maximis dentium doloribus summe facit hoc. Anguis senectā exurito, & cū oleo ad mellis solidi spissitudinē redigito, ac dentem præpurgatum ex eo integro, omniaq; circūstita oblinito, itemq; cauernis indito. Aut senectā anguis nō usitā dentibus apprimito, & excidēt. Aut uermes terrenos tostos cauernæ præmundatæ insperge. Aut araneorū oua utingēto nardino diluta inde. Aut melanthiū torrefactū cū oleo obline, atq; ubi præter cōcluso ore tenuerit, pituitā collectā reijcere iube. Aut piper uel canchry, hoc est rosmarini semen opio exceptū in cauernā inde. Porro ubi ueluti inflam-

matone correpti fuerint, nitru rubru & ossium perfioru nucleu unita resina ex-
cipe, & dentē ex eis intege, ac donec deciderint line, in cauernā uero piper, spu-
mam nitri, & galbanu cum melle inde. Aut strigmenta cum pipere eodem mo-
do. Aut pyrethrum cum myrrha. Aut succu cyrenaicum & piper æquali pon-
dere cum galbano. Aut melanthium, & alij dimidiu eius, ac modicum salis si-
mul trita obline, dolore tollit. Aut blattæ pistrinariæ auulso capite adipem cum
rosaceo calefactu & in aurem instilla, & in cauernam inde. Aut gallam tritam
cum cedria adhibe. Aut in aurem denti uicinam oleum sesaminum in quo uer-
mes terreni cocti sunt instilla, Verum ipso dolente dente hyoscyamū conterant.
Aut hederæ albæ cacumina quinq; cū rosaceo terito, & in mali punici putamine
tepesacta, bis aut ter in die in aurē ulcinā instillato. Quin & ipse fructus cū uino
tritus, denti illitus iuuat. Cæterū his relatis Archigenes etiā hæc subdit. Sum-
me facit cruciatu gingiuis, Alumen liquidu duplo aloes pondere addito admo-
num. Aut alumen scissum & myrtum tenuissime trita affricato. Vbi uero restri-
ctæ fuerint melle ipsas illinito. Aut nucleoru ossiu siue macherarū perfioru par-
tes II. myrrhæ parti I. præmūdato denti indito. A dolore asserit. At uero quas-
satis & dolentibus dentibus cauterium ignitu admooueto. Apophlegma-
tismi pituitam extrahentes. Post prædicta uero Archigenes ita scripsit. Apo-
phlegmatismi optimi sunt in dentium dolore. Staphis agrestis per se & cum pu-
legio manducata. Aut quod intra gallam est nigrum dolenti dente conterat, si-
natq; pituitam effluere. In opposita autem aurem duos hederæ corymbos cum
rosaceo tritos instilla. Aut myricæ fructus drach. II. spumæ nitri drach. I. alumi-
nis parū, aliorū nucleos V. myrti folia pauca, cum aceto ad dimidias coque, spā-
thula ex teda agitādo, idq; decoctū colluendū ac ore continendū præbeto, Dein
de hiante ore pituitam effluere permittito, & post hoc rosaceo ore colluto, pitui-
nam sorbendam exhibeto. Si uero ex colluendo aliqua circa os ulcerata fuerint;
croco & rosarū succo inungito. De fomentis. Fomenta ad dentium dolo-
rem faciūt, forinsecus ex sale torrefacto, & milio in sacculos cōiectis, aut per sor-
didos panniculos probe calfactos, Quin & Epithemata cōducunt citra aquam
apparata, uelut sunt quæ ex ordeacea farina sunt, siue ex semine lini. Ipsius uer-
o dolentis dentis fomentū hoc modo adhibeatur. Origani aridi ramulum in fer-
uens oleū tinctū dolenti denti superne affricato. Aut ricini cauliculum eodem
modo. Aut staphidem agrestē stilo cuiusā acuto infixā, eodē modo. Aut cera
dolenti denti imposita, specilli extremū calidis assidue adhibe. Aut opopanax-
cem & peucedani succum unita linteo lo illigato, & in feruenti oleo liquefacto.
Quum uero incorperit feruere pharmacu, denti imponito & cum specillo appri-
mito. Vtere mane & uesperi, & simul fomentū forinsecus & intrinsecus uelut
dixi, ante cibū adhibe, similiterq; post cibū, multo spatio tēporis interposito uter-
re. Cæterū species fomenti & hæc est. Dentem ualde bene præpurgato, & agro
contectio ac hiare iusso, hyoscyami semina sufflito. Quod si ad nullū prædictoru
malum ipsum cedat, & dolor uehemēter perseueret, tenui terebello dentē perfor-
rato, ac dictis remedijs utitor; hoc enim modo magis prodesse consueuerunt. Si
uero neq; sic profeceris, & uideat dens tollēdus esse, Citra dolorē tollere possis
ualde cōuenienti pharmaco hoc. Pyrethru acerrimo aceto ad dies XL. condito,
terito, & reponito, Visu ueru exigente, reliquis cera obturatis & probe munitis,
ipsum dolentem præmundatū hoc pharmaco integito, deinde hora interposita
digitis extrahito, aut scalpello exigit. Aut Sori cum acerrimo aceto ad multos
dies imponito, & excidet. Aut plumbaginem tritam cerato exceptam imponi-
to, Educunt fortiter rithymalli succus & sori cum galbano imposita.

De his quæ Apollonius scripsit in primo parabilium.

Primum quidem eorū caput, sunt collusiones dentium doloribus conferen-
res, quæ nihil amplius habent his quæ Archigenes tradidit. Secundo loco
refert quæ ad erosos dolentes dentes imponantur & indantur. Tertium locum
obtinent fomenta & unctiones. Quartum suffusiones ad dentium dolores. Quin-
to habentur cōmanducationes & purgationes. Sexto gargarisationes. Septi-
mo postremū capite ea scripsit quæ in dolore dentium auribus infunduntur, quo-
rum nullius mentionem facere uolui, quum si quis ea expectat ex libro illius pe-
tere possit, qui non adeo difficulter parabilis existit. Ego sanè his quæ Archige-
nes prodidit contentus fui. Quum uero Apollonius quæ naribus infunduntur
consequenter tradat, uisum est mihi etiam ea ipsa apponenda esse.

Quæ in dolore dentium naribus infundantur, Ex

Apollonio in primo parabilium.

Radicis betæ succum per se in nasum instillato, & solues dentium dolorem.
Cumini quantum tribus digitis apprehendi potest, & myrt hæ magnitudi-
nem fabæ, & duplum interioris cucumeris terito, & lacte muliebri mixta in col-
lyria redigito, eaq; in utruq; narem indiro, atq; ita attrahere iubeto, donec quis
quinq; stadia percurrere possit, deinde pharmacum emungat. Idem ad aurium
dolorem facit.

Ne erosi dentes uacillent, neq; foetorem faciant.

Veratrum nigrum erui magnitudine melle cocto exceptum cauernis inde.
Ad dentes denigratos. Testam Callainam assatā ac tritam dentibus
affricato. Hoc etiam gingiuas corroborat. Aliud, Sal fossile melle suba-
ctum in testula torreto, terito ac modica myrrha ammixta similiter affricato.
Aliud, Pulegij partem i. salis tantundem. melle subacta, in eodem donec in car-
bonem transierint torreto, ac trita dentibus affricato. Aliud, Caricas exu-
rito ac terito, modicaq; nardo ac melle ammixto unitor. Hoc & gingiuas com-
primis. Aliud, Polentam acerrimo aceto subactam exurito, ac tritam den-
tibus affricato. Hoc & gingiuas fortificat. Aliud, Alabastræ usti drach.
viii. pumicis usti drach. iiii. salis torrefacti drach. iiii. tritis eodē utere modo. Ab
horum usu collusione utendum est, uino odorato in quo ad multum tempus iris
sicca fuit macerata.

Quæ Asclepiades in i. externorum ad dentes scripsit.

Heraclidæ Tarentini ad motos dentes.

VTendum est spodio cyprio, ut per id gingiuarū comprimantur, itemq; uer-
basci radicibus coctis, postea ablutio fiat ex aqua myrti, aut rubi, aut lauri
deinde spodio rursus admoto, quies præcipiatur. Aliud, Veratri nigri
manipulum, radicis mandragoræ drach. iiii. radicis hyoscyami drach. iiii. in uas
fictile cōscito, & uini chij aut coi quā optimi heminas tres superfundito, ac ad
prunas luculentas ad dimidias coquito, indeq; liquorem excolatum ore retinen-
dum præbeto. Aridum ad motos dentes. Terebinthi fructuum torrefa-
ctorū drach. viii. aluminis scissi usti drach. viii. balaustu drach. ii. gallati drach.
unam. croci drach. i. myrt hæ drach. unam. tritis unitor. Aliud, Cornu cer-
ui usti drach. viii. Rhois rubri drach. iiii. omphacij drach. ii. balaustu drach. iiii.
corticis pinus drach. i. myrt hæ Minnæ drach. i. tritis utere. Collusio ad mo-
larium dolores. Radices smyrnij cum aceto mulso coquito, & excolatū liquo-
rem ore tenendum exhibeto. Aliud, Rumicis agrestis radicem & platy-
ni pillulas ex aceto mulso coquito, atque ut dictū est exhibeto.

Commanducationes ad molarium dolores. Canchyros drach. ii. origani
drach.

drach. II. piperis albi drach. I. uuar passæ albae, aut alterius quàm pinguiſſimæ ſex-
tarij dimidium. Vuar passam diligenter tundito, reliqua uero organū uideli-
cet & cāchry, & piper, probe trita adijcito, misceto, ac instar malagmatis emolli-
to. Vſus uero tempore nucis ponticæ magnitudinem cōmanducandam prabe-
to. Postquā uero collectā pituita fuerit, ægrum hiare ac prouere oportebit, quo
liquor facile profluat. Quo facto, uinum colluere iubeto. Aliud, Vuar
passæ pinguis ex cinatæ sextariū dimidiū, piperis albi acetabulum, grani enidi
drach. II. spice nardi drach. II. cassiæ drach. I. pyrethri drach. II. myrrhæ drach. II.
apparato ac utitor ut dictū est.

Ad corrosos dentes præseruatiuum. Per huius uſum cōseruari erosos dentes
absq; dolore. Zingiber cum aceto mulſo coquito ac probe terito, indeq; in ca-
uernā indito, forisq; dentē ex eo integito. Aliud, Hedere lachrymā galbano
misceto, aut tithymalli, siue ficus syluestris succo dissoluto, ac utitor ut dictū est.

Aliud dolorem tollens ad dolentes & erosos dentes. Conducit itidem tuſſi.

Succi papaueris drach. II. piperis albi tuſſi & cribrati drach. I. myrrhæ drach. II.
styractis drach. II. galbani drach. I. passi quod satis est his excipiendis, comundito
ſimul & catapotia formato, denti q; circūponito, & cauernæ indito. Aliud,

Succi hyoscyami drach. II. myrrhæ drach. II. opij drach. II. galbani drach. II. styrac-
tis drach. II. zingiberis drach. II. piperis drach. I. succi ſyraci tantundem, passi
quod satis est, præparato ac utitor ut dictū est.

Molare emplastrum bonum, quod in multis miraculo fuit.

Lachrymæ oleæ drach. I. myrrhæ drach. II. ueratri nigri drach. I. ſeminis bal-
ſami drach. I. styractis drach. I. piperis drach. I. hyoscyami drach. I. succi papa-
ueris drach. I. caſtorij obolos III. galbani drach. VI. succi cyrenaiici drach. I. succi
carpaſſi drach. I. panacis drach. I. ſagapeni obol. III. pyrethri obol. III. ſtaphidæ
ſylueſtris drach. II. cedriæ quod satis est quo emplatri formam acquirat.

Aliud, Sulphuris uiui drach. III. bituminis drach. II. amurcæ olei drach. III. pi-
ſtis liquidæ drach. VII. cedriæ drach. XII. piperis drach. III. opij drach. III. ſtaphi-
dæ ſylueſtris drach. unam. ueratri nigri drach. I. grani enidi drach. I. opopanacis
drach. I. picis aridæ lib. I. Arida aceto excipito, deinde liquida affundito, ac abla-
tis utitor, ex pharmaco hoc molaris dens est iniegnendus.

Ad tollendos dentes ut citra dolorem excutiantur.

Pyrethrum in acetum coniectū ad dies III. aut IIII. ſinito, deinde terito & do-
lenti denti imponito, uicinis dētib; opime præmunitis, & dolente diligen-
ter præmundato, ita ut per II. aut III. dies dentem ex hoc pharmaco integas: ita
enim citra dolorē excutietur. Aliud, Cucumeris ſylueſtris radices eo-
dem modo ut pyrethrum præparato, ac utitor identidem ut dictū est.

De mobilibus dentibus ac prominentibus.

Relatum à me etiam ante est, quod ob ſenilem ætatem aliqui dentes reſiccati
mobiles ſiunt, modicum omnino auxilium ex adſtringentibus pharmacis
quibus gingiuar coartantur ferentes, referetur autem & nunc quod aliqui ex pla-
ga mobiles ſiunt. Quidam uero etiam citra plagam, in quibus cōieſturam facio,
Nerium qui ad radices ipſorum adnatus & ſubſtratus est, per multam humidit-
tatem rigatū, laxatum eſſe, & ob hoc reſiccantibus medicamētis ad curationem
opus eſſe. Poſtquam autem motūs dentium reliquis prominentiores facios ui-
debam, & maxime quū & plaga id eſſent perpeſſi, uſum eſt mihi eos lima atte-
rendos eſſe in tantum quantū ſuper reliquos prominēt, ne ſcilicet oppoſitos ſibi
offendant tum in loquendo, tum in manducando, atq; ſanē reperi experimentū
mihi ſauens ac teſtimonium præbens, Ferream itaq; limulam quo celerius opus
n succederet

successerit feci, Multæ enim aggressiones dentem mobilem faciunt, cui quiete & minimo motu opus erat, si saltem stabiliri debeat. Quædoq; igitur eminentiæ inæquales apparent in dentibus, & iuxta aliquas tantum partes lima opus habet. Aliquando uero æquales sunt extremitates, & æquali similiter lima indigent. Oportet autem gingiuis linteolum molle usq; ad radices dentium circumdare, deinde cum digitis sinistræ manus leniter amplecti, simulq; tute & circa compressione, ne concutiantur cui limam adhibemus, atq; ita chirurgiam aggredi. Quod si dolore percipiat in admotione limulæ, & quod affecta pars digitis uehementius contingatur, quiescere quidem ab opere statim conuenit. Vbi uero ex pharmacis quæ post referentur, interea aliquid exhibuerimus, rursus ut dictum est aggredi, iterumq; modice cessare, donec extremitates circa dentes dederantur, atq; id non prima tantum die his & ter, sed etiam sequenti faciendū est, ac imperandū ægro ut neq; loquatur, neq; durum aliquem cibum accipiat. Vtatur autem alimento succo pisanæ, & sorbitione ex alica, & pane madido, atq; alijs ad hunc modum mollibus. Cæterum materiei sylua quæ motis dentibus comoda est, talis existit.

Ab Archigene scripta, quæ mobiles dentes corroborant.

Mobiles dentium stabilire uolens, myrrhæ, pompholygis, aluminis scissi, amyli, æquales singulorum partes tritas admove. Aut oliuarum albarum succum & rutam melle mixta affrica, deinde nardum cum alumine liquido obline. Aut alumen rotundum cum duplo sale dentibus adsperge. Aut aluminis scissi & misyos æquales partes cum cedria ad cerati liquidi spissitudinē redactas dentibus obline, & pituitam defluere sine. Quo facto, asinum lac colluat calidum, aut acetum, aut uinum in quo malicorium & galla sunt incocta.

Ad debilitatos dentes tum alios, tum molares.

Mel, ceram, æquis portionibus ad solem calida aqua diluito, & picis dimidium ammisceto, ac ad emplastri formam deducito, atq; manducanda exhibeto. Quod si aridum sit pharmacum, parum olei addito. Summè facit & mastichechia commanducata. Cæterum in dentium stupore portulacam manducant, Aut oleum calidum ore contineant.

De dentitione puerorum, ut Archigenes scripsit.

Infantibus qui dentunt, si doluerint, canino lacte gingiuas obline. Aut si leporino cerebello infantis gingiuas illeueris, cito dentes proueniunt.

Amuleta dolori dentium reluctancia, quibus fidem deberi putant, hæc sunt.

Si batrachij siue ranunculij folia ei qui dentem dolet, in eiusdem partis brachium imposueris, dolore quidem liberabitur. Brachium autem exulcerabitur, cuius curam prout conuenit facies. Si uero infans cui dentes prouenire incipiunt, dolores habeat, ueteris cochleæ cornu pelliculæ illigati pro amuleto appende.

De doloribus gingiuarum.

Gingiuis dolentibus collutiones serè eadem faciunt quæ ad dolores dentium sunt descriptæ, Magis tamē proprie facit acetum cui hyoscyami radix est incocta. Verum inflammatis gingiuis alumen cum salis quarta parte tritum admove: post morsum uero perceptum, uino aut foliorum oleæ decoctio ipsas colluant. At uero fluxione laborantibus gingiuis & corrosis cum tumore & dolore, & per nomen depastis, præclare cōducit fomentū, quod sit per atriscapium cui lana obuoluta est, in feruens oleum tinctum, & gingiuis usq; quo exequetur admorum & donec circumcirca albæ reddantur. Ita enim sistitur Nomes, & ex sana carne id quod corrosus est connutritur: postea uero affricationibus utere & his quæ ad dentes sunt descriptæ, proprie autem conuenit galla tenuissime trita, acetabuli mēsurā, cum myrrhā magnitudine fabæ, tritis itaq; ac leuigatis utitor.

Quod

Quod si enascens dens grauititer reprimat & compungit gingiuam, cyperum cum busyro & ungento fusino iuxta exortum illinito. Cæterū in Epulide, hoc est super percreſcente ex inflammatione carne, atramentum sutorium cum pari myrteo, & modico alumine scisso admoueto. Faciunt pleraq; etiam ex Antheris, id est floridis appellatis compositionibus.

Quæ dentes præseruent.

Quin & doloris dentiū præseruatua Archigenes his uerbis tradidit. In dentium doloribus præseruantia à dolore cōueniunt eiusmodi. Tithymalli radices in uino ad dimidias coquito, & his in mense colluito, ac nunquam doleris. Optime conseruat citra dolorem, & fortes dentes, si fabam ægyptiam, reiecto interno amarulento, trueris ac dentibus & gingiuis semel in anno affricaueris. Aut alumine scisso cum modica myrrha confricato, & nunquā erodentur: si uero adstringat hoc nimium, melle utitor. Aut granorum Iuniperi paruorū, & cupressi foliorū parem portionem, & gallæ parum, melle cocto excipito, & in pastillos drachmæ pondere reducto, ac utitor unum ex his cōmanducando, in superq; uino odorato colluendo. Aut iridis illyricæ nucis ponticæ magnitudinem mande, similiterq; collue. Aut salī gallam omphacinen in uino odorato coctam misceto & mandito. Optime præterea tum ad præseruandos à dolore dentes, tum ad corroborandos eosdem, ac pariter gingiuas, ampliusq; ad decorem faciunt smegmata subscripta. Lanæ succidas linteolo illigatas exurito, deinde salis tertiā parte addita affricato. Aliud, Aut dasypodis caput uisū tritū. Aliud, Aut salem & mel ad cerati formam terendo redigito, deinde mūdo linteolo illigata exurito, & ammixta iride illyrica modica dentes confricato.

Quæ Andromachus scripsit ad omnes dentium dolores.

Compositio molaris eadem hora dolorem sedans. Piperis, pyrethri, succi tithymalli, galbani, singulorū drach. i. galbano excepta in cauernam inde. Molaris Antiphanis, etiam si non præmundaris indito, & dentem ex ea intergito. Seminis hyoscyami, opij, nitri, myrrhæ, pyrethri, piperis, singulorū drach. unam, galbani drach. ii. tritis ex uino utitor. Alia molaris qua utor. Aluminis scissi drach. i. piperis albi drach. ii. opopanacis aut piperis longi obol. iiii. foreos obol. iiii. gummi aqua macerati drach. ii. ceræ duplum totius ponderis omnium, ceram in aqua calida tritam reliquis misceto, atq; ita utitor.

Alia Chereæ. Myrrhæ drach. i. ueratri sesquidrach. pyrethri sesquidrach. aluminis scissi obol. iii. Aqua terito, & dentē oblinito, ac superne cerā imposito.

Alia molaris ex libris Aphrodæ. Aluminis scissi drach. iiii. myrrhæ obol. iii. piperis grana v. ego obol. iii. accipio, & melius facit. Resina excipe & præmundata cauernæ inde, & splenium illitum superimponē.

Alia molaris elusdē. Etiam non præmundatæ cauernæ hanc inde, & superne spleniū ex phar-maco itē imponē, & probe faciet. Seminis hyoscyami, succi papaueris, myrrhæ, nitri, pyrethri, piperis albi, singulorum partem unam, galbani partes duas. Cum aceto tritis utitor. Alia ex libris Aphrodæ. Succu peucedani drach. unam. succi papaueris drach. i. tithymalli myrsinitæ, succi cyrenatici singulorum drach. i. galbani drach. i. & dimidiam. Galbano excipe & in cauernam inde, & ubi præpurgaris dentem in splenium illine, in una hora dolorem sedat.

Molaris bona. Scissum alumen papaueris succo exceptum indito & oblinito. Alia ut Aristocrates. Papaueris drachmas ii. sagapeni sesquiobolum, succi cyrenatici tantundem, piperis drachmā unam, sphondylii tantundem, myrrhæ tantundem, galbani, pyrethri, croci, singulorū tantundem, mel quo strigmentitiam spissitudinem accipiat.

Ad dolores dentium, gingiuarum, aliāq; multa Aristocratis gr̃matici.

Mellis lib. i. aceti acris sextarii i. aluminis scissi sexuncem. Alij liquidij trientem habent. coquito donec nigrescat. Ad dentes motos. Aluminis scissi partē i. manne partē i. tritis utere conspergendo motū ex eis dentem.

Ad erosionem & dolorem dentium.

Quinquefolij radices in uino coctas à coena colluendas præbet; coquito autem ad tertias. Aliud, Rumicis radices cum uino aut aceto coquito, & modicum auripigmenti triti inspergito, ac liquorem ore retinendum exhibeto. Coquatur itidem ad tertias.

Ad gingiuas madore laxas. Pyrethri drachmas iij. thymi drach. ii. aluminis scissi obol. iij. Iridis illyricæ drach. i. tritis utere, ac gingiuis impone.

Pythij, ad motos dentes, gingiuas humore grauidas, & subcorruptas.

Alumen scissum chartæ inuolutum uritur, deinde tritum rubrica coloratur, atq; ita gingiuis admouetur, similiterq; subcorruptis inditur.

Dioclis medici ad dentium dolores.

Galbani, opij, pipēris, ceræ, staphidis syluestris, granī cniidij singulorū drachmam unam, trita cerā excipito & illinito.

Aliud commodum ad corrosos dentes.

Succum silphij indito, aut ipsam radicem. Aut galbanum cum pipere. Aut opij cū galbano. Facit & opopanax in cauernas infartus. Ad dentium dolores. Soreos drach. ii. aluminis scissi drach. ii. misyos drach. i. Aridis utitor.

Smegma quo utor gingiuas contrahit.

Cornu cerui usti libras. ii. lanæ succidæ teneræ quadrantem, salis ammoniaci trientem, pipēris albi sextantem, costi unc. i. aluminis scissi sextantem, Iensisci, & perdicij herbæ ustæ cum lanis, aut per se solum, utriusq; quartam libræ partem, foliorum malabathri unc. i. contrusis simul utere.

Quæ Crito scripsit ad omnes dentium affectiones, Quædam ex eis etiam gingiuis cōferunt, & ad foetorē oris, & nigros in superficie dentes.

Ordeum & salem melle ac uino subacta in charta ligato ac urito, & ex leuigatis gingiuas confricato. Aliud, Atramentū sutorium, alumen, putamina mali punici dulcis, æqualibus partibus trita ac leuigata, gingiuis in ieunio affricat; deinde uino adstringente collue. Aliud ad gingiuas ulceratas. Nitri usti, cyperi usti, utriusque pares partes leuigatas cum melle illine.

Aliud ad gingiuas & dentes motos. Iridis trientem, corticis pinus trientem, aluminis scissi unciam unam, aridis utere.

Aliud ad motos dentes. Lentiscum, myrtum, gallam, in uino cocta colluenda præbeto. Aliud, Salis partes duas, aluminis scissi usti & acri aceto extincti partem unam, tritis utitor, deinde uino colluito.

Ad motos dentes stabiliendos. Atramentum sutorium cum oleo terito, & cum lana dentium radicibus admoueto. Facit & ad erosos dentes cerā exceptum & inditum. Item cum myrto pari tritum ac melle exceptum. Aliud, Vlmī corticem in uino coquito, & decoctum ore tenendum exhibeto. Item cerui cornua in uino cocta. Ad corrosos uero dentes capparis radicem cum acri aceto ad dimidias coquito, ac tepidum colluito. Cortice item eodem utitor modo, Idem ad dolores facit.

Fomentum dentium corrosorum & dolentium. Sulphuris uiui partem unam, butyri partem unā, liquefacito & cum his per auriscalpium foueto. Aliud, Dentes ex sale præfricato, & lixiuum reperfactum medio cri tempore in ore conuincto. Oportebat hic apponere, In gingiuarum dolore hoc conuenire.

Compositio

Compositio molaris eadem hora siue die dolorem sedans.

Piperis, pyrethri, succi tithymalli, galbani, singulorū drach. i. terito & galbano excepta in cauernam indito. Alia, Piperis sesquibolum, granicnidiū tantundē galbani sesquidrach. spumæ nitri obol. ii. croci sesquibolum, tridis sicca sesquibolū, rosarū tenerarum drachmæ dimidiū, trita melle excipe, & ad emplāstri formā redactis molarem denti intege. Ad corrosos molares. Melanthiū torrefacito & ex acri aceto terito, indeq; molarū cauernā integito, & non amplius erodetur, sed manebit ut est. Quidā etiam nitri drachma una cum acri aceto uiuntur. Ad idem, Castorij, pyrethri torrefacti, galbani, singulorum æquales partes mixtas indito. Ut molaris citra dolorem tollatur.

Farinæ cicerū puræ drach. ii. succo tithymalli exceptas denti imponito, supraq; hederae folia addito, & ad horam finito, tollito, & sua sponte in minutas partes frāgetur. Facit idem ad erosos. Verū usus tēpore ceram emollitam circumponito.

Aliud, ut dens digitis tollatur. Præmūdato aurea circumcirca denrem, & forreos, gallæ omphacines, staphidis syluestris, aluminis scissi, sulphuris uiui, piperis logi, æquales partes leuigatas cedria excipe & impone, ceraq; liquefacta dentem circumline. Eijcet ipsos etiam pyrethri, & tithymalli myrsinitæ succus cum farina erui ad massæ fermēti modum coactus & impositus. Aut pyrethrum ad dies XL. a cetō maceratum & denti circumpositum. Aliud ad fauciatōs. castorij, pyrethri, opij, galbani, singulorum æquas portiones mixtas indito.

De dentifriciorum compositione, quibus utor.

QUædam ex dentifricijs à me cōpositis experimento cōprobata, & generosa efficacia prædita, digna mihi uisa sunt quæ conscriberentur, & primū sanē ea quæ frigidas dentium affectiones curant, siue ob immoderatā frigidaæ aquæ portionē, siue ex fructibus per niuem frigefactis, siue ex quibuscūq; alijs edulij, aut potionibus, sint productæ. Insuperq; si propter frigidū humore ē capite in ipsos defluentem ortum habeant. Denies igitur ob humorem refrigeratos magnifice iuuat Apophlegmatismus. Quomodo uero hunc præparare oporteat, alio capite priuatim conscriptum habes. Eos uero qui citra humorem frigefacti sunt, per solum medicamentū hoc quod nunc referetur curare decet. Præstat eo etiā post apophlegmatismum uti, ut non solum nocuum euacues humorem, sed etiam generatam ab ipso affectionem persanes. Compositio pharmaci hoc modo habet, Accipito herbas duas, quarum altera sideritis, altera perdicias appellatur, easq; domi sensim citra solis admissionem siccatō, ut neq; humida amplius, neq; sicca adeo extent, & urito in tantum, ut ubi primum conuersioni & sectioni aptæ fuerint, ab urendo cesses; ulescit enim & corrumpitur uis earum si diutius urantur. In alia porro oli uia sal fossilis uratur cum alumine scisso, Autico melle subactus, Deinde hæc alijs permixta tundantur, & per angustissimū excreta cribrum, rursus in mortariō terantur, Melius enim erit pharmacum, quanto diligentius fuerit leuigatum. Utendum autem eo est solum ad dentes confricandos, citra gingiuarum circumfutarum contactum, nisi humore fuerint pregnantes, Quum enim resiccandi uis habeat pharmacum, aptum quidem est gingiuis humanibus, iniunctum uero siccitatē tamen ipsas dentium radices post gingiuas sitas, eo confricare oportet itidem ut ipsos dentes. Cæterum eorum quæ in compositionem miscetur eiusmodi ponderum proportio esse debet. Herbarum quidem post ustionem drach. xvi. Salis uero cum alumine uisti drachmas xli. Ante uero ustionem utriusq; herbæ par pondus miscatur. Sal autem quadruplici aluminis pondere ammiscatur. Aliarum autem rerum nihil uratur, sed arida iniiciantur iuxta subscriptam appōderationem. Comæ origani drach. ii. piperis drach. ix. in alio ex

exemplari drach. II. pyrethri drach. II. costi drach. III. seminis apij drach. III. iridis illyricæ drach. V. mentæ siccæ drach. II. cornu cerui aut capræ usti drach. II. feseleos, hyssopi, utriusq; drach. II. Si odoratum esse uelis, calliæ aut amomi drach. II. ammisceto. Si uero in regis usum præparaueris, cinamomi drach. I. addito.

Ad mobiles dentes aliud, quo utor.

Seminis callitrici libram unam, aluminis scissi & rotundi utriusq; quædrantem, spicæ nardi sextantem, malabathri foliorum unc. I. piperis albi unc. I. pyrethri drach. V. contundito & cribrato simul omnia, ac gingiuis usq; ad radices dentium admoueto. Timocratis dentifricium.

Ad gingiuas madore laxatas, putrescentesq; ac cruentatas, mobiles molares, cõcussos dentes, ozanas, putrefactiones, parulidas, & omnia oris uitia, ac dentium dolores. Accipito herbæ perdicidis modium italicum, alij minam habent, salis albi tenuis sextarium unum, mellis hexagiũ. Contundito ut massa friabilior reddatur, qua in ollam nouam coniecta, ollâ luto figulino obturato: operculum autem adaptetur circa medium perforatum, quo per ipsum foramen rudicula immissa pharmacum super prunas possum agitetur, donec neque fumosum quippiam neque uaporosum effertur, Deinde ab igne tollito & refrigerato. Et fumito ex hoc toto, drachmas XIII. piperis albi drach. V. piperis nigri drach. VI. pyrethri drach. VI. aluminis scissi usti & uino austero extincti drachmas II. pumicis, myrrhæ, hyssopi, seminis apij, pulegij, singulorum sextantem, mentæ, iridis illyricæ, utriusq; drachmas III. Hæc omnia in sole præsuccata tridito & cribrato, ac reliquis ex olla leuigatis, ammisceto. Aliud, Perdicij recentis drach. X. mellis drach. III. aluminis scissi drach. III. iridis illyricæ drach. III. piperis albi drach. VIII. nigri drach. III. pumicis drach. II. myrrhæ drach. III. pyrethri drach. II. mentæ siccæ drach. III. hyssopi drach. II. pulegij drach. II. seminis apij drach. II. herbæ sideritidis drach. III. salis fossilis drach. XIII. Perdicium & sideritidem ac mel & salem mixta uirito: alumen uero per se ustum uino extinguito, deinde simul omnibus contusis uiutor.

Aliud, Salis assati cum melle & perdicio drach. XIII. aluminis scissi, assati, & uino austero extincti, iridis illyricæ, utriusq; drach. III. helixines, myrrhæ, mentæ siccæ, singulorum drach. III. pulegij seci, pumicis, pyrethri, hyssopi, seminis apij, singulorum drach. II. folij malabathri drach. II. piperis albi drach. V. nigri drach. VI. Tussis & cribratis utitor. Aliud, Salis rosti cum melle & perdicio drachmas XIII. pulegij drach. II. aluminis scissi usti et uino austero extincti drach. III. iridis illyricæ drach. III. piperis albi drach. V. nigri drach. VI. pumicis drach. II. myrrhæ drach. III. mentæ drach. III. pyrethri drach. II. hyssopi drach. II. seminis apij drach. II. Sal lotus, melle probe subigitur, tritusq; in ollam nouam mittitur. Deinde etiam perdicium inditur, sale undiq; conspersum: quo factio, operculum ollæ imponitur, ipsaq; luto oblita in clibanum datur, indita torrentur, & exempta simul cum alijs teruntur. Oportet enim ualde leuigata in usum adsumere.

Smegma dentium quo albi & odorati redduntur, & ab erosionē adseruatur. Nitri unciam unam, testæ sepiæ unc. I. myrrhæ unc. I. tritis utitor.

Dentifricium optimum. Aluminis scissi sexuncem, mastiches unc. I. comæ rosarum quadrantem, iridis tridentem, tritis utere, indeq; aquam tepidam colluctandam præbe.

Dentifricium Damocrati inscriptum.

Libellus paruus extat Pythici appellatus, quem Damocrates Pythicũ inscripsit, ab eo qui ipsi pharmacorum ori destinatorum compositiones tradidit appellatione ducta, in quo sanè libello iuxta finem etiam hæc conscripta reperiuntur.

Si denti

Si dentificijs uoles uti bonis,
 Quæ candidos custodiant, immobiles
 Dentesq; reddant, oris & grauolentiam,
 Laxasq; gingiwas sedent, & comprimant.
 Album hoc parabis optimum sic pharmacum.
 Cerui cape cornu sic quater usti quàm optime,
 Quartam libræ partem, salis solam libram.

In alio exemplari sic reperit.

Cerui cape cornu sic quater usti quàm optime,
 Libram mediā rursus salis uncias duas,
 Ammoniaci siccī nec amari hīnc amplius.
 Alicuq; mastiches chiæ, solam libram.
 Costi quadrantem, aut paululum quid amplius,
 Albiq; iunci tantum, & albi mox piperis
 Vnam unciam, malabathri at uncias duas.
 Contusa, cribrata omnia hæc mortario
 Utenda præbebis modo quem dixerō.
 Quod si uelis parare quandō ad phlegmonas,
 Et uile gingiuis cruentis, saucijs,
 Carnemq; callosam simul promentibus,
 Aluminis coniungito his scissi libram.

Aliud Damocratis dentificium.

Verum magis parabile hoc fortasse erit,
 Et promptius factum, minus nec commodum,
 Admixta & hoc quadam simul dulcedine.
 Mulsum Sideriū uiridem capito herbulam,
 Magnam in nouam quam tu patinam mox inditam,
 Miscebis ordeo recenti sed modico.
 Sico rdeo ut posito sequatur fasciculus
 Herba, sal hinc, herba atq; iterum, mox ordeum.
 Fiantq; tam diu uicissim hæc omnia
 Donec patinæ omnem expleis amplitudinem,
 Ut mox supernum rursus herba habeat locum.
 Furnoq; mox calente, uel clibano indita:
 Torrenda per noctem fines, uel sic potius
 Vrenda, quo teri queant ita promptius,
 Cribroq; mox sed arctiore hinc excuti.
 Odoris addes gratia his, parum tamen,
 Albi piperis thurisq; mox item modicum,
 Hiac iunci odori plus, cypericq; optimæ.
 At omnibus mixtis probe & iam sepositis
 Plus mastiches aridæ chiæ confunxeris,
 Dabis sed hinc in uesperam uolentibus,
 Maneq; rursus maxime puris uiris.
 Sed colluant à pharma co mox Bromium
 Lymphis sociatum, & maxime hoc in uesperam,
 Sed mane acetum mulsum aquosum præstiterit,
 Oris leuandis turpibus foetoribus.

Aliud Aurelij. Alumen in testa ærea aut figulina uirito, ac uino austero ex-

tinguko, eiusq; dodrātem accipito, & mastiches sextuncem, thuris unc. l. solij ma-
labathri drach. iiii. cyperi drach. iiii. misceto ac utitor. Aliud quo utor.

Cornu cerui usti drach. ii. marmoris unciā l. origani drach. iiii. utitor.

Compositio pharmaci dentes præseruantis.

TRagorigani drach. ii. hyssopi drach. iiii. herbę perdicij seu perdicidiadis, mel-
le & sale tenui subactę, & in olla exusta, donec in prunas redigat, quadran-
tem. piperis drach. iiii. tundito & cribrato, & post usum reposito, Neq; dolebūt
dentes neq; sindentur, neq; parulides producētur, neq; gingiue superflua carne
redundabunt, neq; fluxione infestabūtur. Habebis autem os odorum, & splendi-
dos dentes. Quidam balsamenta in olla exusta ad pharmacum addūt, aut etiā
cybū. Si quis enim eorum cinere per se utatur, dentis dolorem non percipiet.

Finis quinti libri.

CAPITA SEXTI LIBRI

De affectionibus in ore, & de pharmacis ad eas commodis.

De crustis in ore.

Ad columellam siue gurgulionem.

De pharmacis ad ulcera oris aphthas appellatas.

Caput I

Cap. II

Cap. III

Cap. IIII

CLAVDII GALENI PERGAMENI

DE COMPOSITIONE PHARMACORVM LO

calium, siue secundum locos Liber VI Iano Cor-

nario Medico interprete.

De affectionibus in ore, & de pharmacis ad eas commodis. Cap. I



VERVS profecto sermo est, quę pleriq; artifices in ore habent,
Quod non idem sit, neq; simile, à uiua uoce discere, & ex li-
bro legere. At uero industrij & natura prudentes homines,
non uulgarem sæpe utilitatem consequuntur, si in libros in-
cidant nō obscure cōscriptos. Itaq; quā sciam nō paruam
utilitatem ex hac tractatione, primū quidem amicis ac sōda-
libus accessuram esse, qui uidelicet etiā per opera cogno-
uerūt quantā uim habeat rationalis Methodus ad medica-
mentorū copā parādā: deinde uero etiā alijs qui optimarū rerum studio se
fatigare nō cessant, rem gratam facere uolens, ad huius operis explicationē pro-
gressus sum, nō festinabūdo & cōpendiario docendī modo in hoc instituto, sed
prolixo & longiore, quali etiā in sermonibus, quos frequenter citra scriptum
ad amicos habeo, uti soleo. Præstat rationalis auxiliorum inuentio experimen-
tatrici: quemadmodum etiā ante iam mihi in sermone de sauciatis neruis di-
ctum est, in cognitione uniuersali facultatis pharmacorum, quorum usus circa
singulas affectiones contingit. In pharmacis itaque orī destinatis: ob id stomati-
cis appellatis: uelut est quod ex moris constat omnibus nōrum, primus meden-
di scopus est communis omnium partium inflammatarum, deinde cōsequenter
alter scopus priuatim ex ea quę curatur. Quę igitur sit affectio inflammatorum
prius nosse oportet, si ex ipsa indicationem quandā auxiliorū accipere uelimus.
Prædidicimus autem & prius demonstratū habemus, Inflammationes ex calidi
sanguinis

sanguinis influxu fieri. Didicimus etiam quod hunc ipsum influxum in principio quidem reprimere ac repellere oporteat, præterquam si ad partem aliquam principalem recursum sit, atque aliud quoddam grauius malum effecturus. Verum nunc adeo nihil opus habemus eiusmodi determinationibus, sed uelut memores adhuc sumus quomodo totum corpus præparare, ad curationem affectuum circa quæcunque partem consistentium oporteat, ad institutum progrediar. Et enim uenæ sectione utimur, & purgatione, & clysteribus, & inedia, ubi totum corpus apparuerit aut multitudine humorum refertum, aut eorundem malicia uitiatum. Si uero neutrum horum adsit, statim ad curationem per localia remedia peruenimus. Quomodo igitur inuenire ipsa oporteat eum qui oris inflammationes rite curare uelit, præsens sermo statim te docebit. Quomodo uero inuentis conuenienter uti oporteat solidilibus in memoriam reuocabo, qui sæpe uiderunt me pharmacis eorum medicorum qui me in consilium aduocarunt, curantem eas affectiones, quarum gratia uocatus fui. Impossibile enim est pharmaco rite uti eum qui uim ipsius non noscit, iuxta cuius efficaciam auxiliatur. Eodem igitur modo in inflammationibus in ore consistentibus, communis scopus omnium ipsarum si adsumpserit ex natura particulæ indicationem, reperiet primum quidem genus pharmacorum quibus uti cõueniet. Deinde consequenter etiam particulares in ipsis differentias si quidem præcognouerit simplicium pharmacorum facultatem, uelut iam sæpe est demonstratum. Genus igitur repellentium pharmacorum in principio inflammationum, in refrigerantium materia situm est. Hæc autem ipsa quum duplicia existant ut didicimus, Quæcunque adstringendi natura prædita sunt, efficaciorẽ uim habent ad influxum citius repellendum. Inest autem ipsis statim etiam uis cogendi & densandi superficiem corporis, cui adhibentur. Cõmunis igitur scopus hic est prohibendi incipientes inflammationes, ab ipsis affectionis indicatione inuentus. Alter uero à particulæ quæ curatur natura ipsi accedit: quum sciamus rariorem esse ac molliorem superficiem tunicæ oris, nõ paulo quam est cutis, quæ totum corpus ambit. Inest autem & aliud quiddam particulis oris, atque id duplex, quod non adest ipsi cuti. Insuauitatem enim medicamentorum quæ adhibentur sentiunt, & duos meatus subiacentes habent, per quos in uentrem & pulmonem defluere quippiam ex stomaticis pharmacis potest: quale est quod per atramentum furoris constat. Et sanè medicus neque imprudens, neque inexpertus facultatis pharmacorum, ubi hoc misceuerit pharmaco ori destinato, multo quidẽ fortius ipsum reddet, uerum uchementer lædens, si quidẽ ad gulam, aut asperam arteriæ extremum quid præterlabatur, atque hæc quidẽ ut statim occurrentia, per ipsa uero & uentrem, et asperam arteriam, & pulmonem. Adest autem pharmaco ipsi circa gustum insuauitas, quæ tum usus tempore molesta est, tum per totam perseverat diem, adeo ut etiam in cibis accipiendis iniucunda sit. Huiusmodi itaque fortibus & quæ uenenosam habent facultatem nõ cõuenit uti, ad affectionum oris curationem, nisi magna necessitas urgeat. Neque uero de inflammationibus solus hunc sermonem intelligere oportet, quum neque ex harum indicatione ipsum inuenerimus, sed cõmunem esse de omnibus oris affectionibus intelligendum est, ut qui indicationem ex ipsa particulæ natura habet. His igitur cõsideratis ab eo qui pharmaci ex succo mororum composuit primum quidẽ ipsum cum melle coxit, quo repositum in promptu haberet per totum annum, non illo tempore solum, quo expresso fructu, succo uti licet. Melior enim solus est incipientibus inflammationibus, ideoque me sæpe ipso in huiusmodi inflammationibus uti uidistis. Durabilior autem est priuatim cum melle apparatus. Appellauit autem durabiliorem, nõ solum quod cito corrumpitur citra cocturam cum melle repositus, ita ut sequenti anni tempore eo uti non possimus: sed etiam propterea

propterea quod utilior est, ad sequentia inflammationis tempora, usq; ad perfectam curationem. Quemadmodum enim in principio comoda sunt pharmaca id quod influit repellentia: Sic post principium usq; ad finem, pharmaco opus est ex utrisq; mixto, repellente uidelicet & discutiente facultate praedito: ac primo quidem tempore adstringens praecellere oportet, ad finem uero discutiens, interposito uero tempore aequales utrorumq; partes esse conuenit. Quando uero uelut induratum quiddam de inflammatione relinquitur, penitus non conuenit adstringens ad discussorium ammiscere, nisi prius totum corpus sit euacuatum. At qui neque in principio bonum est discussorium adstringenti ammiscere. Ceterum qui pharmacum ex succo mororum composuit, parum ex croco & myrrha et commiscuisse uidetur, quod communem habeant facultatem concoctoriam inflammationum: priuatim uero crocus quidem adstringat, myrrha autem calfaciat, intantum ut sufficienter discutiat. Penetrat enim magis in altum corporum myrrha q; crocus, utpote substantia tenuium partium habens, atq; ex hoc duplicem utilitatem exhibet, simul introducens quidem secum uires ammixtorum, & per sanas usq; in altum inflammata. Et tamen adiuuat se mutuo crocus & myrrha in penetrando in profundum, crocus quidem uelut impellens myrrham, myrrha uero uelut dux praecedens peditem sequentem crocum, si ita dicere liceat, deducens. Quemadmodum enim crocus ob adstringentiam uim, minus habet substantiam tenuium partium quam myrrha, Sic myrrha substantia tenuiorum partium praedita, citius quidem uim suam in altum transmittit, citius autem etiam ad cutem recurrit, simul secum efferens ea quae in profundo sunt attenuata. Hanc igitur recursus eius uelocitatem impediunt adstringentium mixturae: non enim hoc solus facit crocus. Est itaq; in pharmaco stomatico ex moris appellato, tum mororum succus, qui non modicam habet adstringentem qualitatem & facultatem, tum alia quaedam etiam ammiscetur ubi quis forte pharmacum reddere uelit. Haec igitur adstringentia deducuntur quidem per myrrham, quae uicissim ab illis compellitur, atq; ita se mutuo adiuuant, quousque ipsorum amplius progrediatur. Vidistis autem saepe me ad pharmacum ex moris in principio quidem Rhoeis succum, aut uuae acerbae succum, quem priuatim omphacium appellant, ammiscere. Si uero haec non adfuerint, florem rosarum, aut ipsas rosas siccas, halaustium, cytinum, & malicorium aridum, & gallam omphacium appellant. Amplius autem & pini corticem, itemq; thuris, & gum hypocythidis, tum lentiseci succum, & ut compendio dicam, omnia adstringentia, praeterea ea quae corrumponentem habent facultatem, quae uenenosam uocant, & lethalia species quaedam existit. Didicistis enim quod non omne lethale statim etiam est uenenosum. Quemadmodum autem in principio inflammationis harum rerum mixtura fortius efficit medicamentum stomaticum: Sic quum resisterit quod influit nullo eiusmodi opus habet solo. Sufficit enim tunc id pharmacum quod crocum & myrrham assumpsit ad inflammationem concoquendam. Nam ubi iam fuerit concocta, addimus etiam aliquid ex discussorijs, uelut saepe uidistis me inijcere spumam nitri, & aliquando ipsum nitrum, quod tenuium partium existit, & iam ab omni bus Berenicium appellatur. Ultra hoc etiam sulphur uiuum uocatum, aliquando etiam saponem, origano quandoq; incocto, interdum etiam hyssopo, aut alio quopiam simili, pulegio uidelicet, thymbra, thymo, calamintha hortenſi ac agresti. Hoc igitur modo quis recte utetur pharmaco ex moris, si iuxta indicationum uniuersaliu quantitate ipsius usum permutet. Quousque enim quicquid influxerit, id ipsum repellere conuenit. Vbi uero resisterit, concoctoria asserre, & deinde consequenter discussoria. Manifestum enim quod per huius methodi usum, nemo qui simplicium pharmacorum facultatem nouit, unquam auxiliorum inopia laborabit, siue per morientes uenietur.

res uenietur, siue quid operetur in agro, siue in peregrinatione quandoq; præparatis careat medicamentis, uelut Erasistratus scripsit, qui seipsum curauit ad rubi succum progressus, quum in illo loco Andronius pastillus præfens non esset. Quum enim sciret pastillum Andronium in adstringendo curadi dominium habere, materiam adstringentem perquisiuit. Non uelut Serapion & Menodotus aiunt, empirica transiitione ad simile usus. Iuxta hanc enim uobis demonstraui plurimam dissimilitudinem succi rubi ad pastillum Andronii esse, paucissimam uero similitudinem iuxta unum solum, uim uidelicet adstringendi. Verum qui generale facultate quam uniuersalem uocant, nouit in quacumq; materia eam repperit, cõfidenter ea utetur. Huiusmodi autem materieru ingens est acerus, quibus omnibus uti licet, ita ut solum fugiamus quæ uim quandam iniucudam aut uenenosam habent. Sic igitur etiam ego pharmacum ex succo nucum uiri dium præparauit, nullo doctore usus, neq; aliquod præscriptum sequutus. Cuius uim expertus sum multum aliorum stomaticorum facultatem excedentem, alia autem dico, id quod ex moris constat, & id quod ex succo rubi mororum præparatur. Ita enim rubi fructu appellant, & tertium quod ex musto, & quartum quod ex punicorum succo, & quintum id quod per adstringentia mala cõponitur, ex quoru numero optima sunt cydonia & struthia appellata, & post hæc ad præsentem usum quæ Cestiana à Romanis appellantur. Cæterum composita ex multis talibus sunt, quæ ex fructibus præparantur.

De stomatico medicamento ex nucibus.

EGo autem quando primus ex Alexandria in patriam redii, agrum pertransiui & inueni quendam hortulanu ab uua & tonsillis ac glandibus ferè suffocatum: utebatur autem collutione aquæ mulsæ rosæ in ipsa incoctis. Quum igitur uidissem fructum nucum in uigore esse, iussi detractum ab eis externum corticem, quo etiam tinctores uideram utentes, statim in mortario contundi, & succum eius per linteu excolari, nondum sciens quomodo iuxta crassiciem aut tenuitatem haberet: quum uero reperissem aquosum & compage tenuem, gargarisare eum iussi ipsum hortulanu. Postquam uero ualde tenuis apparebat, præcoxi: & mel cõmensurate, uelut in eo quod ex moris fit fieri sciebam, ammiscui: atq; ubi iam ad cõpagem mellis reductum esset, hortulano utendu reliqui. Porro quum uiderem celerrimam utilitatē ipsi inde oboriri, præstabile ratus sum in multis experiri, atq; ex hoc sufficiente experimento accepto de facultate eius pharmaci, semper ipso utor, uelut noster. Merito itaq; mirandum nullum ex prioribus medicis aliquid de hoc pharmaco mēte cõcepisse, ut tum parabili, tum generoso hoc succo uteretur, maxime quum uiderint quomodo etiā manus insiciantur eoru qui uirides nuces decorticant. Ex his enim apparet qualis sit eoru succus, & quod agere elui possit ipsarum adstringendi uis, adeo ut neq; per fortissima exterioria elui queat. Amplius astit adhuc miratus sum de medicis qd nō cogitauerint forte esse ipsaru uim, quum etiā tinctores uideant eiusmodi nuci corticibus uti. Nisi enim in profundu manu descenderet, & nisi per omnem substantiam lanaru penetraret, non certe agre eluibilis esset. Quum uero descendat, indicat planè substantiam succi tenuium partiu esse, rationi autem consentaneu est adstringendi uim maxime proficere, ubi in eiusmodi substantia cõtineatur. Etenim quæ ex adstringentibus crassas partes habent, per adstrictionem cogunt & cõdenfant superficiem corporum quibus adhibentur, & à progressu in altum ipsorum corporum sese impediunt. Quibus enim etiam alias ob substantiæ crassitudinem impossibile erat progredi in altum, his sanè amplius impossibile fuerit densato corpore suauare id quod totum est inflammatum. Optimu itaq; esse nucum succum persuasus, ut qui

ut qui etiam coctū cum melle gustarim nihil insuauē habentem. eum in quatuor partes diuidō, & ad primam statim aliquid ex adstringentibus iniicio, ad secundam ex croco & myrrha, ad tertiam sulphuris quiddam ac nitri addo; quartā uero solam sinceram seruo, pueris utilem futurā ob dulcorem, Imò etiam uiris ob delicias mente fractis, & mulierculis. Ego quidem igitur à ratione inductus inueni, quemadmodum neruorum fauciatorum curationem, ita etiam hoc phar-macum quod omnibus præstat. Est equidem id quod ex rubi moris constat, fortius eo quod ex moris sit, quemadmodum hoc eo quod ex musto paratur, Omnibus autem his præstat id quod ex nucum succo inuenimus, in principiis quidem inflammationum cum his quæ fortiter adstringunt confectum; in uigore uero croco & myrrha additis, quanquam etiam solum aliquando moderatas inflammationes sanare queat. Quando uero humorem qui inflammationem produxit impactum digerere ac discutere oportet, cum acriū mixtura cōmodum existit. Verum dixerit fortassis quispiam mihi ex medicis pauperioribus, se amplecti quidē ipsum medicamentum, si unam pyxidem expleri iubeam hoc pharmaco semel præparato. Me autem præcipere, aut statim à principio quatuor facere compositiones, aut unam ex melle & succo compositam reponere, atq; usu experiente ei ammiscere, usq; quo quidem influxerit quispiam inflammatis, ea quæ uerhementer adstringunt, postquam autem quicuerit fluxus, concoquantia; ubi uero euacuationē postulauerint ea quæ influxerunt, discutientia; operosum autem hoc esse & difficile his qui domi non habent supellectilem omnium simplicium pharmacorum, Imò neq; ad peregrinationes me commodam confectiōem exponere, in quibus impossibile sit quatuor unicuiusq; medicamenti differentias circūferre: Ob id igitur excogitata sunt tum mihi, tum alijs etiam prioribus medicis, pharmaca medias facultates habētia, & ad peregrinationes idonea futura; & pauperculis medicis utilia. Quæ uero hæc ipsa sint, paulo post referam. Nunc autem pauperum medicorum sermoni respondere uolo. Quemadmodum enim ipsi exilem apparatus laudant, sic oportet etiam diuitibus permittere, ut confectiōes pharmacorum pro opulentiæ suæ dignitate comparent. Satis enim scio etiam ipse, non solum multos pauperes esse medicos, sed & qui ab ipsis curantur, quibus satis est ubi ægrotent, alicam cum aqua mulla accipere, & mundū panem habere, aut aliquam farinam utilem ad cataplasma. Verum eum qui curandi tractationem scribit, omnis materiæ meminisse operæpretium est, quo tum diuitibus copia sit ipsis artificiose utendi, tum pauperibus electio sit illarū tantum, quibus unusquisq; pro oportunitate abundet.

De mediōrum pharmacorum compositione.

DIcamus igitur iam aliquid de compositione mediōrum pharmacorum, initio ab eo quod ex moris cōstat sumpto. Cōmune est autem omnibus medijs, ut congruens modus mellis ad succum ipsum decernatur. Inuenitur autem hic modus per experientiam. Vbi enim succū ipsum cum melle miscueris ac gustaueris, si quidem apparuerit moderate habere, rursus similiter ipsa miscerēbis. Si uero deficere quid uidebitur, addes. Velut exempli gratia, In mororum succo si quinta pars mellis addatur, mediū fuerit temperamentum, ut hoc modo coctum pharmacū plurimis ualde placeat, & hanc mixturam pauci reprehendant; alij quidem uelut dulciorem, alij uero ut austriorem. Quemadmodum enim alij qui aquam mullam dilutiorem, alij dulciorem libentius bibunt, Sic etiam his pharmacis utriq; delectantur iuxta propriam naturam. Quando igitur aliquis pharmacū sibi præparari postularit, semper utiq; uidistis me ei qui dulcioribus delectatur, plus mellis iniicere, qui uero contrarijs, minus. In pharmacis igitur quæ

quæ deglutuntur maxime coniectare oportet naturam eorum qui ipsa sument. Quod enim cum molestia aut inuolunde acceptum est, stomachum subuertit. In pharmacis aut stomatidis eiusmodi sinceritate aliquando contemnere licet. Medium itaq; temperamentum, uelut dicitur, succi ad mel, quintuplum habeat multitudinem succum. Audit o autem me diligenter animaduertens quibus utor uerbis in symmetria seu cōmensuratione medicamentorū quæ inuicem miscentur. Iam etenim præcepi quintuplum esse debere multitudinem ipsum succū ad mel, quod nihil differt ab eo si dicā mole quintuplum esse ipsum oportere. Vt uis enim modo dicatur, mensurare oportet pharmaca permiscenda. At uero si pondere iubeam quintuplum esse hoc pharmacū, per lancem utiq; facere oporteat symmetriam grauitatis ipsorum. Carterum ad permutationē succi ad mel, non est necessarium hemina aut cyathi meminisse; sed sufficit dicere, quintuplum esse oportere succum, mellis respectu. Si uero quid aliqd his ammiscendū sit ex dictis paulo antè, necessarium est dicere, quōta quantitas mole ipsis existentibus, quantum addendum sit illorum in lance appensorum. Velut in ipso adeo pharmaco ex moris, in Heræ Cappadocis medicamentario libro, Mellis conijciatur libra una, succi autem mororū lib. v. i. ammiscet autem ipsis croci drach. i. myrrhæ duplum, par etiam croci pondus conijcit ex succo uux acerbe, qui omphaciū appellatur, atq; eius dimidiū ex alumine scisso. Mihi uero placet quintuplum succum ad mel conijcere; par autem pondus croci & myrrhæ, utriusq; drach. unam & dimidiam, ita ut ex utrisque tres drachmæ consentiant. Quod si quis omphaciū addat, & uini austeri item heminam unam, uelut Heræ uidetur, recte sanè drach. i. omphacij addet. Si uero citra uinum præparetur, multo plus de ipso conijcere conuenit, si quidē mediū temperamento pharmaci efficere uelis unciam i. si uero austerius, ut in principijs conueniat, nihil peccatis si omnino duas aut tres ammiscueris. Quod si non sit omphacium, pro ipso rhois succum injice; & si uolueris par pondus utriusq; indere, neq; sic quicquam deliqueris. Heras tamen in symmetria huius pharmaci etiam hoc adscribitur, hoc modo. Quidā autem & hemina unam dulcis uini, multū eum uelle indicare palam est: prædixit enim uini austeri maris expertis hemina unam. Mihi uero nō placet, sufficiente melle iam cōiecto, unā cum hoc quod & heminam austeri uini addidit, rursus aliam misceri uini heminam. Reddetur enim ualde uiriosum medicamentū. Coquunt autem hoc ex moris medicamentū, aliqui quidem à principio miscentes succum mororum, aliqui uero modice præcoquentes. Heras autem uidetur uelle succū solum diutius coquendū esse. Scripsit igitur hoc modo. Succo mororum heminas v. i. ad strigmenticiā crassitudinem coquito, deinde trita ammisceto, croci drach. i. & reliquā uidelicet iam dicta. Quin & ego censeo succū ipsum solum per se præcoquēdum esse; deinde uero adijciendū mel, atq; ubi iam cacabum ab igne auferre uelis, reliqua ammiscenda esse. Verum Heras uidetur simul cum melle etiā alia ammisceri iubere. Et uinum quidem rationabiliter quis nunquam ammiscuerit. Myrrham uero & crocum, melius est in fine cocturę injicere, eo usq; saltem cum alijs coquendo, aut olla in terrā posita mouendo, donec omnia probe uniantur. Amplior autem coctura ipsorū, destruit facultatem aromaticorū medicamentorum. Spuma argenti equidem & plumbago, atq; alia multa metallica per cocturā meliora sunt. Crocus autem & myrrha multaq; alia aromata in decoquendo uires amittunt. Itaq; medijs facultate pharmaci & symmetria, & coctura, moderatis inflammationibus congrua, ampliusq; in maiorū uigore, atq; insuper in principijs & augmentis eorundē conueniens, iam relata est. Carterum ad induratas inflammationes, quū iam præterierit uigor, & nihil amplius influxerit, uenerit autem

tempus discutiendi, ammiscere conuenit ad stomaticum pharmacum aliqua discussiorum. Talia autem sunt, Spuma nitri, & ipsum nitrum molle, asiaeque petraeflos, & sulphur uiuum. Sufficit porro ad praedictam medij pharmaci comensurationem ammisceri, Nitri quidem unciam dimidia, sulphuris autem uncias II. Quod si neque sic praeparatum habeas ipsum, neque praesto sit tibi nitrum, aut sulphur, aut asiae petraeflos: organum in sapa, quam alij straeon, nostri omnes hephema uocant, seruescito, stomaticoque pharmaco addito, ac gargarizare iubeto. Si uero neque sapa adsit, in aqua mulla origanum coquito. Nihil autem refert etiam si hyssopum conijcias pro origano, aut pulegium, aut thymum, aut thymbraem, aut calaminthen, aut mintham odoram, quam ueteres hedyosmon appellant. At uero in uigore inflammationum, non solum nihil ex eiusmodi pharmacis adhibere oportet, sed etiam contrarium totum: atque raro quidem stomaticis medicamentis uni, collutionibus autem & gargarismis mitigatorijs concoquere inflammationem. Cuius generis est, Decoctum pinguium caricarum, & oleum lentiscinum in duplo uase tepescitum. Quin & ipsum stomaticum pharmacum in uigoribus gargarizare conuenit, aqua mulla dilutione permixtum, aut calida sapa: quae si non adsint, aqua calida. Praualere enim oportet tunc mitigatoriis & concoctorium ductum, uelut in declinationibus discussoriis, qui ex fortioribus constat medicamentis. Porro meum pharmacum ex succo nucum omnium aliorum esse fortissimum opere experti estis. Ad uos enim sodales loquor, in quorum gratiam maxime ad hanc tractationem progressus sum. Quod uero etiam omnium uilissimum & parabilissimum sit, nemo ignorat. proijciunt enim hortulani uiridium nucum cortices, ubi ipsas decorticauerunt, ut uel maximos corbes nobis explere liceat gratis. Mel igitur solum ut pauperibus medicis (Nam & illis oportet nos ea quae narramus communicare) deficit, quod eius fuerit penuria, nihil uero aliud, nisi quis ultro adeo aliud uelit, Sape enim hoc modo confectum pharmacum, nihilo deterius apparuit eo quod ex moris constat, in quod tum crocum, tum myrrham indebamus. Quin etiam si Alumen ipsi addere uelimus, non est necesse scissum iniicere, Sufficere enim adstringit etiam liquidum, quod aliqui phorimon appellant, quod uilis precij & maxime parabile in omnibus regionibus existit, tenuitate tamen paruum a scisso deicit, & ob id etiam minus efficax est. At uero si hortulanus aliquis aut ruralis hoc pharmacum sibi praeparare uelit, habuerit gratis quos conijciat, cytnos aridos contusos & cribratos, Nominantur autem sic primogenita punica. Quo tempore enim arbor florere desinit, fructus ipsius apparet figuratus in speciem punici mali, quem ablatum & resiccatum adseruare licet ad tempus fructus nucum. In fine enim ueris cytini generantur. Desinente autem aestate ad perfectionem ueniunt nuces. Quin & in terram decidunt multi cytini, aut a uento decussi, aut alio quopiam modo, quos collectos siccare licet, ut neque hac parte egenos medicos quicquam impetere opus sit. Nostis autem acidorum & acerborum punicorum, (quorum fructus parum abest ut esitari nequeat) cytnos meliores esse, Quare etiam si ex arboribus eos auellas, aut nemo penitus te prohibebit, aut certe uilissimum pretium sibi dari pro eis postulabit. Ceterum balaustium appellatum penitus cibis non conuenit, & si quis colligere id uelit, quemadmodum organum, & thymbraem, ac thymum, atque alia huiusmodi, gratis licebit. Itaque si balaustium uelit quis crudum tustum ac cribratum iniicere iuxta proportionem quam antea dixi, pari omphacio potest, utile pharmacum efficiet. At uero & cortices punicorum malorum, ualde parabilis res sunt, adstringendi uim sufficientissimam habentes, & qui ad praedicta statim in principio conijci queant. Optimum autem pharmacum reddetur, si iuxta id tempus quo punica nondum perfecte matura sunt, non tamen longe a perfectione absint, eos

cortices detractos cōleceris atq; id statim in principio cocturæ succi. Oportet autem prius in mortario tundere, quo ipsorū uis uniuersa citius in medicamentum quod paras diffundatur.

De confectiōe pharmaci ex malis punicis, & malis, alijsq; stomaticis.

QUum uero tres sint punicorū malorum differentię, Aliqua enim ipsorum sunt austera, aliqua uero dulcia, & quædam acida, Siquidem sola austera inijcias, magis adstringēs pharmacum reddetur: si uero dulcia, suauius. Quem admodum sanè fortius fiet, si acida tantum indas. Ego autem consueui par pondus uniuscuiusq; generis ammiscere. Nam & aliās ipsa sola matura punica mala integra unā cum corticibus tundo, deinde succū exprimo, ac cum melle coquo, & non solum stomaticū pharmacū ori cōmodum habeo, sed & ad multa alia utilis, ueluti rursus dicitur: atq; sit hic succus ad omnia præstantior ex tribus punicorum speciebus, aut generibus, aut differentijs, aut quomo doctiq; quis appellare uelit. Miscemus autē & ruborū fructus quos aliqui quidem à planta denominant, batina, hoc est rubina appellant: aliqui autem cōposita appellatione Mora appellant, apponentes quæ à rubis producuntur. Ex quibus sanè succus similiter succo mororū præparatus, melius illo pharmacū redditur: sed minus ualidū eo quod ex nucum succo paratur. Quin & malorū cotoneorū, & pirorū syluestrium, ac mespilorū succus similiter præparatus, stomaticū pharmacū efficitur, deuorariq; aptum, quū hoc quod ex nucibus cōstat deuorare non liceat: quantūq; enim noctū non sit, uelut atramentū sutorium, tamen stomacho nō est commodum. Manifestū uero quod & ex punicis cōstans pharmacum aptum est fractio & cibos fastidienti stomacho: deficit tamen ab eo quod ex malis constat. Innotuus est etiam rubi mororū succus deuoratus, uelut etiam ipsorum mororū, sed succus rubi mororū habet quid quod stomachū corroborat, quod ipsum mororum succus non habet. Porro mel his omnibus succis non eadem proportionem inijcitur. Plurimo enim nucum succus opus habet, & post eum rubi mororum, modico autem malorū, & punicorum, & pirorū syluestrium. Medius autē inter hos est mespilorū succus. At uero & ex cornis ac brabylis, & prunis apud nos appellatis præparantur apud nos stomatica pharmaca, eodem modo quē in principio de moris recensui, in quorū omniū confectiōe rationem quandam cōmunem referam, hanc. Siquidem crassus apparuerit succus, statim mel ammiscere oportet. Si uero liquidior sit succus præcoquatur. Suscipit autē pirorū ac malorum succus: amplius uero etiā plurimorū fructū, parem sibi ipsius mensurā mellis. Succus uero eorū quæ multū acerba sunt, uelut est corni fructus, aliquando duplum, aliquando triplū mellis adsumit. Omnia igitur hæc citra noxam deuorantur. Si uero atramentū sutorium ammixtum sit, non ualde deglutire oportet cōfectum pharmacū, præterquā si iuxta stomachū aut aluum ulcerosam affectionem fieri suspicemur. Quin & si in ipso orge maligna ulcera fiant, præstat ex atramento sutorio medicamenta. Sufficit autē drachma ad prædictā cōpositionem ammixta in qua unam mellis librā conijci est relatū. Sed & plus quandoq; recte inijcitur ad ulcera putrefacta. Singula porro quæ dixi inijcere licet aliquādo & musto uarū austerrū quas Aminæas appellant. Præstat autem ultimum mustum in hunc usum. Quod enim in principio fuit liquidius est & aquosius. Inijcienda uero sunt ex prædictis pharmacis acerbiora, quemadmodū sæpe uidistis me aut punica mala, aut balauitū, aut cytinus, aut ægyptiæ spinæ fructū, aut corna, aut aliud quid ex huiusmodi adstringentibus ammiscere. Maxime uero aptus est Rhus, siue masculino, siue muliebri genere ipsum uelis nominare. Est autem duplex, Alter obsonijs inspergitur stomacho commodus, alter à tinctio-

ribus corporum expetitur. Vterq; uero multo incoctus stomaticum efficit medicamentum, cui ammiscere licet etiam alia iuxta eandem proportionē, uelut in eo quod ex moris constat relatu est. At uero citra mellis mixturam, mustum solum per se in mellis compagem redactū, exemptis etiam quæ aliās induntur, bonū sit pharmacū in principijs, augmentis & uigoribus. Ad declinationes autem si te, clas addideris pingues, aut etiam in tenuia frustula contusas & fractas easdē unā cum Rhoē in mustū confeceris, deindeq; interposita una die coxeris, donec suam ipsorum qualitatem in ipsum mustū transmittant. Tunc enim redas quidem eximere ac proficere oportet. Mustum uero usq; ad aptam compagē coquere, quo uidelicet illiniri cōmode possit. Quæcūq; autem prius ex adstringentibus inijci dixi in id quod ex nucibus preparatur medicamentū, ea omnia etiam accipiēda sunt recte in mustum addi. Quod si uero pretiosius efficere pharmacū uelis inijcies etiam cassiæ corticem, aut nardū indicam, aut malabathri foliū. Aequè enim ut pauperibus, sic etiam diuitibus nos pharmaca scribere oportet. Eadem etiam prædictis stomaticis pharmacis miscentur. Sufficit autem drachma una singulorum ex his tribus ad tantam medicamēti symmetriā ac cōmensurationem, iuxta quam libra mellis una cōijciatur. Nihil uero læseris si ad singulas drachmas adhuc dimidiā apponas, ut in totū quatuor drachmæ & dimidia fiant. Cæterū ad induratas inflānationes consiciūtur quæ generosius discutere possunt, tusa uidelicet & cribrata. Tempus autem indendi ipsa non est principiu, sed ubi prope perfectē coctum fuerit pharmacū, aut etiam penitus coctum, olla iam in terram deposita. Sunt autem hæc costus, amomū, & quod Macer appellatur, Nominatur autem sic cortex quidam aromaticus qui ex India affertur, multū calefaciens & adstringens. Quin & cyrenaicus succus ad discutiendas induratas inflānationes aptus est, quemadmodum etiam Medicus, aut aliquis eorum qui postea celebres facti sunt. Pauperibus porro pro sumptuosīs discussorijs pharmacis, aut dictamnū, aut acorum, aut Meon, aut pyrethrum, aut cardamomum, aut sinapi inijciēdum censeo, pari pondere, ita ut ad triū drachmarū pondus eorū mixtorū moles perueniat, ad prædictā in principio stomaticorū pharmacorū symmetriā, in qua mellis libra habebatur. Si uero quatuor aut quinque drachmarū pondus ex his exple re uelis, magis discussorijū pharmacum habebis. Semper enim pro cōstitutionis affectuū proportionē, augeri ac minui pharmacorum uehementiam oportet.

De confectioe pharmaci ex musto, in quo etiam parabilla diuersa.

IN pharmacum ex musto, ad decē musti heminas, tres inijcimus heminas Rhois, coriariorum, aut eius qui obsonijs inspergitur. Si uero utrūq; inijcimus, utriusq; unam & dimidiā, aut paulo plus sumimus. Iuxta proportionem uero etiam ex discussorijs quodcūq; tandem inuenerimus. Quod si unum tantū habeamus adstringēdi uim habens, quod in principio inijciamus, aut unum saltem discussorium quod iuxta finem indamus, ex illo totū pōdus immittimus quod ex omnibus alias cōflaretur. Quæ igitur dicta sunt in medicamentū ex nucibus consicienda, ea omnia etiam in pharmacū ex musto indātur. Quin & quæ isthic non dicta sunt, amplius inijcere licet. Velut gallam omphacitiū appellatā, aut extremitates mollis rubi, aut rubi canini, & corni, cuius etiam fructū diximus inijci oportere, uelut etiam pruna, & myrti baccas, & fructū myricæ ac spinæ ægyptiæ fructum, omniāq; adstringentia præter ea quæ medicamētariam uim habent, ne uidelicet deuorata lædāt. Omnia porro stomatica pharmaca quomodo cūq; parata iuxta propria tempora oportuna ac commoda sunt. Si quidem enim austeriora fiant, in principijs & uehementibus influxionibus conueniunt. Si uero moderatiora, in uigoribus. Si aut magis discussoria ui prædicta, in declinationibus. Quate etiam si non

si non ipsi præparauerimus quid, neq[ue] symmetriā iniectionū nouerimus, sed tantum ipsum cōpositum pharmaci gustauerimus, cognoscemus quomodo eo sit utendum. Hæc igitur si memoria conseruabitis, quando necessitate aliquādo ur gente eorum quæ experimento constant pharmacorū copia non sit, ex parabilibus illius loci materia, uos ipsi ex tempore aptum medicamentū componere poteritis. Non solum autem in hanc rem utilis fuerit prædictorum memoria, sed etiam ad iam inuentorū cōuenientem usum. Si enim in ipsis adstringentem qualitatem præualere inueneritis, in principijs eis utemini. Si uero misigatoriā & laxatoriā ac concoctoriā, in doloribus & uigoribus inflammationū. Si uero obduratum quippiam & ægre solubile ab inflammatione relinquantur, in declinationibus. Eodē modo etiam in medijs temporibus, media relatorū pharmacorū medicamenta offeretis, ab repulsoijs ad discussoia paulatim transeundo, atq[ue] si unū duntaxat uobis præsto sit medicamentū, id ipsum per aquæ mulsæ & aquæ simplicis mixturam exsoluentes, & per additionem parabilium intensius reddentes. Sunt autē parabilia ex adstringētibus, Rosæ, & myrtus, & lēniscus, & rubus, & rubus caninus, & galla omphacijs appellata, & ægyptiæ spinę fructus, omniaq[ue] aluminis genera. Post hæc parabilia sunt Rhus culinaris & corarius, & succus qui ex Syria affertur, atq[ue] hic quidem per se ammiscetur, culinaris autem & corarius Rhus aqua prius decocti, utiles mixtura sunt. Est autem & glaucū ex parabilibus, & omphaciū, & cytini, & balaustia. Ex discussoijs autem parabilia moderata sunt, caricarum & fursurū decoctum, et aqua mulsā in qua origanum, aut hyssopū, aut thymus, aut calamintha, aut pulegiū, aut mintha odora, quam hedyoscinū uocant, sint incocta: fortiora autē sunt etiam hæc, si diutius coquantur, amplius autem & nitri spuma aut ipsum adeo nitruū ustum: fortius uero his est sulphur uiuum.

Stomaticorum pharmacorum compositio, in quibus etiam quæ ex moris constat, Heræ.

Proprie quidē stomatica appellantur quæ ad uas, tonsillas, ac omnes quæ in ore sunt derepente inflammationes conueniunt. Componuntur autem per prædictam materiam, ex qua sanè multæ particulares cōpositiones à medicis sunt confectæ. Ego uero etiam hic celebrium tantum mentionem faciam.

Compositio pharmaci ex moris iuxta Heram.

Pharmacum ex moris stomaticū faciens ad tonsillas, & uas, atq[ue] alias in ore inflammationes, tum illitū, tum gargarisatū, uelut est prædictū. Præparat aut ipsum Heras hoc modo. Succum motorū heminas vi. ad strigentiā spissitudinē coquito. Deinde tritas croci drach. i. myrrhæ drach. ii. omphacijs drach. unam, aluminis scissi obol. iii. Mellis heminam unam addito. Ipse autem Heras se etiam aliter præparare ipsum ait, hoc modo, ut croci drachma dimidia inijciatur, & passi hemina una, & uini maris expertis austeri hemina una. Coctura autem sit usq[ue] ad compagem melleam.

Andromachi descriptio, pharmaci ex moris.

Andromachus autem de pharmaco ex moris in hæc uerba scripsit. Succum motorum heminas vi. accipito, & in ipsum gallas v. conijcito, radices autem dulcis drach. xx. Vini chij heminam i. & in solato aut coquito, deinde ubi coactum & spissatum fuerit pharmaci, radices tollito ac projicito, gallas autem tritas ammisceto, & myrrhæ drach. i. croci drach. i. aluminis scissi drach. i. omphacijs drach. ii. Quidam autem aluminis drach. ii. mellis atticj heminam unam. Manifestum autem est, quod hoc pharmaci magis adstrictorium est quàm præscriptū, maxime si alumen adsumat. Sufficientes enim erant gallæ, & omphaciū, ut mul-

tum adstringens redderent pharmacū, uerum ubi alumen amplius additur, plurimum in ipso adstrictoria uis augetur. Recte tamen in eius cōfectionem ammixta est dulcis radix, quę exasperata lenit, & propterea asperitatē ex adstringentibus inductam lenire potest. Caterum pro mororum succo conijcitur etiam mororum rubi succus, alijs quomodocūq; uelis appositis, siue ut Heras, siue ut Andromachus scripsit. Relatum autem à me antea est, quomodo liceat ipsum uariare, per eorum quę adijciuntur ammixtionem. Dictum est etiam, quod per sue cum nucum cōponi queat hoc pharmacū, reliquis eodem modo iniectis. Quin & per punicotū malorū succū similiter præparatur, tum succo solo cum melle præparato, tum iam dictis iniectis. Si uero & rubi fructus cum melle confectus sufficienter adstringens sit pharmacū, quemadmodū sanē & quod ex nucū succo paratur, uel ut prius est dictū. At uero etiam uaria cōpositione pharmaca ex punicotū succo à medicis conscripta sunt, uelut etiā ab Andromacho his uerbis.

Stomacicon ex malis punicis, Andromachi.

Punicorum dulcīū nucleis carentiū partes II. & acidorū partem I. Succū in uas amplum quod congiū capiat exprimito, deinde excolatū ad lentum ignem ad teritas coquito, Sint autē in prōpriū myrrhæ minarę drach. VIII. crocomagmatis drach. VIII. omphaciū drach. VIII. illyridis drach. VIII. aluminis drach. III. gallæ drach. VIII. His affundito liquorē teritoq; ac ad melleā spissitudinē coquito: deinde in pilam trāsata rursus terito ac uitior, quandoq; cū melle, quandoq; sincero. Hic non simul coquit mel cum punicorum malorum succo, sed postea quum paratum est, dupliciter pharmaco uti iubet, aliquando quidem sincero, ad inflammationes uidelicet adstrictiōnis indigas: aliquādo uero cum melle, quum discussione indigent. Multitudinē autem succi congiū esse iubet, hoc est sextarios sex Romanos Quū enim Romæ medicatus sit, semper eius urbis mensuris utitur. Iniecit autē in ipsum myrrhā, & crocomagma, & gallam, & iridem illyricam. (Ipsam enim Illyrida appellare solet.) Amplius autem ad hæc omphaciū, omniū quinq; numero, singulorum unciam loco enim drachmæ unciam efficiunt. Ex alumine uero scissū unciam dimidiā. Scripsit porro deinceps Andromachus etiam id quod ex musto sit stomacicum, sic in hæc uerba,

Andromachi stomacicum ex musto, quo utor.

Gallas XXX. Rhœis coriarij sextarios II. musti sextar. VI. Gallas confractas cum Rhœ per diem & noctem in musto macerato, deinde coquito donec ex toto quarta pars supersit, & per lineolū colato, exprimito, & in olla ad mellis crassitudinē spissato, deinde trita addito, aluminis scissū drach. I. croci drach. I. myrrhæ drach. I. permixta reponito atq; uitior. De musto nihil manifesti retulit ex quālibet uia ipsum sumi uelit, Num ea quę austerū uinum fundit, aut quę dulce, aut medium. Nos igitur nosse oportet quod pharmacū ex dulci confectū magis mitigatoriū & moderatum erit, ac minus efficax. In quibus autem adstrictiōne opus est, uti uehementiore, id quod ex acerbis uinis sit uehementius quidem adstringit, leniendū autem uim non habet. Palam est autem ex medio uino paratum, etiam mediā facultatem habere.

Critonis stomacicum ex malis punicis.

Crito pharmacū ex succo punicotū his uerbis descripsit. Stomacicū ex punicis ad ulcera & aphthas oris. Succī punicorum dulcīū heminas VI. in aëreo uase ad teritas coquito, deinde cinamomi drach. I. cassiæ drach. I. myrrhæ drach. I. omphaciū obol. III. croci obol. III. nardi Indicæ obol. III. terito, eisq; mellis heminā iammisceto, atq; ita adinfuso succo ad lentum ignem moueto, ac donec spissetur coquito ac uitior. Scribit autem & altā cōpositionem pharmacū

maci ex punicis huiusmodi. Malorum punicorum dulcium unā cum corticibus tusorum ac expressorum sextarios VI. mellis boni sextariū I. in ollam confecta coquito ad spissitudinem mellis; deinde aluminis scissi unciā unam, myrrhæ unciā dimidiā, trita addito, ac mixtis utitor. Magis adstringens scripsit certe hoc pharmacum Crito quā præcedens. Ridicule igitur quidam faciunt interrogantes utrum ipsorum altero melius sit. Alterutrū enim in proprio tempore altero melius est, atque hoc quidem posterius ad ea quæ uehementi adstrictione indigent, ad ea uero quæ discussione, prius, maxime quā & cinamomum iniecerit in ipsum discussionem medicamentum. Scripsit autem & ex musto medicamentum Crito, hoc modo.

Critonis stomaticum ex musto.

Stomaticum ex musto facit & ad aurium & sedis ulcera. Musti sextarios VI. ad sextarios II. decoquito, deinde Rhois coriarij drach. III. alij drach. II. misceto, & gallarū drach. III. alij uero gallas XXX. croci drach. II. alij drach. I. aluminis scissi drach. II. Quidam etiam myrrhæ drach. I. mellis sextarium I. mixtis utitor. Multa uero alia pharmaca ex prædictis succis à multis medicis scripta sunt iuxta commensurationem uariantia, quum aliqui quidem omnia prædicta cōficiant; quidam uero auferant, alius aliud, & alius plus, alius minus in quibus uelut dixi inspicere oportet quid redundet, an adstringens & repulsorium, aut lenitiuum & cōcoctorium, aut discussorium. Ita enim rectissime ipsis utemur. Quare relinquam particulares eorum quæ scripserunt differentias. Transibo autem ad alia pharmaca citra hos succos præparata.

Stomatica pharmaca citra succos composita, ex aceto & gallis.

Stomaticum pharmacū scripsit tum Andromachus, tum Crito, eandem habens symmetriam. Sufficiet itaque descriptionem Andromachi referre, hoc modo habentem his uerbis. Stomaticum Aristodis ad Synanchas, quas anginas Latini uocant, & reliquas in ore affectiones. Hac & Antipator usus est. Gallas numero XXX. aceti albi sesquicyathum, alij cyathos IX. myrrhæ drach. VIII. nardi Indicæ drachmā unam, Rhois culinarij sesquicyathum, alij cyathos IX. aluminis scissi drach. I. piperis grana XX. mellis Attici cyathos II. alij sesquicyathum. Coquuntur gallæ in aceto donec flaccescant, deinde tritæ mellis miscentur tempore usus. Quidam etiam seminis mandragoræ unciā unam addunt. Hæc quidem Andromachus scripsit. Fortassis autem dubitauerit quispiam propter quid, quum scripsisset aceti sesquicyathū, mox adscripserit alij cyathos IX. multum enim mēsurā altera alteram excedit. Quemadmodū etiam rursus quum ait, Rhois culinarij sesquicyathum, alij cyathos IX. Singulatim itaq; utrunque expensum dubitationem affert. Si uero inter se complicantur, conuenienter scripta sunt. Si etenim cyath. IX. iniecerimus, iniiciemus etiam Rhois culinarij eodē IX. cyathos. Si uero aceti sesquicyathum, sufficiet etiam Rhois culinarij sesquicyathus. Quare in pharmaco plus aceti habente, diutior coctura facienda est, in minus habente breuior. Præstat autem diutius fieri cocturam. Ita enim gallæ molles reddentur. Conspicuum uero est, generosum esse hoc pharmacū ex contrarijs compositum. Gallæ enim & acetum, & Rhus magis adstringentia sunt, & maxime repellunt; ualde autem discussorium est piper, sed mixtæ facultatis est nardus. Myrrha uero discussoriam habet uim, sed & lenem ac mitigatoriā unā cum hoc quod etiā concoquit. Discussoriæ facultatis est etiam mel, sed citra mordacitatem earum affectionum quæ in ore fiunt, quum in oculis mordax existat. Verū de aceti uiribus iam sæpe mentionem fecimus, quod & secat, & discutit & repellit. Albū autem in descriptione addidit, ut uidelicet tenuiū partiū indicet,

Quidam uero tum acetū quinq; cyathos, tum Rhois eosdem iniiciunt, medium quodāmodo apprehendentes inter eos qui plurimum, & qui minimū de utroq; coniungunt. Manifestum igitur est eos medium quoq; pharmacum iuxta facultatem præparare, quemadmodum symmetria ipsa media existit.

Stomatica illitio ex besafa, hoc est, semine rutæ syluestris.

CElebre est & hoc pharmacum ab Andromacho hac uerborum serie descriptum. Stomaticū ad anginas ex besafa, faciens ad desperata, quo utor. Seminis anisi, seminis apij, seminis ammi, floris funci odorati rotundi, aluminis scissi, iridis illyricæ, besafa quod aliqui harmala uocant, cinamomi, myrrhæ, troglodytæ, aristolochiæ longæ, singulorū unc. i. cassiæ, rosarū siccarū, utriusq; unc. i. crocomagmatis, unc. i. costi, cineris hirundinū recentis, utriusq; quadrātem, croci sesquidram, nardi indicæ, amomi, utriusq; uncie dimidium, gallas viii. tritis cum melle utere. Verū usus tempore tandem mel adde. Hoc ipsum pharmacum etiam Heras scripsit, ut parū absit quō minus penitus idem sit. Solas enim rosas uariavit, et nō ipsas cōiicit, sed florem ipsorū, et ad finem addit. Quidā etiā cassiæ fuluæ unc. i. De hirundinibus aurem ambo obscure tradiderūt, quanq; alij clare scripserint, nisi quod inter ipsos non cōuenit. Alij enim nidum utere iubent ex stercorebus hirūdinum maxime cōpositum. Alij ipsas hirundines. Alij ipsarū pullos. Hi uero obscurius scripserunt, & Andromachus quidem, cineris hirūdinum recentis, oportebat autē ipsum apponere uistarū. Tale enim quiddā cineris uox significat, nisi nidū ipsum terere ac leuigare iubet. Heras autē, hirūdinum recrementū, non apponens uistarū. Forte igitur neuter uult cōburi debere hirūdinum recrementū, quemadmodū alij. In quibusdā tamen exemplaribus sic scriptum est. Hirūdinū tenerarū unciam i. quemadmodū in alijs hirūdinū à trahibus. Palam est aurem acre & discussoriū hoc pharmacum esse ex hirūdinum excrementis cōstans, Quemadmodū etiam alia omnia omnīū animalū stercorea, aliqua magis, aliqua minus. Velut etiam ipsorum animalū uistorum cinis. Dicitur etiam etiā nobis de besafa in simplicīū pharmacorū tractatu, quod rerū sit ordinis calfacientīū, & nunc sanè ut eiusmodi ammixtum est etiam prædictio medicamento, quod plurima discussoriæ facultatis in se habet, Quemadmodū aliqua ex alijs stomaticis adstringentis & repulsoriæ. Etenim iam relata pharmaca ualde discussoria sunt, & ad hæc amplius cinamomū super omnia uim tenuium partium & discussoriā habens. Quin & semina anisi, apij, & ammi discussoria sunt, & iris & aristolochia ex discussorijs sunt, uelut etiam myrrha. Mixtæ autē facultatis ex discussoriæ & adstringente est cassia, & crocus, & nardus, & amomū, & costus. Præcellit autē in ipsis calfacitoria & discussoria, & maxime in costo. Mixtæ facultatis est & funci rotundi odorati flos, sed utraque imbecillitum adstringente, tum calfaciente. Gallæ uero, clarum est autem quod de omphacitidū genere loquor, ex adstringentibus multum sunt pharmaci, uelut etiā alumen scissum. Rosæ autem rursum debilissimam habent adstringendi uim. Ex contrarijs igitur facultatibus particularium pharmacorum, hoc medicamentum propositum iam constar, & non solum contrarijs, sed etiam utrisq; foribus, atque uelut dixi antea, multò fortioribus discussorijs quàm adstringentibus. Quando uero cōfectionem eius clare conscripserit Heras, usum est ob id etiam illius uerba in commune proponere ac adscribere, quæ hoc modo habent.

Stomaticum ex besafa, Heræ.

STomaticū faciēs ad anginas, et inflānatas rōssillas, ac ulcera facta in ore. Cōuenit etiā stomachicis & dysentericis summè, in frigida exhibita magnitudinis fabæ. Est & Arterica bona, & dolorē sedat. Anisi unc. i. ammi unc. i. apij seminis

minis unc. i. costi sesquiunciam, floris iunci odorati unc. i. iridis illyricæ unc. i. alu-
minis scissi unc. i. gallas omphacitidas mediæ magnitudinis viii. crocomagna-
tis unc. i. croci sesquiunciam, myrrhæ unc. i. dimidiū, floris rosarū unc. ii. aristolo-
chiæ lōgæ unc. i. seminis bēfāsa unc. i. cinamomi unc. i. spicæ nardi sesquium dā,
amomi racemi unc. i. dimidiū. Quidā etiā cassiæ fuluæ unc. i. cineris hīrūdīnum
recrementi unc. i. Myrrham cum melle terito: reliqua uero omnia cōtusa & cri-
brata in mortariū conijcito, & per pistillum myrrhā cum melle moderato cōmi-
sceto, ut pharmacū melle crassius reddatur. Vsus uero tempore melle dilutū illi-
ne, atq; ex aqua gargarissandū præbe, aut ex aqua mulla uel succo pisanæ. Cæ-
terum pharmacum hoc in stanneo uase reponitur ac adseruatur.

Aliud stomaticum ex hīrūdīnibus absq; Bēfāsa, Aselepiadæ.

Scripsit etiam Aselepiades stomaticā illitionem his uerbis. Aliud stomati-
cum facit & ad Anginas. Hīrūdīnū syluestriū ustarū cineris drach. iiii. cro-
ci drach. i. nardi indicæ drach. i. melle excipe. Mixture sit quā iam sub manibus
sunt affectiones. Hīrūdīnes porro uruntur hoc modo. Pullos sale conspersos
unā cum pennis in sicile conijcimus, obcuratumq; prunis imponimus. Gratia
habenda est Aselepiadæ ob id quod tam diligenter describit quomodo hīrūdi-
num pullos uri iubeat, & quod ipsa animalia, & non eorum recrementa, in phar-
maci cōpositionem preparanda censeat. Scripsit uero etiam Andromachus sto-
maticum pharmacum ex hīrūdīnibus, hoc modo.

Stomaticum ex hīrūdīnibus ad anginas, ut Harpocras.

Pulorum hīrūdīnū ustorum numero x. mellis cyathum i. alij cyathi. ii. ha-
bent, succi myrti uiridis cyathū i. alij cyath. ii. myrrhæ obol. iiii. Pullos uri-
to omnibusq; mixtis ac tritis uitor. Clare etiam hic hoc loco pullos cōburitū-
bet. Hæc itaq; duo præscripta pharmaca ex hīrūdīnibus sunt absq; bēfāsa, Alia
autem duo stomatica hæc præcedentia ex hīrūdīnibus unā cum bēfāsa constāt.
Est autem & tertia coniugatio pharmacorum eiusdem generis, in qua ea quæ ex
bēfāsa citra hīrūdīnes præparantur, continentur.

Alia stomaticæ illitiones Andromachi.

Præstat autem opinor neq; alias relinquere oris illitiones, quæ sanè laudan-
tur ab his qui de pharacorum experientia sunt curiosi, maxime quum mul-
torum ex eis etiam ipsi experimentum fecerimus, partim quidem ex nostro usu,
partim uero eorum qui nobiscū sunt medicati. Incipiam autem ab his quæ An-
dromachus scripsit, ipsas compositorus iuxta illius uerba.

Ad Columellam laxatam.

Mellis lib. i. aluminis liquidi lib. i. florum rosarum libram dimidiā, succi hy-
pocisthidis quadrantē. Alumen in melle coquito, deinde sicca inspergito
atq; ita uitor. Coquito autē modice. Vere bonū est hoc pharacū, eoq; tribus
modis uti oportet, quæadmodū uidistis me plurimis stomaticis pharacis uti.
Vnus utendi modus est & maxime in principio, ut dissoluatur per aquam cali-
dam aut aquā mullam ac gargarissenur, Nam & mitigatoriū est hoc, & quod cō-
uenit efficit. Interea autē dum eo sic utimur, etiam sin cero pharacō uti cōuenit,
partim quidē cum digitis illinendo, partim uero per cochleare admouēdo, unā
cum hoc quod reprimamus & intrepide foras columellā ipsam ducamus. Con-
fert enim quā maxime ad linguā ipsam uergere, & à rectitudine secedere quā
habet ut plurimum ad ipsius asperæ arteriæ extremum.

Aliud stomaticum eiusdem Andromachi ad omnia uitia oris:

Crocomagmatis drach. ii. iridis drach. iiii. sandarachæ drach. dimidiū, hoc
est obol. iiii. terebinthine drach. ii. lycij Indici drach. i. uic passæ drach. viii.
aloes

aloes drach. i. omphacij drach. i. nucū pinearū tostarum drach. viii. succi glycy-
rhizæ drach. i. aluminis scissi drach. i. balauſtij drach. i. floris roſarum drach. ii.
mellis heminas duas & dimidiam. In quibusdam exemplaribus ſeſquihemina
habetur. Ipſe quidem Andromachus ſic ſcripſit, non oſtendens quomodo mel
miſcere oporteat, Num crudum, aut coctū, aut deſpumatum tantum. Ego uero
deſpumatum miſcendum eſſe cenſeo. Scripſit etiam alias ſtomaticas illitiones
Andromachus omnes bonas, quare minime relinquēdas putauī, ideoq; ſubſcri-
bam omnes deinceps, quemadmodum ipſe præſcripſit.

Stomaticum quo ipſe ſe uti dicit. Floris roſarū drach. ii. nucū pinearum
drach. i. croci drach. i. Excipe melle. Aliud quo item ſe uti dicit. Iris illy-
ricæ drach. viii. croci drach. viii. alij iii. florū roſarum drach. iii. Excipe melle.

Aliud. Miſſyos cyprij drach. viii. iris illyricæ drach. iii. myrrhæ drach.
viii. croci drach. i. Excipe melle. Aliud odorum tenerum ad inflammationes
& cruſtas cōmodum. Nucū pinearum drach. iii. amyli drach. ii. alumi-
nis ſciſſi drach. i. floris roſarum drach. i. croci obol. iii. Excipe melle. Hæc ex ſeru-

la Cratiſſpi eſſe ait. Aliud ſtomaticum Menecratis. Croci drach. iii. ba-
lauſtij drach. iii. florum roſarum drach. i. alij dimidiam, fructus ericæ drachmam
unam, malabathri drach. i. nardi indicæ drach. i. nucū pinearum numero xx.

Excipe melle. Aliud quod ex libris Melſi eſſe ait. Rhois rubri drach. ii.
florum roſarū drach. i. coſti, croci, utriuſq; obolos iii. Excipe melle. Hanc etiam
gargariffari cū paſſo, aut aqua mulſa ait, neq; ſcio cur hoc hic adſcripſerit, quum
omnia gargariffari poſſint. Aliud ſtomaticum quod etiam ipſe laudat.

Floris ſunci rotundi odorati, myrrhæ, croci, caſſiæ, aluminis ſciſſi, illyridis, ſingu-
lorum drach. iii. nardi indicæ drach. unam. Excipe melle cocto. Hic quidem igi-
tur cocto adiecit. In prioribus uero ſemper ſimpliciter melle dixit, permittēs no-
bis quomodo cūq; preparare uelimus. Ego aut uelut dixi melle deſpumato utor.

Aliæ illiutiones ſtomaticæ, quas Aſclepiades ſcripſit.

Illiatio ad putredines oris Aſclepiadæ Rhois rubri drach. iii. acaciæ drach.
unam, medullæ drach. iii. uino pramnio diſſoluta excipe melle cocto, & ute-
rē ad illiutionem. Haud ſcio quomodo reliquerit adſcribere ad medullam, Num
ceruinam, an uitulinam conijci uelit. Quando igitur nō adſcripſit, tutius eſt cer-
uinam adijcere. Forte enim eſſe uult medicamentum, fortior autem eſt medullā
ceruinā q̃ bubulā. Aliæ. Succī hypociſthidis drach. ii. balauſtij drach. i.
lycij drach. i. acaciæ drach. i. Excipe oliū immaturę ſucco, & melle ſubactis utre.

Illitiones oris aptæ eis qui medicamentarias qua-
litates ægre admittunt.

Porro de mulierculis quid attinet dicere, & maxime diuitibus, quæ præ deli-
cijs ſtomatica medicamenta ægre admittūt. Iam uero etiam uiri quidā non
ſolum præ delicijs, ſed etiam natura quodā modo malum ſtomachum habentes,
eiſmodi pharmaca non ferunt. Et ſanē præterlabentia ſæpenumero in ſtoma-
chum, non ſolum iniucunda aliquo modo ſunt, ſed etiam nocua. Manſueuiſſi-
ma igitur ex ipſis crocum habent & myrrham, & alumen. Melius igitur eſt ali-
quas ſtomaticas compoſitiones abſq; his faciās habere. In moderatis itaque in-
flammationibus aut tonſillarum, aut uuar, aut alterius alicuius partis, ſufficiunt
ſucci ſoli fructuum tam dictorum, uelut rubi & mororū, punicorumq; malorum
& cotonearum. Quin & ſuccus nucū, ubi cum ſolo melle paratur, ſuauem gu-
ſtum habet, item que muſtum ex acerbioribus uuis, ex quibus Amīnaum ui-
num funditur, ſi in ipſum Rhus addatur: hoc enim uelut adſcripſit optimum
ſit pharmacum coctum ut dictum eſt. Ad eas uero inflammationes quæ multa
adſtrictione

adstrictione indigent, illationes stomaticas huiusmodi paravi. Aufterotū puni-
corum succum, aut aufterorū cotoneorū, aut etiam utrorumq; simul, iuxta prædi-
ctam proportionē cum melle miscui, atq; sufficiens erat. At uero mororum suc-
cus debile pharmacū est. Sed inter hūc & prædictos medius est iuxta adstringen-
di uim succus rubi mororū. Fortis autem est nullo minus ex corticibus nucum,
quanquam non sit etiam in gustu acerbus. Vnicuiq; uero ex his licet uas acer-
bas expressas miscere, si quidē uehementius efficere uelis, eadem mensura: si ue-
ro non, omnino tamen dimidiū succi ipsarū addes. Vehementissimū autē redde-
tur pharmacū si punica integra tundas unā cum corticibus, indeq; succū expri-
mas, atq; hoc magis si fuerint acerba. Amplius uero acerbissimū ex his fiet, si ad
punicorū aufterorum ita tusorū succum, uas acerbæ succus superaddatur cum
moderato melle. Præstantius adhuc erit, si tota cōtusa punica mala passo cocta
excoles. Licebit etiam ex solis dulcibus punicis pharmacum præparare, ut debi-
lius, ita suauius, & magis si ex solo succo citra cortices cōposueris. Ego uero sæ-
pe tria punicorum genera permiscui, auftera, acida & dulcia. Ne uero ualde ex-
asperet, ammixto glycyrrhizæ succo, optimū pharmacū efficies. Quin & ex fru-
ctibus factum per se solum optimū est medicamentū, tum his qui gargarissando
colluere, tum qui illinire oris inflammationes uolunt. Est autē & hoc partim au-
sterius, partim moderatius in adstringendo, diciturq; de cōpositione ipsius pau-
lo post. Quando uero non solum repulforū pharmacū nos habere oportet, sed
etiam disculforū si quid appareat induratū, in hūc modum ipsum parabis. His
quæ medias facultates habent ex prædictis, insicies aliquid dum coquantur, ex
pulegio, aut thymo, aut origano, hyssopo, mintha, aut calamintha. deinde cola-
bis, & habebis optimū medicamentum. Si uero calidius efficere uelis, piper ad-
des. Præparavi quandoq; etiā sine pulegio, aut thymo, aut aliquo huiusmodi id
quod ex succis constat, solo pipere in ipsum coniecto. Omnibus autem si glycy-
rrhizæ succus addatur, melius pharmacū efficietur. Quod si pro opulentiis com-
ponas, etiam amomi quid mīcebis. Quantitas autem huiusmodi rerum eadem
tibi seruetur, cum his quæ crocum & alumen ac myrrham adsumunt, uelut præ-
scriptum est: pro illis enim tibi hic amomum erit. Quin & mastichen chian quan-
doque inieci, post factam uidelicet colaturam, & postquam ea quæ incocta sunt
fuerint exempta.

De crustis in ore.

Cap. II



N calidis & humidis corporis locis, quale est os, cito putredo acce-
dit, ex quacūq; tandē causa fuerit exulceratū. Confert ad hanc rem
etiam, id quod nihil penitus in ipso ex pharmacis incubere queat, ue-
lut in alijs ulceribus potest. Eluuntur enim omnia à salua. Quapro-
pter etiam fortissimis pharmacis sæpe ad ea uti cogimur. Fortissima autem sunt
quæ crustam, escharan Græcis dictam, efficiunt ad modum cauteriorū. In exter-
nis igitur ulceribus, ubi parti curāda crusta fuerit inducta, à fortibus pharmacis
desistimus, ad ea quæ crustas tollunt transgredientes, quæ manifestū est extero-
riæ qualitatis ac facultatis esse. In his uero quæ in ore sunt propter loci naturā,
tutus mihi esse uidetur ammiscere ad exterioria pharmaca quædam fortia, quæ
singulatim admodum crustas infligunt. Ob hanc igitur causam melli uehementissi-
ma extergēdi ui prædita, pharmaca ammiscemus ipsas crustas efficiētia, Quem
admodū sanē in sordidis ulceribus in cuticula obortis, diximus ammisceri opor-
tere melli, quæ parū extergent, thus, erui, iridem, aristolochiam, & quæcūq; alia
huiusmodi, eadē ratiocinatione contraria apponentes, uelut Hippocrates dixit:
Vna enim eadēq; ratiocinatio in utrisq; est, ut uidelicet exteriorū pharmacum
moderate

moderate habens ad affectionē adhibeatur. Habebis autem cōmoderatū phar-
macum ipsum mel, in ulcerum quidem sorde, debilibus exteriorijs permixtum.
In quibus autem ob loci naturam, putredinis accessionem formidamus, ex for-
tioribus quippiam ad ipsum mēl ammiscemus. Rationabiliter igitur ad oris ul-
cera arida medicamenta cū melle cōmiserunt, per quæ crustas inducimus. Quæ-
dam igitur ex huiusmodi pharmacis prius recēsi in eo loco, quo ad nomas oris
medicamenta scripta sunt. Eadē enim etiā ad crustas cōuenire dixi, si mel ipsi
addatur. Quin etiā nūc de ipsis scribā, omnia tamen his dici cuiquam uidebitur.
Quæ igitur ab Andromacho scripta sunt paulo antē, in memoriā saltem
me reuocare oportet, ex eo loco in quo docuit quæ pharmaca ad nomas oris cō-
ueniant: apponam autem principia ipsorū tantum. Vnum igitur pharmacū sic
conscripsit. Andromachi stomaticum odorum tenerum ad inflammationes &
crustas cōmodum. Cōposuit autem ipsum ex nucibus pineis, amylo, & alumine
scisso, flore rosarum, ac croco, melle ammixto. Alterum hoc modo scripsit. Illi-
tio ad affectiones in ore, crustas, ac nomas, quæ etiā ipse cū melle utitur. Quin
& omnia alia ab ipso ad nomas descripta, etiā ad crustas cōmoda sunt cū melle.

Quæ Crito ad crustas conscripsit.

QUæ uero Crito ad crustas scripsit illius ipsius uerbis sic habet. Misy cru-
dum cūstigiō tollit. In alio exemplari cum melle tostum habetur. Ad oris
uero crustas, aqua diluio ac modico utere. Sint autem misyos torrefacti drach-
mæ mellis boni cyathi sex, commisce ac utere. Similiter facit & chalcitis assata,
cum melle, ut strigmenticia sit spissitudo.

Quæ Archigenes ad crustas scripsit.

Archigenes autem de his sic tradidit. In crustis quæ Escharæ Græcis ap-
pellantur, priuatim cōmodum est stercoꝝ caninum cum melle illitū. Aut
atramentum suuorū purpuræ marinæ tomento inuolutum urito, neq; agitato,
deinde cum melle tritum illinito. Aut pice liquida cum pari melle, modica ce-
dria ammixta utitor. Aut Rhoen coriariū in aqua sufficiēter, donec strigmen-
tosus reddatur, macerato ac coquito, & melle ammixto utitor. Facit & Syriacus
Rhus cum melle. Aut hirundinū ustarum, & stercoꝝ humani parem modum
cum melle illine. Aut hepatis lupi aridi cocbleari duo tria bibēda præbe. Hor-
um pharmacorum maximam partem laudo, quod uero ex rhoe cōstat damno-
sum, quum adstringentis sit facultatis quæ nequaquam crustis cōueniat. Verum de
lupino hepate non habeo quod dicam. Ad hepaticas enim affectiones scio hoc
pharmacum tum per se, tum pharmaco ex eupatorio mixtū bibi. An uero etiā
ad crustas in ore potum cōueniat, iuxta aliquam totius substantiæ proprietatē,
per solam experientiam iudicare oportet, de qua non est quod dicam ut qui hoc
non sit usus in huiusmodi affectionibus. Caninum autem stercoꝝ ubi ossa co-
mederint canes, per omnia optimum est. Nam & magnopere auxilia iur, neque
ullam insuauitatē exhibet utenti. Humanū uero tanquam abominandū semper
detestatus sum. Usus est itaq; ipso quidā non prædicens, sed latere conatus. Ac-
cepit autem nō uulgare, sed pueris dabat in cibo panē cum leguminibus quæ lu-
pini uocantur, atq; ita resiccatū habebat in promptu ad quæcūq; eo utiq; opus
esset. Quin & Musa plurimum usus est primus adeo stercoꝝ canino, album sem-
per adsumens. Scribit igitur in præsentī affectione similiter eodem canino ster-
coꝝ se usum, his adeo uerbis.

Musa ad Anginam.

AD Anginam stercoꝝ caninum album accipito ac resiccato, tritumq; cribro
medico cribrato, & in promptu habeto. Usus tempore melle diluio, atq;
tunc ut

atq; tunc ut deuoretur illinjo. Hæc quum scribat Musa, merito ei ad stipulamur; hoc enim pharma co fortius nullum nouimus, neq; in angina, neq; in magna tonsillarū inflammatione, aut his quibus ex glādulis suffocationis periculū imminet.

Ex Sorano. . . Experti sumus etiam Sorano scripta pharmaca probe facere, quæ his uerbis tradidit. Chalcitidis tostæ, mellis Artici, quod satis est, chalcitidem cum melle terito ad strigmenticiam crassitudinem, ac unior. Aliud ad crustas faciens & humore prægnantia itemq; foetentia. Misyos uisti drach. viii. iridis illyricę drach. iiii. croci drach. i. Hæc trita ac mixta in pyxide lignea reposito, & tum per se, tum cum melle unior. Consequenter uero etiam hæc hoc modo prodidit. Aliud pharmacum Anthera ad prædicta faciens. Iridis illyricæ, sandarachæ, cypri, singulorum drach. iiii. aluminis scissi, croci, crocomagmatis, singulorū drach. ii. his tritis ac mixtis utere. Quidam uero & florum rosarū, & gallæ, utriusq; drach. ii. adiungunt. Vtere autem ad putredines, & dispersas per abscessum ac cruentas gingiuas arido, Ad crustas cum melle.

Quæ Heraclides Tarentinus ad crustas in ore scripsit.

Heraclides Tarentinus in scriptis suis ad Anniocidem in hunc modū scripsit, de putredinibus in ore. Facit quidem & Anthera admota. Si uero ualidior sit putrefactio, apposita est hæc compositio. Bdellij uisti partes iii. auripigmenti partem i. tritis mixtis utitor, & superne linamentum cōuulsum impone, rosaceo tinctum ac expressum. Quidam bdellij partes viii. capiunt.

Aliud ad robustas putrefactiones oris, ac reliqui corporis. Chalcitidis partem i. calcis uiuæ tantundem, auripigmenti partem dimidiā, tritis mixtis utere.

Aliud ad putredines in ore & gingiuarum abscessus. Florum rosarū drach. iiii. aluminis scissi drach. ii. gallæ drach. ii. myrrhæ drach. i. trita melli misecto ac unior. Verū ad ulcera leuiter crustosa, inijce aluminis drach. iiii. myrrhæ obol. iii. gallarum drach. i.

Aliud. Aceti a cerrimi hēminam unam accipiro, in ipsumq; tantum salis donec non amplius liquetur conijcto, deinde donec sicetetur coquito, & ex illo accipiro, atq; acetī cyathum unum affundiro, a c ore detinendum exhibeto, per satis multum tempus, deinde iterum atq; iterū idē facito ter aut quater per diem, respectu habito ad subiectas partes. In pueris uero lanas circū specillum apponito, inungitoq; ac locum confricato, ea corporis figura ordinata ne ipsam deuoret. Quidam uero arido sale uiuntur terentes ipsū cum aceo & resicantes. Faciunt & alumen rotundū a c fori, pari pondere. Oportet autem colluere lentum decoctum modico ammixto melle, aut rosarū cremore cum melle. Quod si non exuperetur per hæc putrefactio, utere iube, muri/tis et cōrectis in orbem circū sitis locis, Sic autem candens ac pellucens cauteriū, quod admoueatut donec nullus humor amplius defluat, & locus uideatur exuperatus. Postea colluenda prædicta & Anthera compositione utendū ex melle, usq; quo crustæ circū rumpantur, atque tum sanè melle uteris.

Aliud odorum tenerū ad inflammationes & crustas commodum. Nucum pincarum drach. iiii. amyli drach. ii. aluminis scissi drach. i. florum rosarū drach. i. croci obol. iiii. Excipe melle. hoc medicamentū ex Ferula Cratippi sumptū dicit.

Ad columellam siue gurgulionem.

Cap. iiii



Amosa quedā particula in summo ore apparet depēdens, si quis aperito plurimum ore toto, linguam deprimat. Hæc ipsa carticula duobus nominibus appellatur à ueteribus Græcis, gargareon, & chion, hoc est gurgulio & columna. Cæterū posteriores Medici ferè omnes, non ita, sed cionidem, id est columellam uocāt. Nam qui staphylen, id est uulū, ipsam appellant, eorum neq; meminisse præstat, Nos enim non particulam ipsam, sed

unam aliquam eius affectionem, staphylen siue uuam nominamus. Raro autem hæc affectio circa columellam contingit. Verum ualde sæpe inflammatur. Et sæpe ne quemadmodum in alijs omnibus, in quibus ex humorum influxu contingit morbus. Ita etiam hic prima auxilia reprimunt fluxum. Adstringentis igitur facultatis hæc esse oportet, & siquidem moderatus sit influxus, moderate adstringētis, quam austeram priuatim dicunt. Vbi uero uehementior fuerit influxus, acerbæ. Ambæ enim adstringunt, sed debilius austeræ, uehementius autem acerbæ. Relatæ sunt autem sæpe ambarum materiæ. Verum præstat & nunc meminisse, quomodo in paruis inflammationibus debiles, in magnis uehementes adhibeatis. Collusiones itaque moderate sunt ex palmulis, aut phœnicobalanis, aut quomodocumque appellare uelis, decoctis quandoque sola aqua, quandoque modico melle infecto. Huius consimilis est collusio ex decocto rosarum, pampinorū uitis, rubi, rubi canini, aspalathi, cyperi, ac cytinorū, item siliquarum, & radicum mori, hypocistidis, malorum austerorū, & pisorū acerbiorū, ac sorborū. His fortiora sunt myrti ac baccarum eius decoctum, & ex acerbis cotoneis malis, & uirgultorum tenerorum siccis, arbuti, simlacis, ac phagi, & ipsarum glandium, mespilorum item & cornorum, & fructus memæyli. Genere similissimum autem est decoctum gallarum, & Rhodæ culinarij ac corarij, ac fructus mirtæ, & spinæ Aegyptiæ. Ex his singula tum per se, tum etiā mixtim, cocta ex aqua gargassare oportet. Mirum enim quam mixturæ ipsorū uiliores sæpe sunt ipso simplici usu. Quin & aridis tritis columellam contingere oportet, sen sim quodammodo ad supernam regionem & externam, ad linguā uidelicet, ducendo. Verū trita arida pharmaca cochleariis excipiuntur, & melius est ut ipsum cochlearium ad finem in obliquam sectionem desinat, quam in rectam. Et ex his ipsis, Moderatæ quidē sunt rosæ, & flos ipsarū, & uirgulta iam enumeratarū plantarū, hypocistidis, Rheon, lapis quoque sutores muliebria calciamenta expoliunt, uocatur autē Ageratus, uelut non senescens, aloëque & cyperus, & iunci rotundi odorati flos, radix nardi Indicæ, ac nostræ montanæ. Fortiora his sunt, & citra manifestam aspritudinem adstringunt, fructus spinæ Aegyptiæ, Rheon, & quod diphryges appellatur, Rhus obsoniorum siue culinarius, & ex acerbis, balauftium, cymini, malicorium, galla, & magis exacte quam omphacitis fuerit. Adstringunt etiam eximie omnia aluminis genera, Scissum uero inter ea tenuiorum partium est, & ob id uilius. Arramētum uero sutorium uehementem habet adstringendi uim, sed non expers est calfaciendi, & propterea putredinis ulceribus conuenit, & tamen exacerbat columellam, etiam si iam sit in scirrhi indurata. Succiporro adstringentes ex omnibus dictis plantis sunt, & fructibus ipsarum consimiliter. Dictum est de ipsis inter illationes stomaticas, quarū aliquæ ex musti, aliquæ ex mellis mixtura præparantur. Corruptur enim succi omnino, si absque melle reponantur, aut rursus resiccantur, si plurimum fuerint cocti. Quidam uero succi etiam si ad solem astium siccantur ad moderatam spissitudinem, per tempus tamen exarescunt, & si ad plures annos durarint, in eam perueniunt ariditatem ut conterantur in modum cytinorū & balauftiorum. Tales sunt hypocistidis succus, & quæ acerbæ, ac glycyrrhizæ & centauri. Et ut in summa dicā, Omnes succi etiā si absque melle diutius fuerint cocti, non quidem corrumpuntur, uerum tempore fiunt aridi, & quidam sanè uelut dixi conterantur, quidā uero natura uidelicet tenaces & viscosi, in laminam magis abeunt, quam ut conterantur. Atque hæc quidem simplicitate comoda existunt. Composita autem ex ipsis iuxta duplicem utilitatē fiunt. Vnam quidem ex his quæ eiusdem generis sunt, quando uehementi molle ammiſcemus, carentes medio, uelut florem rosarum aut ipsas rosas cum galla aut alumine

mine permiscentes, & unūquodq; ex prædictis lenibus pharmacis ad uehēmens addentes. Non pauca enim numero iuxta huiusmodi permutationē erunt. Imò & iuxta mixturā ipsam ex duobus factā, plura pharmaca fient, quum aliās alia quantitate misceantur. Velut si duplus sit rosarum flos quantitate aluminis, aut uice uersa, duplum alumen ad florem rosarum: possit autem non solum duplum, sed & triplum, & quadruplum, alterum alteri misceri. Neq; cū est etiam par pari, atq; hoc quidem mediū fuerit inter summa siue extrema. Reliqua uero omnia partim propius molliori accedūt, quæ uidelicet plus rosarum habent, partim autem uehementissimo, quæ scilicet plus aluminis capiunt. In utrisq; uero non obsecurum est magis & minus. Quū enim duo sunt pharmaca, forte quidem est in quo alumen rosas excellit. Fortius autē est in quo triplum alumen ad rosas continetur, quàm pharmacū quod duplū saltem habet. Quod igitur semper me dicere audiistis, etiam nunc dicā. Stulti sunt qui inter duo eiusdē generis pharmaca, utrū ipsorum melius sit quærent, aut quod tandem omnī optimum existat. Perinde enim faciūt ac si quis quærat, præstet ne alicam aut pūsanā agris exhibere, aut Num uinū, an acetū mulsum, aut aliquod purgatoriū medicamentum, aut Num melius sit ueratrū album an nigrum, aut si in uniuersum quis de omnibus auxilijs interroget, quod ipsorū optimum existat. Omnia enim respectu ad aliquid, tum emolumentū, tum detrimentū in se habent, quod ipsum etiam Hippocrates dixit primus omnī posteriorū quod equidem sciam. Ex recētoribus autem medicis aliqui, quemadmodū alia multa nugātur, sic etiam talia. Vidistis porro sæpe opere perfectā quam dico ueritatē. Intempestiue namq; aliqui pharmacis quæ habebant usū, deinde quod exacerbari affectionē his uiderent, ad alia citra methodū transgressi, & neq; his quicquā efficientes, ad tertiam deinceps trāstionem, aliquando etiam quartā præter rationē delati, & affectū tam malignum esse iudicātes, me in consiliū adhibuerunt; quibus ostendere mihi iussis pharmaca quæ habebant, id quod cōmodum esset ad præsentem constitutionē indicauit; atq; quum ipsi dicerent per pharmacum quod ego consulebam, agrum exacerbatum esse, & ob id se eo uiri formidare, uerū etiam sic persuasos à me ad ipsius usum cōpuli, & tum illis, tum uobis, utrunq; quod Hierophilus dixit, uerum esse ostendi. Siue enim dixeris pharmaca nihil esse sola per se ipsa, recte dices. Nihil enim sunt, nisi utentē eis recte fuerint adepta. Siue rursus pharmaca ueluti Deorum manus esse dixeris, etiam hoc recte dices. Iuuant enim maxime, si is qui eis utitur in rationali methodo fuerit exercitatus, & cum hoc natura prudens. Quidam enim nō solum præstantiores existētes, de sapientia cum prudētissimis contendunt. Mixtura itaq; medicamentorū eiusdē generis, mediōrū pharmacorū usus gratia sit, & ob id semper duo cōtraria facultatibus pharmaca in uno quoq; affectu nos habere operaprepiū duco. Permiscēdo enim ipsa omnino multis medijs pharmacis abundabit. una igitur mixtura eiusdē generis pharmacorū causa hæc est, tam uidelicet relata. Alia porro mixtura ex diuersi generis pharmacis, ex huiusmodi ratiocinatione cōpīt. Raro equidē inueniēt quis affectionē aut discussorij tantū, aut repulsorij indigentē. Paruæ etenim, & affectionis nomine uix à medicis dignatæ, conseltim sedātur. Vbi uero generatus affectus maiorē habuerit causam, impossibile est ipsum per repulsoria perfecte sanare, & maxime ubi ægri corpus fuerit humoribus multis repletū, aut particula affecta natura debilis. Ob id igitur cogimur sæpe quidem in principio, sæpe uero paulo post ammiscere quippiā ex discussorij. Si uero dolor affuerit simul uehemens, etiam ex mitigatorij. Itaq; tunc opus est unicuiq; prædictorū pharmacorum aliquid ex discussorij addere. At uero quū & hæc omnino multa sint, à mollioribus au-

spicandum erit. Ab acribus enim inflammata exacerbantur. Atq; ea gratia composita medicamenta in usum uenerūt, quā ad aliarum partium inflammationes tum gurgulionis. Velut quum ad alumen iridem illyricam ammiscemus, aut farinam eruinā, aut thus aut myrrham. Quū enim adstringentia sint multa, & non pauca citra acrimoniam discutientia, uarietas pharmacorū ad columellas inflammatas merito multijuga facta est. Ceterū tu perspecta inflammationis magnitudinē ac caliditate, & considerata influxus quātitate, ampliusq; copiam humorū in toto corpore per cōiecturam assequutus, pharmaco in quo aut adstringētium, aut discutientū uis excellit uteris. Adscribā aut rursus etiam hic pharmaca quæ ab expertissimis tradita sunt, partim quidē cum proprijs discriminibus, non pauca uero etiam citra distinctiones. In quibus sanē ego, uelut etiam in alijs quæ supra tradidi, propria discrimina apponam.

Quæ Archigenes scripsit ad gurguliones inflammatos.

AD propositam affectionem sic scripsit Archigenes in primo pharmacorū. Uua laxata succū dissolutū admoue, aut gallam tritā cum sale, aut ipsum sal dissolutum, aut lycij radicem tritam, aut omphacium cum melle. Si uero fortius uelis, Atramētū sutorij, squamæ aris, aluminis scissi, misyos, myrrhæ, gallæ, æquas partes tritas ac uino exceptas illine. Si sola illa Archigenes tradidisset & sic cessasset, haud iniuria ipsum reprehēderim citra discrimen scribeutē pharmaca facultatis penitus contrariæ. Verum quando in sequentibus hanc ipsam tradēdi negligentia corrigit, recte facit. Quod uero indiscriminatim hæc dicta sint, hinc discere licet. Uua inquit, laxata succū dissolutū admoue. Oportebat equidem etiam hic apponere, qualem succū dicat, Verum quū omnibus iam persuasum sit cyrenaicum succum optime facere ad columellam inflammatā, non appositum cyrenaicū, & ob id sanē quāspiam ipsi succēssuerit. At uero quod acerrimum & maxime causticorū pharmacum, ipsum cyrenaicum succum cum contrarijs scripsit, non apponens discrimen, neq; ostendens quando ipso succo uti conueniat, & quādo astringentibus pharmacis, In hoc perperam fecit. Atramentū sutorium enim & squamā aris, & alumen scissum, & misy, & gallam, omnia æquis partibus in uino terere iubens, ampliusq; ad hæc myrrhā pari pondere addens, hoc modo composito pharmaco uuam illinit, quod fortissima adstringēdi facultate præditum est. Verum huius scripturæ indeterminatā incertitudinē mox mitigauit, præscribendo uidelicet hæc uerba pharmaci cōpositioni, Si uero fortius uelis. Hoc enim scripsit tanquam scientibus nobis quando fortibus utēdum sit. Porro mixtum pharmacū est & hoc ubi scripsit, aut gallam tritam cum sale, Gallam enim uehementer adstringit. Sal uero discutit cū modica adstrictione. In principio uero sale non est priuatim utendum, sicut neque succo, sed in indurata iam & diuturna columellæ inflammatione. Ipse autē nō columella scripsit, sed uua laxata, cum uulgo existimans columellæ inflammationē uuā appellari. Et quid mirum hoc purandū, quando etiam ex nostratibus quidā ob Artificiū superciliorum & iactabundus, uuam ipsam particulam appellari existimauit. Maior enim huius quā Archigenis ignorantia fuit, quanquā tum ex alijs ueteribus huius appellationis usus parabilis sit, tum ex Hippocrate cōstet, ex his adeo in prænotoynum libro, uerbis. Gurguliones cum periculo excinduntur, uruntur, ac refecantur quādiu rubri fuerint, & magni, Nam & inflammatio ad hoc cōsequitur, & sanguinis eruptio. Verum tales graciles reddere alijs artibus hoc tempore oportet. Hæc præfatus Hippocrates deinceps ait. Quū uero totum fuerit separatū, quod sanē uuam uocant, & extremum gurgulionis maius & liquidū fueris factum, superior uero pars tenuior, in hoc sanē tempore rursū est manus admoliri. Præstitit

autem

autem alio prius euacuata manū adhibere, si tempus hoc permittat, & non sufficitur homo. Manifestius autē adhuc Dioctes interpretatus est, qualis sit affectio tua appellata, & post eum Praxagoras & Mantias, & quicūq; concomitantia affectus conscripserūt. Quidā uero etiam ob id affectionem uiam appellatā esse dixerūt, quod uia fructui extremum gurgulionis simile apparet. Quae porro deinceps ab Archigene scripta sunt, recte dicta sunt, discrimina nimirū usus ipso rum eo adscribēte. Habent autem sic. Cōmune pharmacum columellae & tonsillarū. In cōmune tūm tonsillis, tūm columella inflāmatīs, aut exulceratis, in principio cōuenit, quies, inedia, & cōsequens diata, gargarismi simplices leniter adstringētes. Posca dilutior tepida, aut aqua mulsā, aut palmularum, aut uitis pampinorū, aut malorum cotoneorū, aut mespilorum, aut pirastrorum, aut rosarum decoctū, ita ut ad austerā decocta parum mellis ammiscetur. Paulo autē quum aqua mulsā per se uti iussit in principio inflammationum, non recte fecit. Nihil enim adstringens habet aqua mulsā, sed rectissime quis ipsam extensoriam dixerit, & si simul discussoriam dicat, nihil deliquerit. Quae uero deinceps ab eo scripta sunt, recte habent in hunc modum. Facit & acacia succus aqua dilutus. Illinenda sunt etiam cōsimilia stomatica medicamenta, uelut est quod ex moris cōstat simplex. Rhois item syriacae ac coriariae cremore cocto ad spissitudinem, cum melle mixto utere. Aut puniceorū dulcium atq; acidorum succum ad mellis crassitudinem decoquito ac utitor. Aut uuae acerbae succum expressum adhibeto. Aut rubi, aut lentiscae, aut terebinthi, aut myrti, aut rosarū succo cū mellē utere. Et postea forinsecus alumen scissum cum dimidia aloes parte, ac modica acacia cum succo solani, imponere consulens, haec uerba infert. Quod si moretur inflammatio, acetum tepidū per se gargarisset, aut galla trita ammixta, aut rubi aut agrestis oleae radice. Aut cyperi decoctū cum melle. Aut passum cum aqua. Aut lycites uinum calidū. Aut maluae decoctū. Manifestū est enim haec auxilia cōmunia esse, uelut praedictum est, tum columellae, tum tonsillarum. Verum non recte uidetur mihi passo cum aqua cōsidere, utpote imbecilli ad talia medicamentis. quemadmodū etiam uino lycitae, & maluae decocto, priusquam ad supputationē perueniat affectus: oportebat autem hoc ipsum ab eo indicari. Connequit deinde Archigenes ad praedicta sic scribēs. Illinito & ea quae supra ad ulcuscula in naribus scripta sunt. Priuatim autē picem cum oleo aut melle. Aut crocomagna cum modica galla & melle. Aut alumen rotūdum cum flore rosarū tritū, aut rosas aridas, aut florem ipsarū, trita insperge, aut tūm tonsillis, tum uue insuffla. Aut cyperi radicem, uel myrtū, aut lentiscū, uel rubum, aut gallam, aut salem tenuem similiter insperge. Aut omphacium uel lentiscū cum melle illine. Aut florem rosarū uel crocum cum mali punici succo. Hic rursus adstringentia ad discussoria citra discrimen permiscuit. Nihil enim simile est inspergere salem tenuem, aut rosas siccas, uel florem ipsarū. Aut pice cum oleo uti, quod pharmacum est calfactoriū ac discussorium, aut galla & alumine, quae pharmaca sunt maxime adstringentia. Ceterum indurata iam inflammatione, recte pix liquida adhibeatur, aut arida oleo liquefacta. Tunc uero etiam sal cōmodus fuerit, corpore uidelicet prius euacuato. Incipiente uero aut augescēte & cū multa caliditate uigente, maxime contrarium auxilium est pix cum oleo, eademq; ratione etiam sal. Consequenter autem recte descripsit Archigenes ad uigentem affectionē auxilia. Indicat autem ex eo, augescens & nihil opis sentiens ex praescriptis malum. Habet sermo eius hoc modo. Si uero in uigorē peruenierit affectio, aut alius subducatur, aut fursurū loturā calidā gargarisset, aut prisanā succum, aut passum tepidum, aut radicis dulcis decoctū cum passo & hyssopo, aut

ficus uino incoctas, aut pitisanæ succū in quo uuæ passæ sunt incoctæ. Magnopere iuuantur si amygdalinum oleum in aures infuderis, forinsecusq; spongij expressis leniter foveris. Quin & omelysis ex cruda ordeacea farina imponenda, aut ex farina seminis lini aut foeni græci, aut etiā mixtura ex his omnibus facta. Si ita prope suppurationem fuerint tonsillæ, coadunare assidue per ficum decoctum oportet, & tantum non indefinenter id ad gargarissandum exhibere, similiterq; aquam mulsam calidam. Si uero nihil tale apparuerit, augeat tamen malum, ita ut ægre transglutire possint ægri, & suffocationis principium sit nobis spectrum, alius fortè clysteri aut glande subducendus est, & uena cubiti secanda, cucurbitæq; cum scarificatione collo ac mento affigendæ. Fomentis etiā ac cataplasmatibus frequentius & robustius utendum, & assiduus gargarismus. Quod si ad nullum horum præsidiorum cedat sed augeatur, uenæ sub lingua secetur, aut iuxta angulos oculorū, atq; ea quæ in fronte est. Illinatur autem assidue fel tauri, & elateriū cum melle, aut sal cum oleo ueteri melleq; & aceto. Aut cētaurea cum melle. Aut absinthium cum nitro & melle. Aut hirundines integras unā cum pennis uistas ac tritas cum melle illinito. Asunt aliqui etiā summe facere hirundinum pullos teneros ualde siue recentes, siue inueteratos assatos, & in cibo exhibitos. Statim enī leuant suffocationem. Siue autem pueri sint, siue senes, sulphur & iridē cū melle delingēda dato. Quod hæc cōmunes medelæ sint utriusq; uelut in principio dixi, uide licet & tonsillarū, manifestū fecit ex his quæ cōsequenter infert, quum ait. Aliqui angina prebēlis, quos tum synanchicos tum cynāchicos Græci appellant, elaterij, & fellis tauri, utriusq; obolos II. cum aqua multa tepida bibēdos præbent. Quidā uero asellos sub aquarijs uasis nascētes in potu exhibēt, aut delingēdos dant, aut dolentibus & affectis partibus illinūt, & ualde se iuuari testātur. Quin & per uaporē intra os receptum hoc modo fomentum adhibetur. Origanum aut hyssopum, aut satureiam, cum sufficienti aceto diligenter in olla seruefacio obturata, Operculum autem circa medium habeat foramen. Deinde harundinem ad foramen operculi ac os ægri adprato, ac fomentum admittito. Si uero os à seruore harundinis cōburatur, ouum uacū utrinq; perforatum ægri in ore contineant, & per ipsam harundo inferatur. Mollius sit fomentum, si pro aceto aqua sumatur. Quidam nītrum, & origanum, & nasturtij semen, ac oleum in posca trita miscent, & similiter pro fomento adhibēt. Aut cinerem pullorum hirundinum implumū illine, aut solani succum, & buryrum æquis partibus cum rosaceo cerato mento impone. Eis uero qui suffocantur, picem cum aqua & nitro in potu præbe. Hæc quidem Archigenes scripsit. Ego uero nunquā tentauī ulli alicui, ea quæ bibuntur pharmaca, in eiusmodi affectionibus exhibere, qualium sanè tum ipse, tum alij quidam meminerunt. Itaque hoc quod ad finem sermonis præscripti habetur, his uerbis: Eis uero qui suffocantur, picem & nītrum cum aqua in potu præbe: non possum mihi persuadere qua ratione sit dictum. Imò neq; ex præceptoribus aliquem, neq; alium ullum eo utentem uidī, neque etiā ipse in usum assumere tentauī. At uero uenam secare eis qui suffocantur, & eluere fortè atq; acri clysteri, & purgatoria exhibere, gratia eua cuandi uniuersum corpus, & transferendi infra humorum momentū qui ad affectas partes feruntur, rationabile est, & multa experientia iudicatum ac cognitum. Similiter etiā post totius corporis euacuationem & diuersionem ad infernas partes, pharmacis acribus multum disculsiōis uti, rationi cōsentaneum est, & experientiam testem habet. Picem uero cum aqua & nitro in potu præbere, abstīnuī, utpote quum neque alium utentem uidēim, neque rationem ad hunc usum ducem habeam.

Quæ Apollonius in primo parabilium prodidit.

Apollonius in primo parabilium sic ad uerbū scripsit. Ad inflamatam columellam illitiones. Sale trito & melle illinens reprimes columellam. Picem illinens per digitum apprimito. Succum cyrenaicum aqua diluito, & columellæ adhibeto. Chalcididē tritā similiter admoueto, omphacio trito cum melle utitor. Hæc Apollonius. Licet autem nobis uidere in his quæ absq; discrimine scripta sunt, quod si quis non uniuscuiusq; indefinite scripti facultates nouerit, quo in oportuno tempore eis utatur, maximum omnino nocumentum inferet. Scriptum est itaq; hic primum omnium, Sale trito & melle utendū esse. Potestremū autem, omphacio cum melle. Cōtraria autem facultas est omphacijs ad salē. Quare si quis in principio sale utat, maxime si humores in corpore ex equo abundant, aut etiam circa caput hæreant, extreme ægrum lædet. Omphaciū uero in principio commodissimum est, non trahens, neq; euellens ad se ex alto, uelut sal cum melle, sed repellens. Sales autem cum melle discussoriam uim habent, modica adstrictoria uel salī cōmixta, quæ sanè per ammixtionem mellis penitus euertitur. Cæterū id quod ex pice constat, inueteratis inflammationibus, & iam in scirrhum, ut ita dicam, induratis conuenit. Quemadmodum etiam cyrenaicus succus non incipientibus, sed ubi iam quod influit per adstringentia repressum est, prodest. Chalcitis uero in totum inepta est, præterquā si ualde inueterata & ægre curabilis sit affectio. Est enim medicamentum mordax si cruda adhibeatur, quapropter ut uim ipsius deleamus, uita frequentius utimur. Deinceps Apollonius hæc ad uerbū scripsit. Gargarismi ad pendulam columellam, Origanum tritam, aceto & aqua affusis, fenefacito, & cum caricarum succo misceto, ac utitor ad gargarissandum. Aut hyssopum terito, & caricarum coctarum succo misceto, ac utitor uelut origano. Mentam ac rutam & coriandrū lacte asinino trita gargarissanda præbe. Apium & lauri folia trita, & uino aut lentis decocto diluta gargarissato. Noui quendam qui omnibus ab Apollonio scriptis indiscriminatum utitur, in principio inflammationis gurgulionis uno ex his usum esse, & ægrum extreme læsisse: præter alia enim neq; sciebat quid pendula columella esset, quum uelit Apollonius ualde laxatam absque inflammatione, gurgulionis affectionem ostendere, quam etiam refecare consueuimus, atque in hac re uera p̄tuitam detrahentia & calfacientia pharmaca commoda existunt. Nam in totum subalbida sit & exanguior. Deinde Apollonius hæc subdit. Lotium asini plurimum & calidissimum bibendum præbe. Idem etiam in angina. Miror equidē eiusmodi auxilia tradētes: certe enim scio omnes homines, paucis omnino exceptis, citius mori uelle, quā urinam asini bibere. Verum hic etiam plurimam addidit, & aliās uelut etiam antè dixi, absurdissimum est curantē oris inflammationem, pharmacum potabile exhibere, nisi si ex purgandum numero existat. hæc enim alterius usus gratia dantur. Ex alijs sufficiunt quæ citra transglutitionem auxiliari possunt. Quin & quod postea scriptum est similem habet absurditatem, quod itidem bibere iubet. Scribit itaq; sic de ipso. Lauri folia trita ex uino & aqua bibenda præbeto.

Quæ ab Hera tradita sunt.

Heras igitur multò melius quā Apollonius scripsit hoc modo. Ad columellam laxatam. Gallæ omphacitidis partem. Mālis ammoniaci partem. Vtrūq; per se ac simul terito, & expleto inde cochleario uuam cōtingito. Lapidem Ageratū appellatū, quo sutores ad muliebria calciamenta expolienda utuntur, deradito, indeq; cochliariū expletū uuæ adhibeto. Ex his duobus pharmacis, alterum posterius omni molestia caret, neq; nocere potens, neq; magnopere

iuuare, quocumq; tandē tempore quis eoutatur. Fortius est prius. In principio itaq; & quum ualde rubent, minime aptum est. Si uero praeuacuato toto corpore, & post repulsiuū pharmacorū usum, adhibeatur, ubi non ualde rubens sit gurgulio, iuuare potest. Ex cōtrarijs enim fortibus cōponitur facultatibus repulsiua & disculsiua. Quare non recte fecit Heras indiscriminatim ipsa tradendo.

Quae Heraclides Tarentinus tradiderit.

Tarentinus porro Heraclides in libris ad Antiochidem, ad inflammata columellas sic scripsit. Omphaciū siccū terito, & ammixto sufficenti melle adhibero. Aut gallam tritam cum melle, aut alumen scissum eodē modo. Aut succū cyrenaciū cum melle. Aut Melantheriā qua sutores utuntur. Aut Andronium pastillum, quē in uulnerarijs medicamentis referā, cū uino. Oportet autem post haec lentū decoctū gargarissare. Recte ad finem hoc a descripsit. Vehementia enim sunt omnia praescripta ab ipso pharmaca, acerbata qualitate praedita, & ob id exasperanti. Itaq; aspretudinem ab ipsis inductam mitigare uult per lentum decoctū. In moderata inflammatione non est necesse his uti, quemadmodū neq; ubi columellae ualde rubrae fuerint, & calidā inflammationē habent. Imò neq; in declinatione earū; tūc enim disculsiuorū medicamentorū uim predominari oportet.

Ab Asclepiade prodita.

Asclepiades ad easdem sic scripsit. Siccū ad laxatas columellas. Anethum unā cum semine & radicibus quod faris est accipe, & in uas fictile contritum, cuius os sit subobstruatū, & ipsum uas luto oblitū, in furnū donec uas igne scat mitte, deinde ex furno extractum anethum ustum tere, & sublatum reponere. Vsu uero expetere anethi partes II. accipe, & tridis silyricae in tenuissimū puluē lum redactae partem I. ammisce, ac per harundinē insuffla. Aliud, Rosarū siccarum sextariū. Nardi celticae unā cum radicibus & adherentē terra fasciculū unum, nidi hirundinum syluestriū aridi drach. III. myrrhae drach. VIII. gallae omphacitidas numero XV. contusa & trita insuffla, & cū digitis adhibe. Ex his duobus pharmacis prius penitus nihil ex repulsiujs habet, sed est totū disculsiuū. Alterū uero ex contrarijs mixtum est facultatibus; multam enim disculsiuam uim habet syluestrium hirundinū nidus, adstringentem autem gallae, Mediae uero potentiae est myrrha, & mixtae nardus celtica, ita ut tum disculsiua, tum adstrictoria facultas, ambae in eo sint moderatae. Ceterum per harundinem eiusmodi pharmaca insufflari, ualde improbo. Defertur enim ex ipsis multū, tum in gulā summum, tum in ipsam gulam. Praestat itaq; cochleario indita apprimere, quemadmodū ego uti soleo, ut uidistis. Quin & tertium pharmacū Asclepiades post praedicta duo cōscripsit his uerbis. Siccū ad laxatā columellā & tumētem Neapolitae. Piperis albi drach. I. myrrhae drach. I. aluminis scissi drach. II. gallae omphacitidis drach. II. trita admoue. Hoc pharmacum à principio usque ad finem utile esse poterit, praeterquam in uehementer rubentibus. In his enim uigere oportet acritum ac mordacium ualde mixturam, quale hoc loco piper existit. Aliud deinceps eiusdem facultatis scripsit ad tumentes columellas ex his compositum. Lapidis agerati drach. III. floris lapidis Asij drach. III. tetræ famiae drach. III. aluminis scissi drach. II. croci torrefacti drachmas II. gallarum omphacitidum drachmas II. tritis utere. Hoc & nos usi sumus saepe ut optimo, & quod omni tempore iuuare possit, praeterquā uelut in praecedenti dixi, statim in principio, & quum ruber & calidus fuerit inflammationis tumor. In inueteratis autem iam, & corpore euacuato, post unum usum statim magnam commoditatem exhibet. Sunt enim uehementer adstringentia, ac discutientia, & ea quae medicae materiae sunt, in ipso temperate mixta.

Critonis pharmacum hoc modo scriptum ad columellas.

Hoc pharmacum ad ipsam temporis oportunitatem apparato. Ossium palmarum, nucum tenerarum immaturarum siccarum, utrorumq; drach. iiii. urito ac in puluillū terito. Vttere arido admoto. Et in hoc pharmaco ossiū palmarum vis satis discussoria est. Nam & in alijs affectionibus, eorum experientiam habemus, quod eiusmodi uiribus sint prædita. Nucum uero tenerarum siccarum cinis, discussoriam uim habet unā cum adstringente.

Sorani ad columellas.

Quin & Soranus pharmacū indiscriminatim scripsit, nō apponens in quibus priuatim faciat. Habent autē uerba eius hoc modo. Radicē dulcē cōtundito, & mel & dulcē aquam pari mēsurā affundito, deinde coquito, & succū gargarissandū præbeto. Peccauit in hoc quod nō adscripsit, maxime mitigatorium hoc pharmacū esse, quod in uigore inflammationum magnopere auxilia ripotest. Huius usus cōmodus etiam est, ubi ex acerbis pharmacis immoderatus quis irritarit & exasperarit columellā inflāmatā. Hāc enim lenit hoc pharmacū.

De pharmacis ad ulcera oris aphthas appellatas.

Cap. iiii



Lceratiōes in superficie oris obortas aphthas appellāt, habētes quīpiam igneæ caliditatis: sunt autē ut plurimū pueris lactēibus, quum aut uisiosum fuerit lac nutriticis, aut nō probe ipsū cōcoxerit infans.

Curantur facile utpote quæ ex moderate adstringentibus sedantur. Quandoq; tamen diuturnæ sūt ac ægre solubiles, & progressu tēporis putredinosum quid acquirunt, quod à Medicis Nome appellatur. Scripta itaq; sunt & ad ipsas medicamenta moderata quidē ad eas quæ nihil maligni habent. Fortia uero ad eas quæ iam quid putredinosum & serpendo depascens habent. Mentionē faciū eorū quæ recentiores coacenuarunt, Nam ex his quæ ueteres conscripserūt, optima cum magna experientia ipsi elegerūt, & quedā eorū quæ postea inuēta sunt apposuerūt. Inuenias aut post ueteres, etiā Mantias & Heraclidē Tarentini plurima pharmaca scripta. Similiter & Menecrates librū optimorū pharmacorū inscripsit, ex quibus plurima ipse inuenit. Quemadmodū & cappadox Heras. Andromachus autē duos, & tertius in quo oculorū pharmaca cōtinentur. Plures autē libros cōposuerunt Antonius Musa, & post eum Asclepiadē duo, & post hos Crito. Verū hi quidē tres post Andromachū nati sunt, Heras autē ante Andromachū, & ante ipsum etiam Musa ac Menecrates. Longo uero tempore etiam hos præcessit Heraclides, & præceptor eius Mantias. Verum Mantias uelut ab initio Herophili sectator fuit, ita etiā per omnia mansit. Heraclides autem medicorū empiricorū sectam elegit, optimus medicus tum circa alias artis partes factus, tum plurimorū pharmacorū expertus. Quū itaq; aphthæ, de his enim sermo institutus est, malignæ euadunt, fortioribus medicamentis egent, qualia etiam alias in tonsillis ac ore affectiones sanant. Prædicto igitur scopo compositionis eorum, nihil amplius opus habeo de his dicere, sed ad narrationem progrediar præcognitorū, initio sumpto ab his quæ Andromachus scripsit, quem admodum consequi ad uerbum ipsa transcribere.

Quæ Andromachus scripsit ad aphthas.

Non solū Andromachus, sed & alij multi duo pharmacorū genera ad aphthas conscripserunt. Ad eas quidem quæ nihil maligni habent, moderata uiribus pharmaca cōponentes. Ad malignas uero fortiora: adscribunt autem in his ipsi aliquando, quod ad aphthas & ulcera hoc pharmacum conuenit, aliquando quodd aphthas putredinosas, Quum uero simpliciter ad aphthas adscripserint, simplices indicant & nihil maligni habentes. Andromachus igitur ad malignas

ad malignas aphthas sic scripsit. Ad aphthas in ore & ulcera. Aluminis scissi usti drachmas. II. fructus ericæ drach. I. oleo excipito, & per digitum locis apprimito.

Aliud, Aeruginis drach. II. aluminis scissi partes II. gallæ in puluillum redactæ partem unam, terito & per linteolum cōcernito, deinde digitū oleo madefacto, succumq; excipito, & tonsillis extergēdis apprimito, item palato, & uux. Disparat pelliculas, & tollit asperitates circa ipsum os, callos excoriat, & ulcera ad cicatricem perducit. Cæterum ad aphthas in superficie hærentes sic scripsit. Ad aphthas lycium Indicum uino tritū circūlitum facit, & ericæ fructus tritus, aut rosæ siccæ cum melle. Hæc præfatus insert. Si uero nigre sint & malignæ, Vuæ passæ puræ partes III. anisi tantundē, trita cum melle illine, deinde collue.

Quæ Crito ad aphthas scripsit.

Crito uero sic ad aphthas scripsit. Portulacam in melle tinctam māduet, aut oleæ folijs in uino coctis os colluat, aut foliorū myrti albæ decocto ex uino, aut æruginis uermiculatæ obolos III. in uini hemina parte quarta tritos colluat. Quin & galla in aceto teratur, ac illinatur. Faciunt & amygdalæ amaræ cum melle. Nigrefactas autem aphthas, uua passa exacinata & aniso tritis cum melle illine. Tarētinus autem Heraclides, ubi exterseris ait farina erui cum melle, gallam cum melle adhibe. Conuenit & Rhus obsoniorum cum mentæ ramulis. Sit autem Rhois copia quantum tribus digitis prehendi potest, mentæ uero ramuli tres, & rosarū folia septem, & nuces pineæ septem. His omnibus cum melle tritis utitor, aut lycio ex aqua. Conuenit & fex uini dulcis illita cum melle. Aut alumen, & malicorium punici dulcis, æquis portionibus terito, & adipe anserino mixta illinito, atq; aquam calidam frequentius colluendam præbeto, ampliusq; adipem anserinum admoueto. Aliud Musæ. Fructus myricæ drach. VI. aluminis scissi drach. II. oleo excepta admoue.

Aliud maxime in pueris. Rhoen rubrū tritum melle mixtum illine, aut adipem suillum & mel liquefacta. Præbeto eis etiam gargarissandum lac asininum. Quod si multa salua feratur, gallam & solanum aceto diluta gargarissare facito, aut uiolas albas siccas cum melle tritas illinito. Hæc quū scripserit Crito, merito quis eis succenscat, uelut etiā alios semper reprehēdo, qui ex ordine indiscriminatim auxilia recensent, non apponētes an incipiente affectione, aut progrediente, aut decedente, aut uigente, aut decrefcente, cōueniant, & Num parua existente affectione & mansueta, aut adeo maligna ut iam putredinosum quid habeat. Ex his enim quæ scripsit aliqua simplicissima sunt in pueris maxime cōuenientia nullam affectionem habentibus. Velut quum adipem suillum & mel liquefacta assumit, & multo magis quum asininum lac colluere præcipit. Simplicissimum pharmaca cum est & portulaca melle tincta & manducata, & collusio ex folijs oleæ, similiterq; ex myrto alba. Fortissimum uero quod ex ærugine & uino constat, quem admodū etiam galla acri aceto trita ac illita. Valde enim forte hoc pharmacum, uelut etiā id quod ex ærugine cōstat. Verū in illo paucissima est ærugo, (obolos enim tres dedit in uini quarta hemina parte terēdos esse ac colluendos) debilisq; sit, copia mixturæ uini exoluta, Gallæ uero aceto acri trita ut crassa fiat, & illitio ni apta, ualde uehemens est pharmacum, Quemadmodū etiam quod ex alumine & malicorio punici dulcis componitur, quod nisi ad adipem anserinum amixtum esset, ad putrefactiones fortes congruens esset. Forte est & quod ex myricæ fructu ac alumine constat, sed non adeo uelut id quod ex galla & aceto. Semel porro tantum recte fecit apponendo in uerborum serie sic. Quod si multa salua feratur, gallam & solanum aceto diluta gargarissare facito. Multam enim saluam ferri, maiorem affectionem esse significat. Præstabilius autem fuisset sta

rim dixisse. Quod si pascendo proserpat affectio, aut ulcera profunda fiant, aut eiusmodi quippiam adscripsisse.

De his quæ Asclepiades ad aphthas scripsit.

Recte igitur fecit Asclepiades, tamen si non multa pharmaca ad aphthas con-
scripsit. Veruntamen in duobus quæ in principio tradidit sic. Ad aphthas
citra nomen serpendo depascenti. Deinde post duo rursus adscribens. Ad aph-
thas depascentes. Lenia enim sunt duo pharmaca, alterū quidē prius in quo ait,
Medullam bubulam melle mixtā ac tepesactā illinito. Maxime uero pueris in-
fantibus est commodum. Alterum uero est, Adipe suillo melli ammixto utitor.
Cæterum ad depascentes aphthas, gallarū decocti cyath. i. ac mellis tantundem
miscere iubet, & feruesfacto uti. Verū ego tum hoc pharmacū, tum alia tria post
ipsum tradita, paulo ante in pharmacis ad nomas præscripsit: neque enim referre
puto, siue ex aphtha, siue ex alio quopiam transitio ad nomen contingat.

Quæ ab Apollonio ad aphthas scripta sunt.

Apollonius autem Herophili sectator in primo parabiliū pharmacorum sic
scripsit ad uerbum. Ad aphthas albas. Chalcitidem oleo tritā penna illi-
nito. hoc euestigio sedat. Postquam uero pura facta fuerit, Myricæ fructum tri-
tum, & aqua mulsā aut uino dilutū illinito, maxime infantibus. Deinceps autem
aliud scribit, & maxime ad nigras aphthas. Vuam passā exacinatā & anisum
trita cum melle illinito. Et rursus aliud, Atramento sutorio trito cū melle uti
tor. Videtur sanē in malignis, eiusmodi pharmacis tubere uti. Adscripsit ita-
que ad primum, Ad aphthas albas. Ad secundum, Ad nigras. ostendens per
id colorem præter naturam, & magnitudinem affectionis. Cōsequenter adscri-
bit & collutiones ad aphthas, hac uerborum serie. Vino nigro austero & subad-
stringente colluito. Olea folijs in uino coctis colluito. Myrti albæ foliorum de-
cocto cum uino similiter utere. Hæ collutiones citra discrimen scriptæ nullum
detrimentum inferūt. Nam & in moderatis, & in maioribus, & in maximis affe-
ctionibus conueniunt. Recte uero deinceps aliud ualde efficax scripsit. Aerugi-
nis uermiculatæ obolos iii. in uini quarta hemina parte gargarissādos præbe.
Deinde etiam uinū colluendū præbe. Hoc enim in fortioribus conuenit, quem-
admodum etiam quod consequenter sic scriptum est. Muriam oliuarū & ace-
tum parī mēsurā mixta colluenda dato; indeq; uino colluito, postea etiam aqua
mulsā, & deinde aqua. In omnibus autem oleum colluendum præbe. Post hæc,
duo pharmaca scribit diuersis formis ac speciebus aphtharū congrua. Hyssopū
enim tritū ad calidas & erosas affectiones, itemq; puras maxime contra-
rium est: congruū autem sordidis & inflammatis aphthīs. Omphaciū uero cum
uino aptū est pueris & mordacitatem sentientibus ac erosīs. Iubet autē ompha-
cium cum uino tritū collui, hyssopū uero cum uino aut aqua mulsā. Validum
ualde est quod ab his sequitur pharmacū, ut iam pascendo proserpentibus aph-
thīs cōueniat, quod ipsum componit, myricæ fructum coquens cum aceto. Va-
lidum est & quod deinceps ab eo scriptum est, in quo ait, Gallā tritam in acri
aceto colluendam præbe. Hoc uero quod postea sequitur, in quo ait, succo sil-
phij diluō similiter utitor, & postea oleum colluendum dato: etiam ipsum acris &
mordax est ac discussorium non adstringens. Non recte itaque adstringentia &
acerba ac repulsoria, discussoria ammixta sunt ac acris, atq; hoc nullo discer-
mine adiecto. Quod uero sequitur ex aceto apparatus generosus est: quod autē
nō apposuit ad acētū, acris, in hoc deliquit, & quod per semen lini moderatius
reddi tacuit, adiecit autē ipsi etiam loliū, pharmacū multū discussorium, atq; propter
rea ipsum ad linguæ tumores cōuenire ait. Verū adscribā omnē ipsius dictionē.

Semen lini, ac solium, æquis partibus aceto trita colluito. Hoc idem ad linguæ tumores facit. Longe lentius his omnibus pharmacū deinceps scripsit hoc inop. do. Folia pruni cōtusa ac lacie permixta colluito. Quum enim adiecerit sermōni, colluito, manifestum est quod multo lacti pauca folia ammisceat. Nam si folia cum lacie trita pro pharmaco inunctū esse iussisset, palam utiq; esset, quod multa folia, paucū uero lac esse iussisset. Deinceps porro etiam quæ mansa aphthas iuuent annexit. Mandendæ sunt oliuæ muria conditæ. Manifestum est lenissimum hoc pharmacum esse. Et rursus. Portulaca melle tincta manducetur. Et hoc similiter mite est. Differunt hæc duo inter se in eo, quod oliuæ muria conditæ & adstringunt, & discutiunt: plurimā uero in se adstringendi uim habēt. Portulaca uero cū melle imbecillius est pharmacū. Consequenter probe fecit quum ait, In pueris cōuenire quæ dicturus est medicamenta. Scribit uero de eis in hæc uerba. Vbi puer aphthas habeat, Similaginē & medullam bubulā, ac farinā, cōcta in cibo exhibeto. Si uero sugere nequeat, lienem bubulum in uino coctū, ac tritum cum melle, in cibo dato. Hoc pharmacū superuacaneū est, & plus æquo curiosum. Deinceps recte scripsit. Abstinendū circa dietam, ab acribus, & falsis, & acidis tum edulsi, tum potibus. Deinde haud scio quo modo, in hanc sententiam scribit. Atramentū sutorium tritum cum melle illinito. Hoc enim medicamentum superius scribere oportuit cum alijs fortibus pharmacis.

Quæ Archigenes scripsit ad aphthas.

Quædā ex his quæ Archigenes ad aphthas scripsit, eadē sunt cum præscriptis. Verum uisum est mihi ex ordine omnem ipsius sermonem adscribere, ita ut nihil ex eo relinquam. Scribit igitur sic. Ad aphthas collusiones faciēs. Foliorum oleæ decoctum, aut foliorum myrti albae eodem modo. Aqua oliuæ colymbadis appellatæ, hoc est muria innatans. Facit & amurca, & marrubij succus, aut lentis decoctū, seu rubi, aut cypri. Aut æruginis uermiculatæ obolū, in uini cōsidij quarta hemine parte dissolutas colluat. Illitiones autē faciunt pleraque ex descriptis stomatidis medicamentis: priuatim autem cōgruunt hæc. Aluminis scissi, florum rosarū, æquales partes, fructus myricæ duplum, utere siccis. Aut thus & glycyrrhiza succum æquis portionibus, gallæ, myrrhæ, anisi, singulorum parum quid, cum uino protropo illine. Aliud, Mannā & salem pari pondere sicca, per pennā adhibeto. Aliud, Fecem urini dulcis cum melle illinito. Aliud, Misy & alumen & Rhoēm cū melle, aut chalcidē cum oleo, per pennam illinito: uehemēter bonum est. Aut oleæ folia cum oleo illinito. Postquam uero repurgatæ fuerint, myricæ fructum cum aqua mulsā aut uino illine. Aut ubi cum erui farina & melle exteferis, gallam cum melle adhibe. Aut myricæ semen & aluminis tertiā partem cum oleo illine. Hoc etiam ad nomas facit. Aut adipem suillum aut anserinum manna inspersa illinito. Aut gallam tritam cum oleo. Aut liquidum alumen dilutum. Aut cypri folia manducant. Aut lycij radicem aridam adhibe. Aut oleæ germina trita ex melle, Aut gallam cū sale. Si uero extendatur affectio, & serpendo putredinose depascant, collusionibus quidem & gargarismis utēdum est ad aphthas descriptas fortioribus: priuatim autem muria frequētius colluenda est. Aut herbam sacram aqua aut uino incoctam colloendam aut gargarissandam dato. Illitionibus etiam ad aphthas descriptis fortioribus utātur: priuatim uero cornu cerui tritum affrica. Aut atramentum sutorium tostum tritum cum melle. Aut æruginem aeris siue squamam cum melle. Summe facit ad nomas, sceniculi radicis uisq; cinis. Hæc ad aphthas Archigenes in primo de pharmacis scripsit, quæ partū abest ut omnia etiā alijs sint scripta. Quid igitur operæ pretiū duxi eadem bis scribere, quāuis cauērim

cauerim ne hoc facerē: Quod sanē & Archigenem, quem scimus maiore quā alios dignitate, etiam communia cum proprijs discriminitus scribere posse, uidebam nunc ipsum in pluribus eiusmodi doctrinae negligentē. Nunc enim omnia confusim projicit auxilia, unā cum hoc quod cōtinenter inter se scribendo commiscuit, lenissima & acerrima. Quid enim simile habet ærugo ad lentis & rubi ac cypri decoctū: quid galla simile ad pīanferino aut suillo. Aer enim & erodens fortiterq; resiccans pharmacum est ærugo. Rubus autem & cyprus, & lens, paucissimam habent adstringēdi facultatem. Sic etiam galla fortissime adstringens, contrariā uim habet suillo ac anferino adipi. Quin & deinceps ab eo scripta plāneq; omnia quorum mentionem facit, eandem confusionem perturbati ordinis habent. Præstabat autem uelut semelalicubi in sermone apponendo dixit. Hoc etiam ad nomas facit: eodem modo etiā alia distinxisse ut adscripseret uidelicet, hoc quidem infantibus ac pueris conuenit, hoc uero perfectis: & hoc incipientibus aut moderatis aphthis, hoc autem uigētibz & fortibus. Maxime uero omnium, aut inflammatis & calidis, aut magis frigidioribus: & ex inflammatis, hoc quidem rubicundioribus, hoc uero flauioribus. Alia enim ex sanguine, alia ex flaua bile inflammationem habent. Quemadmodū rursus non inflāmata pituitosa in rosum exsunt, quemadmodum aliqua ex inueteratis humoris atræ bilis malignitatem acquirunt. Cognoscitur hæc omnes facile uisu simul & tactu: Visu quidem ex coloribus, quemadmodum etiam nunc dictum est. Rubicundiores enim sanguineū humore præualere ostendunt: flauiores autem amarā bilem. Quemadmodū rursus albescētes pituitosiores, liuescentes & nigrescentes, atræ bilis succū. Qui enim hæcrite discreuerit, noueritq; amplius singulorum simplicium pharmacorum facultatem, quemadmodum in libris de ipsis à me scriptum est, is in unaquaq; aphthæ specie, tum simplicibus, tum compositis uti sciet, uelut iam sæpe est prædictū. Considerabit autem simul & corporum naturas, Num molles sint & humidæ, uelut in pueris, eunuchis & mulierculis, an duræ & aridæ, uelut in piscatoribus ac nautis, & uenatoribus atq; agricolis. Fortioribus enim corporibus fortiora adhibebis pharmaca, debilioribus molliora. Ego porro infantibus qui adhuc à nutricibus aluntur, lentem cum modico pane & medulla cetui, aut uituli præbeo. Ammisceo etiā cibis, ex malis coronæis, atq; alijs quæ adstringunt, uelut Romæ cestiana appellata. Quin & ex piris addo, sorbisq; ac mespilis, & cornis. Quādoq; etiā de lactuca, & seride, ac solano, & portulaca in cibos permisceo, si aphtha fuerit inflāmata. Quod si cibum adhuc adsumere nō queant, nutricem eiusmodi uictu alo, eiq; simul bonam concoctionem prospicio. Verum tamē etiam infantes pharmacis illino, siquidē subrubras uidero aphthas, in principio quidē his quæ moderatissime adstringunt ac frigefaciunt: deinde uero his quæ citra mordacitatem discutiūt. Si uero subflauas uidero, ipsdem quidē utor, sed magis refrigerantibus. Si uero pituitosiores, adstringētibz. Si nigrescentes, discussorijs generosioribus. Ceterū in maioribus pueris, eiusdē generis facultatibus pharmacorū utor, auctis tantū uiribus ipsorū. Quemadmodū sanē etiā in perfectis & duris corporibus, singulis relatis facultatibus fortissimis utor. Sufficit autē mihi in his per omnia misyos usus cum uino adstringente, quod tum intendit, tum remittit uim suam, prout magis aut minus uinum fuerit adstringens, & prout crassius, aut liquidius efficitur pharmacum ex misyos ac uini mixtura. Quod si sordida appareat aphtha, Misy cum uino mulso tero. His uero qui fortioribus quā misy est, pharmacis opus habet, Aerugo similiter cum uino & uino mulso utilis existit. Illinenda autem sunt ex his pharmacis affectæ oris partes. Commodum est etiam pharmacū ad hanc rem, chalcitis oleo trita. Atq; hæc

quidē efficaciora. Moderata uero & maxime ad incipientes affectiones, ompha-
cium cum uino & uino mulso. Similiter etiā Rhus. In pueris sufficit rosarū flos,
& ipsa rosa sicca, & collutiones moderate adstringentes, pro ætatis & nature
eiusmodi corporū ratione. Et in summa, Moderatæ aphthæ maxime in teneris
corporibus, moderatis pharmacis opus habent. Fortes uero & maxime in duris
corporibus, à fortioribus curantur. Fortia pharmaca dico, tum quæ fortiter ad-
stringunt, tum quæ mordent, & immoderatus discutunt. Fiunt porro etiam
in his, uelut in alijs prius dictum est affectionibus, cōposita medicamenta, & læ-
petiam ex contrarijs, quale est quod ex oleo & chalcitide constat. Ipsum equi-
dem oleum per se infestissimum est aphthæ affectui, uelut etiam chalcitis. Quan-
doquidem alterum quidem humectat & sordidū facit. Mordet autem uehemen-
ter chalcitis. Verum mixtura ipsorum ubi fuerit moderata, optimum phar-
macum efficit. Quemadmodum igitur ex cerato & æruginē, incarnans effici phar-
macum ostensum est, quum tamen ambo incarnationi cōtraria existant, Eadem
ratione ex oleo & chalcitide aptum medicamentum efficitur. Si uero in putre-
dinem aphtha uertatur & exulcerationes facit, neq; aphtham amplius affectio-
nem nominare conuenit, neq; pharmaca eiusmodi affectiones curantia, inter ea
quæ aphthis commoda sunt connumerare. Quemadmodum neq; inter erysi-
pela sanantia, recte cōnumerantur ea quæ præclare discutiūt siuidas & duras par-
tes, ex frigidorum medicamentorum adhibitione tales factas, & tam ad indura-
tam in scirrhum affectionem, ex erysipelate delapsas. Profectō enim qui eiusmodi
scripturarū indiscriminata incertitudine decepti, erysipelatis calida & discus-
soria medicamenta, aphthis autem ea quæ putrefactis cōueniunt, adhibent, non
parum detrimenti inducunt.

Finis sexti libri.

CAPITA SEPTIMI LIBRI

De affectionibus circa partes respirationis contingentibus.	Caput i
De Arteriæ ab Andromacho descriptis.	Cap. ii
Confectiones ad tussim ab Andromacho libro ii. de cōfectionibus interius con- scriptæ.	Cap. iii
De reiectione sanguinis.	Cap. iiii
Confectiones dolorem sedantes, tabescētibus & sanguinem reiectantibus com- moda, itemq; alijs quibusdam accōmodata, præterquā colicis.	Cap. v
De Orthopneæa.	Cap. vi

CLAVDII GALENI PERGAMENI

DE COMPOSITIONE PHARMACORVM LO-
calium, siue secundum locos Liber vii. Iano Cor-
nario Medico interprete.

De affectionibus circa partes respirationis contingentibus. Cap. i



OS est recentioribus medicis arteriæ pharmaca, Arteriæ ap-
pellare, non apponentibus num antidotos dicāt, an iuxta aliud
significatum. Quidam uero electa nomināt ipsa, non apponen-
tes pharmaca, & quidam penitus nullum discrimen ipsis adscri-
pserunt, aliqui uero raro addiderūt, alijs ad uocem interceptam,
alijs adhuc generalius ad uocem læsam. Sunt qui & ad exaspera-
tam

tam arteriam, & ad exulceratam scripserunt; adeo ut rationabile sit, eos qui arteriacis appellatis pharmacis indiscriminatim utuntur, aliquando feliciter eis uti, aliquando vero nihil penitus agros iuvare, sed maxime ledere. Palam est autem quod asperam arteriam in huiusmodi affectionibus criminantur. Quondam igitur quando nondum eas quæ similiter ut cor pulsant arterias, sic nominabāt, in solam eam quæ ex pulmone in laryngem emergit arteriā, ipsum arteriæ nomen inferebant, Venas appellantes in totū, uelut alias quæ non pulsant, sic etiam pulsantes. Postea vero consuetudine obtinente arteriæ appellationē in pulsantibus dici, propter æquiocationem asperæ nomen apponentes, eam quæ ex larynge in pulmōnē descendit arteriam, asperā arteriā appellauerunt, unā cum hoc quod ipsam etiam bronchiū uocant, quandoquidē cartilaginosa corpuscula, quæ plurima eius pars sunt, bronchia appellant. Ambit autem ipsam arteriā intrinsecus crassa pellicula, quam ob crassitudinē aliqui tunicā uocāt. Quā igitur affectio aliqua aut circa hanc, aut circa laryngis (qui summa arteriæ pars est) musculos contingit, arteriacas appellant curātes ipsam, non apponentes, uelut dixi, antidotos. Dissimiles autem facultatibus sunt ab ipsis descriptæ, & ob id contingit utentes ipsis absq; discriminē, à scopo aberrare. Quod uero multa sit differētia earū quæ in medicamentarijs libris scriptæ sunt, ex tribus exemplis discere licet, quorū primum omnis acrimonix experta est, & exquisitè meatus obturat, leuigans asperitates, alterū huic contrariū est, acrimonix mordacis nō parum habens, ut si sanæ particulæ adhibeatur, ipsam exasperet. Medium deinde inter ambo dicta, aliud genus arteriacorū pharmacorū est, lenis & citra acrimoniam extergētis facultatis. Id igitur quod meatus obducit, ex passo cretico, & gummi, & tragacantha, ac ra dice dulci apparatus. Acre uero ex pipere, & cassia, & dinamomo, & galbano, ac resina terebinthina. Mediū autem amborum ex pilulanae constat succo, & amygdalis, & fabis fressis elixis, & alijs huius generis. Inter mediū autem & utrūq; extremū plura pharmaca sunt, partim magis, partim minus, à medio progressa. De quibus deinceps determinabo, eos quidē qui discrimen aliquod addiderunt laudaturus, qui uero simpliciter promulerunt, neq; admissurus. In horum medio locandi sunt, qui discrimina non tamen integra secerunt, qualia sunt eorū qui scripserunt. Arteriace ad interceptā uocem, aut rursus. Arteriace ad raucā uocē. Etenim uox intercepta, hoc est nō posse loqui, ad plures causas, sequitur, partim quidē ad destillationes à capite diurnas, partim uero suppuratis pectore ac tabidis, & his qui ex magno & multo clamore læsi sunt, & deinde nō probe curati sunt, aut etiam affectionē quæ adhuc generatur habent. Eodem modo etiā rauca uox fit ob easdem causas, & amplius ob frigidi aëris inspirationē. Affectio itaq; interceptæ ac raucoſæ uocis eiusdem generis est. Magnitudine tamen differunt inter se hæc mala. Quum enim uocis organa ab humiditate uehementius & ut aggre solui possit, fuerint madefacta, uox intercipitur, quando uero moderatius sunt humecta, raucoſo oboritur. Organa uocis quā dico, arteriā accipite, & eius summū, ac fauces. Qui igitur ex uehementi clamore uocē amplius oblatam habēt, his similis quædā affectio cōtingit ei quæ manibus, & cruribus, & lumbis, & spina, & musculis ubi plurimū laborem pertulerint, accidit. Vocāt autē aliqui exercitiōrū magistri eiusmodi affectionē musculorū, in quibus cōsistit, lassitudinem inflāmatam. Itaq; iuxta arteriā intrinseca pellicula, aut tunica, aut quomodoq; quis nominare uelit, à spiritu in magnis uociferationibus extra prolatio pculsa, in affectionē inflāmatā deuenit; atq; hoc multo magis si ad magnitudinē uocis, acumen quoddā acceſſerit. Iuxta arteriæ uero summū ultra hanc plagam, etiā musculorū ipsum mouentiū actio offensa, maiorem affectionē efficit. Porro

curationis ipsarum genus, in omni particula secundum materias euariat. Etenim crura, & manus, & spinam, per olei confricare facile licet, quū per cutem in adiacentes ipsi musculos, uis ipsius olei penetrare possit. Iuxta asperā uero arteriam cartilagine post cutē sita, prohibent in subiectā pelliculam transitū facultatis emollientiū ungentorū. Quemadmodū enim oleum, sic etiam alia multa cōposita pharmaca eandem utilitatē præbent. Quin & ea quæ in principio Acopa tantum appellata sunt, hoc est lassitudines emēdantia, paulatim appellationē suam à seipsis extenderunt ad similia cōpage medicamēta, etiam si gratia uehementer calfaciendī assumantur. Cæterum cōmunis materia auxiliorū ad uocis organa, præter reliqua, est quæ ex balneis cōtingit. Manifestū est autem quod dulcium aquarū dico. Marina enim balnea, & sulphurentia, & aluminosa, & atramentū turtorium olentia, ac bituminosa, propterea quod fortiter resiccāt, inepta sunt. Et sanē ita faciunt phonsci, qui magno uocis exercitio utuntur, quū contendendo, oblaeserint uocē. Sunt autem hi citharedi, & præcones, & tragœdiæ ac comœdiarum personati repræsentantes; balneis enim multis utuntur, & cibos lenes ac laxantes edunt. Si uero etiam aspretudinē percipiant, cibos qui infarcuntur paritulis quas contingūt assumunt. Vna enim est tunica sibi ipsi coherens & continua, quæ summo gulæ, summo asperæ arteriæ, gulæ etiam, atq; ipsi asperæ arteriæ, intrinsecus prætenditur. Quod si ex uictu ac balneis oborta affectio non sedetur in organis uocis, ad arteriā transcūt, per totū hoc tempus cibis utentes qui ex lacte, amylo, alica, ouis, & dulciarijs libis componuntur. Si uero per hæc nō curētur, inuēta sunt à Medicis pharmaca sub lingua tenenda, inde etiā hypoglottides appellata. Sunt autē ea eiusdē cum arteriæ inflammationē arcētibus facultatis, ex uino Theriaco & gūmi, ac tragacanthā, & glycyrrhiza cōposita, quæ ut dixi, leuigant simulq; reprimūt asperitates, quicquid uero reliqui est in partibus inflammationis, hoc concoquūt & cito persanāt. Industriū porro esse oportet qui pharmacū linguæ subdit, quo eo paulatim liquefcēte, asperæ arteriæ summū id quod in ipsum defluit suscipiat, renitendo obonienti tussī. Obluctantes enim ut ne tussiant, permittent quippiā ex pharmaco in arteriæ summū ipsamq; adeo arteriā demanare. At uero sic curatos claram uocē habere impossibile est, citra usum pharmacorū absq; acrimonia extergentiū, quale est faba fresa elixa, & ptyfana, & semē lini torrefactū; huiusmodi enim mediū obtinent, inter ea quæ mordaci facultate prædita sunt, & ea quæ meatus obducunt pharmaca. Cæterū his omnibus uina mollia, & passum crētīcū, & theriā, ac scybelites apta sunt, & ad hæc haud scio quomodo neglectū, id quod à Græcis in nostra Asia hepsēma appellatur, Latini sapam dicūt. Verū Atticissantes ipsum Siracū uocant, quēadmodum alij caricarū decoctum Siracū appellandū censent, pugnantq; inter se utrum ipsorū Siracū uocare oporteat. Est sanē & hoc ipsum Siracū, quod pinguibus caricis in aqua decoctis sit, mediæ facultatis, quā lenem & citra acrimoniā extergentem appellauimus. Mustū quidem igitur coctum, hoc est sapā ipsā, lenissimum pharmacū est & maxime meatus oblinens. Caricarū autem decoctum magis discutit & extergit. Quemadmodū igitur in præcedentibus dixi, Omnium simplicium medicamentorū uires exquisitè nosse oportet eum qui cōpositum quoddā sit facturus, atq; hic ipse etiam ab alijs cōpositis recte utetur, & maxime ubi indiscriminatim fuerint cōscripta, quemadmodū plures arteriæ habentur. Passum est etiam quod hic ipse his quæ cum discrimine prodita sunt rectius utetur. Etenim iuxta exactā rationē, in quantū apparatus affectionū transmutatur, tantum etiā cōmodum ipsi pharmacū permutare oportet. Hæc ipsum uero solus is qui singulorū simplicium pharmacorū uim nouit, exacte præstabit, ad primum phar-

macum parū quiddam ex sequenti ordine apponendo. Velut exempli gratia. In lassitudinibus tenuis, quū in summi ipsius asperæ arteriæ musculis sunt, in principio lentissima edulia cōueniunt, pharmaca uero meatūs obducuntia. Cōsistere autē inflāmatione parū quid extergentiū addendū est. Deinde consequenter amplius. Deinde rursus aliud illo præstatius, quo paulatim cōpositio ad meridiū extērioriū perueniat, & rursus secundū eundē modū ab hoc magis discusso, rursus ac extērioriū, ita progressu ad uehementissimū factū, ubi diutius uelut in scirrhum indurata affectio in uocis organīs persistit. Primi itaq; ordinis est tragacantha, & gūmi, & samius alter, amyliūq; & ex alica ac trago probe coctis sorbitio, Quin & lac aprū est, & dulciarij panes, & oua sorbilia, ac nuces pinæ, quas nūc omnes Græci strobilos uocant: quondā autem apud Atticos Coni uocabantur. Sefama etiam ex hoc genere sunt. Ab his autē deinceps est butyrū, quod etiam butyros masculino genere Græcis appellatur, & decoctū radicis dulcis ad crassitudinem Attici mellis liquidi redactū. Atqui radicē dulcē quam glycyrrhizām uocant, præstat in primo tēpore in aqua, uelut dixi, coctam, ad siccū siue sapā ex multo paratā ammiscere, ad passum uero Creticū idem decoctum misceri potest: siue autē cum sapa, siue cum passo Cretico fuerit permixtū, rursus post mixturam decoquendū est. Hæc igitur in affectionibus inflāmatis iuxta arteriā eiusq; summum, commoda in principio sunt, donec inflāmatio moderata fiat, & præ omnibus à uini potu hoc tempore abstinendū. Quum uero moderatior facta est inflāmatio, Vinū dulce Theræum aut scybelites bibere licet, aut ex nostra Asa caryinū, & deinde Therinū appellatum, deinde etiam dulce Tmolites. eo tempore etiam butyrū aprum est, & sorbitio ex amygdalis, sorbitio item ex lacte & melle diutius coctis, amylo iniectio, & si amylium non adsit, siligine Romanis appellata iniecta. Manifestū est autē quod per huiusmodi uictū, inflāmatio tum pellicularū, tum musculorum, circa arteriā eiusq; summum sedatur. Relinquitur autem humiditas multa, ob quam impossibile est clarā uocē proferri. Quare transire tunc cōuenit ab his edulij, ad omnia ex melle cocta, & ad sabam frescam elixatā, & pisanam, ac brassicā, & porrum probe coctum. Pharmacorū porro usus idoneus est, quo tempore aut inflāmatio, aut aspretudo præualeant, eorum quæ sub lingua detinētur, de quorū cōpositione dicam. post hæc magis extērioria & resiccantia damus, et deinde rursus his ipsis magis extērioria, & adhuc magis resiccantia, usq; quo ad ea quæ aliquid acredinis habent perueniamus, ita ut etiā in his à moderatioribus initio factū, ad uehementiora paulatim trāscamus. Itaq; qualem formam esse cōueniat uictus, antea dictū est, quemadmodū etiam simplicium pharmacorū species est relata. Cæterum cōposita ex ipsis pharmaca multiformiter alij iuxta aliam symmetriā & cōmensurationem cōscripserūt. Et quibusdam sanē ex tribus aut quatuor simplicibus compositum pharmacum sufficit. Quidā uero in maiorem numerū extenderūt. Et quidā uelut dictū est, ex mollissimā & lenissimā materia, arteriācas confectiōes composuerunt. Alij uice uersā ex acri, calida, extergente, ac multū resiccante. Sunt & qui tertium genus mediū inter ambo ista fecerunt. Post hos uero, alij mediū generis inter mediū & mollissimum, alij mediū generis inter medium & acriū, & iuxta eandem rursus rationē, quidam magis, quidā minus, à medijs facultate pharmacis digressi, diuerfas compositiones fecerūt, quibus omnibus solus is recte utetur, qui singulorum simplicium pharmacorū uires nouit. Ipse enim sciet & ordinem pharmaci, & quanta distantia sit à medijs digressum. Porro eiusmodi pharmaca scripserunt etiam qui ante Mantian & Heraclidem uixerunt. Verum multo præstantiora à prædictis uiris tradita sunt, per libros quos nobis reliquerunt, & in quibus

medicamentariam artis partem auxerunt, partim ipsi componentes, partim ab alijs cōposita transcribentes. Progressu uero temporis tum hæc, tum etiā priora, exacta & longa experientia cognita, à uiris electa et coacervata sunt, quorum iam sæpe in hoc opere mentionem fecimus. Sunt autē hi: Asclepiades, Musa, Andromachus, Heras, Crito, & Menecrates. Quin & multa alia pharmaca Archigenes & Philippus scripserunt, ut nullo ex ueteribus opus habeamus. Hij enim omnia ab antiquioribus inuenta optime uelut dixi, tradiderunt.

De Arteriācis ab Andromacho descriptis.

Cap. II

Purimas arteriacas confectiones scripsit Andromachus, ut promptū sit à debilissimis ad fortissima paulatim per media transitu factū progredi, si quis ipsorū differentia nouit. Ipse enim Andromachus indiscriminatus ipsas prodidit. Verū ego discrimina apponā, in memoriam reuocatis his quæ paulo ante dixi. Quod enim circa simpliciū pharmacorū tractatū præexercitātū esse oporteat eum qui dicenda assequi uelit, sæpe à me dictum est. Citra enim singulorū simpliciū exactam ac certam cognitionē, impossibile est cognoscere ex quo ordine eiusdē generis medicamentorū cōpositum sit. Num ex mollissimo, an uehementissimo, aut medio, aut alio aliquo inter hunc & alios intermedio.

Prīmā itaq; arteriācā confectionē, non longe à principio libri, in quo affectionū corporis internarū curationem tradit, hoc modo in hæc uerba scripsit. Arteriāca qua uxor. Thuris drach. i. alij. iiii. myrrhæ drach. l. alij iiii. croci drach. i. alij iiii. scyllæ drach. ii. passi cretici sextar. iiii. Scylla in passo coquitur donec passum spisset, deinde scylla abiecta, reliqua insperguntur. Hoc pharmacū si scyllam nō reciperet, inter exacte mollissima numerandū esse, uis potest in tres passi cretici sextarios, paucissimo thure, ac myrrha, et croco cōiectis, ut partū absit quo minus totū passum creticū existat. Manifestū est autē quod pharmacum hoc, electione hoc est delingibile efficitur. Vocāt autē huiusmodi etiā Attici eclectas, hoc est, delingibiles cōfectiones.

Cōsequenter ad præscriptā alteram addidit Andromachus hoc modo. Arteriace diacodyon ex capitibus papaueris. Capita papaueris uiridia mille & ducenta, mellis Attici lib. iiii. croci ciliij drach. v. alij x. succi hypocisthidis drach. x. acaciæ drach. x. aquā pluuiā ad capita papaueris. Aqua quidē pluuiā additur, quo minus putredini obnoxium sit pharmacū, habet autē & adstringens quippiā in se hæc aqua. Scopus est prædictio pharmaco cōcoquere affectionē circa arteriam, quod sanē cōtinget per somnū, & cōcoctoria, cum adstringēdi ui nō adeo multa. Cæterū simplex pharmacum ex papaueris capitibus, sola capita habet in aquā coniecta, atq; ubi flaccida reddita fuerint, ipsa quidē proijcimus, aquā uero ipsorū ad solum mel Atticū amiscemus, usq; ad cōpagem delingibilis pharmaci facta coctura, quomodo sanē ego apparare cōsueui. Quantā autē copiā aquæ itēq; mellis miscere oportet, in huiusmodi pharmacorū preparatione, in sequentibus dicā eo loco, quo talia uerba scripturus sum, Cōfectio ex capitibus papaueris.

Tertiam deinceps confectionem Arteriācā Andromachus hanc prodidit. Arteriace qua uxor, Blasti ad tabescentes ualde bona. Nardi celnicæ drach. iiii. amomi drach. vii. cinamomi drach. x. malabathri drach. iiii. nardi indicij drach. iii. floris funci rotundi odorati drach. ii. castiæ drach. v. iiii. thuris drach. iiii. myrrhæ drach. l. costi drach. iiii. scis ungētī malabathri drach. vi. succi glycyrrhiæ drach. iiii. succi mādragoræ drach. v. mastiches chiæ drach. iiii. croci drach. vi. Palmulas in uino mullo aut protropo coquito: deinde in ipsum decoctū nuces pīneas x. x. cōijcito ac terito. Postea ex pharmaco ad nucis ponticæ magnitudinē, aut paulo minus accipito, & ad aliquot dies cū hoc decocto untor, deinde etiā simplici pharmaco utaris. Postea autē ad duos uel tres dies hiera ex aloe uteris, cochlearij mēsurā ex aqua in diem

in diem data. Vtere pharmaco etiam cum lacte, in his qui arteria affecti sunt ad gargarisandum, & rursus factio interstitio, utere pharmaco sabæ Aegyptiæ magnitudine. Quæ uero fortis fuerit fluxio, opium & castoreum in antidotum miscemus; utriusque parum quid. In his autem qui stomacho male affecti sunt, ea ipsa uitamus. Manifestum igitur ex ipsis uerbis, quæ scripsit Andromachus, quod in fluxionibus partium thoracis, & pulmonis, ac arteriæ, præscripta cōfectio apte cōponitur. Dixit enim ipse; quæ fortis fuerit fluxio, opium & castoreum in antidotum miscemus utriusque modicam partem, resiccare nimirum fluxionem & sanam reddere uolentes. Varium autem est pharmacum, & ex multorum mixtura constans, ut ad omnes conueniat affectiones, quæ etiã diuturnæ & malignæ existunt ac ægre curabiles, etiam si ulcus sit circa arteriam aut eius summam extremitatem, Laringem Græcis dictam, & multo magis si iuxta pulmonem. Talia enim fortibus adeo opus habet pharmacis, quo ad longius tempus sufficere queant tabidam affectionem habentes. Quæ enim obdigerit eis regio sicca, & in cōueniens uictus ac pharmacorum usu perseverarint, ipsi diutissime renitent cōsuetas actiones moderate obeuntes. Hanc igitur cōfectionem non censuerim ammiscendam esse his quæ priuatim Arteriæ appellatur.

III. deinceps cōfectionem Andromachus sic scripsit. Altera eiusdem. Blasti ut dicitur, de quo circa præcedentem arteriacam scriptum est, Arteriaca Blasti quæ uxor, cōpositionem autem eius talē facit. Aloes sextantem, croci unc. i. mastiche unc. i. Pala est hoc pharmacum ex eorum numero esse, quæ priuatim stercorū eductiua appellantur, una cum hoc quod cōcoctorium quiddam habet crocus. At uero quæ cōcoctiorum dico, intelligere oportet eius affectionis cuius gratia exhibetur. V. ex ordine cōpositionem Andromachus talē prodidit. Cōfectio sedans dolorem eiusdem. Opii quadrantem, croci unc. i. myrrhæ sextantem, acaciæ uncie dimidiis, succi radices drach. iiii. Excipe melle. Hæc Andromachus. Verum ego non audeo recipio eiusmodi cōpositionem pharmacorum, ubi non ostenditur affectio, in qua ea sit uendū. Scimus etenim cōponendi sedantia dolorum scopum, quæ somnum uidelicet inducere uoluerimus, & uehementem dolorem stupefacere. Acaciæ autem mixtura uelut ad ulcus est, quemadmodum radice dulcis succus ad lenienda exasperata. Crocum autem & myrrham in cōpositiones dolorem leuantes miscere plurimis placuit. Videntur enim ipsis omnes affectiones sufficienter cōcoquere posse. VI. cōsequenter cōfectionem Andromachus hoc modo scripsit. Arteriæ eiusdem. Thuris unc. i. succi radice dulcis unc. i. myrrhæ drach. iiii. tragacanthæ drach. vi. nardi drach. i. amomi drach. iiii. croci drach. iiii. mellis Attici quod satis est. Non obscurum est etiam hanc ad respirationis organorum affectiones cōpositam esse, ex cōcoctioribus, mitigatoribus, adstringentibus & extergentibus. Myrrha enim & thus, & crocus, affectiones cōcoquunt. Radice dulcis succus exasperata mitigat, idem etiam tragacantha facit. Amomum fortiter resiccat cum modica adstringendi facultate. Mel autem calfactorium & extensorium uim habet. VII. post relatas cōpositiones Andromachus scripsit ex multis ualde medicamentis constantem, quæ omnes ferme facultates habent. Nam & adstringentia, & mordentia, & attenuantia, & mitigantia, & leuigantia, in ea continentur. Quin & soporifera uis & discussoria ac extensoria in ipsa habentur, in quibus omnibus multifariam mixtis facultatibus communis ratio est, quemadmodum etiam antea dixi, quod uidelicet quispiam ex omnibus pharmacum quoddam cōponere uoluit, spe faciendi unum medicamentum ad omnes eiusdem generis affectiones commodum. Verum ex ipsis aliqua quidē per experientiam cognita sunt maligna, & propterea relictā. Aliqua uero feliciter pro ipsius cōponētis cōiectura, efficaciam euaserunt, & ob id receperat. Quin & preparandi ipsam modum Andromachus adscripsit, quanquam hoc facere alias non soleat. Quod uero ex pharmacis cōposita sit eas quas dixi facultates

rates cōplectentibus, prestat meminisse eos qui hos libros in manus sument: si tamē non promptam habeat memoriā, eo sanē tempore quo huiusmodi phar-
maca discunt, sextum & septimum ac octauū de simplicium pharmacorū facul-
tate librū legant: in illis enim omnem pharmacorū materiā cōscripsi, quā radi-
ces & folia, & flores, & semina, & fructus, & liquores, & succi, omnium ex terra
nascentiū plantarū existunt. His itaq; præmissis, iam animū ad ea quæ Andro-
machus de hoc medicamento scripsit aduerte. Arteriaca quæ utor. Radices
filicis crassissimę lauātur donec purissimæ fiant, & omne terreū deponāt, deinde
per diem unū perfrigerantur, & in frusta magnitudinis trium digitorū secta con-
quassantur, atq; ex eis libræ x. in ollam nouam picatā aquæ dulcis sextarios x.
complectentem iniiciuntur, & ad dimidias, hoc est ut sextarij v. reliqui fiant, co-
quuntur, exprimuntur: & liquor quidē in duplū uas diffunditur, & aromata cras-
sa ac integris partibus adduntur, Nardi indicæ drach. iiii. cinamomi drach. vi. ras-
dicis dulcis drach. vi. cassiæ drach. iiii. Rhei pontici drach. iiii. balaustij drach. vi.
rosarum siccatū drach. iiii. alij, vi. Hæc similiter ad dimidias coquuntur, ac expri-
muntur, & ad decoctū mellis Attici sextarius unus additur: sit autem mel præco-
ctum & in duplici uase priuatim spissatū usq; quo manus non inquinēt, adijciun-
tur & terebinthinę pellucidæ drach. iiii. galbani drach. ii. croci drachmæ v. succi
hyoscyami drach. i. succi hypocisthidis drach. i. mād. dragoræ succi oboli iiii. piper-
is albi drach. viii. viii. deinceps confectionem scripsit, summa facultatis
ipsius indicata, quod ipsum in omnibus fecisse oportuit. Habet autē sic. Arteriacę
laudatæ Mithridatis, ad thoracis collectiones, subpurgat & leuigat. Irionis tor-
refacti drach. i. in quibusdā exemplaribus sabæ fræsæ scriptū est. Sunt autē ambo
exterforiæ potētix, seminis lini tosti drach. xx. & hoc exterforiā uim habet, nuc-
cis pineæ drach. viii. hæc leuigandī uim habēt. Vuæ passæ exacinatæ drach. iiii.
& hæc ob id quod modice subadstringat, simulq; cōmodus corpori cibus sit, me-
rito ammixta est. habet autē & passī facultatē, qualē in quarto de simplicij phar-
macorū uiribus indicauimus. croci obol. ii. Minimū quid ex croco coniecit qui
pharmacū cōposuit, ut prope nihil sit aliorū proportione. Diximus de croco eū
cōcoquendi uim habere, unā cum adstrictione. Dictum est etiā quod adstrictio,
corpora cogit, cōstringit & corroborat. Adieci autē etiā mellis heminas iiii. l. uir-
no dulci, ac sapā digressus. Vult enim hoc modo præparatum pharmacū uelut
præfatus est, in pectore harētes collectiones depurgare. Cæterum in huiusmodi
pharmacis ea quæ crassos succos habēt, impediūt repurgatiōē. His ammiscuit
tragacanthæ drach. iiii. quod pharmacū leuigat exasperata: prædictū est autem
quod uult hoc propositū medicamentū repurgare, & leuigare ea quæ iuxta tho-
racem harēt. Scopus enim huiusmodi est, attenuare & abstergere, ac ad educiō-
nem superne aptas facere collectiones in thorace. Verum sedandī doloris gra-
tia, & ne nimium extergantur ac emungantur partes exasperatæ, leuigantia ap-
ponuntur. Maximū hoc est, atq; ipsius per omnia meminisse oportet, Nimirum
quod sæpe unus scopus sit, in quē pharmacū cōponitur. Ne uero hoc ipsum ali-
quo modo offendat, utraq; miscentur primū utilitatē scopū habētia. Nonam
arteriacen post has Andromachus his uerbis tradidit. Arteriacę Marini. Cro-
ci unc. i. gūmi sextarij. tragacanthæ unc. i. mellis Attici sextariū i. Coquito donec
quum diffunditur nō inquinēt. Hoc pharmacū mediū est facultate, efficitq; exac-
te mitigatoriū ac dolorem sedans, si non crocum haberet, neq; mellis sextariū, sed
pro ipso Theraci uinum Creticum, aut sapam ex multo cocto factam, quam nos
Asiani, ut dixi, hepsēma appellamus. Verū hoc loco importune interrelata for-
tā pharmaca locatum est, utpote quæ suppuratis & tabescentibus conueniunt.

Decimam consequenter recenset, quæ inter exacte lenissimam ac mediâ, qualem sanè esse dixi præcedentē, intermedia est. Ex gūmi igitur hanc, & passio cretico, ac aqua componit, melle etiā ammixto. & gummi quidem injicit bellem, passi sextariū unum. mellis lib. i. dissoluere cum aqua iubens ipsum gummi, copia eius non expressa. Itaq; ob gūmi, & passum, & aquam penitus nihil extersorium habet, ob mel uero, à lenissimo & leuigante est digressa. Scimus enim extersoriū esse mel. Coqui autē super prunas oportere ipsum dixit, hoc est ad mollem & nō fumantē ignē. Melius uero fecisset si etiā ad alias omnes hoc adscripsisset. Ego itaq; sic ipsum præparo, & neq; ad prunas adhuc ardentes cocturâ facio, ne uidelicet inde quid acre & fumosum sublarū, acrimoniam non necessariâ medicamento ipsi affricet. Mellis equidem acredinem toleramus, quanquā ea nō sit uehemens, propter aliā ipsius utilitatē. Verū sumi nulla est utilitas. Quare fugiendus est fumus in quantum possibile est, circa omniū huiusmodi pharmacorum præparationē. Præstat autē & in his quæ meatus obducūt, lignis fumū nō edētibus quæ.

XI. confectiōē sic prodidit. Arteriaca alia bona. Cinamomi, thuris utriusq; unc. i. succi radicis dulcis une. i. myrrhæ drach. iiii. tragacanthæ drach. vi. nardi indicæ drach. iiii. amomi drach. iiii. croci drach. i. melle Attico excipe. Recte dixit bonā hanc Arteriaceū esse, uerū deest sermō, ad quas affectiōes bona sit. Dicitur enim in principio est & per uociferationē, & per distillationē ladi atteritā, ampliusq; propter ulcus & inflammationē obduratā. Hæc autē cōfectio quā nūc Andromachus descripsit, etiā ad tabidos aprium pharmacum est, & simpliciter omnes inueteratas thoracis ac pulmonis affectiōes. Cinamomi etenim natura tenuium partiū & resiccatoria, etiā induratas affectiōes sanare potest. Ab eo proximū locum amomi facultas habet, simulq; adstringens quippiā habet. Verum ob horū actionem uehemētem rationabiliter ammixta sunt, thus & radicis dulcis succus & tragacantha, pharmaca exasperata lenire à natura apta. De croco & myrrhā sepe diximus, esse uidelicet cōcoctoria & modice resiccatoria huiusmodi affectiōnū.

XII. arteriacā Andromachus hoc modo scripsit. Alia ex libris Galli ad arteriā affectū, ulcera pulmonis, puris & sanguinis refectiones, & fluxiones in thoracē, & ad ea quæ aegre educi possunt, uehementer efficac. Resinæ terebinthine drach. iiii. croci cilicij drach. iiii. thuris drach. iiii. myrrhæ troglodyticæ drach. iiii. cinamomi drach. iiii. amomi drach. iiii. nucis pineæ drach. iiii. radicis dulcis electa medulla drach. iiii. nardi Syriacæ drach. ii. & dimidiā, cassiæ nigre drach. ii. tragacanthæ drach. iii. palmularū Syriacarū carnis drach. iiii. asteris Samij drach. iiii. galbani puri obol. iiii. costi drach. iiii. alij drach. i. mellis Attici heminas iiii. Mel & resina in duplo uase coquuntur, atq; ubi spissari cœperint galbanū miscetur, donec nō inquinent. Deinde refrigeratis reliqua trita amisce, & sic utere. Recte fecit in hoc pharmaco, tum quod ad quas affectiōes cōueniat, tum quod quomodo præparare ipsum oporteat, adscripsit. Ratio autē cōpositionis ex superioribus constat.

XIII. arteriacen Andromachus his uerbis prædidit. Arteriaca Galli, eadē etiā antidotus est ad eadē efficac. Nardi Syriacæ drachmas iiii. myrrhæ drach. iiii. croci drach. iiii. costi drachmas iiii. alij drach. unam. piperis albi grana xxx. radicis dulcis drachmam unam, nucs pineas centum, styracis drach. i. tragacanthæ drach. i. cinamomi drach. unam, amomi drach. i. thuris drach. i. obol. iiii. cassiæ fistulæ drach. i. balaustij drach. iiii. obolos iiii. mellis Attici aut passi cretici heminas duas. Passum in duplo uasculo coquitur ad spissitudinē mellis, atq; ita ad arida trita affunditur. Tragacantha autē & styrax per diē antea in sufficiēte protropo macerantur, & ita ad reliqua ammiscentur. Reponit pyxide argentea aut uiurea. Recte fecit & hic quod tum ea quæ

promittit hoc pharmacū, tum quomodo preparatur adscripsit. Ego uero propterea omnes ab ipso descriptas Arteriācas apposui, ne quis alium scriptorē requirere cogatur. Omne enim facultatum genus in ipsis cōtinetur, mollitū, fortitū, ac mediorum.

XIII. Arteriāca eius est de qua sic prodit. Arteriāca ex uerbis mentibus, Moschionis. Est eius facultas non modice medias transgressa ad fortissima. Habet uim secādi & attenuandi ac calfaciendi ex multis pharmacis, quibus etiam lenia quaedā ammixta sunt ob eam quā dixi causam. Cōpositio eius hāc est. Rubricæ lemnig, thuris, myrrhæ, nardi, amomi, cassiæ rufæ, croci, tridias illyricæ, floris iunci odorati, singulorū drach. II. cinamomi drach. III. resinæ terebinthinæ drach. III. floris rosarū drach. III. opobalsami drach. II. mellis heminā unā, aut passi cretici heminæ dimidiū ampliusq; quartā eius partē. Liqueorem & resinam donec fulua reddantur coquito, deinde ab igne ablatis reliqua addito ac cōquassato. Datur in thoracis & arteriæ affectionibus fabæ græcæ magnitudinē, cum aqua quarta heminæ parte. Reliquis forma eclegmaris delingendum.

XV. Arteriācā sic scripsit. Arteriāce ad gutturis siue arteriæ aspretudinē, uocem interceptā, & sanguinē reiectantes, qua utor. Ex libris Apollonij & Alcimionis. Tragacathæ drach. VI. gummi drach. VI. thuris drach. I. obol. I. myrrhæ drach. I. obol. II. croci drach. I. obol. II. succi radicis dulcis drach. I. obol. III. autradicis sesquidrachmā, piperis albi grana XXV. palmularū pinguiū carnis drach. III. alij palmulas V. aut tres habent. Tragacanthā passo maceratā ac tritam, reliquis aridis tritis cōmitte, ex eisq; omnibus catapostā fabæ magnitudine effice, sub linguāq; tenenda exhibe. Huiusmodi cōfectiones hypoglottidas medici, ab eo quod sub linguā datur, appellant, iubentq; id quod à dissoluto pharmaco deriuat, sensim in asperæ arteriæ summū excipere, obnitēdo simul ne tussis excitef.

XVI. ex ordine sic scripta est. Arteriāce delingibilis ad omnes internas affectiones, maxime tabescētes, & suppuratos, ad hydropas incipientes, tussis ueteres. Datur per diē & noctē, cochlearij mēsurā. Succī scyllæ sextarios III. passi cretici sextarios III. uini falerni sextar. V. mellis Attici sextar. III. myrrhæ trientem, croci sextantē, thuris sextantē. Aristolochiæ dactylitidis minam unā & dimidiā, glycyrrhizæ minā unam, radicis eryngij sextantē, cassiæ unc. I. nardi celticæ unc. I. xylobalsami bessem. Aristolochiā, eryngiū, glycyrrhizā, xylobalsamū, cassiam, nardū, in crassas partes cōtusa in uini sextarijs V. macerato ad tridui, deinde ad lentū ignem ad tertias coquito, atq; ita exprimito, & retribuentis abiectis passum, mel, & scillæ succū cōmittito, & ad mellis crassitudinē coquito. Cum uero thus & myrrhā cum uino terito, atq; ubi optime habuerit pharmacū addito, & ubi modice fuerint liquata ab igne tollito, & repositus utor. Recte fecit & hic Andromachus quod quæ promittit, & quomodo præparef adscripsit.

XVII. Cōfectio talis ab eo traditur. Arteriāca alia ut Heraclides Tarētinus. Succī scillæ sextarios III. passi cretici sextarios III. mellis Attici heminam unam, croci trientem, alij sextantē. myrrhæ quadrātem, tragacanthæ unc. I. succi radicis dulcis sextantē, thuris unc. I. opobalsami sexuncē utere præparato. Iuxta hanc cōfectionem neq; quæ promittat, neq; quomodo præpareretur tradidit, tanquam iam ante sententiā ipsius legētes intelligere queant. Ex eo enim quod dicit. Alia Arteriāca, similia præscripta ipsam promittere, nōs intelligere cōuenit. præparationē aut ex antea relatis cōputare oportet.

XVIII. Cōfectio sic tradita est. Arteriāca ex libris Perigenis, ad omnes arteriæ affectus. Croci drach. I. uisq; passē exacnate drach. I. amygdalarū drach. VIII. myrrhæ obol. III. tragacathæ drach. III. piperis albi obol. III. mel coctū. V. uisq; passa torref, amygdalæ excorticantur. Tragacathā in aqua maceratur per diē unā, & teritur, ac reliquis ammiscetur.

Et hic

Et hic recte ab eo factum est quod tum promissionem, tum compositionem eius adiecit. Ceterum medice facultatis pharmacum existit, quare ad omnes affectus ipsum commodum esse ait. Est enim mediorum pharmacorum natura talis, unde etiam ipsis medijs affectionibus proprie & primario convenit; his vero qui mollibus aut fortibus opus habent, neque emolumentum neque detrimentum magnū affert. Ultimam omnium Arteriacam hoc modo descripsit. Vini mulsi veteris sextarios III. ad unum decoquito, deinde nucum pinearum tostatarum heminam a dijecto, piperis albi sextantem, ac untor. Esset sane hoc pharmacum ex mollissimis, si non piper accessisset. Hoc vero addito, ad mediam facultatem pervenit: quapropter etiam eiusdem generis cum prescripto esse ratus subscripsit.

Arteriace à Critone conscripte quatuor numero.

EX arteriacis à Critone conscriptis quatuor produxisse suffecerit. De prima scribit in hæc verba. Ad vocem interceptam ob contentionem. Ficum & eryngii probe coquito, & ad decoctum gummi misceto, ut melle durior confectio fiat. Dato ad noctem. Facit & ammoniacum. Ob id sane pharmaci huius mentionem feci, quod in principio apta est hæc prescripta confectio si per eryngium præparetur. Ammoniaci autem inueteratis commodum: forte enim pharmacum existit, non recte igitur Crito fecit, quod cum moderato fortissimum pharmacum indiscriminatum tradidit. Si enim duro pro moderato permutatis vicibus uteris, non solum nihil iuueris, sed etiam lædes hominem. Alteram arteriacam scripsit Crito mediam facultate, concoctioriam & lenem his verbis. Alia faciens maxime ad phonascos, & asperam arteriam, & tussis irritationes, dolorem aurium, ulcera in auribus, ac pudendo. Concoquit etiam destillationes. Thuris obol. III. myrrhæ drach. II. passi cyathos III. passum ad mellis spissitudinē decoquito. Deinde myrrham & thus trita cum passo semicocto ablato adiecto. Facit etiam ad dysentericos, coeliacos. Quidam croci etiam drachmam addunt, & sic aurbus comoda atque oculis inflammatis. Hæc Crito perspicue & probe scripsit. Neque opus est me eiusmodi pharmacorum expositionē apponere, ut qui sæpe iam de his dixerim. Porro alias duas prædictæ quidē similes, verū moderatiori facultate & simplicissimas sic scripsit. Eclegma Faustianū appellatum. Vinifaleri sextarii I. mellisatici lib. I. In duplici vase coquito, rursus ramulo agitando.

Alterū pharmacum tale est. Eclegma ex uino scybelite quo utimur. Vini scybelitæ sextarium I. gummi quadrantem, mellis dodrantem. Coquito in duplici uasculo, gummi prius macerato ac dissoluto. Hoc solum loco apposuit, in duplici uasculo, hoc est diplomate, cocturā fieri debere. Rectissime autē fecerit, qui omnes arteriacas quæ mitigatoriæ, concoctioriam, & lenitoriā vim habere prædicantur, in duplo vase coxerit, quod Diploma Græcis uocatur, quomodo sanè unguentarii ungenta præparant, Nimirum calidam aquam in magnum quandam lebetem infundentes, ac postea uasculū quod pharmacū coquendū in se habet, imponentes, & sic præustas prunas, aut ligna fumum non edentia succedentes.

Confectio Diacodyon ex capitibus papaueris, iuxta veterū traditionem.

Quin & circa huius compositionē uerentibus indiscreta discordia fuit. Quidā enim ex ipsis ad capita papaueris CXX. aquæ sextarios XX. infundēdos censent, ut quælibet sextarii mensura, sex papaueris capita recipiat. Quidam uero in LXXX. sextarios octingēta papaueris capita iniiciunt, ut singuli sextarii capita X. accipiant. Quidam ita temperauerunt ut sextario uno VIII. capita tribuerentur. Quidam autem haud scio qua ratione, in aquæ sextarios tres capita papaueris LXXX. coniiciunt, alij capita CXX. in eosdem tres sextarios addunt. Verum mihi uidetur ualde pauca aqua esse, ad tantam copiam capitum.

Confectio ex capitibus papaueris, Andromachi.

Andromachus igitur, uelut supra in arteriacis præscriptum est, alteram ex ipsis præparans sic scripsit. Capita papaueris uiridia mille ducenta, deinde ad finem, Aquam pluuiam, non apponens aquæ quantitatem.

Confectio ex capitibus papaueris, Critonis.

Crito uero sic, Cōfectio ex capitibus papaueris simplex, Capita papaueris agrestis octingenta, aquæ sextarios LXXX. coquito ad tertias, atq; expressis addito mellis lib. X. Si uero uariā efficere uelis, adde croci, myrrhæ, succi hypocythidis, singulorū drach. XII. thuris drach. VI. acaciæ drach. XII. Recte uidetur mihi ad singulos sextarios capita X. conijcere: ita enim contingit, quum scribat ipse, capita octingenta in aquæ sextarios LXXX. indendos esse. Et ego sanè hoc modo præparo non apponens, neq; citocum, neq; myrrhā, neq; aliud quicquam. Optima est enim simplicissima.

Confectio ex capitibus papaueris, Heræ.

At uero Heras ad capita CXX. aquæ pluuiæ sextarios III. infundit, modicè omnino quantirarem, tamen in quibusdam exemplaribus, non numerus capitum papaueris CXX. scriptus sit, sed pondus totidem drachmarum. Adscribam autem totam ipsius dictionem sic habentē. Capita papaueris uiridia CXX. in uas coniecto, & affusis aquæ pluuiæ sextarijs tribus ad triduum madefecere sinistro, deinde ad tertias coquito, & ablata ab igne exprimito ac colato, ammixtoq; mellis sextario in duplici uase coqto, atq; ubi spissari cœperit, acaciæ rufæ drachi unam, succi hypocythidis drach. I. adiecto. Ceterum quum ipsa capita coxeris in aqua, croci drach. I. linicolo illigatam simul coqui permittito. Quidam etiam myrrhæ drach. I. addunt, ipsaq; cum modico passo terūt, atq; ita indunt ac simul coquūt, donec aliquantulum fuerit confectio inspissata. Quod si tamen nō mediamēnariā confectiōnem facere uelis, cum capitum decoctio ad tertias redacta, mel coques, reliquis non adiectis.

Confectio ex capitibus papaueris, Damocratis.

Hoc pharmacum primum à Themisone præparatum est, inquit Damocrates, in libro Damocratis Philiatrus, hoc est rerum medicarū studiosus, inscripto. Scimus autem ex uerbis eum constare. Aiunt Themisonē hoc pharmacum primum præparasse ad rufles humidas, dolorē arteriæ, & gulæ, specis fluxionū simpliciter omniū quæ circa thoracē consistunt, & ad uigilias, quarum sanè illæ existunt cause.

Papaueris quod nominant ipsi agricolæ

Agreste, nam spontaneum est, nec conferitur,

Capita utrentia & recenda, integra,

Semens rubens nondum nigrum gerenda,

Decem quater centumq; magnitudinis

Medicocis, in nouam ollulam atq; amplam indito,

Infunde tres pluuiæ de aqua sextarios,

Macerato in his totam diem noctem simul,

Dein coquito lento igne, ac diutiuscule, &

Omnem liquorem expressum in ollam excipito.

Et mellis Attici libras tres addito,

Rursusq; lenem ad flammulam decoquito.

Dum mellis haud fiat liquidū bona compages,

Mox frīgēfacta in utrūm uas condito.

Sic nos quidem, at Themison primus qui prodidit

Vsum, addidit myrrham, acaciã, & rubens crocum, &
 Hypocysthidis succum, ast ea obsoleta iam.
 Simplex enim parata commodissima est,
 Iocunda ualde, lenis atq; uiribus.
 Ex hac datur myrrhæ minuti quantitas.
 In noctem aliquando plus, minus rursus diem.
 Ut tempore pauco in ore quis hanc sic detineat.
 Iussus liquentem sensim ita post ut deuoret.
 Quod si uoles aluum morandi gratia, &
 Siliatur ut pulmonis & stomachi fluor,
 Eruptioq; sanguinis seprum supra:
 Facere, Eupatoricæ aut tu potius hinc Ponticæ
 Addes Rhois succi simul drachmas duas,
 Tantundem & Acaciæ bonæ, non ueteris, &
 Aufferre iam uolens ab igne pharmacum,
 Diluta passo ambo hæc simul confundito-
 Paulatim, adhuc feruentibus in ollula,
 Quo ferueant partim simul, mox uasculo
 Refrigerata indantur inde uitreo.

Confectio ex capitibus papaueris Sorani.

Sorani porro ita præparandam censeo. Capitū papaueris numero. CL. aque
 Sextarios. XX. in lebetem nouum cōiecta ad dimidias coquito, & reiectis ca-
 pitibus mellis sextarium unum addito, postea uero myrrhæ, croci, hypocysthidis
 & acaciæ succi singulorum drach. I. obolos. III. linteolo illigato, & in ollam siue
 lebetem suspendito, quo simul cum melle coquantur: postq; uero crassescere in-
 ceperit, fasciculum colligatum tollito, & in mortarium coniectum cum passi cya-
 this. III. terito, indeq; in lebetem coniectum, lente simul donec spissetur coquito.
 Verum mitior est cōfectio quæ ex solo melle & capitum papaueris cremore cō-
 stat. Efficacior autem redditur, si in fasciculum linteoli, pro adstringentibus, meli-
 lorum & radicem dulcem addideris.

Confectio ex papaueris capitibus, Galeni.

Cæterum uelut ego compono confectionem ex papaueris capitibus, ita ea
 cutendum censeo. Etenim quum de prædictis confectionibus expetimen-
 rum sumpserim, præstantior ea uisa est, in qua ad unum aquæ sextarium capita
 decem iniiciuntur, quemadmodum Criso scripsit, aut ad duos sextarios quinde-
 cim capita, uelut Sorani. In medio autem horum amborum terminorū est, ubi
 VIII. aut. IX. capita in unum sextarium conijciamus. Præmacerō autem ea nō ad
 triduum, uelut Heras, sed neq; statim ablatis coquo, sed si quidem humidiora &
 molliora fuerint, ad unum diem, Accipienda est autem in omnibus huiusmodi ser-
 monibus etiam nox, Quemadmodum etiam annum dierum CCCLXV. esse, sole-
 mus dicere. Si uero duriora & sicciora sint, etiam longiori tempore ipsa macero,
 præstat aut accipere nondum indurata. Manifestū uero quod etiam ualde mol-
 lia abiicienda sint. Sicciora enim modicum succum habēt, Humectiora uero cras-
 sum quidem sed crudum adhuc & aquosum ac debilem; quapropter ex humidis
 ac palustribus locis accepta fugienda sunt. At uero numerum quem dixi inijci
 oportere iuxta proportionem aquæ, de mediocribus intelligere oportet. Quum
 enim quedam maiora moderatis, quedam minora existant, Quedam uero in-
 ter hæc media, quemadmodum ut plurimum esse solent, ex his prædictum nume-
 rum ad sextarium conijcere oportet. Terminus autem cōcturæ sit non ut tertia,

aut quarta, aut aliqua talis pars aquæ fiat reliqua, uerum ubi primū in totū flaccida fuerint facta, Succum enim ipsorum exprimere uolumus, hoc uero sufficiens continget, ipsis flaccidis factis. Superuacuum igitur diutius coquere. Ceterū mellis dimidiā mensuram huic succo ammiscendā censeo, & coquendo simul ad lentum ignem ad compagem Attici mellis. Verum in aqua pluuiā quidam capitum cocturā fecerūt, ne uidelicet ipsa ad aliam putredinosā qualitatem transmutetur. Tibi uero etiam fontana sufficiet, pluuiā non præsente. Satis est & ipsam mundā esse, & omnis mixturæ exortem, ob quam rem ea quæ per plumbeos canales deriuatur fugiēda erit: limus enim quidā ex plumbo in ea continetur. Unde etiam quæ aquæ eiusmodi fecem combibunt, dysenterici euadunt.

De usu confectiōis ex papaueris capitibus.

VSus eius est in his qui somno opus habet, quibus etiā ex opio cōstantia sepe exhibere cogimur. Opus habet maxime huiusmodi pharmacis hi quibus tenuis fluxus à capite ad asperam arteriam destillat, nō permittens dormire, ob consequentē tussim. In talibus ego etiam ex sapa pharmaci cōfectionem parare soleo. Dictū autem à me antea est Sapa, Hepsēma à nobis appellari mustū coctum, quod etiam sirāum quidā Medici uocant, Sufficiens coctura eius ad huiusmodi est, ubi capita papaueris ad medietatem aquæ fuerint decocta, Quin & per passum, aut Therāum Creticū, melius est quā per mel cocturam fieri, ubi fluxus ualde tenuis extiterit. Scimus enim attenuantis facultatis mel esse, fugiendum igitur tunc, tenues enim fluxiones auget. Ammiscetur etiā huiusmodi pharmaco dum coquitur, radix dulcis quo simul coquatur. Vbi uero hæc non adsit, succus qui ex Creta asportatur. Si uero circa pulmonē cōsistat copia fluoris à capite delati, confectio ex melle melior est. Quemadmodum enim somno opus habentibus, ea quæ ex sapa cōstat, Sic reiectione per sputū indigentibus, ea quæ ex melle fit, cōmodior existit. Cōtra urgenti igitur renitendo, ubi somnum capere uult æger, aut quod ex melle constat, aut quod citra hoc apparatus est, pharmacum exhibebis: aliquando etiam ambobus permixtis, scopum habens ipsum ugens, circa mixturā, ex utro amplius consicere oporteat. Appello autem ugens, id quod maiori auxilio opus habet. Datur cōmoderata mensura, duorū cochleariorum satis magnorū copia, Augebis autem & minues hanc copiam, ad magnitudinem corporis cui exhibiturus es, respiciēs, item ad ætatem, & anni horam, ac regionem. In omnibus enim his, frigidioribus minimū dabis, calidioribus amplius. Quod uero etiam multitudinis ac qualitatis ipsius destillationis respectu, aut plus aut minus dabis, manifestum existit. Cōmune enim hoc in omnibus auxilijs est. Suffecerant equidem præscriptæ arteriæ, uerum apponere amplius mihi uisum etiam eas quæ Asclepiades in secundo interiorum scripsit. Aliquæ enim ex eis penitus eadem sunt. quædā præscriptis ualde uicinæ, ut & ex eo certitudo descriptionum confirmetur. Quin ultra hæc præparandi & utendi modus, diligentius ab ipso Asclepiade traditus est.

Arteriæ ab Asclepiade in 11. interiorum conscriptæ, Quæ Mnasoni inscribit. Antonij Musæ, ad uocem interceptam.

BRassicæ uiridis cauliculos depuratos manducandos præbe, & quod insitarpalearū exuccū est expuere iube, succū uero delingere. Alia, Brassicæ succū cum melle coctum delingendū exhibe, auxiliatur confestim. Alia, Succu eryngij in aqua coctū heminas duas excipito, & succu ficuum in aqua coctum tantundem, his adde gummi subtilissime dissoluti drach. VIII. coquito diligenter ad arteriæ spissitudinem, & inde cubitū iturus ad cyathi mensurā delingendum præbe. Alia arteriaca Charixenis. Facit ad sonum uocis fractum, destillationes

destillationes in arteriam, uocem interceptā & raucoſam, ad interceptiones uocis ex diſtentione. Croci drach. ii. ſucci cyrenaci drach. i. mellis Attici cyath. vi. Mel coquito, & ubi ſpiſſatum fuerit, reliquis ammiſcetō, ac utitor uelut dictū eſt pilulis inde formatis, quæ ſub lingua detineant. Alia Galbani drach. vi. piperis drach. i. niri drach. i. mellis Attici cyath. vi. Galbanū & mel coquito, & denſata reliquis unito, utitor ut dictū eſt. Alia ad exulceratam arteriam,

Charixenis. Facit phonaſcis ante & poſt certamen data. Facit ad oculorum dolores, forinſecus impoſita. Lana ex eā maſeſacta facit & ad internas affectiones delinſta. Gūmi, tragacanthæ utriuſq; drach. vi. thuris, myrrhæ, utriuſq; drach. i. obolos. iii. croci, hypocyſthidis ſucci, utriuſq; drach. i. paſſi ſcybelitæ aut Theri ſextarios vi. Gummi, tragacantham, myrrham, thus, unā cū hypocyſthidis ſucco maſeſato, aſſuſa ſplis paſſi portione, atq; ubi diſſoluta fuerint, diligenter terito, & ad paſſum miſcetō, aſſidueq; mouendo coquito. Crocum uero laneo panniculo inditum, & in ollam ſuſpenſum, unā cum pharmaco coquito, Deinde ex empiū paſſo diluſū ac tritum ad pharmacū conſeſito, & reſoſitis utitor. Alia

Succi radicis dulcis, tragacanthæ utriuſque drach. iii. croci, myrrhæ, utriuſque drach. i. thuris, ſpicæ nardi utriuſq; obolos. iii. protropi ſextarios. iii. Vtere.

Alia Lyſiæ ad eandem affectiones. Croci, myrrhæ, ſucci radicis dulcis, thuris, caſiæ, ſingulorū drach. i. piperis grana. xxiii. paſſi cretici ſextarios. iii. mellis Attici cyathos. vi. Vtere.

Alia Charixenis. Croci drach. iii. myrrhæ drach. i. paſſi cretici ſextarios. iii. Facit ad ſonum fractum, deſtillationes in arteriam, interceptam uocem,

tonſillas inflammatas. facit etiam ad phonaſcos ante & poſt certamen data. Iur uat perfrigeratos, facit ad recentem & ueterem tuſſim, ad ſpuentes ſanguinem, eundemq; ſurſum reſectantibus prodeſt. & coeliaci. Conducit item ad ſpiritus foetorem.

Alia hypogloſſis, ſub lingua tenenda. Facit ad arteriam exaſperatā, & uocē interceptā, ſicq; reliquas affectiones. Tragacanthæ, gūmi thebaici, utriuſq; drach. iii. myrrhæ, thuris non ſecti, utriuſq; drach. i. obol. iii. croci drach. i. ſucci glycyrrhizæ obol. iii. Phœnicobalanorū triū carnem, paſſi protropi aut Therai quod ſanis eſt hiſ excipiendis. Decoquatur ad craſſitudinem mellis, Da tur fabæ Aegyptiæ magnitudine ſub lingua tenenda, & diſſoluta tranſglutiēda.

Alia hypogloſſis Dioſcoridæ. Croci, myrrhæ, tragacanthæ, radicis dulcis ſucci, ſingulorū drach. i. nuceſ pincæ cōtuſas numero ſexaginta, amygdalas mūdatas topidē. Excipe melle coſto. Datur nucis pōticæ magnitudine ſub lingua tenēda.

Alia Scribonij Lari hypogloſſis. Facit ad uocem interceptam. glycyrrhizæ drach. viii. myrrhæ drach. xxiii. terebinthinæ drach. xxxii. tragacanthæ drach. xxxv. Arida ſingula per ſe tōdiro ac cribrato, Reſinā aut in pilā cōteſtā tōdiro, arida ad ſpſam inſpergendo, deinde ex unitis omnibus paſtillos for

mato, fabæ Aegyptiæ magnitudinis, quos in umbra ſiccato, atq; uſus tēpore unū aut duos ſub lingua tenendos dato, ac liqueſcentes deuorādos. Oportet aut hoc pharmacum conſeſtum in paſtillos cōformare. Quo tempore igitur paſtillos co

gis, eodem etiam tundes, Reſiccantur enim cito, & ob id paſtilos ex eo forman

tem ad manū ſimul tundere oportet. Alia aromatica Mithridatis. Facit ad

Arteriz affectiones, pulmonis ulcerationes, ſpuentes ſanguinē, tabeſcentes ſup

puratos, & peripneumonicos. Croci drach. ii. & dimidiā, myrrhæ, reſinæ tere

binthinæ utriuſq; drach. ii. thuris ſeſquidrachmam, nardi, cinamomi, caſſiæ, tra

gacanthæ, ſingulorum drach. i. mellis Attici heminam i. Mel & reſinā coquito,

ut tractilia ſiant ac fibroſa, & nō inquinent in frigidā aquam inſtillata, dein cum

aridis cōmittito, ac probe cōtundito, & reſoſito, Vtere nucis pōticæ magni

rudine sub lingua detēta. Aliā Mithridatis. Myrrhē, croci, utriusq; drach. iiii. nardi Indicæ, terebinthinæ utriusq; drach. ii. thuris, cassiæ, cinamomi singulorum drach. i. passi cretici heminas. iiii. Passum & terebinthinā ad perfectā compagem coquito, & cum siccis cōmittito. Inde q; ad nucis ponticæ magnitudinem sub lingua tenendū dato. Aliā ex filice Andromachī aromaticā. Prodest hæmoptoicis, pleuriticis, tabescentibus, splenicis, hepaticis, ictericis. Facit & ad affectiones circa uterū & uesciā. Radices filicis q̄ crassissime lauātur diligenter donec omne terreū ab eis decedat, deinde perfrigerantur ad diem unā, & ex ipsis libra x. in frustra digitalis magnitudinis secantur & cōquassant, ac in uas figulinū cōiiciuntur. Infunduntur deinde aquæ dulcis sextarij x. & ad ignē positæ coquuntur. Quā uero ad dimidias deuenierint per cocturā, eas collimus & in duplū uas ungentariū excolamus, & radices quidem expressas proſicimus. In aquam uero crasso modo cōtusa cōiicimus. balauſtij drach. vi. nardi Indicæ, rosarū siccarū utriusq; drach. iiii. cinamomi drach. iiii. glycyrrhizæ drach. vi. cassiæ drach. iiii. Rhei pontici drach. iiii. Deinde rursus ad ignem admota coquimus, & ubi ad dimidias peruenerint, rursus in aliud paruum uas ungentariū excolamus, & arida quidem expressa reſicimus, ad aquam uero mellis Attici heminas iiii. addimus, probeq; mixta & igni adhibita, rursus coquimus, & quā instillata in frigidā non inquinarint eam, his resinæ terebinthinæ drach. iii. galbani nō lignosi tantundē ammiscemus. Hæc uero liquefacta ad subscripta deplemus. Sunt autē hæc, croci, succi hyoscyami, succi mandragoræ, piperis albi, succi hypocythidis singulorum drach. i. omnia hæc tenuissime trita, & cū primo ſilicis succo unita habeto, ut strigētitiā & crassitudinem habeant. Postquam igitur inuicem permixta ac probe conquassata fuerint, in uitreum aut argenteum uas reponimus. Datur ex pharmaco cochleariū. maxime iuuat uocem interceptā.

Alia panacea Mithridatis, ad phanascos antē & post certamē Facit & ad glādularū inflammationes, laxatas columellas. Facit ad gingiuas humore pregnātes, & nomias in ore, & mōtos dentes. Prodest destillationibus, recēti ac ueteri tussi, hæmoptoicis, & sanguinē reſcētibus. Vt or pharmaco hoc quādoq; puro, quādoq; passo dissoluto, aut uino scybelite, & aqua calida. Etenim ad consillarū inflammationes dissoluto pharmaco utendū est. Ad affectiones uero in profundo, puro. Cōpositio sic habet. Capita papaueris agrestis, numero. cl. ſilicis lotę drach. iiii. symphyti depurgati, corticis mādragoræ, Rhei pontici, rosarū siccarū, tridis chaletdoniæ, glycyrrhizæ pōticæ, balauſtij, singulorū trītem, cinamomi, drach. ii. nardi celticæ sesquidrachmā, aquæ pluuiæ sextarios. xv. Prædicta in crassas partes conusa in uase duplici ungentario ad tridū macerantur, sequenti deinde die ad tertias coquuntur, & postea in quallum coniecta exprimimus ab ipsis in aliud uas ungentariū liquorē, & res decoctas abijcimus quidē, uerū de expresso liquore quantū sufficit accipientes, subscriptas res in ipso dissoluimus. Sunt autē hæc, gūmi, tragacanthæ albæ, utriusq; lib. i. myrrhæ, succi radicis dulcis, succi hypocythidis, singulorū sextantē. croci, mastiches utriusq; uncia i. Hæc dissoluta diligenter terimus, paulatim de expresso liquore adstillantes. Postea ad pharmaci cōfectionē uino scybelite, aut theriō, aut pramnio utimur. Sint autē eius sextarij xxxiii. Passum in uas fictile diffusum coquimus, atq; ubi mellis spissitudinē acceperit, ipsi dissoluta & trita pharmaca adiicimus, rursusq; coquimus ad cōpagem, & sublato in uas uitreū aut argenteū utimur, quādamodū dictū est antea.

Aliam ad destillationes, & omnes tussiculosas affectiones, Aſclepiades in primo internorū sic tradidit, Ad destillationes pharmacū quo usus est Comon philosophus, auxiliatur statim. Pyrethri, colici, utriusq; drach. ii. piperis albi drach. i.

quis & cribrata reponito. Vsu uero expetente, naribus admoüere, & pharmaci
 attrahere iubeto. Alia. Piperis albi drach. i. seminis urticæ tantundē, costi,
 myrrhæ, croci, singulorū obol. iiii. præparato ac utitur ut dictū est. Alia dor
 lorem sedans. Antonij Musæ. Facit ad destillationē, & uocem interceptā. Opij,
 myrrhæ, seminis hyoscyami, singulorū drach. ii. singula in cicuta decocto mace
 rato ac diligēter terito, & ex mixtis catapoda erui magnitudine formato, & duo
 ex ipsis ante somnū dato. Alia facit ad hæmopticos. Seminis hyoscyami
 albi drach. viii. nardi Indicæ drach. vi. croci drach. iiii. opij, amyli, anisi singulorū
 drach. ii. rubricæ lemnis drach. i. cū aqua catapoda erui magnitudine formato,
 ac utitur ut dictū est. Alia delingibilis, ad tussis extremas & inueteratas. Vi
 ni falerni sextariū. Mellis Artici lib. i. coquito assidue agitando cū ramulis rutæ,
 Dato inde mystrū. Facit & ad stomachicos. Alia Petini, ad ulcerationes &
 suppurationes in profundo. Vini muli ueteris sextar. i. axungie ueteris sextan
 tem, alij unc. i. Axungia probe cum uino mulso terito ac dissoluito, indeq; in uas
 sicile transferto, & ad prunas ramulis rutæ agitando coquito, & ubi densata fue
 rit, in uase uitreo reponito, ac mystrū delingendū ut prædictū est exhibeto.

Alia Origenis. Glycyrrhizæ ponticæ drach. ii. seminis urticæ costi, seminis li
 ni costi, utriusq; drach. i. myrrhæ, croci, utriusq; obol. i. mellis Artici aquæ, utrius
 que cyath. vi. Glycyrrhizæ aqua coquito, deinde expresso liquore, reliqua terito,
 & melle cocto excipito, ac delingenda præbeto. Alia. Aritosti drach. i.
 amij torrefacti, nucis pinearū tostari, Irionis costi, singulorum drach. i. excipe
 melle cocto. Alia placentula, hoc est. Coptarium ad tussitres. Seminis lini
 torrefacti, contusi, & cribrati. Vuae passæ pinguis citra actnos, utriusq; sextariū. i.
 nucis pinearum tostari, nucum ponticarū depurgatarū, utrarumq; heminā. i. p
 peris albi sextantiem. myrrhæ, croci, utriusq; unc. i. mellis Artici lib. iiii. cōsua
 ut oportet tritaq; reponito. Semē lini cū melle coquito. & densata reliquis addito,
 misceto ac cōtundito. Datur nucis ponticæ magnitudine. Alia. Facit & ad
 Thoracis affectiones. Farinæ fabacæ tenuissimæ tostæ heminā. i. tridis Illyri
 cæ quadrantē. nucum pinearū tostari sextantiē. pulegij aridi cōtusi sesquidrach
 mam. seminis urticæ drach. i. piperis unc. dimidiā. Mellis boni sextar. ii. farinam
 cum melle ad densitatē coquito. Seminis lini etiā tusti, costi, & cribrati heminā ii.
 in promptu habeto & adijcito. Alia ad tussim, & spiritus prolationē, ualde
 probe expurgans. Hyssopi, pulegij, utriusq; sextantiē. tridis, seminis sinapis, na
 sturtij, singulorū unc. i. anisi, piperis, utriusq; unc. i. tusa & cribrata melle cocto ex
 cipito. Datur cochlearij boni mēsurā. Si uero hyems sit, & accepturus nō febricit,
 piperis sextantiē, & pro aniso, foeniculum aut euminū, & pro nasturtio, sinapi du
 plum cōijcito. Catapotū ad tussim recentē. Panacea pharmaci dolorem le
 uans, inducēs somnū. facit ad hæmopticos. Styrcis drach. viii. opij, myrrhæ
 utriusq; drach. iiii. diluta passo in catapoda cogito, & erui magnitudinē cubiti
 eunibus dato. Alia exemplaria par pondus omniū habent. Aliud Platoni
 inscriptū, eueffigio auxiliatur. Styrcis, myrrhæ, opij, galbani, singulorum par
 pondus, passo diluta in catapoda redige. Aliud Basso inscriptū pharmaci
 accommodatum auxiliatur statim. Facit hæmoptois, sanguinē reijcientibus, sup
 puratis. Galbani, styrcis, tridis illyricæ, corticis pinus, singulorū drach. ii. enu
 he, opij, utriusque drach. i. Excipe melle cocto, & præbe ciceris magnitudine ex
 aquæ mussæ cyathis. iiii. Confectio ex matrubio Platonis. Myrrhæ, sty
 rcis, opij, succi matrubij, galbani, croci, æquales partes, præpara ac utere, melle
 exceptis cocto. Catapotium dolorem sedans, pharmaci accommoda
 tum ad inueteratas affectiones. Facit ad destillationem, dolorē capitis, ægre spō
 rantes, peripneumonicos, ad uellicæ & ueteri affectiones. Inscribitur panacea ac
 commodata

commodata, ab aliquibus Stichus myrrhæ, piperis, opij, styracis, castorij, galbani, æquas partes excipe passò, fac catapotta, & utere. Aliud pharmacum ualde bonum. Inscríbítur Harmonia, Facit ad destillationes, & inexuperabilem destillatum. Stryacis, castorij, piperis, cardamomi, singulorũ drach. iiii. opij, myrrhæ, seminis hyoscyami albi, singulorũ drach. iiii. Excipe passò, reduc in catapotta. Dato ciceris magnitudine ad somnũ.

Aliud. Croci, sulphuris uiui, myrrhæ, opij singulorũ drach. iiii. seminis hyoscyami albi, cardamomi, piperis albi singulorũ drach. viii. mellis cocti quincũcem, aut quod satis est. Vñs prædictus est. Datur cubiti cõtribus.

Cõfectio Proxeni, ad tussis inueteratas, & ualde dignas duras humectas affectiones, appellatur Symphonos Lexopyreos, id est, opimæ sedas febrẽ. Hac usus est Antonius Musa. Piperis albi, opij, cardamomi, singulorum drach. viii. croci, sulphuris uiui, myrrhæ, seminis hyoscyami albi, singulorum drach. iiii. mellis cocti sexuncẽ. Datur nucis ponticæ magnitudine cum aqua mulsæ cyathis tribus.

Cõfectiones ad tussim ab Andromacho libro ii. de cõfectionibus internis conscriptæ. Cap. l. iii.

Postquam multas ad tussim Andromachus scripsit cõfectiones, deinceps omnes soporẽ inducẽtes, et ob id soporíferas appellatas tradidit. Caterũ hæ omnes tenues fluxiones inspissare possunt, resicantes si mulq; refrigerantes, & propterea aliquæ nõ tantũ opij, sed & mãdragoræ succũ, aut radicis corticẽ, aut hyoscyami semen, aliq; etiã duo aut tria, aut etiã omnia huiusmodi habent. Quemadmodũ alia styracẽ, & crocũ. Rationabiliter autẽ his alijs partim calfacientia ammiscuerũt, partim cum modica adstringẽdi uia aromatica & resiccãtia, itemq; semina quædã familiaria. Velut anisi, foeniculi, apij dauci, fefelis, utpote quæ tum pharmacorũ iniucunditatẽ ac uim obtundũt, tum urinã etiam prolestant. Quædã uero etiã aspretudines leuigant, uelut sunt, tragacãtha, glycyrrhiza, & uina dulcia. At uero ex his, quæ minus de soporẽ inducẽtibus cõplectuntur, eas etiã tabescentibus præbent. Cõfectio ad tussim ex duobus piperis generibus. Cinamomi drach. i. succi papaueris drach. i. myrrhæ obol. iiii. piperis nigri obol. iiii. castorij obol. iiii. piperis albi obol. iiii. galbani obol. iiii. croci dimidium. Redigito in pastillos. Dato cum melle aut passò.

Alia ad tussim excellenter efficax. Eadem febres sedat. Seminis hyoscyami unc. dimidiã. Vñũ exẽplar unc. i. habet, cardamomi drach. i. succi papaueris unc. unã, myrrhæ, sulphuris uiui, croci, singulorum unc. dimidiã. piperis albi iuxta Heram sesquunciam. Mellis Artici quod satis est. Alia ad tussim siccam. Stryacis partem i. succi papaueris tantundem, croci partem dimidiã, contrahito simul & catapotta inde exhibeto. Cõfectio ad tussim qua utor, Sacri fœculi bona. Succo papaueris drachmas x. seminis lactucæ drach. xx. castorij drach. xv. alij xvi. rutæ hortensis aridæ drach. xiiii. croci drach. vii. alij unam etiam unam. Excipe melle. Datur pro uiribus ægyptiæ fabæ magnitudine, febrẽ entibus ex aqua, febre carentibus ex uino, ad noctem.

Catapottũ ad tussim quò utor. Stryacis, myrrhæ, opij, singulorũ drach. iiii. opobalsami, croci, utriusq; drach. ii. simul trita excipe, ac utere. Ad tussim siccam. Succo radicis dulcis drach. ii. styracis drach. i. opij, croci, myrrhæ singulorũ obolos. iiii. excipe passò aut aqua, & ad fabæ græcæ magnitudinem redigito ac unitor.

Potio quã utor ad phthisicos, Rhipall multis cõmoda appellatur Menodorios, & Ambrosia. Facit ad febres per circuitum repetentes. Nardi, croci, myrrhæ, costi, cassiæ, cinamomi, iunci rotundi odorati, piperis nigri & albi, castorij, galbani, terebinthi næ, styracis, succi papaueris, seminis hyoscyami, singulorum drach. i. tragacanthæ drach. vi. mellis quod satis est. Vini faletni heminã i. Tragacantham uino

(sufficienti

sufficienti macerato, & reliqua simul cum melle committito. Datur febrientibus sesquidrachma, ex aqua misa. Febre carentibus uncia dimidia, cum melle, & acetum cochleario i, & uini Falerni cyath. ii.

Apollonij confectio, facit ad multa praesentim ad tussis egregie. Cardamomi drach. xvij. myrrhae, drach. xii. hyoscyami drach. xii. opij drach. x. alij xii. seminis petroselin drachmas xii. croci drach. xv. maiorum mandragorae drach. x. zingiberis drach. viii. sulphuris uini drach. vi. lani drach. vi. thuris drach. vi. costi drach. vi. piperis albi drach. vi. melis Artici.

Alia ad internos abscessus, probe repurgas. Sagapeni drach. ii. myrrhae drach. ii. cardamomi drach. iii. alij drach. i. castorij drach. i. piperis albi obol. iii. opij drach. ii. cum aqua in pastillos formato duorum obolorum ponderis. Dantur cum aqua.

Isotheos ad tussim, ad tabem, ad omnes internas & per circuitum repentes affectiones. Nardi drach. ii. myrrhae drach. i. croci drach. i. & dimidia. costi drach. i. piperis albi drach. i. fectis opobalsami drach. ii. cinamomi drach. ii. succi mandragorae drach. ii. castorij drach. ii. seminis dauci drach. i. & dimidia. opij drach. ii. amomi sesquidrachmam. cassiae nigrae sesquidrachma. mel coctum. Facit ad dolores stomachi, hepatis, pulmonis, oculorum, sanguinis retentione, abscessus. Prodest dysentericis, uoluitosis, nephriticis, ischiadicis, aegre spirantibus. Urinae suppressae, doloribus laterum, praecordiorum, ad fluxum mulierum, & uteri strangulatione. Admiranda est Antidotus ad lethalia uenena, ante & post cibum sumpta, ad omnem sanguinis eruptionem cum frigida, & ad morsos a uipera, & percussos a phalangijs, in uini cyathis tribus. Quattanarijs praefectis dantur ante horam accessionis oboli. ii. ex uini cyathis tribus.

Posio ad tussim, Dyspnoeam, & alia multa Antipatri, qua utor. Stryacis drach. vi. terebinthinae drach. iii. opopanaeis drach. ii. galbani drach. ii. iridis Illyricae drach. ii. myrrhae drach. ii. seminis hyoscyami albi obolos iii. spumae niri obol. iii. piperis albi obolos iii. alij drachmam unam coniungunt.

Edegma ad tussim. Nucleorum nucum pinearum drach. xii. seminis lini tosti drach. viii. tragacanthae drachmas xii. carnis palmarum drachmas xviii. iridis Illyricae drach. xii. amygdalarum dulcium drachmas xvi. Mel coctum. Dato delingendum bis per diem, mane & uesper. In quibusdam tragacantham aqua pluuiam dissolutam primum cum melle coquito.

Cataportion ad tussim, Crispi Libenti. Myrrhae, piperis albi, galbani, castorij, stryacis, croci, opij, singulorum par pondus, stryacis dimidium. Dato inde cataportia ii. ad noctem. Scribonij ad tussim. Seminis apij drachmas duas. florisunci odorati, nardi celticae, stryacis, croci singulorum drach. unam. balaustij obol. iii. succi papaueris drachmas iii. mellis quod satis est. Datur magnitudo fabae non febrientibus ex aceto mulso. febrientibus cum aqua.

Alalepiadae ad tussim. Rhei pontici, croci Cilicij, succi papaueris, spicae nardi, thuris, myrrhae, singulorum drach. unam. radicis nardi Celticae sextante. stryacis sexuncem. Datur drachma una, cum uino mulso.

Thespiana Apollonij ad internos abscessus. Seminis apij drachmas. iii. succi papaueris drach. iii. melanthij drach. iii. iridis Illyricae drachmas. vii. castorij drachmas ii. seminis dauci drachmas. vii. sinopidis rubricae drach. vii. excipe melle cocto, & dato nucis ponticae magnitudine ex aqua.

Cataportum resicatorium ad fluxiones Thoracis, ad morae dolorem, affectiones per circuitum repentes, & percussos a scorpio. Succu papaueris, seminis hyoscyami, utriusque par pondus cum passo aut melle ad fabae graecae magnitudinem formaro. Dato ad noctem. somnum inducendo prodest. Confectio finiens febrem Pamphili pharmacopolae bona. Seminis hyoscyami unca, cardamomi

mi exenterati unc. l. succi papaueris unc. i. sulphuris uiui unc. dimidiū. croci unc. dimidiū. myrrhæ unc. dimidiū. euphorbij drach. ii. costi drach. iii. iridis Illyricæ drach. iii. piperis albi drach. iii. & dimidiā. Mellis quod satis est. Vtere.

Cataportum ad tussim & alia multa cōmodum, & præsertim ad tussim humi-
dam. Iunci odorati drach. vi. opij drach. iii. galbani drach. vi. styracis drach. iii.
fiant Cataportia araci magnitudine, dentur ad somnū. Alia sedās febrē. Da-
rij. Hac antidoto usus est ad omnia, ad tonsillas, tussis, & anginas. Croci unc. i.

piperis quicuncūq; myrrhæ unc. i. succi papaueris unc. i. thuris tantundē. seminis
hyoscyami tantundē, cardamomi tantundē. costi drach. iii. iridis Illyricæ drach.
iii. aristolochiæ drach. ii. melle Attico excipito. Aliud ad omnē tussim ex-
pertū. Anisi drach. ii. costi obol. iii. myrrhæ drach. i. castorij, galbani, piperis albi,
seminis hyoscyami, opij, succi radicis dulcis, singulorū drach. i. excipe passō, redi-
ge in cataportia ciceris magnitudine. Dato in noctē.

Catapotū concoctio-
rium ex libris Perigenis, ad tussim & destillationē. Stryacis obol. ii. piperis gra-
na. xx. myrrhæ drach. ii. & dimidiā. seminis hyoscyami obol. iii. euphorbij
drach. ii. iridis Illyricæ drach. ii. opopanax drach. ii. croci obol. iii. opij obol. ii.
terebinthinæ drach. i. piperis albi obol. iii. galbani drach. ii. trita excipe galbano
ac resina, opioq; & styrace. Datur prout sunt uires. Apollonij confectio ad
tussim cōmoda. Foliorum malabathri drach. viii. croci drach. vi. opobalsami
drach. i. spicæ nardi drach. i. rosarū siccatū, floris tūci odorati, singulorū drach. i.
costi, cassiæ, styracis, myrrhæ, mei, singulorū drach. iii. uix passā mundā drach.
xvi. succi mādragoræ drach. vi. mellis quod satis est. Vuam passam in Cretico
passo per noctē & diem macerato, deinde ammixtis aridis terito, et mel miscro,
ac reposito utitor.

Potio ad tussim ex libris Apollonij, item ad mellebrem
fluxū. Seminis hyoscyami drach. iii. myrrhæ drach. iii. croci, succi mādragoræ,
thuris, singulorū drach. iii. piperis albi & nigri utriusq; drach. iii. uiticis drach.
iii. opij drach. iii. mellis & uini chij quod satis est. Datur magnitudo fabæ.
Ad tussim, incipientem phthisim, hæmoptoeos, ad fluxiones. Seminis hyo-
scyami drach. iii. radicis nigre mandragoræ drach. iii. Rhei drach. iii. corallij
drach. iii. opij drach. iii. lycij drach. ii. balaustij drach. iii. thuris drach. v. tragacan-
thæ drach. ii. croci drach. iii. Cum aqua pastillos triobolares formato. Datur hæ-
moptoeicis ex posca, Reliquis in aqua. Potio prodita à Clectio Abascantō
ad tabescētes, quo utor abūde, Verū ineptū est ad sanguinis refectionē. Ari-
stolochiæ dactylididis drach. xx. sulphuris uiui drach. xx. corticis mādragoræ
drach. xx. thuris drach. xl. gentianæ drach. xxx. x. seselis drach. xxx. opij drach.
xl. seminis hyoscyami albi drach. xl. myrrhæ drach. xl. croci drach. viii. piper-
is albi grana c. euphorbij drach. x. baccarum lauri drach. vii. & dimidiā. costi
drach. vii. & dimidiū, Cardamomi drach. vii. Euphorbij, & myrrhæ in uino tūdi-
to, opij uero & hyoscyami in uino mulso. Reliqua priuatim tūditō, ac simul mi-
sceto ad mel coctū. Vtere pharmaco non recenii. Recte apposuit Andro-
machus ad hoc pharmacū, quod sit ad sanguinis refectionē ineptū, ob sulphur
uidelicet uiuū, & euphorbij, partim etiā ob lauri baccas. Catapodum
ad tussim statim auxilians. Iridis obol. iii. croci Cilicij sesquiobolum, myrrhæ
obol. ii. cinamomi obol. iii. cassiæ obol. iii. seminis hyoscyami albi obolos ii. se-
minis papaueris nigri obolos ii. seminis cicutæ obol. ii. redige in pastillos obola-
res aut semibolares cū passō, & præbe in passū quarta hæmorrhæ parte. Aliud,
Ad omnem tussim, & fluxionem, & abscessus internos, ut Apollonius. Sagar-
peni, gentianæ, myrrhæ, opopanax, piperis albi, singulorū drach. ii. baccarum
lauri mundarum drach. iii. trita cum aqua reduc ad magnitudinem fabæ gra-
uæ. Dato autem ſchiadicis paulo plus ex uini diluti cyathis tribus.

Ad Phthiricos aliud, Cuius utilitatē expertus sum, Fabiani Cretenfis. Succū hypocythidis drach. viii. myrrhē drach. viii. castorij drach. vi. thuris drachmas viii. succi Rhois drach. ix. sagapeni drach. vi. succi papaueris drach. viii. anisi drach. ix. seminis apij drach. viii. marrubij drach. i. corticis mandragoræ drach. x. piperis longi drach. viii. & albi drach. v. & dimidiā uerbenacē supinæ drach. unam. mel coctum. Catapotium album, ut Prytanis & Apollo. Myrrhæ; seminis hyoscyami albi, opij, styracis, singulorū æquale pōdus, formato catapotia quāta deuorari possunt, his ipsis uua passa, aut passo, aut palmularum carne exceptis. Catapotiu ex libris Perigenis. Ad tussim Seminis hyoscyami; castorij, myrrhæ, styracis, singulorū par pōdus. Dato magnitudinem fabæ cum passo, aut aqua mullā. Catapotia ad tussim humidam ex libris Perigenis; Styracis, galbani, ammoniaci thymiamatis, castorij, opij, singulorū æquales partes in catapotia erui magnitudinis redigito, ex eisq; duo exhibeto.

De refectione sanguinis. Cap. lxxxiii

In refectione sanguinis primum periculum est, ne immoderata eius euacuatio fiat. Verū post suppressum sanguinē, Curatio eius quidem quæ ex aperture osculi alicuius uasis contigit, per obturationem fit oris dilatat. Eius uero quæ ex uasis ruptura, per eiusdē cōglutinationem. Quemadmodū eius quæ ex erosione, per renutritionē erosorū. Obturat igitur osculū dilatatū, per adstringentia; cōglutinatur autē ruptum, per eadē, & quæcūq; ipsis in cōpositione miscentur citram ordacitatē reliscātia, & glutinosum quiddā habētia. Velut est lemnia terra sphragis appellata, & Satius alter. Renutritur autē corrosa, per cibos boni succi, & pharmacā carnē gignentia, scarotica Græcis appellata, de quorū facultate dictū est in secūdo opere huiusmodi tractationis. Iuxta primā quidē igitur rationem, ex talibus pharmaca cōponuntur ad refectionē sanguinis curandā cōuenientia. Iuxta secūdam uero, in his qui expulmone, aut thorace, aut arteria, aut summa arteriæ parte sanguinem resectant. Miscentur enī prædictis cōgruenti mensura tum calida, tum tenuium partū existētia, quæ infestissima sunt prædictis tribus affectionibus, aperture uel delictet orarum, rupturæ, & corrosioni. Cuius rei gratia itaq; miscentur. Distributionis nimirū ipsorum in corpus. Etenim adstringentia & uiscosa ac tenacia sibi ipsis uias præcludunt, quare opus habent facultate ipsis uia struente ac præparante. Porro quum ex locis circa stomachum, aut aluum, aut aliquod intestinum, sanguis educitur, huiusmodi pharmacorū mixtura non est opus. Verū rursus infestissimum his est hoc genus pharmacorum, quod in tantum refrigerat, ut affectio stupefiat, & tamē etiā hæc ammiscentur medicamentis ad hæmoptoi cos conuenienter paratis, ut quæ altiore somnum ac soporem inducāt, & comodissima sunt his qui à tussi lancinātur, sistentia nimirū sanguinem qui ad affectum uas deferretur, atq; hoc per suam frigiditatē. Atq; hi quidem sunt cōponentes discopi. Cōpia autem materiæ pharmacorum, quæ sufficientem experientiam prioribus medicis, qui circa curatiuam artis partem diligenter uersati sunt, exhibuerunt, deinceps referetur.

Quæ Andromacho ad sanguinis refectionem scripta sunt.

Primum ex his quæ sanguinem reijcientibus cōueniunt pharmacis, Andromachus sic tradidit. Ad sanguinis refectionē, quo ego uor. Acaciæ drach. iiii. rosarum siccarum drach. viii. balastij drach. viii. gummi drach. ii. tragacanthæ drach. i. cum aqua pastillos facto drachmæ unius. Dato ex aqua pluuiā. Aliud Apollonij. Seminis hyoscyami drach. viii. opij drach. iiii. thuris drach. viii. terræ Samiæ drach. iiii. amyli drach. ii. rubricæ lemnis drach. ii. aut si hæc non sit

non sit, sinopice drach. iiii. coralli drach. iiii. costi drach. iiii. floris balaustij obol. iiii. alij drach. ii. excipe succo polygoni, ac redige in pastillos triobolares, quos ex frigida prębeto. Quidā cicutę seminis drach. iiii. adijciunt. Aliud quo utor, Cytinorū drach. vi. spinę Aegyptię drach. vi. succi papaueris drach. iiii. hypocythidis drach. vi. balaustij drach. vi. acacię drach. vi. lycij Indici drach. iiii. myrrhę drach. ii. excipe myrti baccarū decocto, & fac pastillos drachmę unius. Ex eodē decocto prębe bibendos. Aliud sistens sanguinē. Croci Ciliij, myrrhę, iridis, nardi Indicę, thuris, acacię, singulorū unc. i. succi papaueris, costi, piperis, singulorū unciam dimidiā. rosarum siccarū trientem. melle excipito. Datur fabę Aegyptię magnitudo. Aliud fluxiones sistēs. Prodest fluxionibus internis, tonsillarū, & uulę, & ad exulceratā arteriā gargarissarū, & ad sanguinis fluxū ex aqua frigida. Pluribus ex posca magnitudine ponticę nucis. Cōgruit etiam mingentibus sanguinem, & fluxui muliebri, potū & appositū. Myrrhę unc. i. nardi Indicę unc. i. cinamomi unc. i. thuris unc. i. croci unc. i. dimidiā. piperis drach. iiii. succi acacię drach. iiii. costi drach. iiii. styracis drach. iiii. iridis Illyricę sextantem. rosarum siccarum sextantem. Excipe melle cocto. Aliud sistens fluxiones, ex libris Galli. Facit probe & ad sanguinis reiectionē. Croci, myrrhę, iridis, nardi Syriacę, cassię nigre, Rhei pōtici, singulorū drach. i. styracis, piperis albi utriusq; unc. dimidiā. rosarū siccarū quincuncē. tritis mellis Attici quod satis est affunde. Datur nucis pōticę magnitudine ex aquę cyathis tribus. Aliud ad hæmoptoicos, ex libris Apollonij. Succi hypocythidis drach. xii. balaustij, acacię, cytınorū singulorum drach. xii. gallę drach. xii. succi papaueris drach. vi. croci drach. vi. Redigito in pastillos triobolares. Aliud ad hæmoptoicos. Succu papaueris obol. ii. amyli. obol. iiii. Dato ex aqua. Aliud ad sanguinis eductionem, & omnem sanguinis eruptionē, ex aqua potū. Succu papaueris drach. i. cinamomi drach. i. castorij drach. i. costi, piperis longi & rotundi, myrrhę, singulorum, obolos iiii. croci sesquiobolum. corallij obolos ii. balaustij drach. unā. anisi drach. ii. gummi drach. i. Ex tritis pastillos formato ac utor. Aliud ad sanguinis reiectionem. Rubricę sinopice drach. iiii. thuris drach. viii. anisi drach. i. seminis cicutę drachmas iiii. succi papaueris drach. iiii. lapidis hæmatitę drach. iiii. seminis hyoscyami drach. viii. terrę samię drach. iiii. dato pharmaci sejunis ex aqua. Aliud. Succu hypocythidis drach. unā. opij obol. iiii. balaustij drach. i. acacię drach. i. Ex aqua. Aliud ad sanguinis eductionem, ut Herophilus. Radicis symphyti quadrantē, terrę asteris unc. i. thuris sextantē. balaustij unc. i. hypocythidis unc. i. croci obol. iiii. myrrhę drach. ii. opij drach. i. rubricę lemnicę quadrantē, & obol. iiii. gummi drach. i. Excipe succo polygoni aut plantaginis. Aliud ad hæmoptoicos. Boni præceptoris. Balaustij drach. ii. acacię drach. ii. tragacanthę drach. iiii. succi hypocythidis drach. iiii. floru rosarū drach. iiii. opij drach. ii. thuris drach. iiii. myrrhę drachmas ii. seminis hyoscyami obol. iiii. Excipe succo sanguinaricę quę Gręcis est polygonū. Aliud sanguinē reijciētibus. ut Acacios. Terrę Samię drach. iiii. corallij. drach. iiii. rubricę sinopice drach. ii. balaustij obol. iiii. opij drach. iiii. amyli drach. xii. thuris drach. viii. seminis hyoscyami, drach. viii. Cū polygoni succo pastillos triobolares formato. Dato in posca, si fluxio sit multa cū uulso oui assato & aqua plantaginis. Aliud ad hæmoptoicos & dysentericos. Floris rosarū, opij, acacię, gummi, balaustij, hypocythidis singulorū quadrantem. gallę unc. i. seminis plantaginis eiusdemq; succi utriusq; sextantem. lycij Indici unc. i. succi rosarum unc. i. Redigito in pastillos drachmales. Quidam etiam omphacij unc. i. dimidiū addunt. Dysentericis etiam insunditur.

Aliud

Aliud ad hæmoptoicos, Carteri robustius. Seminis cicutæ drach. ii. seminis hyoscyami drach. i. amyli drach. i. nardi obol. iiii. rubricæ lemnizæ obol. iiii. alij iiii. anisi obol. iiii. alij iiii. croci obol. iiii. Dato cum uittello oui affati, ex aquæ lactosæ cyathis tribus. Facit & ad destillationes.

Aliud ad Hæmoptoicos, Magni Philadelphi. Corallij obol. ii. asteris Samij obol. iiii. succi sanguinariæ cyathos vi. Dato hoc rotum pro duabus uicibus in potu.

Vfus prædictorum Andromachi pharmacorum.

Iam ante quidem palam est, ex his quæ in principio sermonis de reiectione sanguinis dixi, qui sit usus præscriptorum pharmacorum. Verum maioris lucis gratia, repetam etiam nunc id quod primum omnium ex acacia, rosæ siccis, balaustio, gummi, tragacanthæq; est compositum. Manifestum autem est acaciam quidem, & rosam, & balaustium, adstringentia habere, gummi uero & tragacantham uiscosa & glutinatoria. Igitur impossibile est ipsum usq; ad thoracē & pulmonem per se deferri, si non habeat quæ adstringentia & uiscosa ac tenacta deducant. Et quod his amplius accedit, neq; mellis quicquam eius compositor addidit. Sed per aquam pluuiam, quæ & ipsa adstringentem usum habet, tum compositio ipsius, tum exhibitio tradita est, ut ad sanguinis ex stomacho & uentre educationes conuenire possit. Quin & si possibile sit ex intestino icuino aliquid per nauseam efferri, ad hoc etiam commodum pharmacum fiet. Contrariam autem uicissim ad præscriptum pharmacum compositionem habet quintum ex ordine scriptum, itemq; nonum. Nimirum quum cinamomum, & piper, & costus, & myrrha eis sint ammixta. Reliqua uero omnia media quodāmodo inter hæc sunt, neq; exacte adstringentia per totam sui compositionem, neq; fortiter calfacientibus permixta. Cæterum opium, & hyoscyamus, & cicutæ semen, maxime quidem his quæ a tussi, aut etiam aliis lancinantur, apta sunt: quāquam omnibus quomodo documq; sanguinem reiicientibus cōueniant. Quare ipsa miscere licet, tum in his quæ ex nutritiuis organis sanguinem sursum educunt, tum quibus ex spiritalibus organis idem contingit.

Quæ Asclepiades ad Hæmoptoicos scripsit.

Ad sanguinis reiectionem. Radicis symphyti sexuncæ. balaustij drach. iiii. aut la quæ sextariū i. Coquito ad tertias, & expresso liquori hæc addito. amyli drach. i. gummi Thebaici tantūdem. Dato in potu. Aliud, Cucumerum satiuorū lib. i. in tenuia frustra dissecato, & aquæ potabilis sextariū i. affundito, ac ad tertias coquito. Expresso deinde liquori terræ samizæ sesquidrachmā inspergito, ac bibendum exhibeto. Charixenis pharmacum accommodatum. Radicis polygoni manipulum, radicis symphyti tantūdem, Rhois rubri acetabulum, aquæ sextarios iiii. coquito ad tertias, & expressi liquoris cyathū unum dato, cum gummi tenuissime triti ac dissoluti drach. una.

Pharmacū Arrhabiani quod ponticum dicitur. Vuarursi libras xvi. aquæ pluuiæ sextarios xvi. Coquito ad tertias, & expressum liquorem reponito. Aliud, Mororum rubrorum nondum maturorū libras xvi. aquæ pluuiæ sextarios xvi. Coquito ad tertias, & expressum liquorem reponito. Aliud, Fructus corni libras xvi. aquæ pluuiæ sextarios xvi. fac eodem modo.

Aliud, Palmularum Thebaicarū lib. xvi. aquæ pluuiæ sextarios xvi. coquito ad tertias, & postquam expresseris liquorem, ad prius expressos liquores infundito, omnesq; probe mixtos ad tertias coquito, & in sicili uase reponito. Et inde cyathū unum ante cibum dato. Pharmacum hoc est ualde bonum, & reiterationem prohibens. Oportet autem singula suo proprio tempore præparare, & ad pharmaci confectionem reponere.

De urſi uua. Quæ urſi uua appellatur in ponto naſcitur. Planta eſt humilis & fruticoſa, folio memæcyli, fructum ferens rubrum & rotundum, guſtu auſterum, quem urſi uua appellant. Catapotū ad hæmoptoicos. Corticis thuris, terræ ſamiæ, amyli, ſingulorum drach. iiii. tuſa & cribrata reponito. Vſu uero expetente, cochleariū unum in aquæ frigidæ cyatho dato. Aliud, Balauſtij, terræ ſamiæ, corticis thuris, gummi, ſingulorum æquale pondus tuſa & cribrata exhibe ut prædictum eſt.

Ad ſanguinis reiectationem eclegma Amaranthi, pharmacum accommodatum. Vini ſalerni ſextarium i. mellis Attici ſib. i. in uas fictile coniecta & conquaſſata ſuper prunas ponito, & ubi arteriæ acciperint ſpæſſitudinem, ab igne ablata refrigerari ſinito, eiſq; cōtuſa & cribrata addito, gūmi cochlearia iiii. balauſtij, thuris, terræ ſamiæ, ſingulorū drach. ii. & ruſus ad ignem admota & caſſaſta reponito. Dato ut prædictum eſt.

Aliud Origeniæ. Succū gētiænæ, ſucci ſymp hyti, balauſtij, ſingulorū drach. viii. croci, myrrhæ, ſucci radicis dulcis, ſingulorū drach. iiii. protropi, aut Theriaci, aut Scybeliæ ſextarios vi. præpara ac exhibe, ut dictum eſt.

Catapotia ad ſanguinis reiectiōem dolorem ſe dantiā. Vſus eſt Charixenes. Succū hypocyſthidis, balauſtiōrū, opij, ſingulorum drach. iiii. excipe utio Myrtite, & fac catapotia. Dato ex his trioboli pōdus. In alijs exemplaribus opij drachmæ duæ habētur. Aliud, Succū hypocyſthidis, ſucci acaciæ, ſucci Rhois Syriacæ, ſingulorum drach. iiii. balauſtij, opij, gummi, ſingulorum drach. iiii. uſni Myrtitæ quod ſatis eſt. Vſus oſtenſus eſt.

Pæſtillus hæmoptoicus, pharmacum accommodatum, Inſcribitur Trypherum, hoc eſt, Delicatum. Amyli, balauſtij, terræ Samiæ, ſucci hypocyſthidis, gummi, croci, opij, ſingulorū drach. ii. Excipe ſucco plantaginis, & exhibe drach. unam. Verum liquor ipſe affectiō ni ſit cōueniens. Alius, Amyli, terræ Samiæ, hypocyſthidis ſingulorum drachmas ii. opij, croci, balauſtij, tragacanthæ, ſingulorum drachmam unam, excipe ſucco plantaginis.

Pæſtillus ex ſuccino. Facit hæmoptoicis, diurnæ & recēti tuſſi, Phthiſicis ſanguinem reiicientibus, ſuppuratis, coeliacis, dyſentericis, & inflatis. Eſt etiam Auricularis bona. Pſyllij mundi drach. xlv. ſiſidis Illyricæ, maſticheſ, ramentorum ſuccini, croci, ſingulorum drach. xxx. opij drach. xv. Pſylliū in aquam calidā cōiectum macerari ſinito, atq; ubi uiſcoſum ac glutinoſum de ſe in aquam depolucriſ, liquore exprimito, & cum eo pharmacum præparato, in pæſtillos ipſum cogēdo, ex quibus obol. iiii. ad ſomnum dato. Sint autem aquæ ſextarij iii. In alijs exemplaribus pſyllium ad triduum maderſcit, deinde ter donec ebulliat coquitur, & ab igne ademptum ruſus ad triduum ſinitur, atque tunc liquor ad pharmaci conſectiōem ſegregatur.

Pæſtillus Neapolitæ. Facit hæmoptoicis, ſuppuratis, phthiſicis, affectiōibus fluidis. Seminis hyoſcyami albi, ſucci mandragoræ, utriuſq; drach. v. thuris maſculi, opij hiſpani, ſtyracis, coaguli hinuli, ſingulorum drach. x. maſticheſ drach. xx. ramentorū ſuccini, iſidis Illyricæ, croci, ſingulorū drach. xxx. pſyllij drach. xlv. aquæ ſextarios iii. præpara ac utere ut prædictum eſt.

Pæſtillus ex corallio, ut Niceraus. Coralli, terræ Samiæ, utriuſq; drachmas viii. balauſtiōrum, amyli, terræ lemnæ, ſingulorum drach. iiii. ſeminis hyoſcyami albi, opij, hypocyſthidis, ſingulorum drach. ii. Excipe ſucco arnogloſſæ, coge pæſtillos ac exhibe. Aliſter Dioclis Chalcedoni. Coralli drach. viii. ſucci hypocyſthidis, balauſtij, ſucci acaciæ, Rhei pontici, terræ Samiæ, opij, thuris, ſucci ſymp hyti, ſingulorum drach. ii. excipe ſucco plantaginis.

Aphrodiſiacum Clidion, pharmacum accommodatum. Facit hæmoptoicis, coeliacis, dyſentericis, & qui ſtomachi fluxionibus laborant. Cytinorum, ſpīgæ Aegyptiæ

Aegyptiæ, balaustiorum, succi hypocythidis, succi acaciæ, singulorū drach. vi. lycij, Rhei pontici, opij, singulorum drach. iiii. myrrhæ drach. ii. cōtusa & cribra ta diligēter baccarū myrti decocto excipe, & pastillos coge. Exhibe pro uiribus cum rosarū decocto, aut baccarum myrti, aut aqua frigida. Forinsecus spongiam aceto imbutam imposito. Postquam uero fluxus constiterit, pectus & fluxione infestatos locos omphacio cum aceto dissoluto illinito. Tepesiat autem ad cinerem calidam, donec aliquantulum spissetur.

Philippi pharmacū accommodatū dysentericis, & hæmoptoicis. Balaustij, acaciæ, hypocythidis succi, opij, thuris, myrrhæ, croci, galle, lycij, aloes, Rci pōtici, baccarū myrti nigrarū, malicorij, singulorū drach. iiii. excipe uino Italico, & redige in pastillos triobolares. Dato febrientibus ex aqua. nō febrientibus cū uino. Cōfectiones dolorem sedantes, tabescentibus, & sanguinem reiectantibus: cōmoda, itemq; alijs quibusdā accommodata, præterq; colicis. Cap. v.

N his equidem qui sanguinem reieciūt, non dū tamen exacte tabe apprehensi sunt, hoc genus pharmacorū dolorē sedantiū priores medici cōposuerunt, ipsumq; anodynon appellauerūt, conueniens & his qui sanguinē reijciunt, & qui tum hoc perpetuū, tum etiam iam tabescūt, itemq; ad alios dolores & affectus, qui circa pulmones, & arteriā, & Thoracem, atq; alias quasdā partes cōsistunt, colicis tantū exceptis. Differūt enim hæc pharmaca ab his quæ priuatim colica appellantur, aromati, & odoratorum ac urinam cientiū seminū mistura. Colicæ enim cōfectiones his uehementiores sunt, stupefactoriā uim prædominantē habentes ex multitudine refrigerantium pharmacorū. Quale est, hyoscyami semen, & cicuta, & papaueris succus, & cortex radice mādragoræ. His nāq; in colicis uti cogimur ob magnitudinē doloris.

Quæ Andromachus scripsit ad prædictas affectiones.

Confectio sedans dolorem, ad omnes internos affectus & pleuritidas, qua utor. Radicis panacis, seminis dauci, utriusque drach. iiii. castorij drach. iiii. alij drach. ii. seminis hyoscyami, opij, utriusq; drach. iiii. alij drach. ii. Mellis quod sufficit. Dantur obol. iiii. cum aquæ cyathis tribus. Alia sedans dolorem, Marcellini. Anisi drach. ii. seminis hyoscyami drach. ii. succi papaueris drach. i. seminis apij drach. ii. croci obol. iiii. rosarum siccarum drach. i. myrrhæ drach. i. lamomi drach. i. Trita cum aqua in pastillos triginta duos redige. Dato in somni tempus cum aquæ cyathis duobus aut tribus. Alia sedans dolorem, Ex seminibus. Seminis apij drach. vii. opij drach. ii. ammi drach. vii. anisi drach. iiii. fœniculi drach. iiii. cassiæ nigrae drach. ii. Cum aqua fac pastillos triobolares. Dato ex passo, sexta & decima heminae parte; aut ex aqua.

Alia Achillæ Aurigæ. Anisi drach. vii. ammi drachmas vii. seminis apij drach. iiii. opij drach. ii. nardi Indicæ drach. ii. myrrhæ drach. ii. piperis drach. i. cassiæ nigrae drach. ii. Fac pastillos triobolares qui resiccati ponderent obol. ii. Dato ut reliquos. Alia dolorem sedans ut Xenocrates qua utor maxime ad tormina & dysentericos. Seminis apij drach. ii. anisi drachmam unam, piperis albi drach. i. myrrhæ obolos iiii. castorij obol. iiii. opij obolos ii. gentianæ drach. ii. Fac pastillos triobolares, & uarie exhibe. Alia Sphragis dicta sedans dolorem, resiccans fluxiones, & tormina ac tussis, qua utor. Myrrhæ obol. v. alij v. l. corticis mādragoræ drach. iiii. succi papaueris drach. v. seminis hyoscyami drach. iiii. alij drach. ii. thuris drach. v. croci drach. v. Excipe uino, exhibe pro uiribus, aliquibus fabæ Aegyptiæ magnitudine, aliquibus obol. ii.

Alia, Aster appellata, sistens dolorem, Qua utor ad omnem fluxū, dolorē, & omnes internos affectus & destillationes, ad uescicam, ad suffocationes, fluxū mu-

liebrem, stomachi fluxionem, dysentericos, sanguinem reijcentes. Facit & ad paralyti resolutos. Croci obol. iiii. seminis hyoscyami drach. vi. seminis apij drach. vi. anisi drach. iiii. styracis drach. iiii. seminis dauci drach. iiii. castorij drach. ii. opij drach. iiii. myrrhæ drach. ii. Quidā etiā mandragoræ succi drach. iiii. ut uero Xenocrates, etiā piperis albi drach. vi. cū aqua fac pastillos triobolares. Dato ex aqua.

Alia sedans dolorem Lycomedis. Resiccat destillationes arteriarum, & fluxiones oculorū. Seminis hyoscyami drach. ii. seminis apij drach. ii. opij drach. ii. anisi drach. i. croci obol. iiii. rosarū siccatū drach. ii. myrrhæ drach. i. alij drach. ii. Cū aqua redigito in pastillos triobolares. Vtere quēadmodū Trigono appellato.

Alia sedans dolorē, resiccatoria. Facit & ad hæmopticos, cœliacos dysentericos, rupta & cōuulsa. Anisi drach. iiii. seminis apij drach. iiii. opij drach. iiii. croci drach. i. seminis hyoscyami drach. iiii. styracis drach. i. iūci odorati drach. i. balaustij obol. iiii. cū aqua formato pastillos diobolares. Dato ex uino, aut aqua, aut protropo.

Alia dolorem sedans potio, Ruffi, qua utor. Corticis mandragoræ drach. iiii. thuris drach. v. piperis albi drach. ii. & dimidiā. croci drach. v. seminis hyoscyami drach. iiii. succi papaueris drach. v. myrrhæ drach. v. nardi obol. iiii. cassiæ nigræ drach. ii. Tria cū passo in pastillos drachmales cogito, ac reposito ne humecti fiant. Datur ex aquæ calidæ cyathis duobus, cholerici, hoc est, biliosa superne & inferne reddentibus, ex frigida.

Alia sedans dolorem ad omnes internas affectiones, qua utor. Cassiæ nigræ, myrrhæ, opij, styracis, croci, singulorū drach. i. quidā drach. i. & obol. iiii. Cogito in pastillos triū aut duorū obolorū. Præbe febrientibus ex aqua, non febricitantibus in uino. Hepaticis in aqua mulla, itidem & pleuriticis. Efficax est & ad tussim.

Alia Trigonos uocata, resiccatoria & sedans dolorem. Seminis hyoscyami drach. iiii. anisi drach. ii. opij drach. ii. cum aqua pastillos formato. Dantur cū frigida, mane & uesper, unus pro uice.

Alia sedans dolorem, Asclepiadæ ad omnes internos affectus. Sefelis, chamæpityos, herbæ saluæ, seminis rutæ syluestris, seminis dauci, singulorum drach. vi. seminis hyoscyami, opij, utriusque drach. vii. castorij drach. xxv. Rhei pontici drach. xiii. Excipe melle.

Alia ut Charicles. Tordilij drach. vii. chamæpityos drach. vii. Rhei pontici drach. vi. castorij drach. xii. & dimidiā. herbæ saluæ drach. vii. seminis rutæ syluestris drach. vii. seminis dauci drach. vii. opij drach. iiii. seminis hyoscyami drach. iiii. croci drach. v. Quidā addit mel Atticū, reliqua ipso excipientes.

Alia dolorē sedans, iucūda appellata. Facit & ad tabescētes, & inflatos. Iridis Illyricæ drach. xxx. succini, croci, mastiches, chie singulorū drach. xxx. psyllij drach. xl. v. aut xxx. succi papaueris drach. xv. cū aqua pluuiā pastillos drach. i. & obol. iiii. ponderantes formato, ac exhibeto. Psylliū per diem & noctē aqua pluuiā macerato, deinde coquito & exprimito, atq; sic cum reliquis cōmittito.

Alia potio sedans dolorem, ex libris Aphrodæ. Ad omnem dolorē, in neruis, utero, coxæ dicibus. Succu papaueris drach. i. opobalsami drach. i. aut carpobalsami drach. i. obolos ii. myrrhæ, seminis hyoscyami, castorij, styracis, singulorum drach. i. Excipe passo, & fac pastillos oboli unius & dimidiij. Dato ex aquæ calidæ cyathis duobus aut tribus.

Aliud sedans dolorem Catapotium. Ex libris Aphrodæ, ad omnes internos affectus, & ad quarranarios, qui interualli tempore remediā ferunt, & deinde accipiūt. Facit & ad calculosos, dysentericos, stomachicos, & iam desperatos atq; anxios. Est & oculis ualde cōmoda. Seminis hyoscyami, anisi, styracis, singulorum drach. iiii. croci, opij, utriusq; drach. iiii. castorij drach. ii. fac catapotia Aegyptiæ fabæ magnitudine. Præbe ex aquæ cyathis duobus.

Aliud dolorē sedans, ad omnes internos affectus, & sanguinis reiectiæ dionem

tionem undecunq; feratur, etiam si ex uulnere prodeat quibusdam prodest, facit & ad nephriticos & hepaticos. Hanc ne prius dederis quam mercedem acceperis. Cinamomi, cassiæ utriusq; drach. ii. myrrhæ drach. i. piperis albi drach. i. & longi drach. i. galbani drach. i. opij drach. ii. Trita cum melle pauco in catapotia redige, partim magnitudine fabæ, partim quantitate araci. Dato pro uiribus cum aqua, aut pro iudicio tuo.

Alia dolorē sedans ad omnia interna. Seminis apij drach. ii. anisi drach. ii. piperis longi drach. ii. & nigri drach. i. castorij obolos iii. myrrhæ, opij, utriusq; obol. iii. panacis, gentianæ utriusq; obol. iii. succi radicis dulcis obol. iii. fac pastillos triobolares. dysentericis drachmæ unius.

Alia sedans dolorem, Crateri ad tabescentes, & sanguinem reiicientes. Myrrhæ drach. vi. mandragoræ drach. iii. seminis hyoscyami drach. iii. opij drach. v. croci, thuris, utriusq; drach. v. Rhei drach. v. seminis cicutæ, styracis, utriusq; drach. v. Excipe uino mulso.

Alia sedatiua doloris, Mysteriū appellata, ut Niceratus. Ad phthisicos, tussientes, coeliacos, dysentericos, destillationes. cōsestim auxiliatur. Croci, costi, castorij, asari, seminis hyoscyami, opij, styracis, singulorū drach. i. quidā hyoscyami seminis drach. dimidiū. Excipe melle ac utere.

Alia doloris sedatiua ad destillationē cōueniens. Seminis hyoscyami, succi papaueris, amyli, singulorū drach. ii. anisi drach. i. spicæ nardi drach. unā. croci drach. i. rubricæ sinopicæ obolos iii. aut lemnis drach. unam. formato pastillos xxx. Dato in noctem cum aqua.

Quæ ab Asclepiade scripta sunt ad easdem affectiones.

Elegna. Farris Clusini appellati sextarij dimidiū, decocti marrubij uiridis sextarij i. hæc in uas uitreum cōiecta per diem & noctē macerari sinito. Sequenti die pharmacū mollito, quemadmodū alicam maceramus, atq; ubi penitus dissolutū fuerit, exprimito liquorem, eiq; pinguedinem aliquam addito, & igni admota assidue coquito, donec spissata mellis crassitudinem acceperint. Ex hoc mystrū datur ante cibum, & post cibū tantundem.

Aliud. Foliorum marrubij teneriorū manipulum cum sufficienti aqua in sicili coquito, & ubi exolura fuerint eximito ac terito, & decocto diluta rursus coquito, pollinis acetabulum inspergens, & pinguedinis arietinæ probe subactæ quadrantē addens. Erubi coctura recte habuerit, ueluti reliquæ forbitiones preparantur, ablata ab igne, et modico sale cōspersa, forbēda exhibe. Amplius absorptū amplius suat.

Aliud Nicerati. Facit suppuratis, dyspnœicis, ueteri tussi, uiscosum ac glutinosum reiectantibus, & his quæ à partu purgātur, secundas deducit. Prodest etiam infansibus alimentū non sentientibus, si nutribus præbeatur. Succi marrubij sextarios vi. Verū probe hunc succū colligere oportet à recenti marrubio tuso expressum. Vini falerni sextar. i. mellis Attici tantundē, piperis albi, myrrhæ, thuris, singulorū drach. viii. Vinum & succum ad tertias coquito, deinde mel addito, quibus inspissatis arida inspergitro & diligenter mixta in uitreū uasculū transferro. Dato mystrū ante cibum.

Aliud, Scribonij Largi. Succi marrubij sextarios vi. succi semperui tantundem, mellis Attici sextar. iii. aliij sextar. i. Vini Italici sextar. i. picis liquidæ brutæ tantundē, nardi Indici, croci, myrrhæ, thuris, piperis albi, singulorum drach. viii. præpara ac utere ut prædictum est.

Aliud phthisicis & ad fluxiones Thoracis. Seminis cucumeris horreſis decorticati drach. viii. amyli drach. iii. seminis lini, seminis papaueris albi, utriusque drach. ii. rufa & cribrata excipe tragacathæ cremore, & in drachmales pastillos redige. Dantur obol. iii. non febrientibus ex uino & myrræ cremore, febrientibus cum Rhœis succo.

Aliud. Amyli drach. iii. seminis cucumeris satui tosti, seminis papaueris albi tosti, amygdalarū depurgatarū, singulorū drach. ii. tragacanthæ

tragacanthæ drach. Lobol. III. croci drach. I. excipe tragacanthæ cremore, & pos-
tea etiam uino scybelite cocto. Vtere eodem modo.

Aliud Scribonij Lar-
gi catapontū, phthisicis, sanguinem reiectū suppuratis, educit pelliculas, re-
purgat sufficenter. Verū immorari pharmaco oportet. Sagapeni, myrrhæ utrius-
que drach. II. opij, cardamomi, utriusq; drach. III. castorij drach. III. piperis albi
obolos III. excipe passo, fac catapontia, Da ex aquæ calidæ cyathis III.

Alia cōfectio Thespesiana. Facit suppuratis, & ad abscessus occultos. Semi-
nis apij, opij, melanthij, singulorū drach. III. castorij drach. II. seminis dauci, sinor-
nis, iridis, singulorum drach. V. excipe melle cocto, præbenucis ponticæ magni-
tudine ex calidæ cyath. III.

Alia Cōf. ad humores ægre educiles, suppurato-
ros, peripneumonicos. Maxime autem his qui crassa & glutinosa educunt utilis
est. Mellis Attici cocti ad glutinis compagem libram I. piperis cōtusi & cribra-
ti, myrrhæ, utriusq; unc. I. Myrrhæ & piper trita melle cocto excipe, & nucis pon-
ticæ magnitudine deuoranda præbe. In alijs exēplaribus habetur. Mellis lib. I.
piperis unc. I. myrrhæ, opopanax, utriusq; drach. VI. præpara ac exhibe similiter
ut prædictū est.

Pastillus ex mandragora, inscribitur Sphragis. Facit ad hæ-
mopticos. Resecat omnem fluxionem. Radicis mandragoræ corticis drach.
III. seminis hyoscyami drach. III. thuris masculi, succi papaueris, croci, myrrhæ,
singulorum drach. V. Trita redige in pastillos obolares, & præbe convenienter
iuxta affectiones.

Aliud Ptolemæi familiaris. Syracis, opij, thuris, croci,
singulorum drach. V. corticis mādragoræ, seminis hyoscyami albi, dauci cretici,
singulorum drach. III. cassiæ drach. II. excipe uino Amnaro, ac præbe obulum
cum aquæ calidæ cyathis duobus.

Aliud, ad easdem affectiones. Syracis
drach. VI. myrrhæ, opij, seminis hyoscyami, irionis torrefacti, singulorum drach.
III. corucis mandragoræ, opopanax, utriusq; drach. II. piperis albi, spumæ niri
utriusq; drach. unam. excipe melle cocto. Dato magnitudine ciceris.

Alia cōfectio Panchrestus ab omnimoda commo-
ditate dicta. Facit ad tussim antiquam, suppuratos, orthopnoicos, tabescentes. Prodest hypochondriorum,
hoc est, præcordiorū distensionibus & ad omnem inflationem. Mulieribus men-
ses, & quæ à foru corrupto, aut à partu relinquuntur secundas deducit. Liberat
etiam ab affectionibus circa uesicam. Terebinthinæ drach. VIII. syracis drach.
VI. myrrhæ drach. V. croci, iridis, galbani, singulorū drach. III. seminis hyoscy-
ami, corucis mandragoræ, irionis torrefacti, opopanax, singulorum drach. II. pi-
peris, spumæ niri, utriusque drachmam unam. excipe passo.

Charixenis. Facit peripneumoniciis, ac ueteri tussi. Myrrhæ, corticis thuris,
In alio exemplari opij, mandragoræ, sagapeni, seminis hyoscyami albi, opopana-
cis, dictamni cretici, pilularum marrubij, singulorum drach. III. Subigito cum
aqua & in pastillos cogito. Dato ex his obol. III. ex aquæ mullæ cyathis tribus.

Alia Asclepiadæ qui Philophysicus, à naturalium rerum studio, appellatus est,
pharmacū accommodatum. Corticis mādragoræ, seminis apij, utriusq; drach.
III. myrrhæ, croci, anisi, seminis dauci, succi rhois rubri, seminis hyoscyami, piperis
albi, castorij, sagapeni, opopanax, singulorum drach. II. excipe melle cocto.
Dato pro uiribus. Liquor uero ex quo exhibetur sit conueniens affectioni.

Antidotus Thespesiana phthisicis, sanguinem reiectū suppuratis. Facit
& ad alias internas affectiones, & præ omnibus cibi appetentiam excitat. Semi-
nis apij drach. XII. myrrhæ, anisi, opij, singulorū drach. VI. piperis albi drach. V.
petroselinij, nardi, piperis longi, singulorū drach. III. castorij, horis iuncto odorati,
croci, singulorū drach. III. cinamomi drach. II. cassiæ aromaticæ drach. III. excipe
melle cocto. Dato nucis pōticæ magnitudine ad noctē, cū aquæ cyathis tribus.

Antidotus

Antidotus Aristarchi. Compositio admiranda hanc Paulinam appellamus. Facit hæmoptoicis, tussientibus, phthisicis, suppuratis, peripneumoniacis, ad conuulsa rupta, ad stomachi subuersionē, & bilem uomentes ac secernentes, coeliacos, dysentericos. Facit ad affectiones circa uentricū, suffocationes uteri, febres per circuitū repentes, una hora ante exacerbationem exhibita: facit in malum habitum delapsis, cibū non sentientibus, & ad lethalia pharmaca, ac plagas uenenum iaculantū bestiarū. Cinamomi, costi, galbani, castorij, succi papaueris, piperis nigri & longi, styracis, singulorū unc. i. mellis sextariū i. Arida tunduntur & cribrantur per angustissimū cribrum. Galbanū coquitur cū melle, & ubi dissolutum fuerit, mel excolatur, ipsiq; reliqua addūtur & tunduntur. Deinde in pyxide uitreā aut argenteā reponuntur. Vfus est ad prædictas affectiones. Datur fabæ Aegyptiacæ magnitudine, cum aquæ mulsæ cyathis duobus, irroratis de digito guttis aceti nouem.

Alia Antonij Musæ Panacea. Vfus est ea Diotris latraliptes. Facit ad eos qui per circuitum à rigore infestantur, deiecit febres antiquas, ac reliquos morbos. Facit ad tussim ueterem, phthisicos, sanguinem reiectantes, suppuratos, dyspnoicos, conuulsa, rupta, inueteratas inflammationes, splenicis, hydropicos inueteratos, coeliacos. Extrahit lapides è renibus. Probecit urinam. Prodest omnī reptilium plagæ, & ad lethalia uenena, & ad omnem materiā uenenosā ac corruptoriā uim habentē. Piperis albi aut longi drach. viii. seminis hyoscyami albi, cardamomi, myrrhæ, thuris, singulorū drach. xii. opij, croci, utriusque drach. x. sulphuris uiui drach. vi. costi, aristolochiæ longæ, corticis mandragoræ aut ipsorū malorū, euphorbij, singulorū drach. iii. Mellis Attici cocti quod satis est. Datur his qui per circuitū infestantur magnitudine nucis pōticæ, reliquis pro uiribus.

Alia Cerustiana, Data est à Philippo Trallianis. Huius usu phthisicos & suppuratos liberabat. Piperis albi, succi cyrenaiici, syriaci, succi papaueris, singulorum quadratē. myrrhæ, croci, sulphuris uiui, seminis hyoscyami albi, singulorū uncia dimidiā. malorū mandragoræ drach. ii. cardamomi unc. i. mellis Attici libra i. Datur pro uiribus ut dictum est. Porro alterū exemplū sic scriptū habebat. Piperis quadratē, succi cyrenaiici unc. i. succi papaueris unc. dimidiā, succi Syriaci unc. dimidiā, seminis hyoscyami albi, malorū mandragoræ utriusq; drach. ii. cardamomi unc. i. Mellis Attici lib. i. Datur pro uiribus, ut dictum est.

De Orthopnoea.

Cap. vi



Vi citra febrē dense respirāt, qualiter faciūt qui uelociter cucurrerūt, ab accessione hac Medicis Græcis asthmatici, Latīnis anhelosi appellantur. Eosdē etiā ab alia accessione orthopnoicos uocant, propterea quod thoracis corpus penitus rectū habere cogitur, ob timorē suffocationis. Quin et stratū circa supernas partes ad quas thorax reclinatur, sibi ipsis erectus faciūt, ne dormiētes strangulentur. Minus est enim quod inspirāt, quam pro usu respiratiōnis, quāuis thorax plurimū ipsis dilatetur. Ex quo manifestū sit, intrinsecus ipsis coarctationē locorū factā esse præter naturā, quam etiam agri ipsi non obscuro sensu perceptant. Fit equidē & suppuratis locorū coarctatio, ob coaceruatū inter thoracē & pulmonē humorē. Fit etiā peripneumoniacis, ob pulmonis inflammationē. Restant autē adhuc duæ affectiones, quæ locorū coarctationem efficiūt in uijs, per quas aer inspiratur, Quū sanē aut humorū crassum a cūscosorum multitudo pulmonis bronchijs fuerit infarcta, aut tumor abscessui similis in ipso cōstitierit. Cæterum curatio ambarū affectionum aliquid cōmune habet, aliquid priuātū & alteri tantū propriū. Cōmune quidē utriusq; est, ut redundantia humoris affectiones generantis expendatur & consumatur.

Proprium autem affectioni uiscosorū ac crassorū humorum, ut per attenuantia & extergentia pharmaca consumantur. ei uero quæ propter tumorem abscessus similem cōtingit, ut per attenuantia & resiccantia eadem consumptio fiat. quæ curatio rursus omnibus in profundo corporis abscessibus communis existit. Vini itaq; potus ambabus conuenit tenuis substantia. Omnis autē potus modicus sit in his qui alicubi abscessum habent. Multus cōtra, in his quibus bronchia uiscosas ac crassis humoribus sunt obturata. Etenim pharmaca quæ eiusmodi humores repurgant, necessariō quidem tussis mouent, non uero facile per sputum reijcitur quod expurgatū est, ob crassitudinem uidelicet. Quapropter humectatio ne multa opus habent, quo facile efferatur. Porro quemadmodum in alijs pharmacis plurimi medici, sic etiā in his quæ ad ambas has affectiones cōmoda sunt, delinquant, indiscriminatim ipsa tradentes, quum tamen cōposita sint quædam pharmaca alteri affectioni commoda, quædam rursus alteri, quædam uero sic ut ad ambas quidem moderate conueniant, uerum nihil operæpretium efficiant. Quare recensendo pharmaca alicuius pretij à prioribus medicis prodita, indicabo iuxta singula qualī facultate prædita sunt. Inio ab his quæ Asclepiades scripsit in II. interiorum, facio.

Asclepiades pharmaca ad dyspnoicos conscripta.

E Clegma ad dyspnoicos, Antonij Musæ. Asellorum sub hydryis nascētium sextariū I. in uas scibile conijcito, & ad prunas torreto, in albaros autem terito, ac melle cocto excipito, & ante cibum mystrum delingendum dato.

Aliud, Scillæ crudæ succū exprimito, eiq; parē mellis Attici mensuram addito, & ad prunas admota coquito. Dato inde ante & post cibū mystri mensurā. Aliud Charixenis. Origani drach. VIII. comæ thymi, iridis Illyricæ, calaminthæ siccæ, piperis albi, anisi torrefacti, singulorum tantundē. tundito & per angustissimum cribrum concernito, ac melle cocto excipito. Dato nucis ponticæ magnitudinem. Aliud. Piperis albi lib. I. rutæ trientem, calaminthæ siccæ, anisi tostī, pulegij semen nō gerentis, singulorū quadrātem. seminis apij, comæ thymi, utriusq; unciam unam. excipe melle, & præparato utere ut prædictum est.

Potio ad dyspnoicos, Charidis. pharmacū accōmodatū, auxiliatur cōflectim. Vuæ passæ Rhodiæ exacinata a cetabulum. fœni græci loti tantundē. aquæ pluuiæ sextariū I. Coquito donec dissoluatur, & liquorē excolatū reponito. Ex hoc præbeto assidue & iuxta singulas irritationes, cyathi mensuram calefactam.

Alia potio. Abrotoni partes II. vuæ passæ pinguis tantūdem, summitatum rutæ partē I. aquæ pluuiæ sextariōs III. Coquito ad tertias, & exprimito liquorem, eiq; mellis unc. I. addito, rursusq; coquito ac dato ut prædictum est.

Catapotium dyspnoicis, asthmaticis. Abrotoni, uirgultorū rutæ, comæ absinthij, singulorū drach. III. trusa & cribrata aceto subigito, & cataporia XII. formato. Dato ex aceto mulso. Aliud Nicerati. Castorij, ammoniaci thymiamatis, abrotoni, singulorū sextantem. absinthij, cumini Aethiopici, utriusq; drach. I. aceto subigito, ac cataporia formato, ac dato ad ciceris magnitudinem.

Pharmacum ex sulphure uiuo dyspnoicis. Anisi, sulphuris uiui, utriusque quadrantē. ammoniaci thymiamatis, castorij, melanthij singulorum drach. III. Aqua diluta in cataporia cogito, unumq; in aceto mulsi cyath. III. dato.

Aliud. Seminis rutæ syluestris drach. III. aristolochiæ, abrotoni, absinthij, ammoniaci thymiamatis, sulphuris uiui, singulorum tantūdem. Aceto subigito & cataporia ciceris magnitudinis formato, ex quibus duo cum aceti mulsi calidi cyathis tribus exhibeto.

Hæc omnia pharmaca ab Asclepiade conscripta, his qui proprie dyspnoici, hoc est, agere spirantes appellantur, conueniunt. Vocant

Vocant autem sic eos quibus bronchia pulmonis crassis & viscosis humoribus sunt obfarcita, in quibus uelut dixi, ultra hoc quod crassitudinem & viscositatem humorum necessariò secamus atq; attenuamus, humiditatem quandã cum phar macis, cum uictui adesse oportet. At uero abscessus qui attenuantibus & resic cantibus opus habet, maxime gaudent aromatũ facultatibus, quas omnes osten dimus tenuiũ partium esse, & resiccatorias, unã cum hoc quod calfaciant. quare his qui propriè orthopnoici & asthmatici appellantur, pharmaca cõuenient ser cantia citra calfactionẽ. & ob id maxime eos iuuat acetum scilliticum appellatũ, atq; ipsa adeo scilla, & acetum mulsũ ex eiusmodi aceto confectum. Ceterum a fellorum sub hydijs nascentium meminit inter ea, ut qui attenuatoriam & dis scussoriam uim habeant. Verum quo consilio ad usum ipsorum peruenerit, non habeo quod dicam. Quemadmodum autem in hac affectione uehemẽter cauendum est ne calfaciamus, propterea quod uiscosi & crassi humores non solum ni hil ab his auxilij sentiunt, sed etiã offenduntur: Eodem modo etiã quæ ualde refrigerant uitanda sunt. Omnia enim crassesciunt, & cogunt, ac coagmen tant humores. eosq; ægre eluibiles reddunt: & ob hanc rem sanè recte fecerunt, qui eiusmodi pharmaca composuerunt, quod neque papaueris succum, neque mandragoræ succum, aut radicis corticem, aut byoscyami semen, aut cicuta, aut psyllij, aut semen lini ammiscuerunt. Ex multo magis quod neq; ex adstringenti bus quippiã pharmacis addiderunt. Maxime enim contraria sunt eiusmodi affe ctionibus, ut palam uidetis.

Quæ pharmaca Andromachus ad huiuscemodi affectiones conscripsit.

AD dyspnœam. Sulpuris uiui drach. I. seminis rutæ syluestris drach. I. aristolochiæ, absinthij, ammoniaci thymiamatis, abrotoni, singulorũ drach. III. Trita cum aceto ad catapotia magnitudinẽ fabæ redige. Dato mane tria & uesperti totidem. Aliud ad dyspnœam, ut Alcimus. Colocynthis carnis obolos III. panacis obol. III. anisi obolum I. fac cum aqua catapotia III. & resicca torũ obol. I. præbeto. Præcedente aut die æger simplici euacuatorio euacuetur.

Aliud. Colocynthis sesquidrachmam. iridis Illyricæ drach. II. radicis opo panacis drach. II. abrotoni drach. I. nitri drach. I. alijs obol. III. excipe aqua & redige ad fabæ magnitudinẽ. Dantur catapotia III. & post semihoræ spatium, da tur aquæ mulsæ hemina dimidia.

Aliud. Sinapis drach. I. salis cõmunis obol. III. elaterij obol. III. alijs obol. I. & dimidia. Terito cũ aqua, fac pastillos VIII. Dato alternis diebus cũ hydromelite.

Aliud. Ammoniaci thymiamatis drach. I. abrotoni drach. II. sulphuris uiui drach. I. formato cũ aqua pastillos, & cũ aquæ mulsæ cyathis tribus præbeto.

Aliud ad orthopnoicos. Elaterij obol. dimidia, a fellis ex sterquilinijs III. terito simul, & dimidia ex aquæ cyatho uno dato.

Aliud ut Philinus ad anhelos & dyspnœã. Cardamomi drach. III. iridis sesquidrach. panacis sesquidrach. cassiæ sesquidrachmam. struthij sesqui drach. styra cis drach. II. thymi drach. VII. seminis rutæ syluestris drach. VIII. abro toni drach. VIII. aristolochiæ clematidis, sulphuris uiui, ammoniaci thymiamatis singulorum drach. VIII. cum acri aceto ad cerati crassitudinẽ redige, præ be fabæ Aegyptiæ magnitudinẽ ex aquæ cyath. III.

Ad orthopnoeas, ut Apollonius. Scyllæ partem unam, sulphuris uiui, bituminis, singulorũ par tem unã. Dantur oboli tres in aceto mulso.

Ad orthopnoeam, Socratis. Opopanacis drach. I. myrrhæ drach. I. piperis grana XL. rutæ fasciculum quan tus duobus digitis apprehendi potest, ex tritis catapotia XX. formato, dato mane itemq; uesperti unum, febricitantibus in aquæ cyathis duobus, alijs ex uino.

Ad orthopnoceam, Andronici. sulphuris uiui obol. iiii. ammoniaci thymiamatis drach. i. anisi, myrrhæ, castorei, singulorū drach. i. cumini Aethiopici drach. i. cum aqua pastillos cogito, scrupulorum trium aut quatuor. Dato ad noctem ex aquæ cyathis duobus.

Ad orthopnoicos, tussientes, peripneumonicos, tabescentes, ægre spirantes, hepaticos, Vt Eugenius. Croci, drach. viii. misios drach. iiii. baccarū lauri drach. ii. piperis albi & lōgi utriusq; drach. i. opij drach. iii. costi obol. iii. terebinthinæ obol. v. galbani obol. iiii. succi radicis dulcis obol. ii. gūmi obol. i. mellis lib. dimidiā. Dato cochleariū i. cū aquæ cyath. duobus aut tribus. Si res urgeat ante & post cibū.

Ad orthopnoicos, Valentis. Opopanacis drach. ii. carnis colocynthidis drach. i. Tannum datur ad summum.

Aliud Onetri. Castorei drach. i. ammoniaci thymiamatis drach. ii. Deī dimidiū ex aqua mulsā.

Ad dyspnoeā, Podanithæ. Sinapis drach. i. salis drach. i. ni tri obol. iiii. Redigito in catapoda viii. Dato ex his duo ad noctē alternis diebus.

Finis septimi libri.

CAPITA OCTAVI LIBRI

De pharmacis stomacho congruis.

Caput i.

Confectiones stomachicæ Andromachi.

Cap. ii.

Stomachica pharmaca ab Asclepiade in primo interiorū cōscripta.

Cap. iii.

Quæ Archigenes in primo pharmacorū secundum genus prodidit, de affectionibus circa stomachum.

Cap. iiii.

De pharmacis quæ foris secus orī uentris imponuntur.

Cap. v.

De hepate & eius affectionibus.

Cap. vi.

Quæ pharmaca ad hepaticos ab Andromacho sunt conscripta.

Cap. vii.

Confectiones hepaticæ ab Asclepiade conscriptæ.

Cap. viii.

Quæ Archigenes ad Hepaticos in secundo pharmacorū secundum genus scripsit.

Cap. ix.

Malagmata à Damocrate conscripta ad hepar & præcordia, Quædam ex eis & ad totum uentrem & splenem.

Cap. x.

CLAVDII GALENI PERGAMENI

DE COMPOSITIONE PHARMACORVM SECVNDVM

locos Liber viii. Iano Cornario Medico interprete.

De pharmacis stomacho congruis.

Cap. i.



VOD semper dico, etiam nunc proloquar, Nimirū persuasum me habere, quod difficilissimum sit ad ueritatem reuocare eos qui secū alicuius seruituti se addixerunt. Verum qui prudentes sunt, simulq; ueritatē sincere amāt, eos spero curiositudo esse ea quæ ueluti iudicandi instrumenta nobis à natura data sunt, ad actionū uitæ cognitionem, Experientiam dico, & rationem, quæ quidē utraq; ex æquo quibusdam cōferunt ad artem, quibusdam uero alterū altero am-

plius: & tamen tanquā semper ad perfectionē alterū altero opus habeat. Sic fac ne ad residuū sermonis, & doctrinæ huius ab soluendū progrediar. Falsæ etenim opiniones animas hominum præoccupantes, non solum surdos, sed & cæcos faciunt, ita ut uidere nequeant quæ alijs cōspicue apparent. Quod ipsum uel maxime circa affectiones oris uentris uidere cōtingit, præsertim quum fuerit inflam-

matum

matū. Eius enim itemq; iocineris inflammationes, adstringētium cōplexu opus habent. Si namq; per laxatorū medicationis ductum, citra amixtionem facultatis robur addentis, curentur, periculum incurrunt de ipsa uita. atq; hoc ipsum quum omnes Empirici medici per experientiā edocti sint, & omnes dogmatici in artis operibus obseruent, Non pauci tamen huius temporis Methodici: neq; enim de omnibus dico, innumeros quidē stomachicos ipsi in animi deliquiū inducunt, omnes uero hepaticos occidunt: nullum enim ego uidi seruatum ex his qui in eiusmodi medicum inciderunt. Quidam tamen ex ipsis quanquā pauci, oleo eos fouent in quo absinthij coma est seruata, & lanam nardino ungento imbutam obligant. Quidam uero etiā mastichen chīam, aur aloen ammiscēt, aut etiā pro nardino melinū adhibent. In diuinitibus uero mulierculis foliatum & spicatū ab eisdem appellata ungenta admovent, atq; quum hæc faciunt, laxa- toriū ductū se seruare putant. Tantū scilicet habent experimenti facultatis phar- macorum. Malim autem ego omnes sic indoctos esse, quā quod adstringētia quæ sint sciant, usum tamen ipsorum uident. Quæcunq; igitur adstringentia in fomenta & cataplasmata misceantur, in hepatis aut oris uētris, quod sanē & sto- machum uocant, affectionibus, non est præsentis sermonis explicare. Quæ cūq; uero in emplastra & ceratiformia medicamēta, quæ forinsecus imponūtur, com- moda sunt, & quæcūq; utiliter deuorantur, hæc ipsa indicabo, ea quæ inflamma- tis pro sunt primū tradendo quandoquidē etiā in ipsis ægri maxime periclitantē. Ceraū igitur quo assidue uor, ex aloe, & mastiche, & cera pontica amara, atq; ungento nardino cōstat. Cōponitur autem hyeme, ad VIII. drachmas cere, uncia una mensurali Romana ungenti nardini cōiecta: Aestate autem ad VII. ead- dem ungenti proportionē. Optimū autem ungentū esse oportet, quale antea quid- dem in sola Laodicea Asiæ præparabatur. Nunc uero etiā in alijs multis Asia- nis urbibus cōponitur. Cera si nō pontica amara tibi in promptu sit, aliam pon- ticam conijce, & neq; illa præsentē, eam quæ Tyrrhenica appellatur. Si uero ne- que hæc adsit, aliam aliquā odoratā & pinguem, si neq; ralem habeas, eam quam habere potes lotam adde. Liquefiat autē in duplici uase, atq; ita refrigeratum & erasum ceratum, cum tritis reliquis probe permisce, cum aloe uidelicet & masti- che. Sit autem utriusq; drach. i. & quandoq; plus, nō tamen ut sesquidrachmam transgrediaris. Quod si ampliori opus sit adstrictione, nimirum debilitate tanta existēte, ut cibū retinere non possint, omphaciū pari pondere addatur, ut trium singulorum drachma sit una, aloes una, mastiches una, & tertia omphaciū. Cæter- um in cerati præparatione primum omphaciū misceatur, deinde etiā alia his uniantur. At uero quemadmodū omphaciū, sic etiā absinthij succū ammiscēo, quādoq; etiā ambo, & tertiū insuper hypocythidis, & quartū cenanthes. Sic autem appello uirium syluestriū germen unā cum floribus, ex quo succedētibus diebus uia fit. Quin & Rhōis succū non raro ammiscui. Sed & cerati nardini co- piam augere oportet, iuxta proportionē numeri reliquorū pharmacorū, ita ut si quatuor drachmæ aliarū rerū accumulētur, triens sit nardini cerati, sextās quidē cere, sextās itē nardini ungenti, hoc est utriusq; drachmæ XVI. Porro si inuete- rata fuerit inflammatiō, & iam obdurata, magis uaria pharmaca adhibere oportet, & quæ ex aromaticis quippiam habeant, ac mollientibus, & discussorijs. Quale est quod fit ex meliloto. Est autē cōpositio ipsius multiformis, propterea quod omnibus iuxta præcordia inflammati conuenit, non magnis adeo differētijs eua- rians. Ita ut aliqua ipsius præparatiō inflammati hepatis sit cōmodior, alia stoma- cho, aut aluo, aut spleni, aut quibusdam istius loci musculis, quæ omnes cōmuni descriptione cōprehensæ sunt in malagmatum compositionibus. Verū in præ-

senti loco ea quæ prioribus medicis ad omnes stomachi affectiones scripta sunt, & non solum forinsecus imposita, sed etiam in potu accepta auxiliantur, omnia conscribentur. Quædã uero ex ipsis communia sunt etiam affectionibus uentris.

Sæpenumero iam dictum est, quod medici in more habent os uentris, ueluti cardiacum, hoc est, cor; sic etiam stomachum appellare. Verum quondam frequentior cardiacæ appellatio erat, Nunc autem ab ea adhuc restant, cardioossin, & cardiacalgiæ, quibus uocibus non cordis, sed oris uentris dolores significantur. Particulam autem ipsam stomachum uocant æquiuoce cum illa particula quæ cibum ex ore in ipsam deferret. Scripserunt igitur priores medici pharmaca ad affectiones in ipso, cum alias, tum subuersiones ab ipsis appellatas. Videntur autem sic uocare tum appetitus perditionem, tum nauoseas dispositiones, in quibus aliquando quidem uomitus contingunt. Fiunt autem & morsus quidam in ipso, quemadmodum etiam magnæ famis & anxiosæ affectiones. In quibus omnibus communis quidam adstringentium pharmacorum usus inuentus est. Ammixta autem sunt plerisque ipsorum calfacientia & resiccantia. Fiunt & aliæ affectiones rariores, humectantibus, aut refrigerantibus aut utrisque simul opus habentes. Cæterum qui ab experientia citra rationalem methodum, auxilia inueniunt, merito ea quæ sæpe inuerunt in memoriam reuocant, & in usum conuertunt. Eorum enim quæ sæpe eodem modo facere uisa sunt, obseruationem & memoriam, suam ipsorum experientiam esse aiunt. Quemadmodum autem in ore uentris, sic etiam circa ipsum totum, singulaque intestina, & ut comprehensim dicam, circa omnem corporis partem, eadem intemperaturæ obortæ, actiones similium partium offendunt, quas si quis non esse morbos ipsarum credet, nihil circa cognitionem efficiet, quæ ignorata neque curationem inueniet. Habent autem non modicam coniecturam cognitiones ipsæ affectuum in profundo corporis consistentium, & ob id utilissima medicæ artis pars est quæ cognitionem docet eiusmodi affectionum, quas neque quod primæ & maximæ sunt, plerique ex uulgo medici sciunt. Quare merito neque cognitionem ipsarum, neque curationem inuestigant. Coguntur igitur etiam si dogmatici sint in rationalibus methodis, ad solam experientiam peruenire; ut si sit miremur quod quæ absque febre & inflammatione, abscessusque & ulceratione, quispiam debilitate concoquat, aut penitus non concoquat, promissione facta se inuenturos curationem, quærant an contritione ciborum concoctio fiat: & deinde ubi hoc ut maximum inuenerint, edulia quæ facile coterantur exhibent, neque quod promptissimum est intelligentes, quod etiam quispiam rei medicæ rudis, alias autem prudens uir me interrogauit, Quomodo prodest scire per contritionem ciborum fieri concoctionem, ad hoc ut quis affectionem uentris sanet, in qua debilitatur ad concoctionem ciborum, quum non per exhibitionem alimentorum quæ facile conterantur curatio fiat, sed læsio tantum euitetur, uelut etiam per paucum alimentum ac inediam. Quemadmodum enim qui inediam perfert, in concoctionis quidem debilitate non incurrit, non tamen ab affectione hoc modo curatur. Sic neque qui in cibo accipit ea quæ in totum nulla contritione opus habent, Quale est lac, pituita succus, & sorbitiones ex alica. Hæc quidem igitur in libris de curandi methodo sufficienter tradita sunt. & non obscurum est præsentem doctrinam utilem esse his qui se in illis præexercuerunt. Quemadmodum autem in alijs quæ prius tradidi, reuocatis in memoriam singulis de illis mihi præmonstratis capitulis, ad pharmacorum compositionem progressus sum; Sic etiam nunc factam.

Quum octo sint in singulis partibus corporis intemperaturæ, atque hæc omnes aut circa solas nudas qualitates, aut cum alicuius humoris complexu fiant; Intemperantiam quidem siccam humedate oportet, Humidam autem siccare; sic & calidam refrigerare

refrigerare, frigidam calfacere. Similiter uero etiam compositas intemperaturas; aut calfacere & siccare, aut humectare & calfacere, aut refrigerare & humectare, aut siccare & refrigerare oportet. Quando uero ueluti dixi, plurimæ intemperaturæ hominibus ex redundantia humorum, magis quàm ex inopia fiunt, phar-
maca resiccantia plerisque magis iuuant. At uero quæ resiccantia partim quidem adstringant, cogendo ac adstringendo substantiam eorum quæ coniungunt, par-
tim uero discutiant & in hoc substantiam ipsorum dissoluant, ob hoc ipsum sanè plures sunt qui adstringentibus indigent. Verum si humida intemperies cum fri-
gidity fiat, læduntur qui per sola adstringentia curantur quæ frigidæ facultatis existunt. Quapropter merito plurima pharmaca per experientiam inuenta, ex
mixta materia cõponuntur, adstringente uidelicet & calfaciente. Verùm ipsorum
differentiã cognosces, si simplicium pharmacorũ facultatem memoria tenueris.
Dictum enim mihi tam sæpe est, Neminem posse rationabiliter & secundũ me-
thodum uti his quæ in hoc opere conscripta sunt, si non memoria teneat quæ in
duobus operibus ante hoc opus editis prodita sunt, de simplicium pharmacorum
facultate, & curandi methodo dico. Quidam enim absq; discrimine pharmaca
ad eiusmodi affectiones stomachi & uentris conscripserũt. Quidam uero aliqua
discrimina attigerunt ab accessionibus omnibus apparẽtibus. Quo igitur & uos
cognoscere sciatis facultates uniuscuiusq; pharmaci per experientiam approba-
ti, etiam si non inueneritis differentias affectionum in quibus conueniunt adscri-
ptas; primum quidem ea quæ Andromachus prodidit adscribam. Deinde quæ
Asclepiades, & post hæc si ita uidebitur etiam alia quædam.

Confectiones Stomachicæ Andromachi.

Cap. II.



Andromachus postq; præscripsit, Stomachicæ, post hanc præscriptio-
nem, sic auspicatur. Ad Stomachicos hiera quæ uitor, & deinceps to-
tam eius compositionẽ adscribit in hunc modum. Floris iunci odora-
ti, xylobalsami, mastiches, croci, nardi Indicæ, asari, cinamomi, singulo-
rũ drach. ʒ. Laues lotę drach. c. simul trita reponē, præbe iesunis cochlearia duo,
aliq; uinum præbent cum aqua frigide cyathis. iiii. Hæc quidẽ Andromachus
scripsit, neq; quos stomachicos nominet ostendens ac declarans, neq; an omni-
bus ipsis hoc pharmacũ conueniat, an pluribus. Itaq; mihi necessarium est dicere,
quom ex his qui stomachici dicuntur aliqui quidẽ statim magnopere ex prædi-
ctæ hieræ usu iuuantur; aliqui uero lædantur. Pleriq; equidem uulgo homines eos
qui appetentiã perdiderunt ita uocant, & quibus post acceptũ cibum uentris os
grauatur, & quandã ægre tolerabilem anxietatẽ habet. Appellant eodem modo
etiam illos quibus nausea cõtingit, & maxime si ad uomitum impellat, & adhuc
magis si simul cibi corrũpantur, quandoq; acidi, quãdoq; nidorosi facti, quandoq;
etiam aliam uitiatã qualitatem adepti. Et præ his omnibus adhuc magis illos stoma-
chicos nominat, quibus ructus eiusmodi, cũ molestia quadã, & anxietate ac sub-
uersione contingunt, sæpe quom nondũ cibum acceperunt. Quin etiã si per plu-
rimum tempus cibi in ore uentris morientur, grauantes & uix descendentes, hos
iudẽ stomachicos appellant. Alios item appetitũ caninũ appellatũ habẽtes, ut &
plurima edant, & maxime grauati paulo post reuomant; similiter uocant. Alios
rursus qui fortiter exoluuntur, ubi diutius inediã pertulerint, & si nõ citius cibum
accipiant, in ore uentris morsus percipiunt, eodẽ modo stomachicos uocant. Ho-
rum ipsorum uero aliqui facile nauseosi fiũt, si citius potum ac cibum acceptenti.
Itaq; qui secundũ rationalem methodũ auxilia inuestigat, ad affectionis inquisi-
tionem procedit, qua inuenta, abundaturũ se sperat proprijs ipsi auxilijs. Qui ue-
rò per solam experientiam auxilia accumulãt, ipse suam fortuitam occasionem
expectat

expectat, & à prioribus tradita relegit. Quò uero plurima ab ipsis indiscriminatim prodita sint, & in plerisque etiam inter se differant ac dissentiant, merito etiam ipse alias aliud sentit, maxime ubi ab ipsis auxilijs aliquando quidem iuuari stomachicos uidet, aliquando uero lædi. Quemadmodum in proposita hiera cõtin gere solet. Quam equidem omnes qui nunc Romæ medicantur, picram, hoc est amarain nominant, quando quidem hieræ appellatio, pharmaco ex colocynthide rite ab ipsis indita esse uidetur. Verù qui ante nos Romæ medicinã exerceuerunt, ambo ea pharmaca hieras appellarunt, & distinctionis gratia alteri ex colocynthide, alteri ex aloë, appositione addiderunt, Sic scribentes. Hieræ ex colocynthide. Hieræ ex aloë.

Hieræ itaq; ex aloë dupliciter præparatur, ab aliquibus uelut Andromachus describit, ad ceterum aloës drachmas, singulorũ aliorum drachmis sex ammixtis, ab aliquibus uero nõ sex sed octio, Quidam uero in LXXX aloës drachmas, sex aliorũ addũt. Plurimi aut ad pharmaca quæ aloë miscentur, & sex numero sunt, etiam florem iunci odorati apponunt. At uero ipsam aloë Andromachus quidam lotam, Alii uero ex alijs etiam sic, aliqui uero illotam adiiciũt. Verum nosse operapretium est, ad uentris subductionem illotam aloë apriorem esse, multum uero de medicamentaria uĩ deponere lotam, quam etiã febricitantibus dare aliquis audeat, si non uehemens, sed ualde debilis sit febris. Quidam uero etiã ex illota aloë pharmacum multis sic febricitantibus exhibuerunt, deindeq; quũ nihil mani festè læsissent, in alijs rursus magnam experti sunt cladẽ. Inestilissima est enim aloë, etiam lota, his qui citra uisatos humores ex intemperie calida & sic ea affliguntur. Proximam ab his cladem percipiunt, qui siccam intemperiem habent frigiditate implicatam. Et in uniuersum qui ex sola qualitate particulam aliquam affectã ac læsam habent. Etenim in humoribus intemperatura, pharmacis ipsas euacuãtib; egent, Quæ uero absq; his cõsistunt, penitus in tabem deueniunt ex pharmaci huius ex aloë constantis usu. Itaq; ubi humiditas uitiosa tunicas uentris peririgat, Hieræ ex aloë utilis est, expurgans humiditatem. Omni no autem sic affectus accessio nausæ plus aut minus adest. Euacuatio igitur affligentis humoris per solam aloë contingit, quæ purgatoriã uim non fortem habet, sed ut ea quæ circa aluum sunt, quæ etiam contingit, purgare possit. Et si aliquando ampliori pondere exhibeatur, usque ad locos circa hepar conscendit. Non tamen totius corporis purgatoriã aloë existit. Cæterum ex his quæ ei ammiscuntur, Mastiche ut stomacho commoda & odora, & quæ medicamentariam aloës uim frangere quæat, ammiscuntur. Cinamomum uero eadem gratia, & præterea quod tenuissimarũ partũ est, ut aperire uentris meatus possit, extergereq; ac attenuare si quid uiscosum aut crassum in humoribus ferat. Crassos enim humores ob purgatoriæ facultatis imbecillitatem, aloë trahere nõ potest. Quapropter biliosarum uentris affectionum optimum pharmacum est, adeò ut in uno die sæpe multos stomachicos creditos persanet. Iuuat autem & hos & alios omnes affectus ex uitiosis humoribus ortos cinamomum ammixtum, utpote quod alterantem habet facultatem uisiosarum qualitatum in id quod secundũ naturam habet. Quare scire oportet affectiones in humoribus uitiosis circa uentrẽ & stomachum, maxime per medicamenta ex aloë iuuari, in maximum uero detrimentum peruenire ex adstringentib; eduliorũ, potuum, ac pharmacorũ usu. Quemmodũ uice uersa, in quibus humiditas multa, & uelut maior quispiam est circa affectã partem, citra uisatos humores, qui ipse sola quantitate & copã affligat, & uelut irriguum uentris os reddat, Vtilissimus adstringentium eduliorum, potuum ac pharmacorum usus existit, languida nimirum & exoluta tunc reddita affecta

affecta particula ad modum laxatorum articuloꝝ. In quibus ipsis etiam adstringentium usus corrigit affectionem. Cæterum picra confectio (de hac enim nobis sermo est) uelut cinamomū, sic etiam alia partim ut stomacho commoda, partim ut sensum partium & extergentia assumit, quæ robore quidem multam à cinamomō deficiunt, idem uero facultatis genus habent.

Secundam à præscripta compositione Andromachus sic ad uerbum tradidit: ut Lampo Pelusiorum. Cinamomi, calami aromatici, cassiæ nigre, xylobalsami, floris iuncis odorati, palmæ elates, singulorum quadrantem, alij unc. i. Omnia in crassas partes tusa in ollam nouam conijce, & aquæ pluuiæ sextarijs tribus infusis, donec dimidium supersit coque, & excola, & accepta aloes Indiæ librâ unâ, aquam pluuiam sufficientem superfundito, & sub caniculæ æstus donec resicceatur terito. atq; ubi primū per hanc aquā aloem ipsam edulcaris, postea eam quæ ab aromatis excolata est aquam affundito, & in sole donec resicceatur terito, indeq; trita hæc quæ sequuntur ammisceto. Croci, myrrhæ, mastiches, singulorum quadrantem, alij unc. i. Conterito simul omnia & sicca reponito, atq; in potionibus ad conuulsa, rupta, plagas internarū partium, incipientes laterū dolores uiror. Item ad inflatos, dolentes stomachum, tarde concoquentes, reiectantes sanguinem, & ischiadicos. Datur ad summū obolus unus, aut duo, ex aquæ cyatho uno. Reliquis pro uiribus præbeto. In uulneribus & inflammationibus discurum aceto mullō imponitur. In oculorum inflammationibus succo mentæ, aut calaminthæ, aut solani, aut alicuius cōsimilis. In podicis inflammationibus cum rosaceo aut uino Aminæo. Vtere etiam in unguinū abscessibus, paronychijs. Græci uocant, siccō, superne linamento cum rosaceo imposito. Et ad sanguinis eruptiones siccum cum aceto, & ad crustas in ore ex passio, gargarisandum dato.

Hoc pharmacum quod Pelusiorum Lamponis esse ait, ad multas affectiones commodū est, polychresta ob id talia Græci appellant, de quibus etiam antè aliquid dictum est, quod uidelicet deficiant ab his quæ unum quoddam optime faciunt ob multitudinem eorum quæ promittunt. Apparantur autem quum unum habere uiginti affectionibus congruum malum, quàm tot numero alia, quum tamen ad singulas affectiones unum aliquod destinatum, eo quod ad plures paratum est, melius existat. Facultas autem ipsius per quam in prædictis efficax est, remuium partium existit & calfactoria, secans, extergens & aperiens, & ob id dissolutoria, redundantium in quibusdam partibus serosorum succorū ac humorū. Et propterea etiam prædictis in sermone affectibus conuenit, discutiens ut dixi, uitiosos & serosos succos ac humores affectarū partium. Quare etiam prædictas alui affectiones, in quibus picra cōfectio moderatam purgationem operatur, curauerit per modicam resiccationem, non per coaceruatam euacuationem. Præstantior igitur est ad huiusmodi affectus picra compositio prima descripta.

Tertium post prædicta pharmacum Andromachus sic descripsit. Ad stomachicos & coeliacos pastillus amarus, mollit aluum. Facit ad somnū. Est autem ex libris Aphrodie. Facit & ad uesicæ, et colicæ affectus. Seminis apij drach. vi. anisidrach. vi. pipēris albi sesquidrachmam, castorei drach. ii. myrrhæ sesquidrachmam, nardi celticæ floris sesquidrachmam, opij sesquidrachmam, cinamomi sesquidrachmam, comæ absinthij drach. iii. aloes obol. iii. mastiches drach. i. cū aqua pastillos formato triobolares aut drachmales & dato cum aquæ cyathis tribus. Neq; in hoc pharmaco descripsit Andromachus, quos nam stomachicos dicat, & quid patiantur. Verum ex eo quod compositioni additum est opium, manifestum sit compositionem huius pharmaci intentionē suam eo direxisse, ut resicatorium simul & doloris sedatorium pharmacū efficeret, somnumq; aliquem in-

duceret, non tamen contentiose cōtra unam aliquam ex prædictis affectionibus instando, quouidelicet breui ipsam excinderet. Quartum deinde pharmacum Andromachus scripsit, neq; ad unam aliquam affectionem cōtentiose compositum, neq; ad multas moderate. Habet descriptio hoc modo. Ad stomachicos hiera Antipatri. Aloes bonæ drach. iiii. mastiches drach. ii. asari drach. iiii. rosarū siccaram, iunci odorati, Mei, phu, cassiæ, singulorū semiunciam. Vtere arido trito quemadmodū alijs.

Quintum post hæc pharmacū, quod ex plantaginis succo præparatur, & ipsum Apollonij esse ait, tale est. Succu plantaginis aridi drach. iiii. mastiches drach. ii. myrrhæ drach. i. mētæ drach. i. zingiberis drach. i. Videtur mihi Apollonius hanc cōpositionem experimento cognouisse, in stomacho calidiorem affectionem habente, atq; ita ipsam indidicriminatim extulisse non potentem frigidis affectionibus conuenire. Refrigeratorium enim est plantaginis succus. Porro quæ sequitur uidetur mihi composita esse ab eodem autore, in prioris usu successum nō sentiente. & recognoscēte pharmacū refrigeratorium se effecisse, & ob id castorij modicū, & aloes quippiam apponente quæ euacuare potest, & mastichen ut stomacho cōmodam, ac crocum & myrrham, ut quæ concoquere queant. Quapropter neq; hoc, neq; præcedens pharmacum adhibuerim in stomachica affectione, quū nullam probe curare possint, præterq; satis multum calidā. Scripsit de ea hoc modo. Succu plantaginis siccæ drach. x. aloes Indicæ drach. i. mastiches drach. i. croci obolos ii. opij obolos iiii. castorij obolos iiii. myrrhæ drach. i. formato ad magnitudinem ciceris.

Similiter autem neq; consequenter scriptū citra discrimen, recte quis adhibuerit in alia affectione, quā quæ moderata siccatione & adstrictione opus habeat, in humoribus quidem modicis, qualitate uero uitiatis. Componitur enim ex succino & mastiche, sic ipso Andromacho prodente. Succini, mastiches chiæ. Succini plus conijce. Dato cochlearium unum ex aqua tritum. Cæterū quod sequitur pharmacū, hac descriptione, Stomachica Galli, affectioni quæ calidæ & secari postulat, utilis existit, ex fœniculo, aceto, & melle cōstans, quod ipsum Andromachus his uerbis tradidit. Stomachica Galli. Corticis radicis fœniculi, libræ dimidium. aceti acris sextarium unum, eiusq; dimidium. aloes quadrantē mellis Attici lib. i. Radices lotas ad triduum aceto macerato, deinde coquito, atq; ubi coctæ fuerint expressas projicito, & affuso ad acetum melle simul coquito, deinde aloen inspergito, & cochlearia tria cum aqua dato.

Alcetiussophista ad hanc descriptionem addidit rutæ, & apij, semina gerētium, utriusq; manipulum; iubens cum radicibus macerari ac coqui, Verum aceti sextarios vi. & mellis lib. ii. conijcit, atq; hanc laudat.

Post præscripta pharmaca, Andromachus sic ait. Stomachica ut Nicofratus, Succini, mastiches chiæ puræ, iridis lilyricæ, singulorum trientem. floris rosarū sextantem. Dato aridi triti cochlearia ii. cum aqua lactosa. Statim enim dolorem leuat. Reponatur in corneo uase. Et hoc pharmacum palam est adstringentius quodāmodo esse, optatq; affectionem humidiores in humoribus non multis, neque ualde mordacibus. In quibus sanè experimentum pharmaci secisse eius autorem opinor, aut certe assiduò eius usum ægrum à dolore leuasse, atq; inde uniuersalem pronuntiationem ipsi apposuisse, quod uidelicet statim ægrum dolore leuet, quonon possit id in multis præstare.

Postremum deinceps pharmacum ab Andromacho scriptum hoc modo est. Ad stomachicos. Corticis radicis fœniculi drach. ii. uini cyath. iiii. coquito ad tertias, ut unus cyathus supersit, ac totum præbeto. Et hoc ex calfacientibus est, opusq; habet affectione quæ calidæ exoptat.

Stomachica pharmaca ab Aſclepiade in primo interiorum
conſcripta. Cap. III



Scepiades porro de ſtomachicis ſcripturus, de iſſis ſic ordiſ. Ad ſto-
machi ſubuerſiones. Quas uero ſubuerſiones dicat non manifeſte in-
dicauit. Poſteſt enim et appetitus perditionē ita appellare, poſteſt etiam
nauſeoſas affectiones ab accepto cibo ſientes. Aliquando enim hoc
unum ſolum ſymptoma accedit accepto cibo, ut ſi paulo fortiori motu mouean-
tur, ſtatim uomāt. Appellant igitur aliqui etiā tales ſtomachicos, & ſtomachum
iſſis ſupinum reddi aiunt. Sequitur autē hæc accēſſio quandoq; ad ſolā oris uen-
tris debilitatē, quod cibos amplecti eiſq; obuolui non poſteſt, uelut tota uentris
amplitudo ſolet. Quandoq; uero & cum uitiata alicuius, modicæ tamen humi-
ditatis complexu. Etenim multā quemadmodū etiam ualde uitiata, etiam citra ci-
bum, nauſeā efficit. Cæterū quæ à multis uulgo ſupinitas ſtomachi appellatur,
contingit quidem iuxta intemperiem quācunq; tandē citra uitiatos humores. Fit
etiam per humiditatē, multam quidem, non tamen malignæ qualitatis. Irriguis
enim ſtomachus per largam humectationē, ſimiliter ut ligamenta neruorū laxa-
tur. Facillime itaq; curabilis eſt hæc affectio ex omnibus ſerē alijs, pharmacis indi-
gens, quæ ſiccare humiditatē, & coagmentare & conſtringere laxatum corpus
ualent. Vbi igitur pet profundū fuerit extenta humiditas, craſſa q; ſit & uiſcoſa,
opus eſt mixtura pharmaci attenuatorijs, & ſi ita dicere libeat, petroſiui quale eſt
acetum, & acetū mulſum. Si uero neq; talis ſit humiditas, neq; in altū extenſa, ad-
ſtringētia ſola ſuffecerint ad curationē. Propoſitū igitur in ſermone pharmaci;
non moderatarū ſupinitatū, ſed fortiorū eſt curatiuū; eſſet autē & moderatarum
ſanatiuū, ſi adſtringentia ſola quis miſceret, aut etiam ex calfaciētib; quiſq; ptam;
ſi frigida eſſe affectionē ſentiret. Sufficiens autē ſignum eſt frigida affectionis.
Si ager ſe non ſitire percipiat. Vbi enim neq; ſiticuloſus fuerit, neq; ardorem ſen-
ſent in ore uentris, palam eſt affectionē non calidam eſſe. Idonea itaq; ſunt ad hui-
uſmodi uentris affectus, quatuor pharmaca ab Aſclepiade cōſcripta, quæ etiam
ego nunc ſcribam, iſſus Aſclepiadæ & uerbis & ordine ſeruatis.

Ad ſtomachi ſubuerſiones. Nucleorū malſpūnici tuſorum ſucci ſextarios. iiii.
ſucci mentæ ſexta. i. mellis Antici ſextariū. i. in uas fictile conſicito; ac coquito af-
ſidue agitando, & ubi denſata fuerint, ab igne ablata reponito. Tempore uſus da-
to myſtrum i. aut ii. ante cibum. Aliud, ſa citra dyſentericos, & uomētēs
cibum. Radicis mali cotoneæ libram. i. uini myrtici ſextarios. iiii. coquito ad ter-
tias, deinde exprimito liquorem, & mellis Antici ſeſquilibram addito ruſusq; co-
quito, aſſidue mouendo. Dato ex repoſito uelut dictum eſt. Conſectio ex
fructibus. Facit ad ſtomachi ſubuerſionem, coliacos & dyſentericos. Mala co-
tonea numero. x. ſorba numero quinquaginta, meſpila quinquaginta, Rhois ru-
bi ſextariū. i. aquæ congios. vii. Fructus tuſos & in aquam conſectios diligenter
coquito; & ubi diſſoluti fuerint, liquorem exprimito ac ruſus coquito, eiectō eo
quod ex fructibus inſtar palearū exſuccum reliquū eſt. quum uero tertia pars li-
quoris ſuperſuerit, mellis Antici libras. iiii. addito, & ad pruinās aſſidue agitando
coquito, ac ſpiſſata reponito. Vſus oſtenſus eſt. Aliud pharmacum. Sor-
borum maturorū ſextariū. i. bæcarū myrti nigrarum ſextar. i. Rhois ſyriaci
ſextariū. i. prunorum ſylueſtriū ſexta. i. meſpilorū ſexta. i. phœnicobalanorum
Thebaicorū lib. ii. mala cotonea. x. mala punica integra unā cum nucleis. x. My-
ſti aminici ſextar. xlviij. præpara pro conſuetudine, & expreſſum liquorem ru-
ſus diligenter coque donec ſpiſſetur. Vt re ur dictum eſt.

Porro poſt præſcriptas conſectiones, Quintā ſcripſit Aſclepiades hoc modo.

Catapotia ad stomachi subuersiones, Origenis, bona & ualde probata. Rosarū drach. viii. baccarū myrti nigræ exacinarū acetabulū. seminis hyoscyami acetabuli dimidiū. Terito simul diligēter, sufficēte protropo paulatim instillato, deinde bis palmularū passarū, paratos Græci uocāt, decē numero carnē addito, & ex cōtritis catapotia ciceris magnitudine formato, & iiii. aut iiii. cū aque mulse ueteris diluta cyath. ii. exhibeto. Et hoc pharmacū in iisdem affectionibus cōmodum est, in quibus quatuor præscripta. Voluit aut̃ autor huius pharmaci per seminis hyoscyami mixturā, doloris sedationē & somnū inducere, unā cum resiccatione. Manifestum est autē refrigeratoriū quip̃iam hyoscyami semen habere, uelut etiam papaueris semen habet, quare ad calidos affectus facit.

Simile præscripto pharmacū deinceps proditum ab ipso est, his uerbis. Rosarū recentū defectis unguibus drach. viii. seminis papaueris albi drach. iiii. seminis hyoscyami drach. ii. aloes obol. iii. asari obol. iii. Cum aqua diluta in pilulas redigito, & ciceris magnitudinem præbeto.

Septimum post prædicta pharmacū Asclepiades scripsit appposito discrimine ab accessione palam apparente. Atenim ardori stomachi ipsum conuenire, & propterea suum extinguere testatur, unde etiam ad ipsos Græci appellant, cōpositionem ipsius sic tradens. Ad ardorem stomachi Adipson catapotium sitim exingues.

Seminis cucumeris satiuū drach. viii. seminis portulacæ drach. viii. tragacanthæ drach. iiii. Tragacantham ouorū crudorum recentū candido dissolue, & probe tritis alijs adde, et ex mixtis catapotia forma, eaq̃ in umbra resicca, atq̃ unū sub lingua tenendū præbe, ac liquorē inde solutū deuorare iube. Quin & quod postea sequitur refrigerat ac corroborat stomachū madore prægnantem, & qui humidā ac calidam affectionē habet. Scribit autē de ipso Asclepiades hæc uerba.

Aliud facit ad stomachi subuersionem, maxime cōtinuum est ardorem multum perferētibz, & qui stomacho exuruntur. Foliorum rosarū uiridiū drach. vi. glycyrrhizæ drach. iiii. nardi Indicæ drach. iiii. Excipe uino dulci aut protropo, & redige in catapotia, ex quibus unū sub lingua tenendū præbe, aut ciceris magnitudinē cū frigida aqua dissolue, & in potu exhibe.

Nonum deinceps pharmacū Asclepiades scripsit, hoc modo. Ad singulū & stomachi debilitatem & cibi reiectionē. Reiectio itaq̃ hoc est uomitus, ex genere est Supinitatum. Quādo enim os uentris fortiter afficitur, hoc autem uelut dixi, ob uiosos humores, quos uēter abrumpere conatus, propter debilitatem nauisæ accessionem perpetitur, atq̃ hanc etiam tum ante acceptionem cibū, tum post ingestū cibum, ob extremam debilitatē perfert. Supinitates igitur ex uitia tis humoribus obortas, picra cōsecūo quā celerrime curat, nempe uitiatos humores expurgans. Vomitus uero ob imbecillitatē grauati stomachi oborti, curantur per intemperaturæ correctionē. Non parum sape contingit etiā, non solum stomachū, sed & uentrem ob debilitatem ferre nō posse ciborum onus, atq̃ ideo reijcere aliquando quidē ad infernā partē, ubi illis robustior sit stomachus, aliquādo uero sursum, ob stomachi imbecillitatē, quādo sanē hic debiliior fuerit infernis partibus. Hoc itaq̃ uomitus symptoma unū quidē est, sequitur autē ad affectiones diuersam medelam exigētes. Similiter & singultus, stomacho interdum ob frigiditatē aut repletionem accedit, interdū ob mordacitatem humorū acrim, & medicamentaria qualitate præditorū. Impossibile itaq̃ est pharmacū inuenire omnibus dictis affectionibus aptū. Cæterū quæ deinceps scripsit Asclepiades duo pharmaca, ostensa sunt substantiam habere multū ab humana natura diuersam, quæ ipsa maxime omnū inter reliquas corporis partes stomachus non fert, ob excellentiā sensus qua præditus existit. Magnopere igitur affli-

gitur stomachus etiā ubi ex stomaticis pharmacis quippiā in ipsum fuerit præterlapsum, maxime quæ atramentū sutoriū, aut tale quid in se habet. Quod enim ex fructibus constat, ex comestibili materia cōpositum est. Verum atramentū sutorium contrariæ penitus homini naturæ est. Quemadmodū etiā mandragoras. Fugienda itaq; sunt hæc duo pharmaca ex chrysobalano & radicis mandragoræ cortice cōposita. Apponiam tamen etiā ipsorum cōpositionem. Et prioris quidem descriptio hæc est. Chrysobalani lib. i. mastichis chisæ libræ dimidium corticis radicis mandragoræ quadrantem. Tusa & cribrata excipe mentis succos & redige in catapotia. Da inde oboli. iii. cum aquæ frigidæ cyathis tribus.

Posterioris autē descriptio hæc est. Mastiches chisæ lib. i. corticis radicis mandragoræ sextantem. tusa & cribrata reposito. V. si exigente datō cochleariū insperum aquæ frigidæ cyathis unū. Post præscriptas confessiones, Aesclepiades sic scripsit. Ad uolulosas stomachi subuersiones. Cōiectantē qui spīa ipsū uolulosas appellare fortes. quemadmodū enim in poluulis subuersiones fiunt cū magna cōtentione & uioletia, adeo ut sterqus etiā reuomant. Sic etiā alios uomitus concitatos, quis appellare uolulosos possit. Sequuntur autem huiusmodi uomitus, ubi affectæ partes a medicatis serosis humoribus magnopere fuerint afflictæ: si uero etiā imbecilliores fuerint, duplicatur malū. Erit itaq; ob id curationis scopus, ut simul ad affectas partes odoratas qualitates imponāmus, quales aromati sunt, & quorundam seminū in ciborū usum uenientia, uelut est anisum, apium, daucus, cuminū & fefeli. Iuxta hanc itaq; rationem Hippocrates in pleuriticis purgatiū exhibet medicamentū, misceri aliquid ex his iussit, sic scribens. Si uero sub septo transuerso sit dolor, & ad elauicula non se extendat, mollire uentrem oportet ueratō nigro, aut peplo, ad ueratū quidē daucos, aut fefelide, aut cumino, aut aniso, aut alio quopīa odorato addito. Apparet enim quod in his miscēdis maxime odorē ipsorū respiciat, quo medicamentaria uim, quæ hominī naturæ cōtraria est, mīget & obtundat. Quemadmodū enim graueo lentia omnia stomachū subuere solent, sic odorata corroborare. Si uero ultra hoc etiā in ciborum usum ueniat, multipliciter auxiliantur stomacho ob uicia tos serosos humores subuerso. Atq; iuxta hanc ratiocinationem auctor propositi pharmaci anisum & apium ammiscuit. absinthiū uero propterea quod a natura uim habet extergendi, ac repurgandi, & subducēdi uiciatos stomachi humores, ampliusq; densat & cōstringit ac robur addit parti affectæ. Cinamomū autem addidit, ut quod omnibus fecidis & putredinosiss serosis humoribus se opponat, iuxta utramq; facultatem suam, alteratiuam & discussoriam. Nō paruum enim ex odore suo exhibet utilitatem omnibus malis affectionibus. Opī uero parum pharmaco immiscuit, sensum stomachi hebetare uolens, qua ratione etiā coeliacis ipsum damus, ut quod profundū quēdam soporē inducere possit. Quo uero uehementē opī frigiditatē cōpositor ipse corrigeret, castoriū ipsi a dieci oppositum ferē ipsi in facultate. Eadē ratione etiā pīper ammixtū est. De myrrha uero operæpretium est scire quod in quantū facultas ipsius est concoctoria humorum præter naturam & uitiosorū, in tantū conuenienter ammiscetur. In quantū autem medicamentaria est, non conuenienter. Verum paucitas eius ad cōctionem quippiam confert, qualitatē autem peregrinitas nō apparet, utpote uicta ab odoratis. Ego itaq; hoc pharmacū etiā sine myrrha præparare consueui, ad securitatem perducere semper tentans usum omnium pharmacorum, præsertim ubi in acuta febrī tale quid exhibetur. Quū igitur cinamomum habeat hoc pharmacū, & semina calida urinam cienda, ac pīper, & præterea castorium ac apium, meritō multis affectionibus commodum est, quandoq; cum uīno sto-

Myrrha

macho grato datum, quale protropum est, quandoq; cum myrri baccarum decoctio, uelut in dysentericis, aut cum aceto mulso, uelut in splenicis. In cholera uero & bilis uomitu ac effluxu, cum frigida, uelut Asclepiades scripsit, sed addito discrimine, si sticulosior est nunc quam antea, aut nausæ calidæ sensus circa os uentris ipsi contingat, aut frigidam bibere sanus cōsueuit. Ego sanè hoc medicamentum ad securiorem usum perduxì, myrrhamq; dimisi, & piperis quantitatem auxi. Quum uero plurimum cinamomum accipiat, necessarium nobis est ubi cinamo-
mi carentus, cassiam optimam cōficiamus, aut plus quam duplo cinamomi pondere, aut omnino non minus. Cæterum cōmensuratio ac apponderatio pharmacorum quæ ipsum constituent, ab Asclepiadè his uerbis prodit.

Ad uolulosas stomachi subuersiones passillus Amazonū. Facit ad inflatos, ardorē stomachi, & uomentes cibum. Facit & ad internas affectiones. Seminis apij drach. vi. anisi drach. vi. absinthij drach. iiii. piperis drach. ii. myrrhæ drach. ii. cinamomi drach. v. Opij drach. ii. castoreij drach. ii. Cū aqua pastillos formato, & sumitū drach. i. dato, stomachicis cū protropi diluti cyathis tribus, cholericiis & uomentibus cibum cum frigida. Coeliacis & dysentericis cum baccarū myrri decoctio, splenicis cum aceti mulsi cyath. iiii.

Aliud pharmacū deinceps scripsit Asclepiades, nō solum ad uolulosas stomachi subuersiones ipsum conuenire promittens, sed & ad intensos singultus, & stomachicos qui ardorē, hoc est, multā caliditatē percipiunt. Dictū autem iam sæpe à me est, impossibile esse inuenire pharmacū ad multas affectiones optimū, Inuenitur enim in unaquaq; ipsarū id quod proprie ipsis destinātū est præstantius esse. Verum his qui unum pharmacū ad multos affectus habere uolunt, etiam horū preparatio ac compositio utilis existit. Cōtinetur tamen ambiguitas quædam in huiusmodi pharmacorū promissionibus, qualem Asclepiades nūc de proposito pharmaco fecit. Putabunt enim fortassis aliqui ex ignaris, tum singulorū trium symptomatū curationē promitti, tum duorū simul coincidentū, aut omnīū simul. Velut quī lancinatur uehemēter nausæis æger, & singultit, & multæ anxiosæ caliditatis sensum circa stomachū percipit. Et de tali sane affectiōe primo dicā in qua tria hæc mala simul hominē infestāt, nimirū ardoris sensus, & singultus, & affectio uolulosa.

Hippocrates quidē igitur cōuulsionem fieri dixit ex repletionē & euacuatione, & additū est ad aphorismū sermō in omnibus exemplaribus, Sic autē & singultus. Ego uero in cōuulsionē tertiam aliquā causam supra euacuationē & repletionē nondū reperi. Singultus etiam sine his fieri uideo, acribus humoribus, aut serosis & medicatis stomachū mordentibus, quos ubi uomitu reiecerint statim singultu liberantur. Quin & multi deuorato pharmaco ex tribus piperis generibus cōstante, si statim uinū insuper bibant, omnino singultū, ex quorū numero etiā ego sum. Amplius autē & cibo in morda cē qualitatem corrupto, alij singultū, & quod à uomitu statim liberantur, omnibus notum est. Quidam etiā ex rigore oris uentris singultū. Verū pueros maxime frequenter singultire cōtingit, tum ob corruptionem alimenti in uentre, tum ob partis frigiditatē. An uero & ob nimiam euacuationē fiat singultus, ueluti etiā cōuulsio, dignum cōsideratione est. Verū si in præsens hac cōsideratione relicta, eos qui ob frigiditatem, aut ciborū copiam, aut morda cē acredinem grauantur, intueamur, uomitum reperiemus sufficientem medelam eorū qui ob copiam aut morsum singultunt, caliditatem uero eorū qui ob frigiditatem. Alio autem modo reperiemus etiā sensus stupefactionem per refrigerantia, & permutationem ac disculsionem morda cū per attenuantia & resiccantia. Cōponitur autem ex huiusmodi ipsum pharmacum. Opium enim & rosæ, & pŷyllij succus, ex refrigerantibus sunt

sunt. Spica nardi uero & chrysobalanos ex discutientibus & corroborantibus. Asarum autem per urinam deducit uisiosos humores. Aloe uero uisiatos humores expurgat & inferne per uentrē euacuat. Crocus autē cōcoquit & roborat partes, per temperamētū quidē caliditatis cōcoctionem efficiens; per adstringendū uero uisū, quæ ipsū adest, robur addens. Costus autem sufficiēter calfacit, moderate uero adstringit, quod & ex gustu eius percipitur. Ex his porro cōpositum pharmacū aptum est singulis uentibus, aptum est & qui ad uocandū lancinantur, & qui circa præcedens pharmacū dicti sunt, uerum non similiter ut illud, aliquid ex odoratis habet, aut cinamomū. Refrigerantiū autem in ipso mixtura stupefacere sensum potens, mitigando molestiā ex mordacitate ferolorum & aliorum etiam humorum obortam, uere aptum pharmacū efficit, ad nauetose affectionis imminutionem. Quandoquidem uero, etiam ad stomachi ardorem cōuenire pharmacū dixit. Repugnet autem huic sermōni Costus, operæpretium sue rit & de eo dicere. Quemadmodū in antidotis colicis appellaris, & a quibusdam, dolorū sedatorijs, qualis est Philonis antidotus, Scopus cōponendi pharmacum est stupefacere sensum dolentiū. Quo uero non cum magno detrimento, id fiat, & ut per altū dolentiū corporū frigiditas penetret, calfaciētia miscantur, quæ refrigerantium stupefactionem deducere possunt, quum illa ipsa per se tardi transitus existant. Hæc igitur ubi quis inaudiuerit, quantitatem consideret simplicium pharmacorum quæ in compositiones miscantur. Ex hac enim sciet num magis, an minus efficere possit cōpositum pharmacum ea quæ promittit. Si namq; refrigerantia plura apparuerint, sensum affectionum magis obtundit, & quantum caloris in ipsa particula fuerit etiam hunc extinguit. Vbi uero calfaciētia fuerint aucta, minus quidē hæc efficiet ipsum pharmacum, innocētius autem reddetur. Nosse enim oportet, corpora uiuentium mortificationi simile quippiam pēpeti, ab omni ex opio, & hyoscyamo, & mandragora compositorum pharmacorum usu; nimirum causis dolorem insipientibus insensibilibus factis: & multi sanē qui assidue talia accipiunt, ad immedicabilem frigiditatem particulas perducunt. Quemadmodum autem in refrigerantium & calfacientium oppositione, utrorumq; quantitas ostendit prædominantem pharmaci actionem, Eodem modo etiam in alijs cōsiderationem facere oportet: uelut denstantibus & rarefacientibus, coagmētantibus & diffundentibus, odoratis & graueolentibus, humectantibus & siccantibus, discutientibus & cohibentibus. Ita quæ ubi subscripsero his mixtorum in compositione quantitatem, ad coherentiā transibo. Scripsit autē ipsam Asclepiades in hæc uerba. Stomachicis, ardorem sentiētib; & ad intensos singultus, & uolulofas stomachi affectiones. Costi drach. iiii. spice nardi drach. iiii. chrysobalanorum drach. iiii. rosarum uiridum drach. iiii. mastiches drach. iiii. aloes drach. ii. asari drach. ii. opij drach. i. excipe succo psyllij, & reduc ad pastillorum formam; exhibe obolos iiii. Liquor sit affectioni conueniens. Post præscripta pharmaca, Antidotum Hieram iam antea in Andromachi pharmaciis conscriptam, ex aloe & cinamomo cōpositam, etiam ipse tradidit non iuxta eandem commensurationem & symmetriam. Habent autem uerba eius in hunc modum.

Antidotus Hiera, hoc est, Sacra, Themisonis. Ad stomachi subuersiones. Facit & ad sentientes ardorem, & omnem inflationem, tardam concoctionem & affectiones uteri. Probe cituinam, & omnino admiranda confectio est hydropticis, hepaticis & nephriticis. Deducit & foeminis menses. Aloes drach. c. mastiches unc. unam. croci unc. unam. nardi Indicæ unc. unam. cinamomi unc. unam. carpopalsam unc. unam. asari unc. unam. tundito & angustissimo cribro

excernito, atq; aridū ut ne transpiret seruato. Vñs eius est ad tarde concoquentes, atq; ita sanòs drach. i. cum frigida cyath. iiii. Vomētibus bilem, aut alias fluxione laborantibus drachina dimidium. Ad inflammationes internas conuenit cum aqua mulla. Verū quibus urinam ciere uolumus, aut mēses deducere, pharmacum cum uino dāmus. Est autem medicamentum inspersile in pulueris ac farinæ formam redactum. Hæc quidem scripsit Asclepiades de prædicto pharmaco, Videamus autem primū in his de quantitate pharmacorum ipsum, constituentium quatenus consensit, & dissensit cum Andromachō. Deinde cōsequenter de promissione & usu. Equidem in mixtura pharmacorum consenserunt inter se Andromachus & Asclepiades, in hoc quod aloes drach. c. coniiciunt. Dissentiunt autem in eo quod Asclepiades simpliciter aloes scripsit, Andromachus autem lotæ apposuit, & quod Asclepiades reliquorum singulorum singulas uncias amixsit, hoc est drachmas argenteas viii. aut septem & dimidiam. Andromachus uero sex. Amplius etiam in eo quod Asclepiades carpopalsamū, Andromachus xylbalsamū iniicit. & præterea quod Asclepiades florē iunci odorati penitus reſiſiuit. Cæterum circa promissionem operum Andromachus nihil amplius scripsit, quā quibusdam unum cochlearium, quibusdam duo, cum aquæ frigida: aut calida: cyath. iiii. exhibere. Verum Asclepiades plura de uisū propoſitæ antidoti prædixit. Ad tardas enim concoctiones sanonum drachmam unam dari iubet, cum aquæ frigida: cyath. iiii. Opinor autē ipsum dicere drachmam argenteam, etenim sic ferē omnes recentiores medici appellare in more habent: neq; ipsa rei natura aliud nos intelligere cogit. Manifestū est autem quod drachmam dicimus nunc in huiusmodi omnes, quod Romani Denarium appellant. Verum non omnibus tarde concoquentibus expedit præbere hoc pharmacum, sed his solum quibus ob uitioſos humores, tarda cōcoctio contingit, & maxime quum tenues fuerint & bilioli. fecerit & quætem in his quibus, citra uitiaſos humores, humida intemperies instanti affectam partem pertrigauit, ut exoluatur & laxetur ad modum ligamentorum neruorum circa laxatos articulos. At uero qui bilē in uentre habent, quæ præsertim ipsis in tunica in alto, continetur, præstantius pharmacum non repererint. Verum haud scio qua ratione parū de ipso exhibeat Asclepiades, quū moderata exhibitio ipsius ad drachmas vi. progrediatur. Porro ad inflammationem habentes non simpliciter in omni inflammationis tempore dandum est, sed ubi concoctia fuerit & declinari. Concoctia enim medicanda recta cenſet Hippocrates, non cruda, neq; in principijs, nisi sua sponte concitata id expetant, hoc est, nisi motus ad excretionē nos adducat, qui nondū firmā aliquam inclinationē ac stationem ad unā partē habeat. Recte autē hoc pharmacū tarde cōcoquentibus, aut bilē uomentibus, aut alias stomachi fluxione laborantibus, aquæ cyathis iiii. inspergens præbet, nimirū subuersionem stomacho ex melle oborientem formidās. Ad declinationē autem internarū inflammationum cum aqua mulla tempestiue quis exhibuerit. Quemadmodum etiam urinam ciere uolens, aut menses euacuare, Asclepiades quidem ex uino dandum ait; præstiterit autem, ut ego sentio, cum uino mullo pharmacum præberi. Ita enim simul & quæ circa distributionem & delationem ex uentre in urinam, & quæ circa uterum instant, secatur & dissoluit, & robur paribus addit per quas transitum facit. Ampliusq; & lo corum per quos fertur caliditatem auget, quæ & ipsa non parum confert ad instantes humores fundendos & euacuandos.

Post præscriptam sacram Themisonis Antidotum, Asclepiades sic scripsit.

Alia ex Mantia cōpositionibus Attalica. Facit ad stomachicos & reiſcientes cibum, cholicos, coeliacos, dysentericos. Cōpositio sic habet. Croci drach. ii. nardi

nardi drach. ii. seminis hyoscyami drach. i. aloes unc. i. balaustij unc. i. tragacanthæ unc. i. piperis albi unc. i. acaciæ unc. i. Rhei pontici unc. i. Rhols syriaci culinarij unc. i. Excipe succo rosarū in uino austero coctarum, & redige in pastillos drach mæ uniū. Tragacantham uero succo præmaceratam unito. Hoc pharmacum nihil priorū simile habet. Illud enim purgatorium est, hoc adstringens, his qui stomachum aut totum uentrem ob multam humiditatē exolutum ac laxum habēt conueniens; quemadmodū etiam in articulis eiusmodi laxitates cōtingunt. ligamentis ipsorū multa humiditate pertigatis, quæ plurimi Medici neruos ligatos rios appellare solent. Multæ enim eiusmodi affectiones tum in uētre, tum in stomacho, sunt his qui multo potu se expleant, aut fructus humedatētes, aut etiā edulia talis temperamenti ingerūt. Quū itaq; multi sint qui tali uictu utantur, ratio nabiliter etiā prædictæ facultatis pharmaca sæpe successu clara euadunt, ut quæ prædominātem adstringendi uim habeant. Vbi uero aut uiciatos humores euacuare, aut affectā particulam calfacere oportet, non solum nihil suat (ita adstringentium pharmacorum usus, sed etiam nocet. Post præscriptū medicamentum, aliorum duorū Asclepiades meminit, quæ & ipsa ambo bona sunt, & ex multis composita, ac propterea multi ad uarios affectus usus, & præsertim posterius. Quod uero tale sit quale ipsum esse dicit, etiā nobis ipsis facile erit iudicare, ubi in memoriā reuocamus simplicia in ipso pharmaca, qualia singula sint, amplusq; methodum compositionis eius audiuerimus.

After stomachicus. Facit ad eos quibus cibus in uētre acescit, ad tormina, destillationes, dolorē capitis, spuentes sanguinem, tabescentes, affectiones circa uentricum & uterum. Præparatur sic. Succī mandragoræ drach. iiii. myrrhæ drach. iiii. balaustij drach. iiii. castorij drach. iiii. croci drach. iiii. opij drachmas vi. anisi drach. viii. seminis apij drach. viii. styracis drach. viii. hyssopi cretici drach. xii. seminis hyoscyami albi drach. xii. Cōposito pro more & digesto in pastillos, Dato pro uiribus. Liquor sit affectioni conueniens.

After inexuperabilis. pharmacum accommodatum, sedans dolorem, inducens somnum, multi usus ad uarios affectus. Nam & stomachi morbos mirabiliter sanat, a ructibus acidis, ægris concoctionibus, torminibus, uolulis, inflationibus. Facit & ad capitis dolores potatū, & foris illitum fronti aceto dilutū. Facit & ad oculorū dolorem pastillus perdictij succo dilutus. Facit & ad densū dolorem uernę inditis, tritus ac galbano exceptus, aut fici succo. Prodest ad influxus oculorum, & tonsillarū inflammationes, uino dulci dilutus, ita ut ad oculos sanam eo imbutam imponamus. In tonsillis uero affectis tepesactum colluamus. Facit ad omnem sanguinis fluxū uino myrtite dissolutus. & ad ueteres ac recentes tussis & destillationes dilutus uino Theræo, aut proptopo, aut scybelite. Facit phthisicis, suppuratis, marrubij succo dissolutus. Hemoptoicis, dysentericis, cholemicis, sanguinarie succo dilutus. & ad omnis reptilis plagā cū ruta decoctio potatus. Soluit irritationes per circuitum repentes, duabus ante eius inuasionem horis, ex uini dilui cyathis iii. acceptus. Menses etiam foeminarum ducit artemisiz decoctio dilutus. Facit & ad uescicæ affectiones uino mulso dissolutus. Similiter etiam his quæ ab uero suffocantur auxiliatur. Facit anibriticis, podagricis, gentianæ decoctio dilutus. Et de his quidem quæ efficit hæcenus. Compositio uero hoc modo habet. Myrrhæ drachmas iiii. styracis drach. iiii. nardi lodicæ drach. iiii. casie fistulæ drach. iiii. terre lemniz quæ spiragis, hoc est, sigillū appellatur drachmas iiii. corticis mandragoræ drachmas iiii. In alio exemplari etiam piperis drach. iiii. croci drach. vi. succi papaueris drachmas vi. seminis danci cretici drachmas vii. anisi drach. viii. scelis massiliensis drachmas viii. seminis

seminis apij drach. viii. Myrtha & styrax, atq; opium uino dissoluuntur odorato & teruntur. Arida uero tunduntur & cribrantur, ac deinde simul miscentur, subiguntur, ac in pastillos coguntur ponderis drachmæ dimidiæ, & in umbra resiccantur. Vfus ostensus est. In alijs exemplaribus pastillorum pondus drachi male proditur.

Quæ Archigenes in primo pharmacorum secundum genus prodit, De affectionibus circa stomachum. Cap. iiii



Vum multæ & uariæ sint circa stomachi affectiones, atq; hæc omnes ferè in totum ex cruditate oboriantur, omne ipsius robur considerandum est, & si quidem per aquarum aut aeris malignitatem lædantur; quod maxime possibile est fieri, ea uariando ac permutando hominè liberabimus. Si uero per inconfuetos cibos læsio fiat, eis interdicemus. Si uero ob copiam, cibos cōtrahemus. Et in uniuersum ex quacunq; causa suspicari fuerimus fieri læsionem, eam prohibebimus. Quod si quis sibi ab omnibus his bono ordine caueat, & iuxta ipsum stomachi tamen cōcoctio impediatur, unctio nibus & exercitijs, uociferationibusq; & alijs huiusmodi per experti artificem adhibitis stomachus corroboretur. Verum ructu acido affectis coriandrum co chlearij mensura ante reliquum cibum edendum dato, & merum insuper bibendum. Quod si quādoq; moderata cruditas & quæ cōtēnni possit oboriantur; longiore tempore in lecto decumbendū est, & si negotia id non permittāt, quantū possibile est, omni distentione, ac labore, ampliusq; æstu ac ira uitatis. Serius etiam quā pro consueto tempore ex feruida aqua lauandū est, & in priore balnei domo aqua tepida hausta, omnia in stomachum coaceruata pituitosa reuocanda, & modico cibo itemq; potu primā die utendum. Si uero fortis ciborum corruptio fiat, stomachiq; morsum sentiant, ac ipsos eructent, ampliusq; nausea afficiantur, aqua tepida exhibita uomere cogito, donec omne corruptū expurgetur, deinde caput pinguis linteo ad ignem calfactis irrigato, aut huiusmodi aliquo non inani ductu locos circa stomachi foueto, & præcordia mitigato, summas item partes pingui frictione aut etiam constrictione lenito, atq; ita in lectulo quiescere sinito, ac inediā per totam sequentem diem perferre. At si non absurdum quid inde consequatur, & satis firmi sint, lauando eos, ut prædictum est, curato. Infirmiore uero moderate ad diem unum refectos, in sequentem lauato, moderatis cibis ac potibus ad triduum uti iussos. Et cruditatis quidē talis quædam (ut rudi quadam forma expressi) curatio existit. Verum de his quæ ex ipsa proueniunt, uelut profluuio uentris, aut bilis per uomitum ac secessum reiectione, aut alijs eiusmodi, in proprio loco dicetur. Cæterum in alijs stomachi molestijs, his quidem qui stomacho exuruntur, cum exolutione aut animi deliquio, aut appetentia perditā, ex qualicunq; tandem causa, præter febrem, erythros iii. aut iiii. aquæ frigidæ absorbendos dato, bis aut ter per interualla; & si quidē inde mitius habeant, ipsos reuocatos tum cibo, tum etiam alijs refocillare tentabis: si uero permaneat malum, ligatis & cōstrictis extremitatibus, eiusmodi quendā cremorem assidue absorbendū dato, uelut palmularū, malorū cotoneorum, pirorū, mespilorū, baccarū iuniperi, pampinorū uitis, rosarū. Mali item punici nucleum non habētis succū, aut nuces pineas xxx. & seminis cucumeris grana xxxv. baccas myri xxx. croci obolum dimidiū & rosarū duarū folia, ex aqua bibenda exhibeto. Aut aquam frigidā cum omphacij succo præbeto. Aut florē rosarū cum nardo & aqua frigida, aut etiā portulacæ semen ammisceto, aut simplicis semen, aut malorū coioneorū decoctū. Aut cucumerū satiuorū semina quinquaginta trita, ex frigida præbe. Aut oryzā coctā cū butyro edendam exhibe

exhibe. Aut tragoriganum tritam & exsuccatam cum aqua edendam præbe. Aut fabas Aegyptias x. & nardi celticæ obol. ii. utraq; tosta & trita bibenda exhibe, cum mali puniçi acidi ac dulcis succo & aqua, pari utriusq; mensura. Aut mentæ ramulum cōtritum bibendū dato. Aut cenanthen similiter tritam cum nardo Indica bibendam dato. Aut lentes coctos tritos ex aqua præbeto. Aut phœnicobalanos cum rosis. Aut marrubiij succum cum melle, & ubi paululum quiesuerint uinū cum polenta exhibeto. Aut cardamomi drach. l. cum acetū mul si cyathis tribus potandā dato ac quiescere sinito. Porro his qui salius multam in stomacho aggregarunt aridam conyzam manducādā dato. Forinsecus uero stomacho imponantur uitis folia uiridia trita, aut mala coronæ, aut palmulæ, aut mēspila cum cerato, aut myrti folia tenera uel rubi, uel lentisci, trita cū polentæ flore frigida subacta, aut portulacæ uiridis similiter præparata, aut caseus recens mollis cum polenta & apij folijs, aut seridis folia cum aceto & polenta ac apij folijs. Si uero multum sint æstuosi, uesicā aqua expletam imponito. Aut niuem superdato, aut cucurbitarū ramenta imponito, & omnino omnia quibus in cardiacis utimur. Dolores autē stomachi lenit, & maxime his quibus tristitia aut desperatio accedūt, lac asininū, aut muliebre, aut bubulū, silicibus incōctis potatū. Aut ungentū nardinum uel aliquod pretiosum dato ex aqua. Aut decoctū floris iunci odorati, rosarū flore simul insperso. Aut portulacæ succum quandoq; per se, quādoq; cum nardo. Aut oui utellum tostū & in farinā comminutum, cum polenta bibendum dato. Aut amaras nuces cum cucumeris semine & nuce pinea. Aut rumicis syluestris seminis obolos iii. bibendos præbeto. Omnes uero circa stomachum dolores & displicentias ac molestias sedari aiunt, cochleā aphricana cruda integra uorata. Exoluto autē solum & nau seabundo factō stomacho, lactucæ albæ semen modicum, ex aquæ cyathis quatuor aut uno bibendum dato. Aut passerū sterqus aridū uelut polentam, siue aquam biberint, siue uinū, inspergito. Aut mastiches chiæ cochleariū ex aqua frigida dato. Aut glaciem ieiunis quotidie exhibeto, ut ea assidue manducata saluam expuant. Aut conyzam aridam māducent. Si uero unā cum humectatione etiam inflammatio aliqua adsit, cenanthen cum meliloto, aut rosam siccam cum cerato rosaceo parum resinæ uisæ habente impone. Aut acaciæ & aluminis melli pares partes dupla ceratū proportionē excipe, & ut malagma impone. Cæterū quibus bilem atram generātib; stomachus inflatur, spongiās aceto acerrimo calido imbutas ad stomachum imponito, atq; hoc maxime tempore distensionum, & si postea etiamnum perseverarint, alumen liquidum cum atramento furorio trito melle exceptum imponito. Aut hæc & aloen pari portione mista & cerato myrteo excepta imponito. Aut hederæ folijs uino coctis pro cataplasmate utor. Aut plantaginīs cum sale tritis. Aut armentariæ bouis sterqus aridum uino coctum, aut marrubiū cum pane & rosaceo subactū, aut bulbos rufos & alumen pari portione imponito. Post hæc antidotus apyretos appellata, aut hiera, aut alia quæpiā, quæ cuiq; per experiētiā cognita est, in potu exhibēda est. In cibo stomachicis cōueniunt, beta, lens, tragus, oryza, alica, malis coronæis, aut palmulis, aut mēspilis, aut mali puniçi nucleis carēris granis, aut melapij simul incōctis, aut teneris lentisci, aut myrti, aut rubi ramulis ammissis. Panis sit summe tantū fermentatus, aut penitus absq; fermento, pparatus. Ex olerib; cōueniūt cruda, cichoriū, meconides lactucæ, eryngiū, intubus, gingidū, seris, lactucæ. Cocta maxime cōmoda est brassica & silarū. Ex reliquis autē coctis cōueniūt cochleæ & bulbi. Ex carnib; uēter, rostra, pedes, turdi, gdicæ, aragænæ, turtures, palūbes, anates, lepores, dorcades. Ex piscib; squillæ, gammari

gammari, natatrices siue colymbæ, locustæ, foligines, sepia: ex his qui duras carnes habent nulli. Ex testaceis maxime buccina, purpura, pectines, glauci, ceri, glandes, siue balani. Verum Sifarium à reliquis omnibus acceptum, ut stomacho gratum, & refectioi commodum, ad plerasq; omnes stomachi accessiones conueniens est. In potu prædest unum quod unusquisque libenter bibat. At uero his qui instantur & stomacho distenduntur, polij fasciculum coquito & bibendum dato, aut calaminthæ decoctum per noctem sub dño expositum, modico melle, & piperis drach. I. ammixtis, bibendum præbeto. aut spongiam acerrimo aceto imbutam pedibus ac brachijs imposito usq; quo bullæ excitentur, maxime si cibos refectient. Aut foeni græci farinā aceto subactam, aut sinapi tritum cum aceto, usq; quo rubefiat locus. Aut psyllium aceto & aqua maceratū & in mortario tustum, pari portione carniū cochlearū ammixta, in malagmaris forma imposito. Quæ stomachicis dolorē eximant. Cumini tostum & apium, utriusq; modica portione cum aqua bibendū præbe. Aut aloes obol. II. cum uino mulso, aut uino, aut aqua bibēdos dato. Aut abrotoni & thymi utriusq; obol. II. ex uino præbe bibēdos. Ligaturas insuper extremarum partium fortiter adhibe, & circa ipsum stomachum cucurbitulis & fomentis uarijs utere. Quod si uehementer ualida sit distentio, etiam uenæ sectio efficax auxiliū erit, & alui solutio per supposititiā glandem. Deinceps post præscripta Archigenes de fame ingenti, bulimo Græcis appellata, itemq; de singultu prodit quæ sequuntur. Porro eos qui ex ingenti fame in uis animo linguuntur, reuocabimus odoramentis aceti, aut pulegij, aut quæ forte obtingit terra aceto macerata, aut malis, aut piris, aut alijs similibus fructibus, qui ad manum sunt. Panem insuper odorandum dabimus, & ingerere cogemus. Ad hæc enim singula cōfestim excitantur, & præterea ad suillam carnem assatam ac coctam, & in uniuersum ad omne quod multum alit, & præsertim ea quæ odorem nidorosum ac probe conditū habent. Per huiusmodi enim odores ut plurimum tales reuocantur. Nihilominus tamen etiam extremæ partes ipsorum constringendæ sunt, ipsiq; excitandi tum maxillatum punctura, tum capillorum ac aurium distensione. Refocillabis porro ab exolutione & deliquio animi, panem in uino diluto, aut etiam aliud quippiam ex his quæ acuatim reficere uires possunt, exhibendo: uelut sunt oua sorbilia, bulbi, cochleæ. Etenim singula hæc stomachi humiditatem eximunt, & in modica mole multā uim complexa cumulatim corroborant. Singulis uero autem rutam cum uino dato, aut nistum in aqua multa, aut opium, aut castoreum, aut abrotonum, aut aristolochiam, aut daucum creticum, aut cuminum, aut anisum, aut zingiberis radicem, aut scillam cum aceto & oleo, aut tordilion, aut dactamnum, aut calaminthen, aut acorum, asarum item & nardum celicum, & pulegium, singula tum per se, tum simul mixta.

Pharmacum nostrum ex succo malorum cotoneorum constans.

Magnæ equidem oris uentris affectiones à prædictis pharmacis curantur. Moderatas uero omnes ferme, præter eas quæ ex uehementi ardore sunt, subscriptū medicamentū iuuat. Succū malorum cotoneorum sextarios II. mellis Attici sextarios II. aceti sesquiseptariū. Si uero multum acre fuerit sextariū unum. Zingiberis quadrātem, piperis albi unc. I. Arida insperges, ubi malorum succus cum melle & aceto coctus ad lenum ignem, Attici mellis crassitudinem acceperit. Aliud ex malorum cotoneorum carne constans. Malorum cotoneorum carnis libras III. mellis libras III. aceti albi lib. III. piperis quadrantem, zingiberis quadrantem, petroselinī Macedonici unciam unam.

De pharmacis

De pharmacis quæ forinsecus ori uentris imponuntur. Cap. V

Nocant quidem plurimi medici haud scio quare, uelut Asclepiades & Andromachus, omnia pharmaca quæ forinsecus imponuntur, siue adstringendo condensent, siue indurent, Malagmata, quæ mox emolitionis significationem habet. Verum nos permittemus ipsis etiam si non proprie appellent. Quæ autem conscripserunt ad stomachi affectiones commoda pharmaca, per experientiam non illorum solum, sed etiam nostram approbata, ea nunc a describemus, ab his quæ Asclepiades prodidit initio facto.

Quæ pharmaca Asclepiades ad stomachi affectiones in quarto externorum tradidit, quæ Marcellæ inscribit.

EVeni ad stomachi subuersiones, doloresque facit partim etiam ad inflammationes. Oenantes drach. vii. croci drach. ii. rosarum siccarum drach. iiii. meliloti drach. iiii. mastiches drach. iiii. ramentorum succini drach. iiii. carnis phœnicobalanorum quadrantem. Vini myrtæ quod satis est. Arida tundito & per angustissimum cribrum concernito, & cum uino myrteo diluito, ut cerati spissioris crassitudinem accipiant, hanc carnem phœnicobalanorum addito, & conuassata cerato ex rosaceo apparato excipito, & linteolo infarta ori uentris imponito. Facit & ad oculos inflammatos. Aliud Oenantes drach. vi. croci drach. iiii. myrtæ drach. iiii. floris rosarum drach. iiii. meliloti, mastiches, utriusque drach. iiii. aloes drach. iiii. corticis mandragoræ drach. iiii. Carnis palmularum quadrantem. Excipe cerato ex rosaceo apparato.

Asclepiadæ qui philosophicus dictus est, hoc est naturæ studiosus, ad stomachi subuersiones facit & coeliacis & dysentericis. Seminis hyoscyami drach. iiii. seminis apij drach. iiii. floris rosarum drach. ii. seminis anisi drach. ii. succi hypocythidis drach. ii. myrtæ drach. ii. croci sesquidrachmā. opij sesquidrachmā. Arida tundito & per angustissimum cribrum excernito, Hypocystidæ uero & myrtæ, & papaueris succum, uino myrteo dissoluta aridis adijcito, & pastillos formato, eosque in umbra reficaco. Vltus tempore quantum opus est tulum, melle cocto excipito, & deinde linteolo infarta locis affectis imponito. Si foris fuerit fluxio, succi hypocythidis aliam adhuc drachmā addito, & floris rosarum tantum dem.

Aliud Galli Marci Asclepiadæ, ad easdem affectiones. Seminis hyoscyami drach. iiii. floris rosarum drach. ii. anisi drach. ii. seminis apij drach. iiii. opij drach. ii. succi hypocythidis drach. ii. myrtæ troglitidis drach. ii. croci sesquidrachmā. uini myrtæ quod satis est. mellis cocti quod sufficit, præpara ac utere ut dictum est. Huiusmodi pharmaca etiam bibuntur, & ualde auxiliantur. Cohibito autem fluxu & sequente dolore, tantum pondus cerati rosacei ad pharmaci confectionem addere oportet. Si uero multa fluxio contingit, ad pharmacum succi hypocythidis drach. iiii. coniicio, & flores rosarum aliam drachmam. Vigiliis infestantibus, etiam succi papaueris aliam drachmam addo. Aliud Nicerati, coeliacis, dysentericis ualde generosum. Oenantes drach. ii. rosarum siccarum unc. i. mastiches unc. i. aloes unc. i. gallarum omphacitidum unc. i. aluminis rotundi unc. i. acaciæ unc. i. cereæ lib. i. picis brutæ quadrantem, olei myrtæ libram i. arida cum liquidis committito. Aliud ualde præclarum. Oenantes unc. i. omphacis unc. i. gallæ omphacitidis unc. i. aluminis scissi unc. i. acaciæ unc. i. cytinorum mali punici, balaustrij, mastiches, singulorum unc. i. uini myrtæ quantum satis est his subigendis, carnis phœnicobalanorum sexuncem, excipe cerato lentiscino, præpara ac utere ut dictum est. Hæc quidem igitur præscripta pharmaca facultatis sunt adstringentioris. Quæ uero deinceps ab Asclepiadæ prodita sunt, mixtæ facultatem habent, adeo ut etiam induratas inflammationes curent, & propter

rea etiam hepaticis utilis sunt. Opus enim habent etiam illi adstringentium ad laxantia mixtura, non tamen aequae ut stomachici. In stomachicis enim medicamentis qualitas adstrictoria praedominatur. Malagma Nilo inscriptum.

Facit ad praecordiorum dolores, dissolvit omnem duritiem, facit & ad exarticulata & luxata post declinationem inflammationis impositum, facit splenicis & hepaticis. Ceræ libram unam, ammoniaci thymiamatis lib. i. olei cyprini lib. i. croci semunciam, aceti quod satis est. Ammoniacum dissoluto, deinde sic arida adjecto. Aliud ex libris Arij Asclepiadei. Ammoniaci thymiamatis lib. ii. diligenter tritas in uas fictile confice, eiq; floris salis lib. i. adde, & olei cyprini sesqui libram. Coque ad lentum ignem assidue agitando, atque ubi emplastri formam acceperint, adijce ceræ lib. ii. qua eliquata & pharmaco amplius non inquinante, eximito ipsum & in mortarium transfero, conquassatumq; diligenter reponito ac utitor.

Malagma Nilei crocerum, pharmacum accommodatum ad praedictas affectiones, facit & ad erysipelata. Hoc usus est Licinius Articus. Ammoniaci thymiamatis lib. i. ceræ lib. i. rosacei lib. i. croci unc. i. aceti quantum sufficit, preparato pro more. Aliud Melinum inscriptum aromaticum, hepaticis, stomachicis, & ad praecordia disenta, & omnem nervorum per consensum affectionem. Ammoniaci thymiamatis drach. c. ceræ ponticæ drachmas c. melilotorum drach. xii. croci, myrrhæ, bdellij, singulorum drach. viii. olei cyprini lib. i.

Aliud facit stomachicis, hepaticis, ad praecordia inflammata, & omnem nervorum per consensum affectionem. Ceræ drach. c. croci drach. xii. ammoniaci thymiamatis drach. c. myrrhæ drach. xii. bdellij drach. viii. confectionis hedychoi quadrantem, uini dulcis quantum sufficit, olei cyprini lib. i. prepara pro more. Aliud Neapolitæ Aromaticum inscriptum, pharmacum accommodatum ad internas affectiones. Ammoniaci thymiamatis lib. iii. ceræ lib. iii. rosacei lib. iii. confectionis hedychoi librae dimidium, mellis librae dimidium, nardi celticæ librae dimidium, floris iunci odorati librae dimidium. Vini dulcis quod satis est. Arida cum liquidis subacta commixtio.

Malagmata bona inflammationum citra debilitatem inueteratarum, quæ ad hepatis inflammationes similiter conveniunt. Malagma Asclepiadæ ex meliloto. Hieraticon, hoc est pontificium inscriptum. Stomachicis, hepaticis, & ad viscerum dolores. Nardi celticæ drach. x. cyperi drach. x. myrrhæ drach. x. cardamomi drach. viii. meliloti drach. xl. croci drach. viii. amomi drach. viii. cyphæos hieraticum hoc est, facrificulorum drach. xvi. ammoniaci thymiamatis drach. xl. resinae terebinthinæ drach. lxxx. ceræ minam unam, olei cyprini drach. cxx. Vini odorati Italici heminam unam. Prepara ut dictum est ac utere. Aliud Basilicum, hoc est, Regium inscriptum, faciens ad praedictas affectionem, omnemq; per consensum nervorum affectionem. Ceræ minas iii. ammoniaci thymiamatis minas ii. resinae frictæ minam unam, meliloti minæ dimidium, propolis drachmas xxv. myrrhæ drach. xxv. nardi celticæ drach. xxv. styracis drach. xxv. cyperi drach. xxv. iudis illyricæ drach. xxv. cardamomi, panacis, utriusque drach. xxv. croci, cassiæ, mastiches, opobalsami, amomi, floris iunci odorati singulorum drach. xvi. Vini Italici odorati quantum sufficit. Arida cum nardini Asiatici aromatici libris quatuor subacta pro more preparato.

Malagma polyarchion. Facit peripneumoniciis, stomachicis, splenicis, hydropticis, facit ad affectiones circa vesicam aut uterum, ad omnem nervorum per consensum affectionem. Ceræ minam i. terebinthinæ minam i. bdellij minā i. ammoniaci thymiamatis, cardamomi, cyperi, singulorum minā unā, meliloti, amomi, nardi indicæ, croci, myrrhæ, thuris, xylocinamomi, singulorum drach. xxv. olei

olei cyprini hemina 1. Vini Italici quod satis est, prepara pro more ac utere quandoq; immixto, quandoq; dissoluo cum cerato cyprino. Polyarchi pharmacū accommodatum, facit ad prædictas affectiones, & omnem nervorum per consensum affectionem. Facit etiam ad assiduas cruditates, & corrumpentes cibum, & uomentes bilem, ac omnes inueteratas affectiones. Vfus est eo Iulius Agrippa, compositio hoc modo habet. Castorij, amomi, utriusq; sescunciam, pipēris albi sescunciam & longi sescunciam, myrrhæ quadrantem, confectionis berydychroi quadrantem, carpobalsami quadrantem, croci quadrantem, foliorū malobathri, cassie rosas referentis, panacis, opobalsami, nardi indicę, singulorū quadrantem, floris iunci odorati, cinamomi, utriusq; trientem, pyrethri, croci, cardamomi, singulorum trientem, cyperi semissem, iridis illyricę, aristolochię longę & rotundę, singulorum semissem, cerę lib. iiii. terebinthinę lib. ii. resinę laticis quadrantem. In alio exemplari, etiam bdellij trientem, ammoniaci thymiamatis trientem, Vnguenti nardini Asiani lib. iiii. Vini salerni quod satis est, prepara pro more. Ego autem adijcio mastiches, cinamomi, ammoniaci thymiamatis, styracis, aloes, opobalsami singulorum quadrantem. Malagma Andromachi ex meliloto. Nardi celticę drachmas viii. cyperi drach. viii. iridis illyricę drach. viii. myrrhæ drach. viii. croci drach. iiii. meliloti drach. xxv. ammoniaci thymiamatis drach. l. terebinthinę drach. l. cerę drach. c. cyprini hemine dimidium, aceri quod satis est. Quidam ammoniaci drach. c. coniungunt, facit ad omnia interna. Malagma polyarchi ex epistola ad omnia interna. cyperi minam unam, cardamomi minam 1. mannę tantundem, cerę tantundem, terebinthinę frictę sesquiminam, aut liquidę minas iiii. cyprini quantum sufficit. Ego etiam bdellij appono minam unam. Aliud, altera descriptio. Cyperi, cardamomi, amomi, bdellij, thuris, balsami, singulorum minam 1. cerę sesquiminam, resinę frictę minas iiii. cyprini heminę dimidium, Vini odorati sesquiheminam. Præpara ut moris est, ac utere uelut præscriptis. Vt ego componere soleo. Cyperi, cardamomi, amomi, bdellij, thuris, singulorum minam unam, cerę minę dimidium, resinę frictę aut terebinthinę minas iiii. cyprini heminam 1. cassię minę quartam partem, ammoniaci thymiamatis minę quartam partem, nardi indicę, croci, myrrhæ, singulorum minę quartam partem. Vinum odoratum.

De Hepate & eius affectionibus. Cap. VI



Vum hæc tractatio postrema omnium à me conscribatur, omnibus sanè manifestum esse opinor, quod ex duobus his alterum uerum sit. Aut alias omnes inutiles esse & superuacaneas, si quis ex hac sola sufficiens sit omnes affectiones curare, quæ medelam per pharmaca requirant. Aut si quidem illæ utiles existant, primum ipsas legendas esse, & in memoriam reuocandas ab his qui hinc aliquid commodi auferre uelint. Ipsas etenim methodos curandi prædictas affectiones, in xiiii. libris de curandi methodo inscripsi prodidi: nunc uero tanquam his ipsis cognitis, citra prædictas demonstrationes in memoriam reuoco, ostendens omnino quomodo nos pharmaca componamus, & quæ à prioribus scripta sunt iudicemus, indeq; in usum agere ac assumere cōsidamus, & sane utilis hæc speculatio existit. Nam empirici qui suā artem rationis expertem esse uolūt, omnia quidem legenda esse censent, quæ à probatis medicis sunt conscripta, non autem statim in usum assumenda esse, sed prius iudicanda, an singula ex ipsis ea quæ promittunt opere etiam demonstrare possint. Nos autem experientiam in omni arte magnum quid posse persuasi, speculationes tum per rationalem methodum, tum per rationalem indi-

cationem inuentas, ad ea quæ ab ipsis de indicationis historia tradita sunt, apponimus; demonstrantes qualem facultatem ad ambulandum utrunq; crux exhibet, talem in medicina experientiam & rationem habere. Itaq; in tractatione de simplicibus pharmacis per undecim libros conscripta, singulorum sponte naturæ productorum pharmacorum facultatem qua methodo quis inueniat recensuimus, atq; etiam ad particularem ipsorum materiam progressi, utilissimam ad artis opera facultatem omnem secundum species prodidimus. Consequenter autem ab illo opere, etiã curatiuã tractationem, quomodo quis optime non solum simplicibus, sed etiam compositis utatur, exposuimus; simulq; vias compositionis ipsorum omnes indicauimus. Cæterum in proposito iam opere, quomodo uarietas compositorum medicamentorum inducta sit ostendimus, ac certos iuxta speciem scopos tum compositionem, tum usum ipsorum deducētes, ampliusq; indicationem eorum quæ iam ante scripta sunt docentes. Quum igitur consequenter post prædicta, ad affectionum hepatis doctrinã progredi uelimus; affectus circa ipsum consistentes non nuda doctrina, sed ratione exquisitos referemus, & ab uniuersalibus scopis curationis ipsorum: quos in curandi methodo tradidimus; ad compositorum doctrinam perueniemus. Primum igitur omnium discernendum est. Num debilitas quædam uisceris adsit, quemadmodum etiam de uentre diximus, aut etiam alia quædam affectio ipsum apprehenderit, aut citra debilitatem affectum sit, inflammatione aut induratione, aut abscessu labo- rans, aut obturatione. Quemadmodum etiam an erysipelatosam habeat affectio- nem; aut ulcus; aut aliquam putrefactionem. Nam & in hoc hepaticam affectio- nem dicunt, quemadmodum etiam ore uentris affectio pleriq; medici ac idiotæ stomachicã affectionē uocant, in multis symptomatibus, non tamen omnibus circa unam affectionem accedentibus contingentem, sed circa multas, una quæ- dam generali communitate comprehensas, & tamen inter se in tantum differen- tes, ut aliquæ ipsarū maxime cōtrariæ existant. Quomodo etiã non maxime con- trariam quis dixerit frigidam intemperaturam calidę, humidam siccæ; quanquã secundum genus eadem sint; sermẽ autem omnia cōtraria eadem genere si quis dixerit, non peccabit. Contrariorum enim notio contingit, ubi plurimum inter se distarint. Plurimum autem distant à medijs in quocunq; genere, ea quæ exre- ma sunt, adeo ut contraria sæpe quidem eadem uideantur iuxta communis ge- neris fines, sæpe uero generalioribus contrarijs supra ipsa ascendētib; ab illis comprehendantur. Illa ipsa uero ob id omnino contraria sunt, quod quĩ unius generis sint, plurimum inter se distent, adeo ut quæ his subiacent primum & su- premum genus cōmune habeant. Atq; hoc quidem hoc loco semel à nobis obit- ter & accessionis loco dictũ, semper in memoria teneatur, ne uidelicet cuspiam uideri possit à seipso dissentire, qui aliquando unam affectionem in duobus ho- minibus eandem esse dixerit, aliquando non unam, neq; eandem, sed duas con- trarias. Intemperiem enim unam quandam affectionem generaliter appellat, sed quæ in contrarias differentias secetur. Licet enim secundum hoc quod diximus, duo & tria & plura, iuxta particulares differentias inter se contrarijsima esse, & secundum hoc debilitatis hepatis affectionē unam esse: quam intemperiem uo- cant; præfatus, non male rursus dixero, non unam, sed octo affectiones esse, pro- pterea quod tot differentiæ intemperierum existant. Etenim rursus iuxta aliam sectionem, duæ intemperierũ differentię fiunt, & rursus iuxta aliam tres, hæ quĩ- dem in qualitatibus solis, affectis partibus alteratis, hæ uero cũ humoribus quĩ- busdam, aut in spacijs affectarum partium contentis, aut in ipsis corporibus irri- guis ab illis factis. Circa uentrem igitur & intestina, una in singulis est cawitas,

quæ uiciatam humiditatē suscipere potest. Verum circa hepar tot numero sunt, quot sunt arteriæ & uenæ. Quum uero hæ omnes angusta oscula habeant, qua parte sima huius uisceris cum gibbis coeunt ac committuntur, obturatio & opilatio uitioforum humorum aliquando contingunt, ad quas putrefactio consequitur, breui in frigidis intemperaturis, in calidis uero nō cito, sed temporis progressu accedens. Fit autem intemperatura iuxta propriam hepatis substantiam, quam Erasistratus putat præterfusionem quandam; parenchyma Græce appellat, & non principalissimam uisceris partem esse. Fit etiam intemperatura circa contentas in ipso uenas & arterias, & iuxta materias in spacijs ipsarū contentas. Quum autē habeat hoc uiscus non unā sed plures facultates actionū, quas uitæ tempore operatur, easq; tot numero, quot sunt actionū species. Contingit saepe unam ipsarū præcipue lædi, saepe duas & tres, atq; omnes quatuor simul. Actio namq; ipsius una quidem attrahere cibum & alimentū in sese. Altera uero obuoluerē & continere, donec permutans ipsum suū ipsius faciat partem. Est igitur hæc ipsius facultas principalissima & ferē prima, concoquere uidelicet & permutare ac alterare atq; assimilare sibi ipsi alimentū, quam alterationē uocamus: quæ uero iuxta hanc alterationē remanent recrementa, ea per aliam facultatem, quam excretionem & expulsoariam nominamus, expelluntur. Ostensum autem est quod hæ facultates omnes in omnibus sunt partibus per omne uitæ tempus. Omnes enim familiare sibi attrahunt, & alienum excernunt, attractumq; temporis progressu alterant, quo tempore etiam retinent & constringunt. Vocatur autem alteratio ipsa usq; quo in similitudinem partis quæ nutritur transmutatur, concoctio. Vbi uero iam parū apponitur, nutritio. Quum igitur hepar præ imbecillitate ex uentre & intestinis alimentum trahere non potest, liquida & nondum in isto modo excuccata, per sedem excernuntur, & si quidem uenter simul cum hoc uiscere fuerit imbecillis ac non probe concoquens, cruda. Si uero ualidus fuerit, concocta quidem; sed liquida, propterea quod nulla, aut omnino modica digestio ac distributio ad hepar est facta. Si uero traxerit quidē hepar in seipsum ex uentre & intestinis alimentum, sanguificare autem ipsum præ debilitate nequit, quemadmodum in uentre multiformis corruptio contingit eorum quæ cruda remanent, sic etiam circa hepar. Dico autem nunc cruditatem solam, non comprehendens hoc sermone tardam concoctionem. quod si uelis alimentum crudum permanens, & alterationē quæ fit à particula iuxta naturam nō assumens, indē crudum appellare, neq; ego fugio appellationem, si mihi saltem differentia rerum conseruetur. Peior enim est transmutatio in peregrinam qualitatem iuxta cruditatē facta, moderatior uero ea est in qua alimentum suam naturā quam diutissime seruat, nulla alteratione ex particula quæ ad ipsum cōcoquēdum à natura destinata est, suscepta. Atq; & tertia præter has, species est frustratæ concoctionis, quā semicoctū sit alimentū. Et circa ipsam sanē exactā concoctionem frustratam, hepaticis sanguinolentus humor per aluū excernitur, talis cōsistentiæ uelut si quis sanguinem cum aqua confudisset, & pleriq; sanē medici imaginem eius depingentes scripserunt talem eius compagem esse, uelut si quis uictimæ recens macatæ carnes aqua lauasset. Et plurimæ hepaticæ affectiones ab eiusmodi excretionibus initium capiunt, nondum magnam debilitatem hepate habente, sed adhuc concoquere, & alimentum alterare uelut in formā sanguinis potente; aucta autem affectione, nihil amplius tale excernitur, sed multiformes aliæ qualitates & compages, uelut à uentre ex cruditate laborante. Verū in uentre ciborum ipsorum corruptiones manifeste apparent, circa hepar uero distributum alimentum ad sanguinem prius in uiscere existentē ammiscetur, corruptū

piturq; temporis progressu etiam hic, una cum alimento circa ipsum non conco-
 dit. Calida igitur intemperie circa viscus existente colliquationes fiunt, primum
 humorum, deinde etiam carnis ipsius hepatis, & euacuatur per uentrē bilis cras-
 sa, graueolens, & abunde colorata, quemadmodum in pestilentibus febribus
 contingit. Frigida uero intemperie existente, neque assiduae excretiones, ne-
 que multae fiunt. Durat tamen affectus diutius, & per aliquos dies profuer ipsa
 uenter maiori copia; cuius neq; foetor similis est his quae ex calore sunt liquefa-
 cta, neq; color similis, aut compages, uerū minus graueolentia ab his excernun-
 tur speciem putrefacti sanguinis, nō colliquatæ carnis habentia. aliquando uero
 id quod excernitur uelut sanguis niger apparebit. Verum diligenter consideran-
 ti neq; sanguis niger est, neque grumus, sed uelut limus quidam sanguinis crassi,
 qui prope ad atrā bilem accedat, & plures ac aegre iudicabiles colores circa eius-
 modi affectionem in egestionibus apparent. In utraq; autem intemperie tum ca-
 lida, tum frigida, quando intemperatura humida & sicca fuerint ammixtae, liqui-
 diores in humiditatis cōplexu, sicciores uero ex siccitatis copula, sicut cremēta.
 Scopus igitur curationis in eiusmodi affectionibus sit communis quidem, iuxta
 intemperiei contrarietatem, peculiaris autem unicuique per cuiusque contrarie-
 tatem. Affectio igitur Hepatica peculiariter appellata, ueluti etiam coeliaca &
 stomachica, circa tumores praeter naturam circa ipsas partes contingit. Inflam-
 matum enim esse hepar, aut abscessu laborare, aut induratum esse, medici di-
 cunt, aut aliud quippiam tale. Non tamen hepaticum uocant hominem ipsum,
 cui tale quippiam accidit. Verum quando circa manifestum aliquod in uiscere
 malum, in proprijs actionibus debilitatur, tunc aegrum hepaticum apellant.
 Videamus igitur primum ea quae scripserunt hi qui ante nos de pharmacis opti-
 me & studiosissime tradere sategerunt, initio ab his quae Andromachus prod-
 dit factio. Hic enim uir in libro internarum affectionum curationes continente
 multas hepaticas confectiones conscripsit, quarum omnium faciam mentio-
 nem hoc loco, ipsius uerbis in medium adductis, & primum sanē Antidoros ad-
 scribam.

Quae pharmaca ad Hepaticos ab Andromacho sunt con-
 scripta. Cap. VII



Andromachi antidotus Cyphoïdes ad hepaticos, & omnia thoracis
 uitia. Vuae passae carnis drach. xxv. alij drach. c. croci drachmā l.
 alij obol. iiii. calami drach. ii. & dimidiam. bdellij drachmas duas &
 dimidiam. cassiae sesquidrachmam, cinamomi obolos iiii. spicanardē
 drach. iiii. floris iunci odorati drach. ii. & dimidiam. myrrhae drach. iiii. teres
 bīnchinæ drach. iiii. alij drach. xvi. ramentorū aspalathi drach. ii. mellis drach.
 xvi. uini quod satis est. Haec quidem est Antidoti descriptio. Appellauit au-
 tem hanc cyphoide, hoc est, cyphoformem, ob similitudinem. Nam & odore
 & gustu similis est cyphi ab Aegyptijs appellato, qui sanē primi hoc pharmacū
 cum composuerunt, & utuntur eo quotidie ad uaporem edendum accenso in
 deorum honorem. Plurima autem eorum quae in illo thymiamate & suffumigio
 scripta sunt, eadem sunt cum his quae in hoc pharmaco habentur, quin & suffu-
 migari hoc ipsum similiter ut cyphi potest. Compositum est autem ex moderate
 adstringentibus, & resiccantibus ac discutientibus uiciosos, serosos humores,
 & corrigentibus humorum maliciam, & contrariam uim habentibus aduersum
 putrefactiones, quorum plurima ex aromatum sylua existunt. Habitaq; phar-
 macum hoc cinamomū omnes putredinosas & uenenosas facultates corrigens.

non solum seroforum et aliorum humorum, sed etiam lethaliū pharmacorum. Quemadmodum & feris uirū ciaculantibus contrarium existit. Consequenter autem post cinamomum, cassia eandem uim habet, optima uidelicet & cognata ipsi cinamomo, & post hanc omne aromatum genus uelut hic est nardus, & iuncus odoratus, calamusq; & myrrha. Hæc enim ad propositum pharmacum iniecta sunt, iuxta iam dictam ratiocinationem & modum: Quemadmodum etiam ex his quæ apud nos gignuntur, aspalathus & crocus, adstringens & concoctorium pharmacum, & quod corrigit putrefactiones. Cæterum uia passa contemptilis uideri possit, ob familiarem eius usum, at uero hoc ipsum eam facit utiliore, nam quum familiaris nobis sit, in tantum adstringens est, quantum opus habet uiscus affectum. Habet autem & uim concoctoriam crudorum humorum, & uim coercendi maligna, sitq; ipsa haud facile putredini obnoxia, & ultra hæc secundum totam substantiam uisceri ipsi familiaris est & propria. Didicimus enim quod alimenta secundum totam suam substantiam proprietatem ac familiaritatem habent ad ea quæ aluntur, quod maximum est in huiusmodi affectionibus curandis quæ iuxta intemperiem fiunt. Optime enim in ipsis faciunt quæ una cum hoc quod intemperiem curant, etiam alere possunt, & ob id etiam uinum conuenientissimum est, citra inflammationem, aut erysipelas, autem abscessum, aut calidam intemperaturam, agrotantibus. Nam & nutrit, & concoquit, & roborat, & putrefactioni resistit, & si intemperies ex humiditate facta sit & frigidityte, eam citra omnem molestiam ac secure per sanat. Eadem est & mellis facultas præterquam quod non condensat substantiam corporum quæ contingit, sed pro hoc uim extergendi, & aperienti, ac puros reddendi meatus, & urinam ciendi, non parua sanè auxilia possidet. Porro ammixtum est à compositore pharmaci bdelliū, sufficienter emolliens & concoquens, uelut didicimus, ampliusq; moderate discutiens. Consimile fermè uim terebinthina resina habet, supra hoc quod angustos meatus extergit & expurgat, quibus auxilijs uiscus curandum opus habet, quo osculorum uenarum in ipso commissuræ laxæ & ab obturatione liberæ permaneant. Didicimus namque quomodo obturatio efficiat putrefactiones. Aliqui tamen huiusmodi confectionum compositores, quemadmodum etiam prius in stomachicis dictum est, opium aut hyoscyamum, aut quippiam aliud ex refrigerantibus miscendo, ad calidas intemperies utile pharmacum effecerunt. Et ob id etiam Philonis Antidotus miscebat semel tantum exhibitā, hepaticam intemperiem sanauit, id quod & compositor eius testatum reliquit. Verum ex pharmacis hepaticis ab Andromacho conscriptis nullum est huiusmodi. Et sanè uehementer refrigerans nullum esse debet, sed qualia tum ab alijs, tum ab Aesclepiade sunt scripta. Nunc igitur hepaticas antidotos consequenter ab Andromacho proditas subscribam, modo memoria nos teneamus, nullam ipsarum calidis intemperaturis conuenire, sed aut humidis aut frigidis, aut ex utrisque compositis, aut certe humidis quidem fortiter, calidis uero moderate. Conscribuntur autem omnes iuxta ipsius Andromachi dictionē.

Alia Cyphoides ad hepaticos, ex libris Galii, ad tussis item & reiectiones. Croci drach. i. myrrhæ drach. i. bdellij drachmas iiii. aspalathi obol. iiii. iunci odorati drach. iiii. calami drach. ii. cassiæ drach. i. nardi indicæ drach. i. terebinthinæ drach. vi. carnis passerarū uuarum drach. ci. x. mellis heminam dimidiā. Vini chij quod satis est ad macerandam uiam passam, bdelliumq; ac myrrham. Resinam uero melle liquefacto, & deinde omnia mixta ac trita reponito.

Alia ad Hepaticos & Ictericos. Amygdalarum amararum drach. ii. anisi drach. i. absinthij, cumini, seminis apij, singulorū

drach. i. cornu cerui obol. iiii. trita cum aqua in pastillos triobolares redigito, ex eisq; unū mane ac uesperī, cū uino mulso dato. Nectarea Antidotus ad hepaticos & arquato laborantes. helenij sesquilibra. crocomagmatis lib. ii. aristolochiae unc. i. petroselinū unc. i. piperis nigri uncia dimidia, myrrhē unc. i. mel qd̄ satis est. Antidotus hepatica Athanasia appellata. Facit & ad nephriticos & ictericos. multum mouet sudorē. Croci drach. ii. cinamomi drach. i. nardi drach. ii. cassiae, myrrhæ, iunci odorati, singulorum drach. i. melle Attico excipe. Datur sabē græcæ magnitudine, febriçantibus ex aqua mulsa.

Hepatica admiranda, qua Pharmaces herbarius agrotus usus est. Croci drach. ii. mei, alari, phupontici, dauci, petroselinū, myrrhæ, singulorum drach. iiii. nardi Indicæ & celticæ utriusq; drach. v. i. costi, cassiæ, iunci odorati, singulorum obol. iiii. carpobalsami drach. iiii. & dimidiā, rubiæ drach. viii. succi radicis dulcis drach. iiii. hemionitidis herbæ drach. iiii. polij drach. iiii. succi balsami drach. vi. confectionis hedychoi drach. v. mellis quod satis est. Vtere, ad omnia uitia efficax est, nucis ponticæ magnitudine, cum uino mulso.

Antidotus Hepatica à Nearcho laudata. Radicis panacis, rubiæ, eryngij, eupatorii, helenij radicis, polij, costi, aristolochiæ, piperis, scolopendrij herbæ, seminis cucumeris, chamæpitrys, radicis gentianæ, milti siue rubricæ sinopidis, fellis ursini, spicæ nardi, baccarum iuniperi, seminis brassicæ, seminis erucæ, singulorum par pondus, melle Attico cocto excipe ac utere. Antidotus Hepatica Diocori. Cinamomi, cassiæ, utriusque drach. iiii. croci, nardi, costi, seminis balsami, hyperici, glycyrrhiæ, singulorum drach. viii. Excipe melle Attico, ac exhibe nucis ponticæ magnitudine.

Alia ad Hepaticos, & reliquos internos affectus, ut Aristocles. Piperis grana xl. myrrhæ drach. viii. croci, costi, mei, acori, nardi, dauci seminis, petroselinū, scordi, singulorum drach. iiii. cinamomi drach. xii. cassiæ drach. xii. Mellis quod sufficit. Datur nucis ponticæ magnitudine. Portio ad spleniticos, nephriticos, hydropicos, auxiliatur & stomachicis, & molestijs ex partu, & consulis. Prodest conualescentibus & se resicientibus ex infirmitate, facit ad uiciosis humores, ictericos & tussis, ac pleuriticos. Est etiam antidotus ad letalia phar-maca, & ad ferarū plagas. Nardi indicæ drach. ii. costi drach. ii. cassiæ drach. i. croci drach. i. piperis albi obol. v. alij drach. ii. seminis apij drach. i. obol. iiii. aridis illyricæ tantundem, acori drach. i. obol. i. opobalsami drach. i. succi ari-masculi drach. iiii. Vux passæ exacinatæ drach. vi. Terito cum passo, aut melle excipiro, & drach. i. cum uino dulci diluto dato, aut cum aquæ mulsæ cyathis. iiii. aut, ut conueniens fuerit. Hæ quidem sunt Hepaticæ confectiones ab Andromacho proditæ. Transibo autem iam inde ad eas quas Asclepiades tradidit in tertio interiorum, Quæ Mnaconi inscribit.

Confectiones Hepaticæ ab Asclepiade conscriptæ. Cap. viii.



Rimam equidem confectionem Asclepiades Antonij Musæ esse dicit, hoc modo compositam. Succi cichorij cyathum unum cum aquæ calidæ cyathis iiii. dato, mellis Attici cochleario addito. Aut filicis uel anethi succi cyathum unum cum aquæ mulsæ cyathis iiii. dato. Aut picridis recentis, aut seridis recentis succi cyathum unum cum aquæ mulsæ calidæ cyathis tribus. Hæc prima est descriptio trium pharmacorum in Asclepiadæ libro. Cichoria itaque & seris cibarij generis existunt, Apud nos namque rurales ambo hæc edunt & cruda & cocta. Vtitur eis etiam Erasistratus ab unde in affectionū circa alui cura. Facultas horū olerū subfrigida est & subamaræ ac moderate adstringens, & propter has qualitates, optima pharmaca calidis

intempe

intemperaturis ipsius hepatis existunt. Ultra hoc enim quod moderate refrigerant, amplius & robur visceri addunt per adstrictiorā facultatē. Insuper q̄ cōmissuras osculorum uenarum in sima visceris parte ad eas quæ in gibba sunt, extergent. Neq̄ uero frigidas intemperies magnopere lædunt, quemadmodum quæ frigidam humiditatē absq̄ adstrictione aut amaritudine possident, facere solent. Iuuat etiā uiscus talis olerum substantia potest, etiā si citra serosorum aut aliorum humorū uitiationē intemperies fiat per se, & cū humiditatis cuiuscunq̄ cōplexu, ex mixtura enim mellis, humiditatē per urinā educit. Quapropter etiā si siccata tusa quis potioni inspergat, itidem iuuant. Quin & decoctorū decoctum potatum multum commodi affert. Si uero nō calida aliqua intemperies infestet, aut si obturatio quædam sit circa uiscus, magnopere auxiliantur ex usū albo tenui potata, cum his quæ urinam ciunt. Vtilis autem non solum succus ipsorū est tum recens, tum exsiccatus, sed & ipsa olera exsiccata tusaq̄ ac trita potui inspersa, & eorum decoctū in potu acceptum, auxiliantur. Cæterū ad uisceris expurgationem & meatuū apertionem, citra manifestā calfactionem aut refrigerationem, optimū pharmacū filix est, prædominantē habens amarā qualitatem. Anethum uero nihil forte habet ad huiusmodi affectiones, sed modice refrigerati ac condensati uisceris curatiuum existit. At uero catapotion ex chamæpity, cuius itidem meminit, eiusdem cum prædictis facultatis est. Amarum enim & hoc pharma cum est. Nihil igitur mirum est, ipsam chamæpityn tum per se, tum cum cichorio potatā, hepaticas intemperaturas iuuare. Quemadmodum Asclepiades scripsit in hæc uerba.

Catapotion hepaticis. Radicis chamæpityos drach. viii. radicis cichorii drach. iiii. contunde & excipe melle cocto, ac præbe nucis ponticæ magnitudinem, & aquæ calidæ cyathos tres insuper bibendos. Hæc Asclepiades scripsit. Iuuant autem prædictæ herbæ hepaticos, non solum radicibus ipsarum acceptis & præparatis uelut Asclepiades prodidit, sed & succo, & decocto, & arida coma una cum semine tusa ac trita, assumptis. Quin & Sphendarni, id est, aceris radix tusa trita, nam & huius meminit, eiusdem est cū prædictis facultatis. Exhibet aut̄ ex ea drach. i. cū uini mulsi diluti cyathis tribus. Insuper & ex nardo celtica pharmacū: cuius item meminit: his cōsimile est. Scripsit autem ipsum sic. Nardi celticę partes tres, absinthij partem unam, tusa & cribrata melle cocto excipito, & mylstrum delingendum dato, Et quod post hoc scriptum est cōsimile ipsi existens in reliquis, plus habet de ui expurgandi ipsum uiscus per urinas. Scripsit autem sic Asclepiades de ipso.

Pastillus hepaticis. Anisi, seminis apij, asari, amygdalarum amararum mundatarum, absinthij, singulorū drach. iiii. præpara cū aqua & reduc in pastillos, ac exhibe drach. i. cū uini diluti cyathis. iiii. febrientibus cum aqua mulsæ. Hoc pharmacum leniter quodammodo est calidum, propter urinam cientium mixturam. Reliqua uero omnia superiora, aut prædominantē habent frigiditatem, aut omnino neque hanc, neque caliditatem. Verum uim exurgendi, & uias digestionis ab obturatione utndicandi, omnia habent.

Alia insuper medicamenta Asclepiadę scripta sunt, partim exurgendi ac aperiendi & secandi uim habentia, partim uero calidiora paululū quàm sunt media, media aut̄ dico quæ neque calfaciunt, neque refrigerant manifeste. Vnum uero inter ipsa calfactorium est, ubi ait, costi triti cochlearium præbe cum aquæ mulsæ calidæ cyath. iiii. Reliqua uero quæ prope ad medium temperamentum accedunt, ad caliditatem uergunt, hæc sunt. Helenij drachmas xii. crocomagmaris drachmas viii. excipe cichorii succo & fac catapotia, eaq̄ pro uiribus exhibe datur ad summum drachma ex uini mulsi diluti calidi cyathis tribus.

Hoc pharmacum poterat absque helenio etiam calidis intemperaturis conuenire. Quando uero helenium extergenſibus ammixtū est, ad caliditatem uergit, nisi quis omnino modicum de eo cum multa frigida permisceat. Quin & id quod ex ſcenicolo constat calfaciorum est, sic habens. ſceniculi drach. i. petroselini drach. ii. anisi, amygdalarum amararum, absinthij, singulorum drach. i. croci, myrrhæ, utriusq; obol. iii. excipe aqua ac redige in paſtillos, & dato drach. i. ut supra prædictum est. Etenim hoc loco ſceniculum quidem & petroselinum, multum calfaciunt. reliqua uero moderate, amygdalæ uero attenuatoriæ sunt facultatis, & præsertim si fuerint amaræ. Medium autem quodam modo inter calfacientia & refrigerantia est hoc pharmacum, quod Asclepiades scripsit hoc modo. Eclegma hepaticū Paulini, auxiliatur conſeſſim. chamæpityos sicca lib. i. myrrhæ unc. i. paſſi protropi sextarios, iii. Chamæpityn & uinum dulce coquito, & ubi superſuerit tertia pars, liquorem exprimito, eiq; mellis Attici libram dimidiam adijcito ac rursus coquito. Postea uero myrrham addito assidue agitando, atque ubi dissoluta fuerit, ab igne ablata reponito, & ante cibū mystrum exhibeto. Scripsit & ex cochleis pharmacum hepaticum Asclepiades huiusmodi. Cochlearum trium carnem ualde probe terito, & affulsis uini nigri cyathis tribus calfacito, ac bibendum dato. Videntur autem hæc iuxta totam substantiam efficacia esse, nō secundum unam aut alterā qualitatem. Quale est & Lupinū hepar, cuius abunde experimentum habemus. Vſus autem ipsius conſimilis cochleis est, teritur enim exacte hepar lupinum, & datur drach. i. cum uinō aliquo dulci, qualia sunt theracum creticum, & scybelites, ac dulce protropum. Benigna enim hæc sunt uisceri, ipsum nutrire potentia, & media iuxta calidi & frigidi oppositionem, & ob id talia pharmaca omnibus intemperaturis conuenire uidentur, ut quæ ex substantiæ proprietate commoditatem de se exhibent, & neque calidas, neque frigidas intemperies lædant. Atqui in febricitantibus manifesta febris, aut non obscure, uelut solet aliquibus hepaticis accedere, melius est ex aqua calida pharmacum præbere, aut ex aliquo prædictorum succorum, uelut est seridis succus.

Ad induratas hepatis affectiones. Et ad has Asclepiades quatuor pharmaca his uerbis scripsit. Conſectio ciens urinam, facit ad induratas hepatis affectiones, ad splenicos, & ægre se à morbo recolligentes, ac hydropicos, & in uniuersum bonum colorem inducit. Croci, nardi, cassiæ, singulorum drach. ii. costi, floris iunci odorati, cinamomi, myrrhæ itaciæ, singulorum drach. i. mellis costi drach. xxv. Datur sabæ Aegyptiæ magnitudine cum uini mulſi cyath. iii.

Alia qua uſus est Paſicrates. Urinam multam ducit. Seminis dauci sesquil drachmam, radicis rheiponticæ, floris iunci odorati, seminis balsami, cedridum, anisi, nardi indicæ, croci, cinamomi, cassiæ, phu, aſari, petroselini, chamæpityos, singulorum drach. i. mentæ sicca obol. iii. nucleorum pinearum nucum repurgatarum numero l. Excipe melle cocto & dato nucis ponticæ magnitudinem, cum uini mulſi diluti cyathis iii.

Alia antidotus ex felle urſino, pharmacum accommodatum ad induratas hepatis affectiones. Chamæpityos, marrubij, seminis petroselini, gentianæ, seminis uiticis, fellis urſi, sinapis, seminis cucumeris, scolopendrij, panacis, rubricæ lemnis, rubiæ, seminis brassicæ, aristolochiæ, piperis, nardi indicæ, costi, seminis apij, seminis erucæ, eryngij, polij, echij, eupatorij, baccarum iuniperi, singulorum drachmam unā. tusa, cribrata, melle excipe. Datur nucis auellane magnitudo in uini mulſi cyathis duobus. Alia accommodata, facit & ad alias internas affectiōes citra tuſſim. Radicis gentianæ, chamæpityos, marrubij, seminis

seminis petroselinī, fellis ūrsi, sinapis, seminis cucumeris scolopendrii, panacis, rubricæ sinopiceæ, rubig, seminis brassicæ, aristolochiæ longæ, piperis albi, spicæ nardi, colli, seminis erucæ, eryngij, baccarū iuniperi, seminis fraxini, chamædryos, dictamni cretici, seminis cestri, seminis dauci, singulorū unciam unam, mellis Attici quod satis est. Datur nucis ponticæ magnitudo, liquor sit passi cretici cyathi duo. Hoc pharmacum usu & experimento approbatum est. In alio exemplari etiam pelecini tantundem habetur. Circa prædicta quatuor pharmaca recte fecit Asclepiades quod non simpliciter adscripsit, uelut in alijs, quod ad hepaticos ipsis sit utendum, sed cum appositione, ad induratas uidelicet affectiones. Humidæ etenim uisceris affectiones, exolutum & imbecille ipsum facere solent, ueluti sunt articuli laxari: siue autem cum frigidityte, siue cum caliditate, siue sine his, laxitas ipsius sola constiterit, penitus adstringentibus pharmacis opus habent: uerum hoc aut cum calfacientium mixtura, si frigida qualitas prædominetur, aut cum refrigerantium, si calida. Quæ uero ob frigidos & crassos ac uiscosos humores in solidis corporibus imbibitos indurantur, ex necessitate frigidam habent affectionem. Quare & calfacientibus simulq; tenuium partium pharmacis opus habent. Hæc enim sufficientia sunt, & ad uiscositatem humorum induratis partibus infarctorum extergendam, & ad secandam crassitudinem, & discutendos ita extenuatos. Verum in quinto de simplicium pharmacorum facultate, ubi de eiusmodi affectionibus sermo mihi habitus est, emollientium medicamentorum mixturam laudauī, nimirum ut præparantem indurata corpora, & prædictis pharmacis idonea facientem: citra uero præmolliuionem, diffunduntur quodammodo ea ipsa corpora, & euestigio manifestam immutationem habent, sed in immedicabiles reliquias terminatur res ubi fuerint superreficcata. Hæc eadem & in XIII. methodi curatorij nobis sunt dicta. Igitur & circa hepar cōfectare oportet emollientiū mixturam. nam quā compagis humectæ sit hepatis corpus, ualde moderatis opus habet emollientibus: prædominatur itaque in ipso, præter aliarum partium induratarum morem, calfacientium & attenuantium mixtura. Merito itaque ex præscriptis quatuor pharmacis Asclepiades postremum maxime laudat, ut quod multā de se experientiam præbuit: ex aromatis enim componitur attenuare ac discutere ualentibus: alijsq; pharmaca adsumpsit, acia secantiq; ac discutioria: mitigatoria autem his amista sunt, cucumeris semen ac iuniperi baccæ. Deinde uero mel & eryngium, uelut urinam cientiā his addita sunt, quō exterræ uisceris affectionis per urinas deductio fiat.

Quæ Archigenes ad Hepaticos in secundo pharmacorum secundum genus scripsit. Cap. IX

IN hepaticis conueniente prægresso ductu per alimenta, unctiones, communia cataplasmata, uenæ sectionem, cucurbitas, sinapismos, dropaces, & consimilem dietam, amplius conscribendis compositis potionibus & malagmatis optime ipsis conuenientibus utaris. Et potionibus quidem his. Senecionis decoctum ut ualde commodum exhibeto. Nascitur aut huius caulīs maxime in regulis. Aut ungenti nardini cochlearia. III. quotidie bibenda dato, & maxime in induratis. Aut aristolochiæ obolos III. propinato febrilentibus ex aqua, febre carētib; ex uino, ualde benefacit. Aut trifolium acidum in aqua coquito ad tercias, & per triduum bibendum dato pro uice cyathi unū. Aut fel ūrsinū in uase leniter feruefacito, & in sole resiccato, atq; ex eo hepaticis cochleariū unū dato. Aut radicis rubi corticis minā unam,

cum

cum aquæ congio uno, in nouo uasculo ad residuum quartæ partis coquito, & ad succum per noctem sub die expositū mellis cyathos vi. ammisceto, & ieiunis ad triduum bibendum dato. Aut pseudobuni obolum unum dato cum melle ieiunis. Aut dauci & fœniculi radicis utriusque minam dimidiam cum aceto mulso ad tertias coquito, & ieiunis cyathum unum exhibeto. Aut glycyrrhizæ succi obolum unum aut duos ieiunis dato, & aluum subducit, & urinam mouet. In magna duriciâ abrotani succū quā crassissimum præbe bibendum, Aut acori obolum i. panacis tantundem, cum aqua propinato. Aut spicæ nardii decoctum assidue exhibeto.

De Cataplasmatibus. Cataplasma porro Hepaticum fit, malis cotoneis cum farina ordeacea & fœno græco coctis. Aut semine lini trito cum polenta in uino cocta. Aut semine lini trito cum melle subactio. Aut capparis radice in aceto mulso cocta. Aut farina ordeacea cum ficibus. Aut oleæ radice in uino cocta. Aut myrobalano tusa est uino. Aut cerato ex phœnicobalanis factio. Summe enim ad hepatis inflammationes facit, maxime in quibus etiam stomachus affectus est, & costæ distentæ sunt. Aut palmulam resectio interno nucleo diligenter tundito, & cum æquali parte cerati rosacei in mortario probe unito, rosaceum adfussando atque ita imposito. Aut myrrham amineo uino macerato, & palmulis ammisceto, & linteolo infarta imposito. Cæterum malagmata quibus quis uti possit in inflammatione hepatis citra manifestam causam, post irrigationes & cataplasmata, iam ante scripta sunt in sermone de oris uentris inflammatione, nimirum communia illi & hepati existentia, in quibus sunt etiam quæ ex meliloto præparantur, & polyarchium. Verum etiam nunc apponuntur quædam ex ipso Andromacho.

Malagma Andromachi ad hepaticos. Ammoniâ Thymiamatis, drach. cxi. alij drach. centum habent bdellij drach. xx. alij centum, aceti heminas. iiii. cyprini heminam unam, ego uero hemine dimidium. Malagma Apollonophanis. Cera drachmas lxxx. ammoniâ thymiamatis drach. lxxx. terebinthinæ drach. xl. manna thuris drach. xl. cum irino contundito.

Malagmata à Damocrate conscripta ad hepar & præcordia. Quædam ex eis etiam ad totum uentrem, & splenem. Cap. x.

Affecta si quis per stomachum præcordia, Et per iecur, intestina per, dein per colum, Per uentriculum, aut uiscus aliud sic proprie Dictum, uolet inquam læsa quis præcordia Malagmate integere bono & percommodo. Primum paratum habebit hoc longe antea, Infirum enim atq; inualidum est factum recens.

Cera capit quod pontice libras duas, Ammoniâ Thymiamatis solam libram, Terebinthinæ frictæ pariter solam libram, Vitisæ resina piceæ simul libram, Et post trientem cardamomi seminis, Arida cyperi tantundem, item myrrhæ bonæ, Pondusq; par uni horum iridis mox candidæ, Sextantem & inde celticæ spicæ integræ, His unciam unam & dimidiam croci boni Et sex meliloti, item duas, bessem puto, Verum melilotum præstiterit hic Atticum,

Recentis & cyprini libras olei duas.

Oleum cyprinum tu cum reliquis liquonibus

Et decoque lenta flammula, & deradito.

Dein tusa cribrata & reliqua, uino bono

Rigata, per noctem integram & totam diem,

Vinum omne donec combibant seponiro.

Vinctisq; post cyprino manibus, hæc pharmaca

Mortario amplo uni, & simul committito,

Mollisq; pelle tecta sic reponito.

Aliud Malagma eiusdem.

Aliud ualens ætas iudem si accesserit.

Verum hoc mage affectus uitantes mox habitum,

Quicumq; non cum flatibus, serpentibus

Erphlegmonis lædunt diutioribus,

Et uiscera irritant grauib; doloribus,

Iuat: solubiles male & iam duntias

Dissoluit, exoluta earum compage.

Paratur hoc modo, ut bonæ terebinthinae

Libram mediam, tantumq; ceræ ponticæ,

Foenicis græci unam capias puri libram,

Et de nitro, & de panace unicam libram,

Rursus anisi seminis unicam libram,

Pinguedinis puræ uisuli simul libram,

Pondusq; par contusæ & albidæ tridis,

Parum de aceto, tres cyathos sine dimidio,

Mellis duas libras recentis Attici,

Ammoniæ thymiamatis solam libram

Quidam addidere, utrum alij libras duas.

Sic tusa, cribrata, & cataplasmatas modo

Cum melle mixta, & pauca aceti stillula,

Donec fuerint mollita tactui coquito.

Atq; hinc liquatam ad cerulam, & pinguedinem,

Terebinthinam & calentem adhuc adijcito.

Et uasculo maiore derafa excipito,

Manibus subacta dein simul committito.

Nec utere mox, inualidum est factum recens.

Aliud Damocratis malagma.

Odorum & hoc, tollensq; mox uitia hepatis,

Affectiones renibus, colo & graues.

Stomacho simul & uulue diutiusculas.

Idemq; iam corrupto habitu super datur,

Morboq; longo pallidis, hydropicis,

Et qui male concoquunt cibum, & fastidiunt.

Habet hoc amomi Scythici, xylobalsami,

Et cardamomi, bdellijq; lucidi,

Aridæ Cyperi, thuris boni, omnium parem

Modum, libram. post cassiæ daphnitiidis,

Myrtæ bonæ, pariter croci, de singulis

Libræ trientem, aut amplius quid paululum,

Nardi bonæ post Syriacæ uncias duas,
 Terebinthinæ puræ bonæ libras duas,
 Albæ ceræ perpolitæ unam libram,
 Recentis ungenti cyprini libram unicam,
 Vini falerni hinc oprimi sextarium.
 Contusa alia cribro tenui concernito.
 Thus, bdellium, in mortarium conjicito.
 Myrrham bonam, simul crocumq; his addito,
 Fractisq; uinum cum cyprino confundito,
 Dein tundito, mellisq; crassitudinem
 Formato, & his aromata mox trita addito.
 Et quod superest uinum addito, committito,
 Totam diem noctem simul quo combibant.
 Terebinthinam uero, cyprinum, ceram & simul
 Igni liquata lentulo, his affundito.
 Vinctisq; post manibus per unguen quodpiam,
 Subacta sic committito, & reponito.
 Nec mox parato uti uelis tu pharmaco,
 Sed tempore interiecto, & hoc ceratulo
 Partim polito, ut mollius sit, addito,
 Quanquam potes solo uti etiam, raro tamen.

Aliud Damocratis malagma.

Aliud malagma ad iam relatas commodum
 Affectiones, si fuerint diutinae.
 Confert lienosis uel omnium optime,
 Si palluerint, & si febricitauerint,
 Aquamq; habeant præcordia his si pauculam,
 Multam nequeunt curare enim malagmata.
 Ficus cape pingues sicciore, sed nouas.
 Et semine ciecio, simul umbiliculo,
 Appende drachmas quinq; denas in super,
 Albæq; ceræ ponticæ parem modum,
 Myrobalani pinguis libram post integram,
 Nitri marini sed libram modo dimidiam,
 Aluminis scissi duas supra & decem
 Drachmas, superq; dimidiam, triobolon.
 Et mox onychis, quod sic uocatur, bdellij
 Addes parem tu aluminis dictum modum,
 Nitro parem florem lapidis sed Afij,
 Ammontaci tantumq; thymiamatis.
 Et seminis post siliculæ, & nasturtij,
 Et cardamomi, quam optimiq; origani,
 De singulis sextarij quartam modo.
 Viniq; post, trini unguinis, quod sufficit.
 Paratur at tandem malagma in hunc modum,
 Vino rigatum suaueolenti bdellium
 Mortario em ollito, & hinc adijcito
 Ficus, simul rursusq; rite tundito,
 Quo trita uini stillulis fiant probe,

Mixtura mox addatur inde inspersilis.
 At post rigatam feruida ceram ex aqua.
 Mollem manibus factamq; latam adijcto.
 Et cusa mox ligni radio compingito.
 Guttis & unguinis frequens madefacto.
 Vfus malagmatum omnium, quæ uentriculo
 Induntur, & stomacho simul interaneis.
 Est tempus, in quo qui cibus congestus est,
 Non amplius residet, sed aluum iam subiit.

Finis octauæ libri.

CAPITA NONI LIBRI

De ictericis.	Caput I
De splenis affectionibus.	Caput II
De hydropse siue aqua inter cutem.	Caput III
De pharmacis dolorem sedantibus anodynis & colicis appellatis.	Caput IIII
De dysentericis.	Caput V
De affectionibus & utriusq; sedis.	Caput VI
De hemorrhoidibus.	Caput VII
Ad pudendorum affectiones.	Caput VIII
De priapismo.	Caput IX
Ad ueri affectus.	Caput X

CLAVDII GALENI PERGAMENI

DE COMPOSITIONE PHARMACORVM SECUNDVM

locos Liber I X. Iano Cornario Medico interprete.

De ictericis.

Cap. I



IVNT quidē Ictericis ratione bonæ indicationis in febris, procurrente nimirum ad cutem bilioso humore, & facile sanæ hi curantur balneis aquarum potabilium, & olei discussorii affricu, omniumq; rarefacientium cutem. Quale est anethinum oleum, & chamæmelinum ac cicinum. Post hæc etiam ungenta faciunt, gleucinum, crocinum, deinde irinū & amaracinum. Verum alias confectiones priuatim Ictericas appellatas suis autoribus, ne putes ad huiusmodi ictericos conuenire, neque enim hoc illi ipsi de his prodiderunt, sed ad eos ictericos qui uasorum circa hepar obturationē habent. Imò etiam eos qui ex inflammatione icterici sunt. Itaq; qui icterum seu Regium morbum ex obturatione incurrunt, sine febre permanent, Qui uero ex inflammatione, omnino febricitant. Quicunq; igitur in pharmacis ictericis adscripserunt, in quibus ea ipsa conuenire dicant, hi re se fecerunt. Qui uero indiscriminatim & simpliciter protulerunt, non parū peccauerunt. Etenim quæ multū medicamentaria sunt, iidemq; facultate calida, magno pere febricitantes lædunt. Talia sunt gēssana, struthion, hebetum, cossius, aristolochia, polium, centaurea. Conueniunt autem ictericis ex inflammato hepate, quæ cūq; inflammationes sanant. Quemadmodum etiam his qui ex obstru-

ratione omnia quaecumq; strenue extergēt, etiam si medicamentariam substantiam habeant, & calidae sint facultatis. Si uero coincident simul obturatio & inflammatio, laxantibus simulq; extergētibus opus erit. Fugienda autem quaecumque medicamentarie substantiae, & calidae facultatis existunt. Quis igitur & plerique ante me Ictericis pharmaca indiscriminatim cōscripserint, ego propria discrimina singulis ipsorum adiciā, quo sciatis quibus nam in febribus citra periculum uti queatis, & quibus maius ex acerbatione febris & inflammationis detrimentum subsequatur, quā ex extersione emolumentum resultet.

De pharmacis Ictericis ab Andromacho scriptis.

Andromachus quatuor pharmaca ad Ictericos indiscriminatim tradidit, minime quidem periculosi usus in his qui non febricitant, uerum nō securi in febricitantibus, & maxime si cum uino aut uino mulso ea exhibeat, quemadmodum aliquando damus in febribus moderatis, & uisceris obturatione. Quare ex aceto mulso nō ualde acido securius itē ea quatuor pharmaca propinant, quae iuxta illius dictionē sic habent.

Ad Ictericos. In colocynthidis calicem uinū fundito, calfacto, ac bibendū dato, subducit aluum. Idem & thus facit.

Aliud ad Ictericos. Adianti obol. III. nardi obol. II. absinthij drach. I. myrrhæ obol. III. Excipe passo, ac dato nucis auellanae magnitudine, ex aqua cyathis. II.

Aliud ad Ictericos quo utor. Struthion cum croco coloratum, nucis ponticae magnitudine ex aqua aut aqua mulsa dato. Datur & Anchusa cochlearij mensura.

Aliud ad Ictericos, ut Apollonius. Enui drach. XXIII. cornu cerui usti drach. VIII. thuris drach. III. nardi Celticae drach. II. nardi Syriacae drach. I. piperis sesquidrachmā. floris lunci odorati drach. I. myrrhæ obol. II. cassiae obol. I. cinamomi obol. I. Vtere sicco cum uini mulsi cyathis tribus.

De pharmacis Ictericis ab Asclepiade scriptis, in tertio internorum.

Ex his quae antea dixi cognobile sit, etiam si citra discrimen pharmaca prodantur, quae fugienda sint febricitantibus. Cōsuevit autem Asclepiades aliquādo distinguere apponendo, febricitantibus hoc modo exhibere oponere medicamentum, Non febricitantibus hoc modotubi uero omnino nihil apponit, his in non febricitantibus magis est utendum, quemadmodum sanē etiam, quando ex uino solo, aut uino mulso usum fieri debere censemus. Talia enim nō febricitantibus conueniunt. Verum scripta ab ipso pharmaca haec sunt.

Potio ad Ictericos. Cichorii succi cyath. VI. febricitantibus per se dato. Non febricitantibus autem cum uini cyath. III.

Aliud. Solani succi cyath. I. Vini mulsi diluti dimidium.

Aliud inspersile. Anchusae tenuissime tritae cochlearia II. cum aqua potabili exhibe.

Aliud. Struthij cochlearium I. dato cum mellis diluti cyathis III.

Aliud Nicerati ciens urtnam. Cicerum siccorum sextarium I. rosmarini manipulum, aquae sextar. VI. foeniculi manipulum, asparagorum palustrium radicū manipulum, preparato ac dato, ut dictum est, coctum ac excolatū liquorem, febricitantibus simpliciter & assidue bibendū. Nō febricitantibus cū uino diluto.

Aliud. Cicerum sextar. I. adianti manipulum, aquae sextar. VI. asparagorum palustrium radicū manipulum, preparato & exhibeto uelut dictum est.

Pastillus ad Ictericos, facit & Hepaticis. Amygdalarum amatarum mundatarū drach. III. anisi, absinthij, utriusq; drach. I. nardi Indicae, asari utriusq; drach. unam, tusa & cribrata aqua subigito, ac formatis pastillis drachmam unam cum uini mulsi cyathis tribus non febricitantibus dato.

Aliud quo usus est Charixenes. Asari, absinthij, utriusq; drach. VIII. seminis anisi, foeniculi, apij, amygdalarum amatarum repurgatarum, singulorum drachmas III. Aqua subige ac forma pastillos, & exhibe ut dictum est.

Nicerati erithinum Medicamentum quod naribus attractū, morbum regium expurgat. Quando reliquum corpus iuxta naturam habuerit, oculi uero pallidi permāserint, acetū acerrimi cochleariū unum in balneo naribus attrahēdum exhibe, detrahit multæ bilis fluxionem.

Eiusdem aliud. Nasturtij uiridis folia tenera, aut rosmarini uiridis folia tenerrima terito, & expresso inde liquore ut prædictum est uritor. Aliud eiusdem. Elaterium cum lacte muliebri utrum naribus infundito, & attrahere iubeto.

Quæ pharmaca Archigenes ad Ictericos conscripsit, in secundo pharmacorum secundum genus.

AD Ictericos conueniens diæta & ductu per frequentes deambulationes, & multam unguentorum frictionem utaris, ampliusq; fomentis siccis & subseriptis medicamentis. Adiung eos qui in febribus morbum regium incidunt, ubi canini fuluo fructu comesto, statim probe suuari, Auxiliatur & chelidoniæ herbar succus cum uino aut aqua mulsa potatus. Aut adianti uel rubiæ radicis obol. III. cum aqua mulsa exhibe. Aut struthion cum melle delingant. Aut fellis ursini cyathum bibēdum dato. Aut hyperici drachmam unam ex uino mulso propinato, uel aquæ mulsæ cyatho uno. Aut helixin decoctum ad dies quinq; uel sex cum uino mulso. Aut stercoris canini albi sextantem, cum mellis quadrante ad triduum bibendum dato. Aut lichenas in petris nascentes cum aqua mulsa propina. Aut lichenis in tegulis uel lapidibus nascentis drach. I. ex meraco propina. Aut nasturtium cum olei cyatho uno bibendum præbeto. radicem uero eius in nares indito. Aut absinthij cochlearia. III. tanisi cochlearia. III. exhibeto ex aceto mulso. Aut oxylapathi siue lapathi radicis trite acetabulū, dato. ex aqua mulsa; si nō febrat cū uino aut uino mulso. Aut adianti & mētæ & rubiæ parem mensuram in aqua feruefacito, & heminam inde bibendā exhibeto diutius ad solem insolato, ac sitienti & anheloso, quo post acceptum potum exudet. Statim transit mutat colorem. Aut adianti & myrrhæ eius dimidium, ieiunio à balneo exhibeto in uini hemina dimidia. Aut leporis coagulum cum meraco ad dies. V. uel. VI. præbero. Aut Scolopendrij drach. III. ieiunis ex uino ad dies. V. uel. VI. dato. Aut mentæ & rubiæ ac adianti æquas portiones cum aquæ cyathis duobus propinato. Aut betæ foliorum crudorum drach. VI. myrrhæ obol. II. cum aqua mulsa ieiunis exhibeto, aut prælotis ac ieiunis cum uini hemina dimidia dato. Aut adianti drach. I. myrrhæ drach. II. mentę drach. I. in aquæ heminis duabus coquiro donec medietas supersit, deinde ubi plurimum deambulaueris probe fricato, & spiritu adhuc sublimiore existente bibēdam dato. Hoc ad bideū factio. Aut cicer eruinum in aqua sub dio per noctem exponito, aquamq; bibendam dato, & cicer insuper comedendū mane ac uespri. Inde uero per triduum absinthium ex aqua mulsa bibant. Aut cum cyclamini succo purgatis naribus lauato. Aut herbam Oronium appellatam coquiro, & cum decoctio lauato, & decoctum cōfestim uride reddes. Aut uenam sub lingua secato. Quod si ad nullum horum auxiliorum malum cedat, expurgatione per scammonia & exquisita diæta utantur, atq; ita ad exercitia progrediantur.

De splenis affectionibus.

Cap. II



Quod omnes corporis particulæ familiarem sibiipsis ex uenis trahant humore, in cōmentarijs de naturalibus facultatibus edocti, in iisdēq; etiam quod uelut fecem sanguinis, ex qua atra gignitur bilis, hoc uiscus alimentum habet institui, & ultra hæc memoria tenētes ea quæ in curandi methodo de Splene sunt dicta, facile assequemini ea quæ nunc referuntur. Quorum primum & principalissimum hoc est, Quod hoc uiscus à natura ce-

lerrime indurari soléat, sanguine nimirum in uenis ipsius obturato, & ob crassitudinem neq; excerni, neq; discuti facile potente. Attenuantibus igitur opus habet pharmacis citra manifestam caliditatem, ut ne uehementius incrassescat succus crassus in ipso obturatus. Quo uero actiones ipsius conferuentur, ex austeris aliquid his ammisceatur, quale est etiam adstringentiũ genus. Didicistis enim in naturalium facultatum cõmentarijs, Quod quum omnes particule suæ conseruationis gratia habeant facultates, tum familiarum attractoriam, tum alienorum expulsořiam, itemq; assimilatricem sibiipsis eorum quæ attraxerint, Aliquis ipsarum insuper inest, per accidens magnopere iuuare totum corpus. Ex hoc genere est & lien, qui ex hepate in seipsum uelut fecẽ sanguinis trahit, quẽ admodũ uesica in hepate bilem, & renes urinam. Si igitur præ imbecillitate eius, modi sanguinem ad se trahere nõ potest, uiciosus humor uniuerso corpori asfricatur. Ob id itaq; naturalem ipsius firmitatem custodire oportet, quo conueniens ipsi alimentum attrahat, per quam actionem uniuerso corpori ad humorum bonitatem cõfert, & generata in ipso recrementa in uentrem demittere potest, unã cum ciborũ recrementis excernenda. Ea gratia igitur ualde amara medicamenta ipsi offerimus, quædamq; ipsis exausteris miscemus. Quædam uero ad materiam comoda, ad ceratorum uidelicet & malagmarũ præparationem, apponimus, quale pharmacum est cera, & resina, & pix, & bitumen, & quæcũq; alia huiusmodi. Iuxta primã autẽ rationẽ acerũ, & acerũ mullum, uisceri comoda sunt, utpote secare & attenuare crassos humores potentia, citra calfactiořnem. Quemadmodum igitur in alijs particulis ea quæ per cataplasmata, aut liquida pharmaca imposita, aut affusa totu auxiliatur, in alio opere relata sunt: Ita & nunc relictis his quæ inflammato spleni cõmodant, eorum solum mentionem faciam quæ indurato uisceri opitulantur, quod ipsum etiam in medicamentarijs libris fecerũt qui ante me scripserunt, proprie eos splenicos appellantes, qui induratum splenis affectionem habent.

Pharmaca porabilia ab Andromacho ad splenicos conscripta.

Ponio ad splenicos Antipatri, ut Nilus. Carnis myrobalani drach. iiii. hemonistidis herbar, quam quidam asplenum, quidam scolopendram dicunt drach. vi. corticis radice capparis drach. iiii. costi drach. iiii. chamædryos drach. vi. polij drach. iiii. radice coryledonis drach. ii. corymborum hederæ nigræ grana xxv. ammoniaci thymiamatis drach. iiii. seminis hyperici drach. ii. galbani drach. ii. seminis periclymeni drach. i. aut radice drach. iiii. nasturtij nigri sesquidrachmam. succi fructus scillæ drach. xvi. Dantur oboli duo in aceto mulso.

Aliud splenicis potabile. Glandis ungentariæ drach. iiii. hederæ alba grana xxiiii. costi drach. ii. seminis periclymeni drach. ii. hyperici drach. iiii. galbani drach. i. oboli ii. nasturtij drach. iiii. Excipe succo scillæ cocto. Dato faba græcã in aceto mulso.

Aliud. Carnis myrobalani drach. iiii. hyperici drach. vi. seminis periclymeni drach. vi. radice dauci drach. vi. rubiæ acri, phu pontici, croci, singulorũ drach. vi. iunci odorati drach. iiii. Mei drach. vi. nasturtij. chamæpityos, radice capparis, singulorũ drach. vi. polij drach. vi. alijs drach. iiii. ammoniaci thymiamatis drach. iiii. cũ aceto mulso pastillos duorũ obolorum ponderis formato, & unum in aceto mulso dato. Facit & ad hepaticos, & hydropicos.

Aliud facit ad splenicos. Trixaginis drach. iiii. polij drach. v. chamæpityos drachmas iiii. rubiæ drach. v. ammoniaci thymiamatis drach. ii. artemisiæ drachmas iiii. myrobalani drach. iiii. corticis radice capparis drachmas iiii. aristolochiæ drachmas vi. tragacanthæ drach. ii. cum aqua in pastillos tribolares redigito, ac dato ex aceto mulso.

Aliud

Aliud Stomacho commodum. Vtere etiam ad omnem affectionem splenis. facit & ad conuulsa, inflata, & vitia muliebría. Myrrhæ drach. iiii. nardi Indicæ drach. iiii. corticis radicis capparis drachmas iiii. costi drach. v. radicis panacis drach. ii. radicis peucedani drach. iiii. dictamnii drach. ii. polij drach. ii. corticis radicis periclymeni drach. iiii. rubig. drach. iiii. & dimidiâ. ammoniaci thymiamatis drach. iiii. & dimidiam. aliqui etiam iridis drach. iiii. & dimidiam. Excipe aceto mulso, præbe obolos ii. in aceto mulso.

Aliud Splenicis, orthopnoicis. Struthij, scillæ assatæ, panacis, radicis capparis, singulorum drach. v. croco magmatis drach. ii. & dimidiam. excipe aceto & præbe in aceto scillitico.

Aliud. Struthij, corticis radicis capparis, trixaginis, panacis, singulorū drach. x. fructus myricæ drachmas iii. Excipe aceto scillitico, & drachmā unam ex aceto scillitico exhibeto.

Pharmaca potabilia ab Asclepiade, ad Splenem conscripta.

Cynoglossi manipulū cum uini cyathis. iii. terito, & expressum liquorem ante cibum bibendum dato. facit & succus per se. Colligere autem oportet herbam sinistra manu ante solis exortum.

Aliud. Trixaginis manipulum cum uini sextario uno coquito, & expressum liquorem reponito, atq; ex eo cyathos. ii. ante cibum dato.

Pharmacum inspersile Splenicis. Myricæ fructum tusum & cribratum reponito. Vnus uero tempore cochlearia. ii. cum aceti mulsi diluti cyathis. iii. dato.

Aut herbam pelargiū appellatam tusam ac cribratam dato ut prædictum est.

Aliud. Asini aut equi syluestrium lienem siccatum tundito ac reponito, & cochlearia. ii. cum uini diluti cyathis. iii. exhibeto.

Cataponium Splenicis. Corymborū hederæ albæ grana. iii. deuoranda præbe, & aceti mulsi cyathos. iii. insuper bibendos.

Cataponium Andreæ pæonium dictum. Myricæ fructū tusum & cribratum galbano excipe, & in cataporia redige, atq; pro uribus exhibe.

Pastillus splenicus tumorem eliquat. Fructus ericæ drach. iiii. piperis albi, nardi Syriacæ, ammoniaci thymiamatis, singulorum drach. ii. Arida tunduntur & cribrantur, ammoniacum aceto scillitico dissoluitur, & aridis additum in pastillos cogitur, sunt autē pastilli drachmæ pondere, daturq; drach. lex aceti mulsi cyathis. iii. Qui pharmacum hoc tradidit, dixit porcellum ad triduum hoc bibisse, & postea relictum, sine liene inuentum esse.

Alius splenem tumentem eliquans & consumens. Ammoniaci thymiamatis, foliorum rubi tenerimorum, utrorumq; drach. viii. corticis capparis drach. iiii. myricæ fructus, herbæ aspleni quæ & scolopendriū & hemionitis dicitur, utriusq; drach. ii. nuclei scillæ assatæ & purgatæ, piperis albi, utriusq; drach. ii. Excipe aqua & redige in pastillos, atq; exhibe drach. i. cum aceti mulsi cyathis. iii.

Chrysermi pastillus, splenicis, hydropicis, Cit urinam, mollit aluum. Scillam magnam luto oblitam assato, & corticem detrahito ac quod ad fundū est durum, ex nucleo uero libras. ii. accipito, seminis dauci drach. viii. hoc est unciam unam, anisi, fefelis, radicis panacis, iridis, singulorum tantundem, seminis urticæ, baccarum cedri, utrorumq; drach. x. ii. myrrhæ drach. iiii. erui moliti choenicem. Vini odorati quod satis est. Subacta in pastillos redigito. Datur drach. i. cum aceti mulsi cyathis. iii.

Alius Eugeræ. Scillæ assatæ depuratæ minas. ii. radicis hyroniæ minas. viii. piperis albi tantundem, petroselinū tantundem, seminis dauci cretici tantundem, erui moliti tantundem, cedridum, hoc est, cedri baccarum sextarios. v. i. aceti bessem; iridis, radicis panacis, myrrhæ, singulorum quadrancem. Vini salerni quantum satis est his in pastillos cogendis, formatos autem pastillos in umbra reficea, & unciam. i. cum uini diluti cyathis uribus exhibe.

Epithemata & emplastra eiusdem Asclepiadę ad recen-
tes splenis inflammationes.

Foliorum tenerrimorum arboris sambuci lib. iiii. aloes lib. i. cum aceto subigi-
to, & linteolo infarcta imposito. Aliud, Ericę fructus semissem, gal-
bani lib. i. alij semissem. fructum tundito ac cribrato, atq; ita galbanum addito, ac
diligenter miscito, atq; in linteolum impacta imposito.

Pharmacum Idiotę accommodatum. Visci quercini lib. i. calcis vię lib. unę,
uiscum in uas fictile coniectum ac prunis appositum dissoluto, & dissoluto cal-
cem usiam inspergit, miscito, & calidum albę pelli infarctum imposito. Opor-
tet autę cum adhærente adhuc pharmaco lauari, atq; ita sinere donec sua sponie
cadat. Curam item habere oportet ut disparatę splenij partes rescentur.

Aliud. Visci quercini lib. i. calcis unc. i. floris lapidis Asij trientem, cedrię
unc. i. preparato pro more, ac utere quotidie auferens pharmacum, & spongijs
calidis fouens locos, rursusq; imponens. Hoc pharmacum urinam mouet.

Malagma auri colorem referens, ualde cōmodum. Cera, resine pinus & friv-
ctę singulorum libras ii. arsenici, alumini scissi, calcis uiuę, singulorum sextan-
tem, aceti, olei, utriusq; cyathos viii. Apparato pro more.

Aliud ualde generosum, quo usus est Andromachus. Cera, resine pinus, pi-
cis Brutę arida, singulorū lib. ii. arsenici, alumini scissi, calcis uiuę, singulorum
sextantię, aceti cyath. viii. præpara pro cōsuetudine. Facit ad splenicos, hydro-
picos, & ad præcordia distenta. Facit & ad Ischiadicos, arthriticos. Nos ad phar-
macum hoc apposuius myrrhę sextantem & unciam dimidiā, uisci trientem.

Ad induratas splenis affectiones. Vfus est Tryphon Gortyniates.

Foeni gręci moliti, sinapis mannę thuris, singulorum sextarium unum, retri-
mentorum a myrobalano expressa reliquorum sextarium dimidium. spumę
nitri quadrantię, tenuissime trita ac mixta, cedria cocta excipe, ut emplastri liqui-
di habeant spissitudinem. Vfus eius est per interualla, pharmacum autem impo-
situm fasciis complectę & oblige. Tempus imponendi est ante balneū, quan-
tum possibile est agrum ferre, postea uero obligatum adhuc in balneum induci-
to, & pro reliqui corporis curatione in solium demittito. atq; ita in aqua fasciam
resolutio.

Aliud ad splenicos per unam diem sanans. Verum supra phar-
maci impositionem per tres dies certo uiuendi modo utimur. Myrrhę, mannę
thuris, utriusq; quadrantem. sinapis Alexandrinę, nasturtij, utriusq; sextantem.
aceti scillitici quod satis est. Sinapi & nasturtium tundito ac cribrato, mannā ue-
ro & myrrham dissoluto, eisdę arida addito, & simul aceto subacta ad malagma-
tis formā reducito, & a secūda hora usq; ad nonam imposito. Postea uero duar-
bus fascijs obligatum in balneum inducimus, atq; ubi laxatę fuerint in calidę so-
lium demittimus. In solio uero longiori temporis spacio morietur, cruribus ex-
tra aquam emotis. Ne uero in animi deliquium delabatur, acetum & pulegium
odore, & fascias paulatim resoluat. Egresso porrō ē balneo lassamētum citra pa-
nem exhibendum est, & uinum mari mixtum. Sequenti die eadē offerenda sunt.
Tertia uero gymnasijs utendum quę spiritum acutum reddere ualent.

Aliud Arię Tarsensis. Vfus est per interualla. Ficuum pinguiusimarum, sina-
pis, radice caparis corticis, singulorum lib. i. aceti quantum satis est.

Aliud Diodori. Sinapis, nasturtij, foeni gręci, seminis lini, retrimentorum ab
expressa myrobalano reliquorum, singulorum drach. viii. Excipe cedria cocta
aceto scillitico ammixto. Vfus est antę balneum. pharmacum bonum est, & post
usum sanguinem mingunt.

Pharmaca ab Aſclepiade in quarto externorum conſcripta, ad ſplenicos, & hydropicos. Quæ iuxta diſtinctionem eius ſic habent.

E Pithema ſplenicis, tumorem eliquat. Foliorum tenerorū ſambuci lib. iiii. aloes pinguis lib. unam. terito cum aceto, & linteolo excepta imponito.

Aliud, Fructus ericæ lib. unam. galbani lib. i. fructum tundito & cribrato ac galbano excipito, rurfusq; tundito ungenti Irini fece admota, quo ad malagma tris formam redigatur, deinde linteolo infarſa imponito. Malagma ad ſplenicos.

Myrobalani corticum tuſorum cribratorū minam dimidiā, & retrimentorum ab expreſſo ſucco eiusdem reſiduorum tantundem. ceræ drach. vi. reſinæ terebinthinæ drach. xxxii. galbani drach. x. Irini parum. Arida cum liquiſdis committito.

Aliud ualde præclarum. Farinæ myrobalani quadrantem, nitri unc. unā. alijs uncias iiii. ceræ ſemiſſem. terebinthinæ beſſem, acetū quod ſufficit, ſplenem eliquat.

Malagma ex Cedria ſplenicis, hydropicis, medicamentum accommodatum. Vrinam cit multam, & ſplenem eliquat. Oportet autem unā cum pharmaco lauare, & quod ab eo diſparatum eſt, à ſplenio uidelicet de corporis cuticula, deſecare. Sinendum enim eſt adhæreſcē pharmacum, donec ſua ſponte dilabatur. Compoſitio hæc eſt. Viſci quercini lib. i. calcis uiuæ ſemiſſem. floris lapidis Aſij trientem. cedriæ quadrantem. Viſcum arca parina coquito, & poſtquam ſuluum factum fuerit, cedriam adiſcō, aſſidueq; moueto ac arida trita inſpergito. Deinde ab igne ablata aliqualiſter frigeſieri ſinito,

atq; in pellem albam à ſpina appellatam infarſa affectis locis imponito, & unā cum pharmaco lauare iubeto, donec ſplenium ſua ſponte dilabatur. Oportet tamen ut prædictum eſt diſparatas ſplenij partes deſecare.

Aliud ualde præclarum. Floris lapidis Aſij ſextantem. lapidis gagatæ unc. i. calcis uiuæ beſſem. viſci quercini lib. i. Præpara ac utere ut dictum eſt.

Malagma Anthiochidis. ad ſplenicos, hydropicos Iſchiadicōs, arthriticos, præparatum eſt Fabullæ. Ceræ lib. iiii. reſinæ terebinthinæ libras iiii. retrimentorum ab expreſſa myrobalano reliquorum lib. unam, ſpumæ nitri lib. i. floris lapidis Aſij lib. unam. ammoniaci thymiamatis libr. unam. olei cyprini lib. iiii. Acetum ad ammoniacum diſſoluendum.

Aliud Fabellæ compoſitum ualde præclarum. ad eandem affectiones. Myrrhæ ſtactæ lib. ii. opopanacis lib. unā. galbani lib. unam. maſtiches lib. unam. floris lapidis Aſij lib. unam. ſtyracis lib. i. ſucci ſycomororū lib. unam. canchrys lib. unam. piperis albi ſemiſſem. ceræ lib. v. terebinthinæ lib. v. pharmacum eſt tuſile, id eſt, quod cōtunditur. Oportet autem tundentes ungenti Irini fecem admouere, donec quā molliffimum pharmacum reddatur. Repoſitum enim molliffimum euadit.

Malagma quod aurei coloris appellamus. Auripigmenti unc. i. aluminis ſciſſi ſextantem, calcis uiuæ ſextantem. Arida tundimus ac cribramus, & in mortarium conijcimus, hiſq; acetū cyathos viii. ſuperfundimus, & probe trita liquiſdis excipimus. Sunt autem liquida hæc. Ceræ lib. unam. reſinæ friſtæ lib. ii. pinus lib. ii. hæc frigeſieri poſt eliquationem ſinimus, & ſic eraſa tritis adiſcimus. Nos ad pharmaci præparationem etiam myrrhæ ſextantem appoſuimus.

Aliud, hoc eſt uſus Andromachus. Facit ſplenicis, hydropicis, & ad præcordia diſtenta. Facit item Iſchiadicis, Arthriticis, & ad inueteratas affectiones. Ceræ lib. unam. picis brutiæ lib. unam. pro reſina friſtā, picem addimus. olei cyath. viii. auripigmenti auricolaris ſextantem. aluminis ſciſſi ſextantem. calcis uiuæ ſextantem. præpara ut dictum eſt. Nos ad pharmacum etiam myrrhæ ſextantē, & viſci quercini trientem appoſuimus.

Ad inueteratas induratas ſplenis affectiones, Authemerōn ab eo quod per unam

unam diem curat appellatū. Oportet autem cum pharmaci impositione ægrum ad triduum conuenienti diæta uti. Myrtæ, mannæ thuris, utriusq; quadrans. sinapis Alexandrini sextantem. nasturtij sextantem. aceti scilicet quod satis est. Arida tundito & cribrato, & cum aceto ad malagmatis formam subigito, & linetolo excepta ab hora secunda usq; ad nonā imposito, ita ut cōplectaris & contineas incubens malagma fasciola obligata. Deinde, uero ita obligatū in balneo mittito, & ubi probe laxata fuerit, in solium desidere facito; & pedes extra solium extendere iubeto, ac longiori tempore in ipso immorari. Ceterū ad reuocandos in animi deliquium collapsos acetum cum pulegio naribus admouemus, & paulatim resolvere fascias tentamus. Sint autem duæ fasciæ malagmati incumbentes. quum enim fasciæ tolluntur, auferimus etiam incumbens malagma, & post affectos locos sufficienter fouemus. Egresso de balneo salsamentum citra panē exhibemus, & uinum mari mixtum. Idem etiam sequenti die facimus. Et tertiū similiter, in superq; gymnasijs utimur quæ spiritum acutum reddere possunt.

Aliud Tryphonis Gortyniæ Creiensis pharmacum accommodatum.

Foeni græci moliti sextarium unum, recrementorum ab expressa myrobalano reliquorum sextarium dimidium. spumæ nitrī quadrantem. Omnia trita cedria excipe. Verum hanc prius cœctiam condensare oportet ad cerati spissitudinem. Vfus est ante balneum, quantum aeger ferre potest. A balneo cerotarium imponimus. Aliud Aûhemeron inscriptum, liberat ab affectione. Pyrethri drach. xx. myrobalani bessem, nasturtij bessem, seminis urticæ bessem, sinapis sextartiū dimidium. omnia trita & aceto subacta per interualla imposito ad horas tres si aeger tolerare possit. Deinde ablato pharmaco lauare iube. In balneo uero cerato utendum est ex rosaceo apparato. Aliud tumorem liquescit. Floris lapidis Asij, nitrī rubri, recrementorum expressæ myrobalani, ammoniaci thymiamatis, singulorū drach. xxiii. corticis radicis capparis drach. viii. seminis raphanis drach. x. aut succi cyathū unum, aceti acerrimi quod satis est, uisci quæ dñi drach. xl. ammoniacum sambuci succo, aut myricæ, aut trifolij dissolue; Arida uero tunda & angustissimo cribro excute, ac aceto subige, indeq; ammixto uisco omnia simul contunde, & utere.

Pharmaca ad splenicis ab Archigene in primo medicamentorum secundum genus conscripia.

In splenicis porro præcedente similiter tota diæta, ex describendis compositionibus his uitor. Potus quidem sit aqua in qua ignitū ferrum sape sit extinctum, non febrientibus cum uino. Febricitantibus uero aqua sola. Aurana gallidis ceruleum florem habentis obulum unum exhibeto cum aceto mulso. Aut serpillum cum aceto. Aut panacis radicem uiridem cum aqua mulsā. Aut semen similiter. Aquam mulsam uero per noctem sub dio exponito. Aut corticis radicis periclymeni & seminis eius quantum tribus digitis apprehendi potest, in uino albo meraco calido ieiunis bibendum ad dies xl. exhibeto. Aut uulpis hepar siccum cum aceto mulso exhibe bibendum. Aut cuminum Aethiopicum similiter ut hepar ex aceto mulso. Aut radicis ari corticis drachmam dimidiam cum aceti mulsi cyathis iii. Aut polium similiter cum aceto mulso. Aut hederæ albæ grana tria cum aceti mulsi cyathis iii. Aut arida trita capparis folia propinato. Cataplasmata autem eadem impones splenicis quæ hepaticis. Ampliusq; cinerē ex ferraria officina cum aceto. Aut capparim maceratam aceto ac tritam cerato cyprino exceptam. Aut nasturtiū & fenum græcum, ac calcem uiuam, & niurum, cum melle mollita imposito. Aut fenum græcum, & calcem, ac niurū, item cum melle imposito. Aut lepidij folia imposito.

Quum

Quum uero iam mortuum perceperint in balneum inducto, & ablato pharmaco in feruida foliū demittito ac detineto, Aegre enim ferunt nimiam mordacitatē, uerum sani exeunt. Idem etiā in lischiadidis facit. Aut myrobalani expressa retrimētū aceto maceratū, rosaceo cerato excipe ac impone. Aut foeni græci & nasturtij par pondus, mannae duplum, calcis uizæ parū, cum melle splenia uelut emplastra facito ac imposito. Aut fecē acris aceti imposito. Aut sapparis radicem cum aceto. Aut spongiā a cerrimo aceto imbutā. Egregie faciunt myrobalani cortices, & nitri tertia ipsorū pars, trita aceto subigito, & resinā ac ceram cum modico oleo liquefacta affundito, & mollitis uisor. Perseuerante malo cucurbitas cum scarificatione affigito. Amuleta autem, & per cōtrarietatem quandam naturalem ad hepar & splenem facere credita, hæc sunt Venam retro sinistram autem secato, & detractō sanguine affectum splenem conficito.

De hydropē siue aqua inter cutem.

Cap. III



Ydropicorū medicamenta, & alia cōmunia ad splenicos ipsos, itēq; quedā multiplicis usus, ad uarias affectiones, tū iam prædictas, tum duricias & ubi quid discutere oportet, etiā si iam purulenta sit cōpā ges, dicere aggrediar initio ab his quæ Asclepiades tradidit sumptō.

Pharmaca ab Asclepiade conscripta ad prædictas affectiones in quarto exteriorum, quæ Marcellus inscribit.

EPithema hydropicis ualde cōmodum, quod adiacentem humore absorbet, Farris, quod zeam uocant, moliti sextar. II. floris lapidis Assi sextar. I. mannae lib. I. Probe trita adipe sudlo ueteri probe subactō, & uiso per integrā noctē macerato, excipito. Sit autem tanta adipis copia quanta ad molle faciendū pharmacum satis est.

Aliud. Balsamē autem semen rutæ syluestris quod in Syria nascitur, & uernacula lingua Harmala ab illis appellatur huius tuss sextarium I. mannae sextariū dimidium, adipis suilli ueteris quantum sufficit, præparato ut dictum est.

Aliud. Ficuum pinguisissimum lib. III. origani lib. I. Quidam cumini lib. I. sulphuris uiui quadrātem, cochlearum Africānarū lib. I. Arida tundito & cribrato, & tussis sicubus unā cum carne cochlearum excepta, ac in linteolum infarcta imposito, melle coctio sufficienti addito.

Aliud ex Critone. Foeni græci moliti ac cribrati sextarios II. sulphuris uiui lib. II. & dimidiū. Arida tenuissime trita melle cocto excipito. Indēq; linteolo infarcta per noctem imposito. In die utere & gestatione, & cōfessione subscripta.

Malagna Ipoteriū inscriptum. Resorbet humiditates ex alto, & duricias dissoluit. Cerae, picis aridae, utriusq; lib. II. aluminis liquidī, sulphuris uiui, mannae, nitri rubri, singulorum lib. I. resinæ frictæ lib. III. olei ueteris heminam I. aceti quantum satis est ad arida dissoluenda. Præpara ac utere ut probato.

Aliud præclarū Ipoterium pharmacum a cōmodatum. Facit hydropicis, splenicis, & ad inueteratas affectiones. Resinæ frictæ lib. III. cerae lib. II. sulphuris uiui lib. I. picis liquidæ lib. II. aluminis liquidī lib. unam. nitri rubri lib. unam. Aristolochiæ quadrantem, bdellij quadrantem, amomi racemi quadrantem, radicis cucumeris syluestris quadrantem, aloes semillem, pyrethri quadrantem, ammoniaci thymiamatis quadrantem, uisci quercini quadrantem, succi fycomorum quadrantem, aceti sesquiseptarium. Aut pro aceto uini Italici tantundem, olei heminas III. præparato pro more.

Malagna ex bacis lauri, ad splenicos, hydropicos. Dissoluit omnē durtiam, absorbet abscessus in profundo. Cerae lib. I. resine pinus lib. I. picis Brutæ lib. I. baccarum lauri siccarum lib. unam. nitri rubri lib. unā. ammoniaci thymiamatis lib. I. adipis uisulini subacti lib. I. arida tundito & cribrato per angustissimum cribrum.

brum. Liquefcebilia liquantur & frige facta aridis adijciuntur, atq; ita contusis ſmul ac repositis utimur.

Aliud, Baccarū lauri lib. i. picis lib. i. mānæ lib. i. adipis taurini lib. i. ammoniaci thymiamatis lib. i. ceræ lib. i. præparato ut prædictum est. Emplaſtrū tonſoris appellationē, ad ſplenicos, et hydropicos. Hoc tonſor quidam uir Bithynienſis uſus, iſchiadicos à coxendicum morbo penitus liberauit. Picis aridæ lib. iiii. ceræ lib. ii. reſinæ pinus lib. ii. ammoniaci thymiamatis lib. ii. nitri rubri lib. ii. adipis taurini lib. i. In alio exemplari etiam iridis lib. ii. habentur. cāchrysos uncia xvi. farinæ ſceni græci ſextarius i. pollinis ſextar. i. radicis chamaeleonis nigræ tenuiſſime tuſæ ſextar. i. cumini tenuiſſime triti ſextar. i. quifextarius, paſſi ſextar. i. In alio exemplari aniſi triti ſextarius dimidiuſ habetur, & pollen deſt.

Aliud Bithynum appellatum, pharmacum à commo datum ad prædictas affectiones. Picis Brutæ lib. iiii. reſinæ pinus, ceræ, ammoniaci thymiamatis, ſingulorū lib. ii. medullæ ceruinæ lib. i. adipis taurini ſubacti lib. i. ſucci ſycomororū lib. i. ſloris lapidis Aſij ſemiſſem, radicis chamaeleonis contuſæ ſemiſſem, baccarum lauri ſiccarū libram dimidiā, farinæ loliaecæ lib. dimidiā, ſeminis dauci Cretici contuſi trientem, petroſelini trientem, cumini Aethiopici trientem, aniſi trientem, ſalis hiſpani ſexuncem, aſphronitri ſexuncē, cyprini ſexuncē. Vini ſalerni qđ ſatis eſt. Arida cū liquidis pro more apparato.

Malagma ex ſeminibus, pharmacū accōmodatū ad prædictas affectiones, hoc uſus eſt Olympius. Ceræ drach. c. terebinthinæ drach. c. ammoniaci thymiamatis drach. c. adipis taurini drach. c. aniſi drach. c. ſceni græci drach. c. petroſelini drach. c. ammiſ, iridis Illyricæ, utruſq; drach. l. panacis drach. c. nitri drach. l. glycyrrhizæ drach. l. cyperi drach. xxv. ſabinæ drach. xxv. ſamſuchi drach. xxv. meliloti drach. xxv. cardamomi drach. xii. & dimidiā. caſſiæ ſiſtulæ drach. xii. & dimidiā, nardi Celticæ, radicis dauci Cretici, utruſq; drach. xii. & dimidiā. Mellis heminam & dimidiā. Vini odorati quod ſufficit. Prepara pro conſueto more.

Aliud, Ceræ minam i. ammoniaci thymiamatis minam i. terebinthinæ minā i. ſamſuchi minam dimidiā. iridis Illyricæ minæ quartā partem, hoc eſt drachmas xxv. ſeminis lini toſti minæ quartā partem, adipis taurini minæ quartā partem, radicis cucumeris ſylueſtris, aniſi, ſeminis apij, ammiſ, cumini, ſceniculi, nitri, ſingulorum minæ quartā partem, piperis drach. xii. & dimidiā, mellis beminam, uini ſeſquiheminam, cyprini ſeſquiheminā, aceti ſeſquiheminam. Composito ac uſitor.

Ex Andromachō ad hydropicos & iſtillationes.

Picis liquide lib. ii. ceræ lib. i. nitri drach. vi. ſulphuris uiui ſexuncem, aluminis ſexuncem. Ad hydropicos Cleophanti. Ceræ, reſinæ, ſpumæ ni tri, ſingulorum drach. c. galbani drach. xii. & dimidiā, propolis drach. xii. & dimidiā, ammoniaci thymiamatis drach. xii. & dimidiā, cyprini cyathos ii. aceti cyathos duos.

Ex Archigenis ſecundo libro pharmacorum ſecundum genus.

Hydropicis diætā ac uiuendi modum conuenientem conſtitue. Pro cata plasmate autem ſtercus bouis armentariæ impone. Reſicca autem ipſum ſtercus diligenter, & tritum in poſca uelut crudam ordeacā farinam coque, inſperſa ſulphuris uiui quarta parte. Cataplaſma uero per omnem uentris ampli tudinē impone. Muſa uero cataplaſma ad ipſos præparauit ex elaterio. ſta phide ſylueſtri, hyſſopo, ſelle tauri, æqualibus partibus ipſorum ſicubus contuſis exceptis.

Aut radicis eucumeris ſylueſtris minam unam in uino coquito & ſicuū minam dimidiā ſimiliter coquito, atq; hæc ſimul terito aſſuſo eorum decoctio, donec malagimatis formā euadat, Inde q; altheæ radicis tritæ tantūdem ammiſcetō

ammisceto, simulq; coquito ac terito, atq; ita imposito. Aut caprini sterus in urina pueri impubis ueneris expertis, uel ipsius caprae urina coctū, ad strigementicam spissitudinem redigito, ac imposito. Egrege ipsum per aluum purgat. Aut ueratrum nigrum, seu taurinū, nitrum, piper, æquis partibus cum melle aluo per dimidiæ horæ spatium imposito. Porro per omne curationis tempus unam aliquam ex his potionibus ipsis propinato. Coryledonis drach. i. scyllæ aridae mundæ drach. i. in uino mulso diluto quotidie exhibe. Aut corticis radicis Ari drach. i. Aut cneori, quā aliqui chamelæan adpellant, teneras eminentias ad calamorū radices nascētes exsuccato, ac succi cyathos iii. prædictis ammixtis quotidie exhibeto. Optime facit & hoc. Cancri fluuiialis siccitū, pedibus ac eminentijs omnibus amputatis, drach. i. asari drach. i. misceto aqua ex ipso flumine unde cancri extracti sunt accepta, & propinato. Aliquādo uero pro asaro, opo balsami par pondus additur. Aut coralli drach. i. aluminis scissi drach. i. oboli. ii. cum calaminthæ cremore terito, & in pastillos duorū obolorū ponderis redigito, & obolum inde ex calaminthæ aqua bibendum dato. Summe facit & ad nephriticos. Aut radicē calaminthæ coctam propina. Aut sion quod lauer Latini dicunt eidem coctum propina, idemq; etiam edendum exhibe. Aut tribuli folia siue radicē cum uino dato. Aut in balneo cum sale & oleo diligenter, usq; quo exudent, illitos educito, & solis æstibus exudantibus ablutis, primū linctis, deinde etiā reliquis amictulis cōiectis curato, ac panē furnaceū cū sufficiētibus caricis edendū dato: uinū uero nigrū Italicū aut Spicātū recēs, in quo ficum triens in uini sextarijs vi. coctus est, donec tertia pars superfluit, bibendum exhibeto purgat per urinā. Aut urinæ caprae cochlearium unū cum nardi drach. una calfactū bibendum dato. Aut cucumim syluestrem uino nardino uel amineo macerato, & ex cremore ter cyathum unum bibendum præbeto, & paulatim usq; ad cyathos tres progreditor. Aut seseli in potu uel cibo exhibe. Aut daphnoides tritum lupini magnitudine inspergens bibendum dato, Ducit urinam multam. Aut corticem radicis Ari ex uino. Aut squamæ aris drach. i. panis medulla excipito, & catapotta factū ac exhibeto. Fortiter aquā ducit. Aut æris usti drach. i. rutæ ramulos tres, stercoris colubæ drach. i. salis cōmunis parū, cum uino Epheso & aqua, ita ut tota mixtura heminae dimidiæ sit, præbeto. Summe faciunt & Theriacæ omnes urinam cientes. Insuperq; potionēs aquam ducētes, quæ unicuiq; per experientiam cognitæ sunt minime periculosæ. Similiter & catapotta. Ceterū hydropicos diutius ad solem, coniecto capite, inungito ex oleo multo sale ammixto, & multa salsugine calida perfundito. Inflatos uero maxime locos, uescis magnis probe inflatis quotidie continenter pulsato, Inde enim arctantur ac contrahuntur. Scarificatis item ipsorum talis & uulnusculis impactis, ipsos in ferculo aut lectica gestato ac circūuehito, Multus enim humor hoc modo ipsis profluere solet.

Ad easdem affectiones Cōfectio Biennij. Croci, opij, opopanax, myrrhæ, iridis, acori, mandragoræ, asari, costi, nardi Indicæ, dauci cretici, mei, singulorū drach. vii. piperis albi & longi, gentianæ, stoechadis, cassiæ, phu ponticæ, singulorū drach. vii. excipe melle.

De pharmacis dolorem sedantibus, anodynis & colicis appellatis. Cap. iiii



Huiusmodi pharmacis magni doloris, aut uigiliarum gratia, aut ne per uiolentam tussim lancinemur, uelut in sanguinis reiectione & grauib; distillationibus aliquādo contingit, uti solemus. In moderatioribus tamen prædictis affectionibus, cōfectiones ex seminibus

privatim tussiculares a ppe llatz sufficiunt, quæ & ipsæ omnino aliquid ex fopori feris seminibus habent: uerum modicum inter multa ad eò semina, quæ odorata & tenuiū partium æurinam clientia existūt. Appellant autem hæc Medici sæpe citra appellationis seminis appositionē, Cuminum dicentes & daucum, & seless, apiumq; & anisum. Eiusmodi igitur pharmacorū compositiones inter tussiculas appellatas confectiones sunt relatz, Vetū dolorē sedātes anodynatzq; & colicæ dictæ, quæ eiusdē quidē generis cum illis sunt: multo autem facultatibus illas exuperant, in hoc sermone ostendentur. Prima itaq; ex ipsis prisctis rēporibus, ut apparet, celebris fuit quam Philo prodidit, & de qua ipse hanc Elegiam fecit.

Philonis Antidotus.

En me Tarsensis Medici prægrande Philonis

Ingentum, mala quod multa dolore leuo.

Sive colum doleas, seu tu iecur, auxiliabor.

Seu lapis infestet, difficile aut lotium.

Et me deor spleni hinc, orthopnoæq; molestæ,

Conuulsa atq; tabem protinus exupero,

Pleuritumq; malam, & sputum uomitumq; cruotis

Eutico, mortis terror & hostis ego.

Viscera tentantes omnes ego sedo dolores,

Interna & quicquid membra dolore quatit,

Tussim, Singultum, destillantesq; fluores

Sisto, etiam si quid strangulet excipio.

Me dedit ille autor sapienti munera magna

Discipulo, stupido nil ego curo uiros.

Odorum fuluūq; psum pueri cape, cuius

Fulget adhuc campis Mercurij ille cruor.

Pondus ad humanos sensus perpendito prudens,

Dein drachmæ pondo Nauplion Euboicum.

Inde Meneziadæ occisoris ponito drachmam,

Qui pecoris densis uentribus excipitur.

Viginti & drachmas candentis conijce flammæ,

Et totidem sabæ post suis Arcadicæ.

Et drachmam dictæ falsæ radicis, ab ipsa

Terra, pissæ quæ loue clara manet.

Quumq; pion scribes, uoci caput amplius addes,

Masculum Achiuorum nominis articulum.

Indeq; post drachmas expensæ sumito lances

Quinq; bis, atq; isthæc prouidus excipito

Nararum tauri textura Cecropidarum.

Sic mecum Tricæ progeniesq; facit.

In his uersibus Philo iubet croci drach. v. consjel, pyrethri unā, Euphorbij unam,

spicæ nardi unam, piperis autem albi & hyoscyami par pondus, utriusq; drach.

xx. opij uero drach. x. Primi quidem igitur duo uersus crocum indicant, ut qui

fuluus colore sit, & renulis ad formam pilorum. Cruorem autem croci fulgere ad

huc in campis Mercurij dicit. Adolefcens enim crocus appellatus cum Mercu-

rio disco ludens, & incuriosus cōsistens, illapso in caput ipsius disco, statim mor-

tuus est: ex sanguine autem ipsius in terram actio, crocus natus est: fulgere uero

cruorem dixit, hoc est sanguinem iam occisi, propter coloris croci splendorem.

Scribitur autem non solū campis, sed & herbis in uersu, hoc modo, fulget adhuc

herbis

herbis Mercurij ille cruor. Cæterum pondus croci drach. v. esse uult, quum ad humanos sensus perpẽdere iussit, qui quinq; numero existit. Quod uero drachmas quinq; esse uelit, et neq; obolos, neq; libras, neq; aliud quicquam tale, per sequentia commonstrat, primum quidem quum ait, Dein drachmæ pondo Nauplion Euboicum. Deinde uero & consequenter quum alijs idem drachmæ nomen apponit. Nauplion itaq; Euboicum, pyrethrũ uocat. Propterea quod Nauplius magnis pyris incensis, ut aiunt, circa Euboicæ portum, multos Græcorũ decipit, ut perirent tanquam ad regionem portus bonos habentem applicantes. Id ipsum uero ob Palamedis necem ipsum fecisse tradit. At uero & Euphorbium similiter his ænigmatice uocauit, quum ait, Inde Meneziadæ occisoris ponito drachmã, Quandoquidem poeta Patroclum sic loquentem facit,

Sed me parca ferox, Latonæ & filius aufert,

Atq; uir Euphorbus.

Pecoris autem hoc est ouium uentribus excipi & adseruari Euphorbium ait, propterea quod hos solos non corrumpit, & ob hoc in his reponi pharmacum potest. Est porro Euphorbium plantæ cuiusdam spinosæ in Maurusiorum terra nascentis succus, facultate calidissimus, & de ipso libellus paruus scriptus est Iubæ regi Maurusiorum. Consequenter uero Philo ait, Viginti & drachmas cãdenis conijce flammæ, piper album per hoc significas. Est autem stomacho commodius & acrius quàm nigrum. Viginti insuper drachmas seminis hyoscyami iniijcere iubet, quod fabam suis Arcadicę appellat, Quãdoquidem aprum Erymanthium Hercules occidisse fertur, qui in Arcadium terra fuit connutritus. Quin & nardi ipsius drach. i. conijciendam censet, quam radicem falso dictam appellat, quandoquidem spicanardi uere nominatur, Vult autem eam Creticã esse, quum ait, ab ipsa Terra pissileo quæ Ioue clara manet, Quandoquidem fabularum scriptores Iouem in dictæo Cretæ monte educatum aiunt, occultatũ ibidem à matre Rhea, ne & ipse à patre Saturno deuoraretur. Apposuit autẽ Ioui epitheton pissis, quemadmodum multi etiam extra poeticam, in comuni sermone dicere solent, per Aesculapium Pergamæũ, per Dianam Ephesiam, per Delphicũ Apollinem, per Vestam Eleusiniam. Quidam uero non Creticam terram, sed Indicam indicatam esse aiunt, ex qua ebur affertur, ex hoc enim statuam Iouis in Pissa factam aformatam esse. His omnibus & papaueris succum ammisceri iubet, qui recepto à medicis more priuatim opium appellatur, quum nullus aliorum succorum quantumuis multi sint in neutro genere: opium uidelicet: nominetur, Quando igitur ipsum nomẽ opion, ex uoce. õ. &. piõn. componitur, ob id sanẽ inquit,

Quumq; pion scribes, uoci caput amplius addes,

Masculum Achiuorum nominis articulum.

Inde q; post drachmas expensæ sumito lancis

Quinq; bis, &c.

Hoc est iniijce & opij drach. x. Superest postremum quo omnia hæc trita excipiuntur, ipsum Mel, itidem coniecturaliter ab ipso appellatum, Natarum tauri textura, quandoquidẽ ex putrescẽtibus tauris apes generari tradunt. Quod autem Atticum ipsum Mel esse uelit, ea gratia addidit, Cecropidarum, hoc est, Atheniensem. Cæterum per extremum uersum ostendit etiam Asclepiadas hoc pharmacũ sic preparare, Ex Tricea enim generis sui originem ducit, ex quorum ordine & poeta est. Hæc sermẽ prima antidotorum dolores sedantium celebris facta est. Iuxta hanc autem alijs partim ad ipsam appositis, partim detractis, aut apponderationibus permutatis, posteri magnum antidotorum dolores sedantium numerum fecerunt, quas etiam colicas uocant, denominatione ab affectione quæ maximos dolores habet deducta, Ego uero primum

quidem generales cōponendi ipsas modos referam, deinde uelut consueui, etiam particulariū materierum seriem quantū latissime se expandit subscribā. Opium itaq; fortissimum est ex his quę sensum stupefaciunt ac somnum soporiferum inducunt. Operatur autem hæc etiam sapa dilutum, deinde tomento excerptum ac sedi inditum, itemq; fronti ac naribus illitum. Si uero cum alio quopiam uim ipsius moderatē misceatur, moderatius hæc facit. Verum quæ ammiscentur ipsi, aut concoquere, aut mitigare dolorosam affectionem oportet, aut humores affectionem efficientes discutere, aut secare, aut attenuare, aut iuxta totā substantiam alterare. At uero neq; ignorare nos puto optimum esse compositionis scopum, qui trium cōiectioni sit intēsus, Nimirū ut & sensus stupefiat, & nullum in posterum inde circa particulam deirimētum permaneat, ampliusq; ut affectio ipsa maxime inde iuuetur. Ad hæc igitur respiciens Philo mihi uidetur hoc pharmacum de quo iam proposuimus dicere, cōposuisse, Ex opij quidem & hyoscyami mixtura somnum soporiferum, & sensitiuæ facultatis stuporem inducere uolens. Quo uero citius distribuerentur, & totorum affectionum corporum profundum penetrarent, calfacientia ammiscuit, pyrethrum, & euphorbium, & piper, quæ nocentes humores discutere possunt, & extergere uiscosos, ac secare crassos, & uentosos flatus attenuare ac euacuare. Est autem non modica concoëctoria uis omnium frigidarum affectionum in nardo sita, Verum Creticā nardum iniicere non oportet, neq; omnino eam quæ apud nos nascitur, quam montanā & herbari Narditen magis quàm nardum appellā, Est igitur Celtica nardus optimum pharmacum, efficiens quæcumq; etiam Indica nardus solet, Verū ab ipsa uinibus deficit, uelut etiā à Celica, Montana, Quæadmodū aut ex aromaticis appellatis medicamentis Philo solam nardum iniecit, Sic posteri alius aliud apposuit, aliqui autē plura. Quæ uero apponuntur sunt, flos iunci odorati, & cassia, cinamomum, amomum, & costus. Quemadmodum autem rursus crocum addidit, crudorum humorum concoëctoriū, itemq; affectionum medicatarum, Sic ali j myrrhā & castoriorum ammiscuerunt. Plurimi autem ex ipsis, neq; male in hoc facientes, & hæc familiaria semina, De quibus etiam antea in confectionibus ex seminibus constantibus dictum est, addiderunt: quo uidelicet amarorum medicamentorum iniucunditatem mitigent, & totum pharmacum ad distributionem & urine propulsionem instigent. Si uero & humorum crassitudo attenuari expetat, etiam hoc ipsum faciunt, Dico autem apj semē, cumini, dauci, petroselini, anisi, & quæcumque eiusmodi existunt. Apponam igitur iam & copiam ac seriem particularum materierum à prioribus medicis usu ac experientia cognitarum.

De colicis pharmacis ab Andromacho conscriptis.

PRima itaq; ipsarum in hæc uerba scripta est. Colica Cassij. Anisi drach. vi. seminis apij drach. xii. nardi drach. iiii. alij drach. vi. castorij drach. iiii. petroselini drach. iiii. alij drach. iiii. piperis albi drach. v. & longi drach. v. myrrhæ drach. vi. iunci odorati drach. iiii. succi papaueris drach. vi. croci drach. iii. Excipe melle cocto. Quidā etiam cinamomi drach. i. aut cassiæ drach. ii. Datur ad summum nucis regiæ paruæ magnitudo ex aquæ calidæ cyathis. iiii. minimum nucis ponticæ magnitudo.

Colica secunda ab Andromacho scripta hæc est. Colica Cassij, ut Crispus. Facit & foris imposita. Anisi drach. xii. seminis apij drach. xxiii. nardi indicæ tantundem. castorij drach. vi. seminis petroselini drach. xvi. myrrhæ drach. xii. piperis albi drach. xii. & longi drach. x. iunci odorati drach. vi. opij, croci, cassiæ singulorum drach. xii. costi, acori utriusq; drach. vi. Excipe melle cocto. Præbe nucis ponticæ magnitudine ex aquæ calidæ cyathis. iiii. Hæc igitur præscriptæ

scriptæ duæ confectiones ex medicamentis de quibus paulò ante dixi composi-
tæ sunt. Quæ uerò deinceps sequitur, qua se usum esse ipse ait, habet etiam alia
quædam præter priora, eiusdem generis cum opiò & hyoscyami semine existen-
tia. uelut malorù mândragoræ succû, aut qui ex radice ipsius expressus est, & suc-
cum cicuræ. Habet item phu ponticû, quod partim nardo celticæ, partim petro-
selino & urins cientibus seminibus simile existit. At uero syluestris brassicæ se-
men ex maximè attenuatorijs est, & quæ multû siccare ac discutere possunt. Ex
minam cientibus est & Meon, & asarum. Illyris uero quam neq; nominauit iri-
dem Illyricam, concoctorium est & attenuatorû pharmacum. Stoechas autem à
putrefactione uindicat & attenuat. Ipsum pharmacum autem sic describitur.

Colica Tullij qua utor. Succî malorù mândragoræ drach. viii. aut succi ra-
dicis eiusdem drach. x. phu pontici drach. viii. seminis brassicæ syluestris drach.
viii. succi cicuræ drach. xvi. costi, piperis albi & longi, myrrhæ, opij, singulorû
drach. viii. opopanacis drach. vi. stoechadis, seminis dauci, Mei, asari, singulo-
rum drach. xii. cinamomi, illyridis, acori, singulorû drach. viii. Sequitur post
præscriptas Colica Abascanti, quam apud me cõsonam repert. Anisi drach. x.
seminis scelis, drach. xx. petroselinî, nardi Indicæ, piperis albi & longi, singulo-
rum drach. iiii. & obolos iiii. opij drach. x. myrrhæ drach. x. cumini Aethiopici,
castorij, utriusq; drach. v. iunci odorati, croci, utriusq; drach. v. Excipe ac præpa-
ra cû melle cocto.

Colica admirabilis qua utor. & ad uoluuolos & qui ster-
cus sursum euomunt in magnis doloribus, datur magnitudine sabæ in aquæ fri-
gidæ cyathis iiii. aut iiii. Piperis albi, seminis hyoscyami, utriusq; drach. xli. opij
drach. xx. croci drach. x. spicæ nardi, euphorbij, pyrethri, singulorum drach. ii.
excipe melle cocto.

Alia non inefficax adiaptotos ob id dicta, ad omnem
etiam inflationē. Sisonis, seminis hyoscyami, piperis albi singulorû drach. xli.
succî papaueris drach. xx. croci drach. vi. opobalsami drach. iiii. excipe melle.

Colica Terentij Valentis. Sisonis, piperis albi, seminis hyoscyami, singulorû
drach. xli. succî papaueris drach. xx. croci drach. vii. alij drach. vi. corticis radi-
cis mândragoræ drach. iiii. mellis quod satis est. Quidam etiâ opobalsami drach. iiii.

Colica Apollonij. Nardi drach. ii. castorij, sceniculi, succi mândragoræ, co-
sti, singulorum drach. i. asari, spicæ, utriusq; drach. iiii. opopanacis drach. i. dauci
Cretici drach. iiii. cinamomi drach. v. piperis albi & longi, fridis, myrrhæ, singu-
lorum drach. ii. lemnis sphragidis drach. x. absinthij drach. ii. excipe melle. Da-
tur drach. i. ex aqua.

Colica ut Nicostriatus, Ilotheos appellata, emptia ta-
lentis duobus. Facit ad stomachicos, oculorum dolores, & uexationes, uulua la-
bores, ex aqua mulla incocta ruta. Croci sesquidrachmam, nardi drach. ii. myr-
rhæ drach. viii. costi, piperis albi & longi, galbani, singulorû drach. i. opobalsami
drach. iiii. cinamomi, succi mândragoræ, castorij, singulorû drach. ii. seminis dau-
ci drach. iiii. & dimidiâ sagapeni drach. iiii. cassie drach. iiii. excipe melle Attico.

Colica ut Scribonius. Cineris cornu cerui teneri usti heminam, piperis al-
bi, myrrhæ, utriusq; drach. ii. ex tritis cochlearium unum exhibeto. Et cochleam
tinam crudam tritam cum uini cyathis duobus & aqua calida.

Colica qua
assidue utebatur, perfectè liberans & malum extirpans. Zingiberis drach. iiii.
falicis drach. iiii. ruta ramulos tres aut quatuor, phœnicobalanorû drach. iiii.
aquæ cyathos vi. conijcto in uasculû nouû, & coquito donec tertia pars super-
sit, & bibendû dato ad triduû post irritationē, & facto interstitio idem facto, ad
plures dies pharmaci in potu exhibendo.

Colica Tullij bona, qua & ipsa
utor. Seminis brassicæ syluestris, phu pontici, utriusq; semissem, piperis albi
& longi, seminis dauci, singulorum drach. ix. castorij, costi, opij, corticis mândra-

goræ, nardi Indicæ, asari, Alyridis, singulorum drach. VI. storachadis drach. IX. cinamomi drach. I. cassiæ daphnitiidis drach. XV. III. excipe melle cocto. Da fabæ Aegyptiæ magnitudine. Colica quam admiratus est Ariston, ut Diophantus Lycius. Succo centaureæ, castorei, scillæ assatæ, piperis albi & longi, myrrhæ, rutæ hortensis, hyssopi, abrotoni, iridis Illyricæ, singulorum drach. II. croci, ammoniaci thymiamatis, radicis acori, plu. pontici, zingiberis, ueratri albi, singulorum drach. I. excipe aceto mulso. Datur etiam drachma una ex aceto mulso.

Colica ut Publius in Puttolio & Apollonio. Polij drach. VI. scordij drach. XII. gentianæ drach. V. seminis rutæ syluestris drach. III. succi cyrenaisci drach. III. rubricæ lemnis drach. V. myrrhæ drach. VII. opobalsami drach. VIII. piperis albi drach. II. & dimidiam, cachryos, drach. III. uerbenacæ herbæ drach. II. pentaphylli drach. V. excipe melle Attico. Da magnitudinem nucis,

Quæ Asclepiades ad colicæ affectus prodidit.

Pharmacu in persile ad colicæ inflationes, Antonij pharmacopola, huius usus sanus erat. Chrysobalani drach. II. seselis, astragali, utriusq; sextantem, illyricæ, tragacanthi, utriusq; unciam I. Hæc simul tusa & cribrata, cochlearij unius plus minus mensura, ex aquæ calidæ cyathis quatuor ante cibum exhibero.

Aliud. Gallinarum inceranea omnia exempta & in uas fictile coniecta assata, ac trita reposito, usus uero tēpore cochlearij unū & dimidiū, & seminis dauici cretici tusi & cribrati tantūdem, ex aquæ mulsæ calidæ cyathis III. exhibero.

Ad colicæ inflationes Charidis. Cumini Aethiopici drach. V. seminis apij, drach. V. seminis dauici Cretici drach. II. piperis albi drach. I. tusa & cribrata reposito. Dantur ex eo cochlearia duo, cum aquæ mulsæ cyathis tribus. Aliud, Seminis rutæ syluestris aridi, seselis massilici, utriusq; drachmas VIII. petroselinī drach. III. sinonis Syriaci drach. III. piperis albi drach. II. tusa & cribrata exhibe ut dictum est.

Eclegma colicis Nectareum. Facit & pleuritidis, & dyspnoeis. Deducit mulieribus menses. Est & concoctorium. Cumini hispani unc. I. piperis albi, zingiberis, utriusq; tantūdem, uini dulcis aut Scythicæ, aut proteropij sextarios II. uini falerni sextarium unum. Mellis Attici librā unam. Arida tunc dantur & cribrantur crassiore cribro, Deinde cum uino coquuntur donec tertia pars supersit, deinde affunditur uinum dulce ac rursus coquitur. Mouere autem oportet ramulis rutæ uirga salicis exceptis, & salicis cortice obligatis. Habenda est ad manum etiam altera uirga similiter rutæ ramulos recentiores complectens, quo prioribus exsiccatis recentioribus moueas. Postquam autem liquor semel atq; iterum ebullierit, inijce mel ac rursus coque, & excolatum per saccum liquorem repone. Vsu expetente mystira tria ante & post cibum præbe.

Alia Scribonij Largi ex salice. Liberat à tota affectione. Corticis salicis drach. III. zingiberis aridæ drach. III. phœnicobalanos VI. numero, aquæ sextarium unum & dimidiū. Cōquito omnia rutæ ramulis mouens, & ubi tertia pars liquoris restiterit, tum excolato, & cyathos duos quotidie bibēdos dato. Hoc uero per triduum facere oportet, & post triginta dierum interstitium rursus repetere, quo per annum potiones XXXVI. fiant. Bibitur enim hoc pharmacum per annum totum. In alijs exemplaribus hoc modo habetur. Corticis salicis uiridis drach. V. zingiberis sicci drach. III. piperis albi drach. III. palmularū passarum maximarum, quas Græci pateros appellant, numero duas aut tres, rutæ uiridis ramulos V. aquæ pluriæ sextarios III. coquito ad tertias, & dato ut prædictum est. Alia Paccij Antiochi, à tota affectione liberās. Cornu cerui recens enati mollissimi uisi ad albedinem cochlearia III. maioris magnitudinis piperis albi grana X. aut IX. myrrhæ parum odoris gratia, omnia teruntur, & cochlea

chilea Africana varij coloris una cū testa inidem teritur, uino salerno per saccum non excolato affuso. Sit autem uini mensura cyathorum trium, Hæc omnia in si-
ciliuasæ permixta ad prunas calfacimus, diligenter mouentes, ne quid ex phar-
maco subsidat. Calfactum uero in ipsis irritationibus bibendum dato, itemq; se-
quentibus duobus diebus. Oportet autem diem unam ante, cibū differre, & reli-
quis diebus prandio solo uti, in eod; assumere cibum qui facile confici potest.

Alia confectio. Succī fœniculi sextar. iiii. mellis Attici sextar. ii. croci drach.
iiii. crocū in linteolum purum ligato, Succū uero & mel mixta in uasē sicili co-
quito, & fasciculo croci moueto, Vbi uero densata fuerit ad arteriæ spiissitudi-
nem, Crocū quidem expressum rescito, pharmacū uero reposito. Vius tem-
pore mystum unum aut duo ante cibum dato.

Colica Sigonis, qua usus est Valens. Facit in summis doloribus data nucis
ponticæ magnitudine, ex aquæ calidæ cyathis tribus, & confestim minuit dolo-
res, & maxime si pruritus per totum corpus fiat. Facit & ad inueteratos spleni-
cos, & ad uoluuolosas affectiones. Facit hepaticis & ad febres per circuitum repe-
tentes, ac uulgæ strangulatus, & uesicæ affectus. Est & arteriaca bona. Sinonis
syriaci aut hispani drach. lxx. piperis albi drachmas xl. seminis hyoscyami albi
drach. xl. opij, corticis mandragoræ, utriusq; drach. x. croci drach. vi. mellis co-
cti quod satis est his excipiendis. Quantitas exhibitionis ostensa est. Alia
exemplaria sic habent. Sinonis hispani drach. lxx. piperis albi, seminis hyoscy-
ami, utriusq; drach. xl. cornu cerui usti, opij, utriusq; drach. xx. corticis mandra-
goræ drach. x. croci drach. vi. mellis quod sufficit.

Cōfectio Lingonis colica, data ex frigida statim soluit dolores. Seminis hyo-
scyami albi drach. xx. opij, seminis dauici cretici, utriusque drach. x. petroselinī
drach. vi. croci, spicæ nardi, pyrethri, singulorum drach. iiii. euphorbiæ, opobalsa-
mi, cinamomi, singulorū drach. ii. Excipe melle cocto, & exhibe fabæ Aegyptiæ
magnitudine cum aquæ tepidæ aut frigidæ cyath. iiii. in irritationibus.

Colica sedans dolorē, qua usus est Cassius. Facit & ad internorū affectiones.
pharmacum est ualde bonum. Anisī, nardi Syriacæ, myrrhæ, singulorū drach.
viii. piperis albi & longi, utriusque drach. xii. seminis fœdis drach. vi. opij ran-
tundem, croci, castorij, petroselinī, iunci odorati, singulorū drach. iiii. mellis At-
tici cocti quod satis est, Datur ponticæ nucis magnitudine.

Colica sedans dolorē Lucij, cōfestim eximit dolores, inscribitur Sícula. Myr-
rhæ, succi hyoscyami, opij, singulorum drach. viii. radicis mandragoræ, piperis
albi, croci, thuris, singulorū drach. x. Excipe melle & præbe fabæ Aegyptiæ ma-
gnitudinem ex aquæ calidæ cyathis tribus ad noctem.

Colica sedans dolorē Eufchemo Spadoni inscripta. Bibitur in dies triginta.
Seminis brassicæ syluestris, phu, cinamomi, iſtidis Illyricæ, acori, asari, opopana-
cis, myrrhæ, nardi Indicæ, opij, costi, succi mādragoræ, castorij, singulorū drach.
vi. trium piperis generū, mel, seminis dauici cretici decorticati, singulorū drach.
x. ii. excipe melle cocto ac præbe fabæ Aegyptiæ magnitudinem, febre carenti-
bus cum uini mulsi diluti cyath. iiii. febrientibus cum aqua mulsa. Hæc etiam in
infusis utebatur nucis ponticæ magnitudine, cum fœni græci decoctio cyathor-
um iiii. & oleo cui ruta incocta est item cyathorum quatuor.

Ad easdem affectiones confectio Breniti. Croci, opij, opopanacis, myrrhæ,
iſtidis, acori, mandragoræ, asari, costi, nardi Indicæ, dauici Cretici, Mei, singulorū
drach. vi. piperis albi & longi, gentianæ, stœchadis, cassiæ, phu pontici, singulor-
um drach. viii. excipe melle.

De dysentericis. Cap. V

DE dysentericis equidem quæ in uniuersum nosse oportet, iam ante dictum est, tum in curandi methodi libris, tum etiã nunc in sermone de hepaticis habito. Reliquum est igitur de uere dysentericis agere, in quibus neq; hepar affectum est, neq; alia aliqua affectio est, præter intestinorum ulcerationem, aut nudam, aut cum putrefactione aliqua obortam, quam Medici cõsuetu uocabulo Nomen appellant. Quæcũq; igitur ad tales affectiones, comoda sunt, & iam frequenti experimento cognita, ea in principio subscribentur.

Quæ ab Andromachõ ad dysenteriam scripta sunt.

Potio ad dysentericos & hæmopticos. Floris rosarum, opij, acaciæ, gummi, singulorum drach. iiii. balsamij tantundem. succi hypocisthidis tantundem. gallarum drach. ii. seminis plantaginis tantundem, & succi eius tantundem. lycij Indici drach. i. succi rosarum drach. i. Fac pastillos drachmæ unius. Vtere uarie.

Ad dysentericos & coeliacos, confectio ex fructibus. Mala punica integrâ XX. mala cotonea XX. rui sextar. i. prunorum syluestrium sextar. ii. Sorborum Ephesi norum sextar. ii. Rhois Syriaci sextar. iiii. pira Terentiana XX. mala Cestriana XXX. siliquas xl. baccarum myrti nigrarum sextar. iiii. musti aminei ad tertias decocti sextarios XLVIII. Coquito simul ad mellis spissitudinem & in sigillino reponito. Alia ex fructibus ad eadem. Stomachum subuersum restituit. Imponitur etiam forinsecus. Mala punica x. cotonea xx. mala orbiculata xv. sorborum sextar. ii. mespilorum sextar. i. glandium sextar. unum. Rhois Syriaci sextar. i. rubi fasciculum manipulem, baccarum myrti nigrarum sextarium unum. palmas passas, patetos Græci dicunt XXX. acinorum aridorum sextarium dimidium, prunorum syluestrium sextar. i. siliquas magnas x. cenanthes sexuncem, cornorum sextarium unum mala citria v. passi Cretici sextarios XVI. Coquito simul & reponito in uitro, utere ut priore.

Ad dysentericos quæ uitor. Gallæ, fructus ericæ, opij, singulorum drach. iiii. cum aqua redigito in pastillos duorum obolorum. Dato ex aqua aut uino.

Ad dysentericos Clidion. Nardi, croci, utriusq; drach. vii. aloes drach. iiii. ego drach. ii. thuris drach. ii. acaciæ drach. iiii. myrrhæ drach. iiii. succi hypocisthidis drach. iiii. alij drach. vi. rosarum siccarum drach. iiii. lycij Indici drach. iiii. tragacanthæ drach. iiii. opij drach. iiii. alij drach. i. obolos ii. pipëris drach. ii. alij etiam iridis drach. ii. Excipe aqua. Quidã etiam cinamomi drach. ii. & dimidia, gallæ drach. ii. fac pastillos obolorum duorum ponderis. Exhibe cum uino myrteo.

Ad dysentericos & coeliacos pastillus Bertij. Nardi, croci, utriusq; drach. ii. myrrhæ, succi hypocisthidis, aloes, opij, tragacanthæ, lycij Indici, gallæ, anisi, acaciæ, pipëris, rhei pontici, singulorum drach. i. tragacantham in uino macerato, & reliqua trita commisceto, pastillosq; drachmæ unius formato, atque ipsos ex uino dato.

Clidion ad dysentericos. Acaciæ drachmas xxv. seminis hyoscyami drach. lvi. baccarum myrti tusarum drach. clx. rhois Syriaci drach. lxx. & succi eius drach. ii. & dimidia. thuris drach. lxxv. Omnia torrefacta terito & uino nigro excipito. Datur summum drach. i. Ad dysentericos & coeliacos. Vini salerni sextar. vi. mellis Attici lib. vi. coquito simul ad multam spissitudinem, utere pleno cochleario ad delingendum dato.

Ad dysentericos & omnia interna uicia, pastillus ab Eudemo seniore.

Croci, cassiæ fistulæ, utriusq; drach. ii. nardi drach. i. myrrhæ, aluminis, succi papaueris, singulorum drach. ii. cum aqua pastillos formato, & dysentericis ex uini cyathis duobus dato, febrientibus ex aqua, hepaticis & peripneumonicis ex aqua mullâ. Ita etiam pleurenticis & tussientibus.

Aliud

Aliud, ad dysentericos. Seminis fœniculi, anisi, apij, malicorij, singulorum drach. iiii. opij drach. ii. cum aqua redige in pastillos duorum obolorum. Dato unum ex aqua.

Ad dysentericos & coeliacos ex libris Antipatri. Piperis nigri drach. iiii. gallæ drach. iiii. myrrhæ drach. ii. croci drach. ii. nardi drach. i. lycij drach. i. succi hypocisthidis, acaciæ, ramentorij loti, gũmi, singulorũ drach. ii. opij, aloes, anisi, singulorũ drach. i. Rhois obsoniorũ, drach. ii. Excipe succo rubi & utere.

Ad dysentericos, coeliacos, & hæmopticos, e Cornelio medico. Myrrhæ, thuris, aloes, croci, opij, rhois Syriacæ & coriariæ, lycij indicij, acaciæ, malicorij, succi hypocisthidis, gallæ, balauftiorũ, singulorũ par pōdus in pastillis cogito, & ad noctem febre carentibus ex uino, febricitantibus ex frigida dato.

Aliud ad dysentericos Valentis. Myricæ fructus, rhois Syriaci, opij, petro selini, singulorũ par pondus torreto acterito, & cum aqua in pastillos reducto magnitudine fabæ, Da in noctem febricitantibus ex aqua calida, nō febricitantibus ex uino.

Ad dysentericos ex scriptis Lucij. Stryacis drach. ii. opij, croci, acaciæ, gallæ, fructus myricæ singulorũ drach. i. cum aqua pastillos facito ac dato fabæ Aegyptiæ magnitudinē cum uino.

Ad dysentericos & hæmopticos, statim à prima potione cohibet fluxum. Cochlearũ ustarum drach. xii. cornu cerui usti drach. xx. obol. ii. baccarũ myrti nigrarum drach. xv. opij torrefacti drach. v. obol. ii. gallæ tostæ drach. v. obolos ii. cœnãthes drach. vi. succi hypocisthidis drach. v. obolos ii. radicis mandragoræ drach. xii. succi rhois, terræ alsteris, utriusq; drach. xii. rhois culinarij drach. iiii. malicorij tostij drach. vii. thuris drach. vii. corticis pinus torrefacti drach. vi. seminis apij drach. xiiii. hyoscyami tostij drach. x. rhois coriarij sextar. ii. acaciæ tostæ drach. v. obol. ii. Vini nigri, quo rhus coquatur ut crassissimus succus fiat. Coquito itaq; cum uino, atq; colato, & cum succo reliqua subacta in pastillos drachmales, & triobolares, ac diobolares cogito, & pro habitu exhibeto. febricitantibus cum aqua calidæ cyathis iiii. Nō febricitantibus cum uini cyathis ii. In alijs exemplaribus cornu cerui drachmæ vi. oboli ii. habentur, & gallæ drach. vii. & acaciæ tantundem.

Ad dysentericos Flauij Pyciæ, id est, pugillis. Baccarum myrti aridarum tufarum sextarium unum, rosarum siccarum tufarum, sextariũ dimidium, fecis malabathrini drach. ii. baccarũ iuniperi drach. xxx. pitorum aridorum tuforum sextar. i. corticis pinus drach. xii. myrrhæ drach. i. gallas v. siliquarum tufarum sextarium unum. Dantur ad summum drach. viii. Dato aridum cum uino diluto. Quæ uero crassiora sunt palmulis pinguibus excepta exhibeto.

Ad coeliacos. Sistrifluorem confestim. Fructus myricæ drach. iiii. rhois ciliarij drach. iiii. baccarum myrti nigrarum drach. iiii. acaciæ drach. ii. succi papaueris drach. i. excipe malorum spissamento & fac pastillos drachmæ ponderis, ac utere cum oui allati utello. Vbi uero bibendum dare uolueris, radicem rubi, aut myrtum, aut mala cotonea coquito, atq; decoctum horum frigidum cyathorum iii. mensura cum pharmaco dato. Facit & lientericus.

Potio ad internos fluores, forinsecus etiã cum melle coctio impositũ facit. Anisi drach. ii. succi hypocisthidis sesquidrachmam seminis rosarũ sesquidrachmam. succi papaueris drach. unã, myrrhæ drach. unam, crocomagmatis drach. i. Dantur cum aqua oboli. iiii. & duo, & unus item. Potio ad omnem fluxionem & inflationem, Lucij Tarsensis. Anisi, seminis apij, utriusq; drach. ii. seminis anethi, dauci, tordyli, singulorũ drach. iiii. opij, seminis hyoscyami, utriusq; sesquidrach. Excipe aqua atque ita utere. Potio ad fluxũ muliebrem sistendum, ut Apollonius. Coralli obol. iiii. balauftij obolos iiii. gũmi obolum unum, excipe oui crudi candido, & dimidium totius cum aqua cyath. iiii. præbe.

Infusa Dysentericis commoda.

Infusum ad dysentericos, Isidori, ad exulcerationes factas in intestino recto. Cineris chartę drach. x. aluminis scissi drach. iiii. auripigmenti drach. iiii. sandarachę drach. iiii. squamę æris, omphacij, utriusq; drach. iiii. croci, succi papav. uetis, utriusq; drach. ii. calcis uiuę drach. v. Tria misce & excipe uino dulci, ac forma pastillos drachmarum trium, & duarum ac unius ponderis. Vltus tempore uino austero disuatur ad strigementum crassitudinem, misceturq; succi prisanę cyathi duo. Infunditio hæc simul ægroto ita ut tum de prisanę succo, tum de pharmaco pro uiribus ipsius sumas.

Infusum Faustianum. Auripigmenti drach. xii. chartę ustę drach. xxx. sandarachę drach. vi. calcis uiuę drach. x. alij xii. cogito in pastillos. quatuor drachmarum, & cum plantaginis succo, in quo spissamenta in cocta sunt, infundito. aut uini diluti cyathos iiii.

Infusum quo utor Athenar. Concordat Harpocre, Magno Philadelpho, Aristolao. Omphacij drach. vi. aluminis scissi drach. vi. calcis uiuę, squamę æris, utriusq; drachmas vi. auripigmenti drachmas viii. sandarachę drach. iiii. chartę ustę drach. xv. Cum uino myrteo pastillos drachmarum iiii. aut iiii. formato. Infunde cum uini diluti cyathis iiii. & aquę tepidę cyathis duobus. Quamdoq; etiam cum aqua pluuiali.

Infusum quo utor. Chartę ustę drach. xxx. auripigmenti drach. xii. galbę drach. ix. calcis uiuę drach. xvi. bituminis drach. xvi. sulphuris uiui drach, xvi. sandarachę drachmas xvi.

Infusum aliud ut Idius. Aeris usti drach. xx. iiii. calcis uiuę, aluminis scissi, utriusq; tantundem. chartę ustę drach. xxx. auripigmenti drach. xii. sandarachę drach. xii. Excipe uino myrteo, aut rosarum decoctio, quę cum uino austero ad dimidias coctę sunt & exptellę, forma pastillos, eosq; infunde cum aqua.

Infusum ab Eubulo. Squamę æris drach. xx. chartę ustę drach. xvi. calcis uiuę drach. vi. auripigmenti drach. viii. sandarachę drach. xv. omphacij drach. iiii. sedis uini ustę drach. i. excipe uino myrteo, & infunde cum uino diluto calido.

Infusum Heræ. Chartę ustę unc. i. calcis uiuę unciam dimidiam, cadmię unc. i. auripigmenti unc. unā. Ex hoc arido cochlearia duo cum decoctio baccarum myrti, aut uino myrteo cyathorum iiii. mensura infunde. Calcem uero cum succo plantaginis exingue.

Infusum aliud eiusdem. Sandarachę, auripigmenti, utriusque drach. viii. acacię drach. iiii. calcis uiuę drach. iiii. excipe uino austero, & coge pastillos drachmarum trium. In debilibus uero minus cum uino diluto infunde.

Aliud, Sandarachę drach. viii. calcis uiuę recens drach. x. chartę ustę drach. viii. alij drach. xxx. malicorij, gallarū, acacię, singulorū drach. v. manarum aceto conditarū ad dies uiginti unū, ac ustarū drach. iiii. auripigmenti drach. xvi. Vruntur manę in olla cruda, Et aliqui arido medicamento utitur, aliqui in pastillos cum myrti baccarū decoctio cogunt. Si uero non moretur pharmacū retentum, antecius usum polygoni succum aut muriam infundito.

Infusum quo utor Aphtha appellatū. Rosi Syriaci, gallarū ustarū, utriusq; drach. xv. chartę ustę tantundē. suberis usti drach. xv. panis Alexandrini sicci usti drach. xv. auripigmenti drach. viii. sandarachę drach. x. acacię drach. v. ceru fę drach. viii. calcis uiuę drach. x. spumę argēti drach. iiii. Excipe uino ueteri & forma pastillos, alios duarū, alios triū, alios quatuor drachmarū pōdere. In principio quidē per plantaginis aut sanguinariz, aut helxines succū infundito, qui si nō adsint, aquam, Si uero uigor sit, & morbus fortis cum dolore, cū sceni graci aut

aut feminis lini decocto infunde. In declinatione aut cum decocto myrti & rubi uini coctorum. In pueris cyathorum duorum copia. In feminis trium, in uiris quatuor.

Infusum quo uitor Gemelli. Auripigmenti drach. vii. sandarachae drach. iii. calcis uiuae drach. viii. squamæ aris. drach. vi. aluminis scissi tantundem, omphacii drach. viii. lycii Indici tantundem, succi papaueris drach. iii. succi hypocistidis tantundem. croci drach. ii. ego aut drach. iii. chartæ usæ drach. viii. Infunde cum uino diluto.

Infusum Agathii. Auripigmenti drach. ii. sandarachæ drach. v. calcis uiuæ drach. iii. chartæ usæ drach. iii. Ex hoc pharmaco drach. iii. cum sale trito infundito in aquæ frigidæ cyathis vi.

Infusum Nicotri ad dysentericos, quo Menader usus est. Calcis uiuæ drach. i. gypsi drach. viii. acaciæ drach. ii. omphacii drach. i. stibii drach. iii. thuris drach. i. gallæ drach. ii. tragacanthæ drach. ii. cum uino myrteo cogito in pastillos. Reponitur reliquis ab expresso uuarum succo restantibus stipati, ne transpirent.

Infusum ad dysentericos Thamyra. Auripigmenti drach. ii. aluminis scissi drach. ii. cadmiæ tantundem. calcis uiuæ nouæ drach. i. chartæ usæ drach. ii. suberis ex dolio uini falerni usti drach. vii. & dimidiam. Cum sapa aut passo hispano apud ter recocto, pastillos cogito. Cæteri pastilli rursus tritis cochlearia ii. infundito. Reliquis pro uiribus cum lenticulæ decocto. Si lenticula non adsit, rubum cum rosis aridis decoquito, & seorsim myrti baccas cum uino austero coquito, & utriusque cyathum unum misceto. Quandoque uero uini cyathos iii. & rubi decocti cyathos ii. Facit item in potu acceptum pro uiribus ad cochlearij plus minus mensuram ex frigida aqua.

Infusum ut Deletius Epagathus. Auripigmenti drach. xii. succi hypocistidis drach. iii. sandarachæ drach. iii. chartæ usæ drach. xxx. calcis uiuæ drach. xx. balaustij drach. xl. viii. Balaustium in uino ueteri austero coquitur. Deinde cum decocto reliqua teruntur, formanturque pastilli drachmarum quatuor, quidam unciae ponderis faciunt. Infunduntur autem in myrti baccarum & lenticulæ decocto.

Quæ ab Asclepiade ad dysentericos scripta sunt, Quorum aliqua etiam coeliacis conueniunt.

Vini myrtiæ sextarios iii. Rhois rubri heminam i. mellis Attici cocti lib. i. Rhoem & uinum coquito rubi ramulis mouendo, & ubi tertia pars restiterit, liquorem exprimito, eique mel adijcito ac rursus coquito donec spissetur. Datur mystrum ante cibum. Aliud. Rhois Syriaci, farinae polentæ, uiuæ passæ non exacinate, singulorum drach. ii. malicorij usti & cribrati drach. i. excipe mel lecocto, dato mystrum ante cibum.

Pastillus coeliacis & dysentericis. Ouum crudum recens perforato & in uacuam euacuato, & cum testa subscripta mensurato, olei omphacini testam oui unam, piperis albi tenuissime triti tantundem. gallarum omphacitidum tantundem. farinae tritici tantundem. Omnia subacta & mollita in pastillos redigito, & in faragine fricta ante cibum dato.

Aliud. hoc scimus multos usos a morbo liberatos esse. Gallarum subtilissime tritarum cochlearium, piperis albi, rhois rubri, malicorij tenuissime triti, singulorum tantundem. Omnia mollita oui luteo excipe, & in uacuam mali punici testam conijce, atque obturato cum farina osculo ipsius, ad prunas torce, deinde depurgata mali punici testa, cochlearium unum comedendum exhibe.

Catapotia, coeliacis, dysentericis. Gallarum omphacitidum non perforatarum drach. iii. opij hispani drach. ii. petroselinii drach. i. excipe aqua, fac catapotia, & da magnitudine eiceteris; uirum tamen ratione circa mensuram habita.

Aliud

Aliud Aspasij, pharmacū generosum. Petroselinū, fructus ericæ, rhois Syriaci, opij, singulorū drach. II. cum myrti decoctio in catapotia redigito, ac dato ut dictum est.

Pastillus sedans dolorē, coeliacis & dysentericis. Et bibitur & infunditur. Quandoq; etiā ipso pro cataplasmate utimur excipientes melle cocto, Seminis hyoscyami drach. III. seminis apij tantūdem, anisi, florū rosarū, utriusq; drach. II. hypocisthidis, opij, utriusq; drach. I. Cū aqua trita in pastillos reducit, & obol. III. exhibeto. Febrē nō habētibus cū uini diluti cyathis tribus, febricitantibus cū aqua.

Aliud coeliacis, dysentericis pharmacū accommodatum, & bibitur & infunditur, & forinsecus impositum auxiliatur. Seminis apij, seminis hyoscyami, anisi, foeniculi, singulorum drach. III. opij, Rhois Syriaci, utriusque drach. II. succi hypocisthidis, balauitij, singulorum drach. I. excipe aqua & coque pastillos, dato ut prædictum est. Pastillus aromaticus, coeliacis, dysentericis, Berytj appellatus, pharmacū accommodatum, sistit confectum. Croci drach. III. nardi Indicæ, anisi, utriusq; tantūdem, myrrhæ drach. II. aloes Indicæ, succi hypocisthidis, succi papaueris, gallarū omphacitidū, tragacanthæ, piperis albi, singulorum tantūdem. Excipe uino & forma pastillos, dato obolos. III.

Pastillus Philippi, ad dysentericos inueteratos, sedās dolorē, Bibitur & infunditur. Balauitij, acaciæ, succi hypocisthidis, Rhois, opij, thuris, myrrhæ, baccarum myrti nigrarū, croci, gallarū, lycij, aloes, Rheipōtici, malicorij, singulorum drach. III. Excipe uino Italico, & coque pastillos pondere obolorū III. da non febricitantibus cum uino. Febricitantibus cum aqua mulla.

Pastillus sedans dolorem, præclare inducens somnum. Ad inueteratos dysentericos. Charta usta drach. X. sandarachæ, auripigmenti, squamæ æris, aluminis scissi, omphacij, calcis uiuæ, singulorū drach. V. croci, opij, utriusq; drach. II. Singula diligenter trita in pastillos drachmales cum uino myrtite coagmentato, ac utitor. Infunduntur ad summum ex eo drachmæ III. Meditū duæ, minimū una. In cōficiendo autem omphaciū cum opio tibi sit in uino myrtite maceratum. Crocus seorsum teratur. deinde simul mixta probe terito, & additis aridis unito, animaduersione habita ne pharmacū à calce uiuæ exuratur. Si tamen tale quid cōsequatur, de myrtite sufficiēter affunde ut omnia dissoluantur. Oportet autē calente adhuc pharmaco pastillos formare. Vtus iuxta appōderationis uariationem, fit secundū quod aegri subtili aut hebetē sensu præditi, id tolerare possunt, & secundum magnitudinem affectionis. Infundito autē diligenter in nō febricitantibus cū uini austeri diluti cyathis VI. in febricitantibus cū aqua, aut decoctio palmularū, aut rosarū, aut myrti. Ante infusionē detur panis nō febricitantibus cū uino diluto, febricitantibus ex aqua.

Alius dysentericis non febricitantibus, facti cōfectum. Charta usta drach. X. sandarachæ, auripigmenti, squamæ æris, aluminis scissi, omphacij, lycij Indicæ, acaciæ, succi hypocisthidis, calcis uiuæ, singulorum drach. V. croci, opij, utriusque drach. II. excipe uino myrteo, & forma pastillos magnitudine differētes. Infunduntur ad summū drachmæ III. Infundere autem oportet quantitate pharmaci ad magnitudinem affectionis apponderata. Sitq; liquor passum creticū dilutū, & ex eo ad summum cyathi VI. infundantur.

Epithemata coeliacis, dysentericis. Seminis hyoscyami albi, apij, utriusque trientem, anisi, floris rosarum, succi hypocisthidis, halauitij, Rhois Syriaci, singulorum sextantē, succi papaueris unc. I. Hæc singula cū uino myrteo terito, deinde mista in pastillos cogito, eosq; in umbra siccatō. Inde uero quantum sufficit tunc dens & cribrās palmis passis excipito, deinde linteolo infarcta uentri imposito.

Aliud. Succū acaciæ, malicorij, seminis hyoscyami, opij, gallarum, omphacij, Rhois Syriaci culinarij, singulorum quadrantem, baccarum myrti nigrarum he

minam unam, tundito, cribrato, & uino austero subacta in pastillos coagmenta-
to, eosq; in umbra siccat. Vfus iam ostensus est.

De affectionibus & utriusq; sedis.

Cap. VI

Sedis uitia & affectus ob multas causas difficilem curā accipiunt. Mul-
to enim sensu particula hæc prædita est, dictum autē sæpe est eiusmodi
particulas facile per acriora & austera pharmaca irritari. At uero &
ipse retrēmētorum alimenti transitus per se mordax est, & hoc magis
ubi eruperit ipsa bilis, & serosi quidam aliquando humores, Quibus accedit &
hoc, quod neq; statum tempus habeant medici ad imponēda pharmaca, sed ple-
rumq; tempore minime conuenienti ægri ad excernēdum condantur. Quin &
humiditas ac caliditas ipsius loci, siccantibus simulq; frigefacientibus opus ha-
bens, non parum confert ad hoc ut ægre cutabilis ani affectus existat: si quidem
mordent adstringentia. Verum locus subtili sensu præditus, acrimoniam ferre
non potest. Ob id igitur aptissima ipsis pharmaca sunt, quæ citra aspretudinem
adstringunt, Qualia maxime sunt ex metallicis, quæ neq; acria, neq; acerba peni-
tus existunt. Hæc enim lota citra mordacitatem id quod oportet operantur. Ho-
rum itaq; in summa dictorum memores, deinceps materiæ syluam experimento
cognitam subscriptam habebitis.

Medicamenta Sedis seu ani ab Andromacho conscripta.

Medicamentū sedis quo uior. Cerussæ, spumæ argenti, utriusq; drach. v.
thuris, aluminis scissi, utriusq; drach. iiii. croci obolos iii. Vini & rosacei
quod satis est.

Aliud ad sedem, ut Apollonius, quo uior. Lycij Indici, sex-
tantē, cœsypī unc. i. ceræ Tyrhenicæ trientē, alij sextantē. Rosacei quod satis est.

Aliud, Buryri fescunciam, ceræ fescunciā, medullæ ceruinæ unc. unā, cœsypī,
unc. i. thuris unc. i. aluminis scissi quadrantē, lycij sextantē. Vini & rosacei quod
satis est.

Aliud ut Nicostatus. Ceræ Tyrhenicæ unc. i. lycij Indici sextan-
tem, balaustij unciam dimidiā, cœsypī unc. i. acaciæ unc. dimidiā, rosacei trientem.

Aliud ut Herophilus. Rosarum siccarū aut uiridium drach. iiii. cerussæ drach.
ii. pompholygis drach. ii. croci drach. ii. spumæ argenti lotæ drach. ii. meliloti
drach. ii. iūci odorati drach. i. succi papaueris drach. i. cœsypī drach. i. ouī assati ui-
tellum unum. Rosacei quod sufficit, succi plantaginis cyathos duos.

Aliud faciens & ad pruritus. Spumæ argenti libram dimidiā, thuris, cer-
æ famiæ, utriusq; unc. unā, cœsypī sextantē, rosacei sextantem, melini libram di-
midiam. Arida in umbra cum uino salerno terito, cœsypumq; infarcito, & affusis
duobus unguentis terito ac commisceto.

Aliud ad sedem quo uior, ad con-
dylomata, inflammationes ani ac rimas. Ammoniā thymiamatis, lapidis hæ-
matite, thuris, aluminis rotundi, singulorum drach. ii. gallæ, croci, utriusq; drach.
i. terebinthinæ drach. i. ceræ tyrhenicæ drach. xii. rosacei heminas, iiii. excipe
pello cum Syriaco, in reliquis cum rosaceo.

Medicamentum sedis ex cerebellis. Adipis anserini curati, ceræ, thuris, me-
dullæ cerui, florum rosarum, pompholygis, cadmiæ, plumbi loti, singulorū drach.
iiii. cerussæ drach. viii. cerebri gruis drach. ii. succi papaueris sesquidrachmam.
cœsypī drach. v. succi feridis heminam unam, rosacei heminam dimidiā.

Medicamentum sedis à Rustico, quo uior. Rosarum uiridium drach. viii. la-
ctis muliebris heminam unam, spumæ argenti drach. xl. succi papaueris drach.
xl. oua cruda integra duo, buryri drach. xvi. cœsypī drach. xvi. malicorij drach.
xvi. mellis drach. c. in alio exēplari heminā dimidiā, ceræ drach. xl. rosacei aut
mytici heminā dimidiā, Verū Heras pro cœsypo adipem anserinū pari pondere
coniecit, & spumæ argenti drach. x. lactis heminas iiii. & ouī utellum assatum,

z Aliud

Aliud à Tyranno. Spumę argenti sextantē. cerussę sextantē & unc. dimidię thuris unc. l. myrrhę unc. l. cadinę sescuncię. aluminis scissi trientem. cerę trientem. Vinum & rosaceum. Aliud Samithrę ad multa commodum. Spumę argēti drach. xii. cerussę drach. ii. chalcitidis drach. ii. misyos assati drach. l. terebinthinę drach. v. olei & aquę heminas iiii. Pinguis cōpositio ad Achoras & pforas. Spumę argenti. cerussę utriusq; drach. xxxii. atramēti sutorij drach. xvi. sulphuris uiui drach. viii. olei myrtei & aceti quod sufficit.

Alia pinguis Galli. Spumę argenti drach. xxxiii. cerussę drach. xxxiii. myrrhę drach. v. i. thuris drach. x. olei myrtei drach. xiiii. Vini austeri tantūdem. Alia pinguis quator, Cleopanti. Olei myrtei. lentiscini. rosacei. singulorum drach. xvi. cerussę libram unam. spumę argenti lotę sexcicem. Vini ueteris Italici sextar. dimidium. cerę trientem. Alia ex nouem medicamentis constans. Enneapharmacos dicta. Mellis partem unam. cerę albę partem l. medullę ceruinę. myrrhę. utriusq; partem unam. butyri partem unā. adipis anserini. adipis utulini. utriusq; partem unam. terebinthinę partem unam. olei partem unam. aliq̃ui & ricini partem unā. Alia Xanitę multi usis. Cerę drach. xvi. butyri drach. x. cesypi drach. x. adipis anserini drach. viii. terebinthinę drach. viii. medullę ceruinę drach. iiii. Rosacei parum.

Alia ex ruta. Spumę argenti minam unam. rutę minam dimidiā. alię minam unam. aceti drach. iiii. olei quod satis est. Alia ad obturationes & alia sedis uitia. Plumbi usti & loti drachmas x. cerussę drach. iiii. cerę drach. xii. adipis porcini uel anserini drachmas iiii. olei quantum sufficit. Ad obturationes & uitia sedis cōpositio Icodoti. quia Astainus curatus est. Cesypi drach. unam. obolos iii. adipis anserini per hyemem curati drach. vi. per æstatem drach. iiii. medullę cerui aut capeli drach. ii. cerę Tyrhenicę drach. viii. plumbi usti & loti drach. iiii. sadani drach. ii. adipis utulini drach. iiii. terebinthinę drach. iiii. cerussę drach. ii. spumę argenti drach. unam. rosacei heminę quartam partem. hoc est sesquicyathum. hoc est sextantem & unciam dimidiā. Arida cum liquidis committito. Quando uero temporis progressu fuerit indurati. dissoluūt rosaceo. & adipe anserino. facit & ad contractos articulos.

Ad condylomata quo melius nullum reperitur. Aluminis scissi drachmas iii. cerę drach. viii. croci drach. iiii. opobalsami drach. unam. cesypi drachmas viii. thuris drach. iiii. aloes drachmas iiii. liquefabilia liquefacito ac cum aridis tritis committito. Ad prolabentem podicem. Asclepiadę pharmaca ex v. externorum. Ad prolabentes podices ut Archelaus. Recrementi plumbi drach. viii. Rhois Syriaci drach. viii. floris rosarum drachmas iiii. myrrhę Minnæ drach. ii. ad moue siccum. ubi prælaueris uino austero aut lentisci decocto. Aliud. Gallę omphacinę. malicorij seci. rhois coriarię. singulorū drach. ii. plumbi usti drach. iiii. Spumę argenti drachmas viii. trita inspergito. Aliud. Balaustij drach. unam. malicorij drach. ii. feminis hyoscyami drach. ii. cerussę drach. viii. myrrhę drach. ii. plumbi loti drach. ii. tritis uitor. Aliud. Corticis pinus. spumę argenti. mannę. singulorum drach. ii. pilularum cupressi aridarum drach. ii. plumbaginis drach. ii. trita insperge. ubi prælaueris uino acerbo.

Pharmacum nostrum ad procidentem sedem. Fructus ericę. gallarum. acacię. cerussę. succi hypocythidis. corticis pinus. thuris. myrrhę Minnæ. singulorum drach. iiii. arida trita insperge. uino austero prælatis locis.

De Hæmorrhoidibus.

Cap. VII



Væ Asclepiades in quinto externorū de hæmorrhoidibus scripsit, in subscripto sermone continentur. Quandoquidē uero plurimæ hæmorrhoides opus habent extractione ad facilem pharmacorū impositionem, necesse est etiā huiusmodi compositiones subscribere.

Extractionum hæmorrhoidū Magni Tarsensis pharmacū accommodatum. Pi peris, nitri, utriusq; drach. i. terito & admouero ante reliquorum pharmacorum impositionem. Aliud, Spumæ nitri, fellis tauri, staphidis syluestris, singulorum drach. i. trita adhibe, modico addito melle.

Aliud, Succu abstinthij drach. i. fellis tauri, staphidis syluestris, utriusq; drach. i. Aliud ut Diogenes. Succu cyclamini, mellis, utriusq; parem mensurā coquito in uale aereo, ad ceratū liquidi spissitudinem.

Aliud ex scriptis Largi, quod uix pronūtes extrahit hæmorrhoidas. Succu cæraureæ drach. ii. aluminis liquidi drach. ii. misyos drach. i. staphidis syluestris drach. i. excipe melle & anum obline, aut lanā ex eo madefactam in sedē inde. Postq; uero hoc pharmacū promptitudine induxerit ad egerendum, & tumor hæmorrhoidarū prociderit, pharmaca ad hæmorrhoidas conscripta adhibeto. Quando uero aliquod huiusmodi pharmacū illiū sedem ac anum ipsam extrahit, necessario tales confectiones adhibemus, qualis est & Nicodemus Romæ medicantis, quæ Euphron à lenitudine appellatur. Cerussæ unc. i. spumæ argenti quincuncē, cadmiæ besselē, aut pōmphygis unc. i. olei myrtei besselē, Vini boni besselē, butyri unc. i.

Ad sedem inflammatā ac prolapsam. Gallam flauā coctam ac tritā imposito, cum uino si fortiore uiti uelis, aut cū aqua si mitiore. Succus item Echini facit ad inflammationes & prolapsam sedem.

Aliud, Corticis pinus drach. vii. pilularū cupressi aridarū drach. ii. prælotis uino austero inspergito. Cæterū ad arduas sedis dolores, oui assati uitellum uel no albo terito, & cerato myrteo exceptū illinito. Verū ad pruritus emolliam tritam ceratō myrteo excipito. Ad rimas uero tum sedis, tum pudendi, rasuram linæteolorum urito, eiusq; cinerem cum pari amylo tritum succo foliorum oleæ amixto, illinito. Pastillus ad eminentias. Aloes, croci, utriusq; drach. ii. & dimidiam aluminis scissi unciam unam, terito uino Aminæo ac uitior.

Ad pudendorum affectiones.

Cap. VIII



Xulcerati pudēdi cognitio ex manifesto circa ipsū dolore cōtingit, unā cum hoc quod & circa mictiones excernitur quid ex corpusculis ulceri ipsi insidentibus. Discernuntur autem hæc ab eis quæ ex uescica feruntur, quod statim circa primū exitum illa appareant, uerū ex uescica delata ipsis urinis amixta sunt. Cæterū ulcera pudendorū & circa sedem citra inflammationē cōsistentia, resiccantibus ualde indigēt pharmacis, qualia sunt, quod ex charta usta constar, & anethū ustum siccū, & cucurbita usta. Verum siccis & recentibus ulceribus, etiā aloe bonum est pharmacū, si eius arida puluillius inspergatur. Omnī autē maxime dolorem sedat, neq; ullo minus efficax est pompholyx, Si uero humectiora sint ulcera, pinus cortex per se, & lapis hæmatites, uerū si profunda etiā sint ulcera, manna prædictis addatur. Porro quæ circa iterum aut uescicam sunt ulcerationes, iisdem pharmacis indigent, sed instrumentis insuper opus habent, quæ ipsa intromittant, quæ metrenchytæ & Carthe teres Græcis appellantur. Apriora itaq; sunt arida qualis est crocus, & pompholyx, & aloe, quæ facile planraginis aut alteri tali succo miscentur.

Ad Scroti & pudendi dolores. Butyro & resina pari mensura utere. Aut semen lini cum aqua coquito, & amixta myrrhæ fermē decima parte, & resinæ tantundem imposito. Ad pudendum intumescens. Foliorum uitis tene-

rotum drach. Læcrussæ drach. v. trita cataplasmatis uice impone. Vtere etiã marina aquæ frigida perussione, & quiete, & colis religatione. Aliud. Lenticulam in aqua coquito, & cum mali punici cortice trita imposito. Si uero à sudoribus ulcera in seroto fiant, gallã tritam cum alumine inspergito. Ad tubercula uero in pudendis nascentia piri semen inspergito, & sel hircinũ oblinito. Ceterum fissuras ac rimas pudendorũ iuuat resina fricta cũ rosaceo trita ad strigmentum crassitudinẽ, ammixto etiã oui assati uitello. Aut rosacei, & amyli, ac thuris, singulorũ uncia una. Aut foliorũ hederæ aridorũ ustorum cinis cum oleo in mortario plumbeo tritus. Ad inflammationes aut pudendorũ, uiam passam exacinatam, & cuminũ, trita imposito. Aut farinã ordeaceã aqua mulsã coqueto, & uitis folia tenera cum polenta terito, omniãq; simul imposito. Aut cuminum tritũ, cum buri & resinæ aequalibus partibus eliquatis cõmittito. Testiculos porro ulcere aphthæ non absimili apprehensos, ex terra cimolia cum aqua oblinito, & exsiccati sinito, Inde q; aqua calida ablutos in myrto arida trita & modico smyrnio item trito conspergito. Excrescentẽ uero testium carnẽ cinis satmentitius cum nitro & aqua subactus sanat cataplasmatis uice impositus.

De priapismo.

Cap. ix



Priapismus est auctio pudendi stabilis in longitudinẽ ac orbem tumefacti, citra rei Venereæ appetentiã. Est autem status uentosus uidelicet qui membrũ ipsum tumefacit, ex humoribus uiscosis ac crassis generatus per moderatã caliditatem. Palsam est igitur non oportere membra ipsa calfacere, sed refrigerare leniter per ceratũ rosaceũ in aqua conuulsatũ, itemq; per chamæmelinũ ceratũ tum pudendo, tum lumbis impositũ. Victus & pharmaca exhibeantur attenuatoriæ facultatis citra manifestã calfactionẽ. Adhibenda sunt etiã naturali efficacia prædita per experientiã inuenta, nymphæaq; in potu danda ac uiticis semen, Ruta etiã uiridis obsonijs ammisceatur. Verum hoc à principio ne fiat, multũ enim calfacit, sed posterius post aliorũ extenuantium usum. Quod si euacuatione uti libeat, per uomitũ id fiat. Quæ enim per inferiorẽ uentrẽ fiunt euacuationes, sepe numero uicinas partes huxione infestant.

Ad eos qui se in somno permingũt. Vesicã caprinã aut ouillã usitam expositã bibendã præbeto. Et ad uesperã siniculosos somnũ petere iubeto, facit & leporis testiculus in uino odorato seruefactus, atq; ita potatus. Aliud. Calaminthã & myrrham in uino ante coenam bibenda dato. Oblinat autem & pudendum cõmolia terra cum perdicij succo.

Ad uteri affectus.

Cap. x



Uteri suffocatione contingit sensus ac motus priuatio, & pulsus obscurus ac paruus, & penitus interceptus. In aliquibus uero tũ sensus tum motus adest, itemq; ratio, uerũ uix respirant. Aliquibus etiã uox intercipitur. Alijs contrahuntur artus. Fiunt igitur & sensus & motus & spiratio nis interceptiones obfrigiditatẽ, quom ipsæ sola perspiratione totius corporis per arterias contingẽre contentæ sint, & respirationem per os nõ expellant, atq; hoc ut dictum est ob frigiditatẽ, Quando sanẽ in priori tempore probe purgatæ, & concipientes, ac uiris coeuntes, his ipsis priuata fuerint, ut passim sit humidum & frigidum in ipsis semen totum corpus perfrigerare. Ad uulgo igitur strangulatus conuenit agarici drach. i. in potu accepta ex uino. Plantaginis semen & succus cum uino. Onyx detractus ex conchylio potatus. Acetum scilliticum absorptũ. Cæterũ olfactu excitant strangulatas, bitumen, castorium, galbanum, pix liquida, cedria, pili uisiti, ruta, allium, cepa. Eandem in rem & cotinũ sufficitur. Et ruta cum melle lana excepta, in anum inditur.

Finis Noni libri.

De Nephriticis.

Cap. I

De Ischiade coxædici morbo, podagra, et morbo articulari seu arthritide. Cap. II

De podagricis & arthriticis affectionibus.

Cap. III

CLAVDII GALENI PERGAMENI

DE COMPOSITIONE PHARMACORVM SECUNDVM

locos Liber X. Iano Cornario Medico interprete.

De Nephriticis.

Cap. I



VOD Nephriticas antidotos & compositiones appellent quæ renibus affectis comodant, ex ipsa appellatione manifestum est. Nephritica enim nihil aliud quam renales sonant. Est autem differentia ipsarum generalissima duplex. Quædam enim calculosos renes iuvant, Quædam vero inflammatos & ulceratos, quæ etiam ad vesicæ similiter affectam conueniunt. Maxime vero contrariæ inter se sunt prædictorum pharmacorum facultates. Quæ enim ad inflammatas & ulceratas affectiones componuntur, mitigatorijs medicamentis opus habent. Quæ uero impossibile sit hæc cito ad regiones renū peruenire, ob id ipsis pharmaca urinam ciētia miscemus. Quæ uero calculosis auxiliantur, unica facultate indigent, quæ secare & extergere eū manifesta caliditate potest. Sunt autem talia fere omnia amara. Quemadmodum igitur in alijs, sic etiam in his materiā experimento cognitam deinceps subscribam, initium ab his quæ ad ulceratas & inflammatas affectiones conueniūt facturum, à quibus etiam Andromachus & Asclepiades orsi, inde ad compositiones calculos frangentes transierunt.

Cōfectiones renales ab Andromacho ad renū & uesicæ affectiones cōscriptæ.

Potio. Seminis lini, seminis papaueris albi, seminis cucumeris, tragacanthæ, singulorū drach. II. amyli drach. III. cum aqua in pastillos redigito, & ad uesicam ulceratam ac urinæ emittendæ difficultatem exhibeto. Alia. Nuccæ pincas. XXX. amygdalas. XX. palmas quindecim, tragacanthæ drach. III. succi radicis dulcis drach. II. croci obolū. I. myrrhæ obolum. I. uino protropo diluito ac uitor ut accommodaro.

Alia. Ad uesicæ affectus & ulcerationes pastillus quo utor. Seminis cucumeris drach. XII. seminis hyoscya mi drach. VI. seminis cicutæ, opij, sceniculi, croci, singulorū drach. III. cassiæ drach. III. amygdala. X. nuccæ ponticas. X. seminis apij drach. VI. seminis malux syluestris drach. III. Excipe passo cretico & præbe obolū. III. nō febrientibus ex passo. Quidā cicutæ drach. VII. habent.

Alia, ad eadem & uesicæ dolores. Croci, seminis bescasæ, hoc est, nuxæ syluestris, seminis malux syluestris, singulorū drach. VI. seminis hyoscya mi drach. XII. opij drach. VI. seminis apij drach. XII. nuccæ auellanas. VIII. amygdalas. XX. seminis cucumeris drach. XII. Mellis Attici quod fatis est. Datur magnitudo nucis ponticæ cum uini mulsi cyathis. III.

Alia, ad profluua sanguinis ex uesica. Aluminis drach. I. tragacanthæ drach. II. gummi obolum unum. Dato ex passo quandoq; obolū unum, quandoq; duos.

Alia, ad uesicæ affectiones unam ciens à Macèdone profecta, facit & ad hepaticos, hydropicos, ictericos, nephriticos, ac omnia uesicæ symptomata, frangit etiam lapides. Aconiti drach. I. phu drach. XXV. nardi celticæ drachmas XXIII. seminis dauci drach. XXII. cinamomi drach. XXXII. pæi drach. XVI. asari drach. XXIII. petroselinī drach. XVI. opobalsami drachmas XVI. & carpobalsami tantūdem. croci drach.

XXIII. myrrhæ drach. XX. radicis dulcis drach. XVI. nardi Indicæ drach. XVI. cassiæ drach. XII. amomi drach. XVI. uux passæ drach. VIII. tragacanthæ drach. IX. Arida melle excipito, & tragacanthum uino amineo macerato. Dato nucis ponticæ magnitudinem cum uini cyath. IIII. febricitantibus cum aqua mulla.

Alia ad uescicæ uicera & inflammationes. Noces pineas. XX. seminis cucumeris syluestris grana. XL. amyli obol. III. nardi drach. I. seminis apij cyath. II. Nardus & apium in aquæ sextario uno coquuntur, deinde ex decoctio duo cyathi præscriptis ammiscentur.

Alia ad calculosos, qua Bassa uxor Marj curata est. Frangit ita ut neq; rursus gignantur. Cassiæ drach. II. seminis apij drach. III. myrrhæ minnæ drach. IIII. pipæris albi drach. II. thuris drach. III. lapidis syriaci masculi drach. I. aut foeminæ drach. I. seminis pastinacæ, anisi, utriusq; drach. II. styraeis drach. III. iridis Ilyricæ drach. III. seminis papaueris albi drach. II. spicæ nardi tantundem, amygdalarū amararum mundarum, asari, utriusq; drach. III. seminis smyrnæ, cypæri, utriusq; drach. II. mellis Attici quod satis est. Dato quotidie.

Alia ad calculosos frangens & paulatim expellens, donec mundâ uescicam reddat, deinde æger pellucida lotia reddet, & quod maximū est, curat ut nō amplius renascantur. Seminis dauci, anisi, seminis cucumeris, petroselinæ, myrrhæ, singulorum drach. VI. cassiæ daphnitiidis, cinamomi, nardi celticæ, singulorum drach. IIII. Terito & cum aqua ad perui lupini quantitatem coagmentato, & ieiunis quotidie per dies XXX. ex aquæ cyathis tribus præbeto. Hoc uero pharmacū quē admodum accepimus, cum quadam religione præparatur. Ligneo enim mortario ac pistillo tunditur, oportetq; eum qui tundit neq; anulum habere ferreū, neq; calciamenta clauis ferreis transfixa. Hoc à rustico ut Mysterium accepimus.

Alia ad nephriticos & omnem fluxionem, ut Apollonius. Coricis mandragoræ rosti sesquidrachmam, anisi rosti sesquidrachmā, tragacanthi, carnis palmarum, utriusq; drach. III. dato cum melle.

Nephriticæ compositiones ab Asclepiade conscriptæ.

A Nionj Musæ. Fructuum pini, qui pityides uocantur, tusorum & cribatorum drach. XX. seminis papaueris albi, tragacanthæ, utriusq; drach. II. Nardi celticæ, croci, anisi decorticati, radicis dauci Cretici, singulorū drach. I. costi obol. III. præpara cum protropo, & repone in pyxide, da nucis ponticæ magnitudinem cum protropi cyatho I. & aquæ calidæ cyathis duobus.

Alia. Seminis cucumeris satui rosti drach. III. seminis malux drach. V. nucum pinearū drach. VI. seminis apij, drach. VII. seminis lini drach. I. amygdalarum amararum mundatarum drach. IX. excipe passo, & exhibe ut prædictum est.

Alia ad Nephriticos Onesidemi. Amygdalarū amararum drach. XVI. seminis dauci cretici, seminis malux, utriusq; drach. VI. radicis iridis syluestris drach. VIII. cornu ceruini usti, tragacanthæ, nardi celticæ, seminis cucumeris satui, singulorum drach. VI. passi quātum sufficit, præpara ut dictum est. Aliud pharmacum accommodatum. hoc scimus multos Nephriticos usos esse, & à tota absfectione penitus liberatos. Oportet per multos dies in pharmaci huius usu perseverare. Datur & calculosis, & colicis medetur, ac uescicæ affectibus. Componitur hoc modo. Nucum ponticarū purgatarum, amygdalarū amararum mundatarum, seminis cucumeris repurgati, singulorū drach. III. seminis cicutæ, croci, seminis malux, opij, singulorū drach. VI. seminis hyoscyami albi, seminis apij, utriusq; drach. XII. Cogito in pastillos cum melle, ac dato obol. III. cum aquæ mullæ cyathis. III. In alio exemplari & besasa, hoc est, seminis rutæ syluestris drach. VI.

Ad callosas in renibus concretiones, Onesidemi. Symphytū, & sion, & Artemonium cum uino coquito, et expressi liquoris cyathos. II. cum pari aqua dato.

Aliud. Malux syluestris radicem, & rutæ syluestris radicem, & apij montani radicem.

radicem coquito, & eo qui dictus est modo exhibeto. Aliud ad calculosos inspersile. Seminis balsami pattem unam, lapidis qui in spongis tepetitur tantundem, pulegij aridi, feminis malvæ sylvestris, ocymij aridi, singulorum tantundem, Tusa & cribrata reponito, & dato cochleariũ cũ uini diluti cyathis duobus.

Aliud, Struthij radices partem unam, iridis sylvestris siccæ tantundem, oxallidis siccæ tantundem, fremij luteum florem habentis sicci tantundem. Tufis cribratis ut dictum est utere. Catapotia Heracleidæ Tarentini. Dissolutum uesticæ to-

fos, commodant & ad uesticæ stillicidiũ. Piperis, galbani, utriusq; drach. i. succi lybici drach. ii. myrrhæ drach. iii. protropi quod satis est. Forma catapotia ciceris magnitudine, & iii. deuoranda dato, & passi cyathos. i. in super bibendos.

Aliud, Ammoniaci Thymiamatis, piperis, spumæ nistri, singulorum drach. i. carpopalsami drach. ii. myrrhæ drach. iii. excipe protropo, & forma catapotia ciceris magnitudine ac tria deuoranda dato, ita ut uini dulcis quadrantem in super propines. Hoc ad dies quadraginta octo, ægro præloso facies. Pastillus cæs

urinam. Detrahít lapillos & tofosas concreciones. Asari, petroselinĩ, phu, Mei, singulorũ drach. iii. acori, feminis anisi, feminis dauci, apij montani, carpopalsami, tragacanthæ singulorũ drach. ii. Tragacantham passo dissolutã aridæ adijci to, & pastillos formato, Inde q; obol. iii. cum passi diluti cyathis. ii. exhibeto.

Alius pastillus Charidis. Educit arenosas subsidetias. Facit ad affectiões ulceratas. Seminis apij, petroselinĩ, anisi, singulorũ drach. xvi. floris iunci odorati, croci, tragacanthæ singulorũ drach. vi. feminis dauci Cretici, piperis albi, utriusq; drach. iii. præpara ut dictũ est, & da drach. lvi. protropi diluti cyathis tribus.

Antidotus ex lapidibus, ut Mithridates. Facit Nephriticis & ad uesticæ affectus, attemit calculos, & tofos dissoluit. Seminis smyrnij, cyperi, spicæ nardi, feminis papaueris albi, cinamomi, cassiæ fistulæ, piperis albi, feminis pastinacæ, singulorum unci. i. Thuris non secti, feminis apij, croci, styracis iridis, amygdalarũ amararum, acori, singulorũ sesquenciã. lapidis Syriaci semina aut masculi, utriusq; semenciã, myrrhæ Minniæ sextantẽ. Excipe melle. Datur nucis ponticæ magnitudine.

Alia Antidotus Biennitæ, pharmacũ accommodatum, sedans dolorẽ, unile & Nephriticis, hoc est, renalibus affectionibus, & ad uesticæ ulcerationes. Frangit lapides, & tofos per urinã expellit. Iridis drach. iii. mei, seselis, chamæ dryos, hyperici, cneori, cancbryos, singulorũ tantundem, amomi drach. viii. cinamomi drach. xii. rosmarini montani, nardi Indicæ, croci eliciij, petroselinĩ, polij, feminis rutæ sylvestris, dictamni cretici, singulorũ tantundem, glycyrrhizę, lapidis Syriaci masculi, utriusq; drach. xvi. thlaspeos drach. xxi. iii. feminis uiticis, myrrhæ, sphondylii, singulorũ tantundem. Cardamomi drach. xlviii. excipe melle cocto, & præbe nucis ponticæ magnitudinẽ cum uini mulsi diluti cyathis quatuor.

Quæ Archigenes ad Renum affectiones scripsit in secundo pharmacorum secundum genus.

EX renibus laborantes Nephriticis appellatos, conuenienti diæta adseruo. Et Ceratũ quidẽ Rosacẽ cum styracẽ ad malagmatis formã redactũ impono. Caterũ Antiochus apud phœcen Linophphum, ualde iuxta naturalem contrarietate auxilio fuisse ait, ad malũ euerfionẽ, Prototomi caulis decocti cyathos duos ieiuno ad dies nouem exhibitos. Inspergito autem salem modicum & magis proficies. Alia posio. Foliotum rosarum, amygdalarum decorticatarum, thuris, æquales partes caput papauetis duplum. Excipe protropo, & in uas fictile repone in loco non humecto, & obolos duos cum protropo exhibe. Quidam pro amygdalis, amyliũ coniungunt, & pro protropo aqua excipiũt, uerũ cum protropo bibendum exhibent.

De Ischiade coxendicum morbo, podagra, & morbo articulari siue arthritide.

Cap. II



X genere Arthritidis est tū Ischias, tū podagra, Quod enim in omnibus articulis Arthritis est, hoc in uno iuxta coxendicem quidē Ischiada, hoc est, coxendicum morbum appellant, iuxta pedem autem podagram. Incipit igitur plerumq; podagræ generatio ex uno articulo, & progreditur in omnes, temporis diuturnitate accedēte. Communem habent hi tres affectus humoris redundantiam, quæ affectam occupat coarticulationem, quæ expleta in omnem partem circumsitæ nervosæ particulæ tenduntur, & ex his dolor oritur. Aliquando quidem igitur irruens humor sanguineus est, ut plurimum uero pituitosus, aut ex pituitoso & bilioso mixtus, aut etiam sanguine cum ipsis permixto. Quod si quis exactius interpretari rem uelit, nō pituitosum humorem, sed qui proprie crudus appellatur, ut plurimum circa arthritidas prædominari dixerit. Est autem hic crassus ad similitudinem puris crassioris. Vbi uero in ipsis articulis diutius moram traxerit, nō solum crassior sed & uiscosior redditur. Qui igitur tofi seu calli appellantur, horum generatio ex his est, & postq; fuerint producti, ne speraueris ad pristinam constitutionem exacte redire articulum posse. Cæterum differentia assigentium humorum facile deprehendi possunt, tum coloribus, tum symptomatis coincidentibus, Itemq; per experientiam pharmacorū quæ adhibentur. Cognitio igitur ipsorum ex colore omnibus exposita est, ex symptomatis uero & accessionibus coincidentibus, tametsi nō omnibus, neq; ex prociñctu manifesta sit, tamen non adeo difficilis cognitu existit. Biliosus enim sanguis multæ caliditatis sensum ægroto exhibet, & calfacientibus impositis exacerbat, quemadmodum rursus à frigidis relaxatur. Verum ad huius moris noxi cognitionem conferet tibi etiam prægressa diæta, siue per exercitia, siue per ortum transmissa, & per balnea post, aut ante acceptum cibum. Quemadmodum cōferet etiam horū gymnasiarum & eduliorū tum quantitas, tum qualitas, Item anni hora, & Regionis ac aeris constitutio, Insuperq; et ætas, & habitus corporis, quorum omnium facultates sæpe in pleriq; locis enarraui. Porro principium curationis sit tibi euacuatio humoris affligere repert. Si quidem humoribus ex æquo redidit corpus, Venæ sectione primum omnium assumpta, deinde purgatione, quibus accedat pharmacorum dicendorum conueniens, & tempore, & ordine usus, Ita ut in manibus & pedibus pharmacis fluxionem repellentibus utamur, circa coxendicum uero iuncturam id facere uitemus. Quum enim in profundo ea sita sit, sanguis ex uicinis & ambientibus uasis ac musculis ad illam concipitur. Mitigatorijs igitur in principio medicamentis opus est in dolore circa coxendicem hærente, quæ neque refrigerent multum, neq; fortiter calfaciant, qualibus, sanè postea opus habet. Exacerbantur enim per ipsas fluxiones, caliditate nimirum plus attrahente ipsas quàm impediēte. Quandoquidem uero præsentis operis institutum est neq; de cataplasmatibus, neq; de irrigationibus quicquam dicere, sed de methodo compositorum pharmacorum, ad hanc solam progrediar, initio ab Ischiade sumpto. Raro equidem sit Ischias siue coxendicum dolor ex sanguinis multitudine, & citissime curatur, uenis circa poplitem aut talos secit, Quemadmodum autem sæpe sola sanguinis euacuatio sufficiens auxilium existit, Sic contra in omni coxendicum dolore, & præsertim eo qui ex humorum copia exortus est, si quis ante euacuationē totius corporis, acerbis pharmacis circa partem affectam utatur, ægre curabilem reddet affectionem, copia nimirum indissolubiliter ibidem condensata. Præter alia enim, & crassa & uiscosa sit, ob calorem & siccitatem acrum pharmacorum non dissimile quippiam as-

fatione

facioni perpetuens. Tanquam igitur maximam uim ad affectionis curationē habeat totius corporis euacuatio, ab ipsa incipiendum est, non solum à cruribus, sed & à cubito primum sanguinis detractioe facta. Auxiliantur etiam uomitus ipsi Ischiadicis, magis uicq; quam euacuationes infernē per uentrem, ut qui reuellant deorsum repentem humorem. faciendi itaq; sunt uomitus in principio ab accepto cibo, postea uero etiam per uomitoria medicamenta, initio à mediocribus factio. In quibus aut uehemens humorum densatio, quæ agre dissolui potest, à medicis intempestiue acerbis pharmacis utentibus facta est, his cucurbita affixa maxime auxiliatur, & purgatio per efficaciora infusa, quale est & quod ex colocynthide constat. Si igitur ea quæ nunc dicta sunt præ oculis habueritis, medicamentis sanè à prioribus medicis traditis iuxta Methodum utemini. Verum in ipsis recensendis auspicabor ab his quæ ab Andromacho scripta sunt, in illa parte libri de externis pharmacis conscripti, in qua præscriptis malagmatis proprie appellatis, inde etiā alia omnia prodit, iuxta quæcunq; tandē modū in ueteratas affectiones iuuantia, in quibus est etiā Ischiadicorū appellatorū cura.

Compositiones ab Andromacho conscriptæ ad Ischiadicos.

Seminis rutæ syluestris drach. iiii. silphij drach. iiii. spumæ nitri drach. iiii. Saccarum lauri drach. iiii. abrotoni, colocynthidis medullæ, cardamomi, amnii singulorum drach. iiii. rutæ uiridis minæ octauā partem. Quidam horum singulorum drach. xx. accipiunt, & picis, terebinthinæ, myrti, ceræ, singulorū tantundem, adipis taurini, tantundem, galbani drach. vi. ammoniaci thymiamatis drach. vi. opopanax drach. iiii. sulphuris uiui drach. iiii. Quod hoc pharmacū fortiter calfacientiū sit, si memoria tenuerimus ea quæ in libris de simplicium pharmacorū facultate scripta sunt, nihil opus recentiore assertionē. Est enim uehementissimū & calidissimū medicamentū syluestris rutæ semen, & cum eo silphium, & bacca lauri, deinde spuma nitri. Post hæc abrotonum, indeq; colocynthis, & cardamomū, & amnium. Ruta etiam uiridis minus quidem his, non tamen contemnendam habet caliditatem, quemadmodum neq; sulphur uiuū. Ex profundo itaq; attrahere omnia hæc possunt humores articulum & iuncturam, coxendicis uexantes. Quo uero Emplastrum ex ipsis fieret, picem & terebinthinam, ac myrteum, & ceram, ac adipem ammiscuit is qui pharmacū composuit. Verum Ammoniacum thymiamatis, & galbanū, ultra hoc quod conferunt ad emplastri compositionē, etiā emolliendi ac mitigandi uim quandam habent. Opopanax uero eiusdem cum ipsis est generis, sed fortiori facultate præditus. Alterā porò compositionem ad eandem affectionē Andromachus sic scripsit.

Aliud Malagma ad Ischiadicos, & alia multa. Cere drach. lxxii. terebinthinæ drach. xlviii. ammoniaci thymiamatis drach. xxxiii. propolis drach. xlii. galbani drach. xxxvi. bdellij drach. xxv. croci drach. v. opopanax drach. xii. spumæ nitri, drach. xxx. ungento irino admoto fundito.

Aliud Protæ pelusiota: ad Coxendicū & capitis dolorē, & ad omnes diuturnos dolores. Cere drach. xxxiii. ammoniaci thymiamatis drach. vii. terebinthinæ drach. vii. succi diapsiæ drach. viii. olei cyathum unum.

Quin & aliā compositionē inter malagmata Andromachus retulit hoc modo.

Ad Ischiadicos ab Hera Cappadocē. Picis liquidæ heminas. iiii. aut duas & dimidiā, ceræ li. i. resine pini li. i. nitri sesquialtera, sulfuris uiui lib. i. staphidis syluestris sexta. i. pyrethri lib. dimidiā, fecis uini ustæ lib. ii. cardamomi sextar. i. galbani lib. dimidiā, arida cum liquidis cōmixtio. Hoc pharmacum etiā ipse Heras in proprio libro prope finē scripsit, sed non appositum est ad picem, aut duas & dimidiā, sed simpliciter scriptum est heminas tres. Præscripsit autem hæc uerba,

Ceratum ad Ischiadicos, quod eruit etiā ualde inueteratas affectiones; hoc usus sum in Frontino. Scripsit autē & alias duas Ischiadicās cōpositiones Heras, quarum altera hoc modo habet.

Ad Ischiadicos ualde mitigatoria. Picis partes duas, sulphuris uiui partem Lutrag; trita mixta dolenti loco imposito, uerū praelauare ægrum oportet, & superne chartā superponere, ac sinere donec sua sponte dilabatur. Licet etiā lauare charta supraposita adhuc incumbente. In quibusdā exemplaribus, picis pars una habetur, & licet etiā sic praparare, modo sciamus nos efficacius esse ambo pari mensura misceri, debilius uero pharmacum, in quo duplum picis ad simplum sulphuris cōiicitur. Porro quæ restat adhuc tertia cōpositionum Ischiadicarum, hoc modo ab Hera prodita est.

Alia Ischiadica, hac usus sum in Frontino, statim in exacerbationibus. Cerę drach. c. uisci quercini drach. xvi. myrrhæ drach. v. terebinthinæ drach. xxv. galbani drach. vi. cedi dris Illyricæ drach. vi. cedriæ heminā dimidiā. cyprini heminā dimidiā. Ceram & cedriam cum cyprino liquefacto; deinde resinā & galbanum, atq; ubi iam ab igne auferre uoles iridem in spersito, itemq; uiscū indito. Ablata autē iam olla, in promptu sit tibi myrrha trita, ad quā liquefacta diffundes; & mixtis simul omnibus uteris. Quidam supra hæc omnia etiā Nitri drach. v. addiderunt.

Quæ pharmaca Asclepiades in quarto exteriorum prodidit.

Quæ Marcella inscribit.

Nominat equidem & hic omnia huiusmodi malagmata, apponit autē alijs quod ad Ischiada, alijs quod ad splenē, alijs ad latus, aut aliam aliquā partē conducāt. Quædā etiā uarij usus esse ait. Quemadmodū etiā hoc scripsit ab ipso in hæc uerba. Malagma Antiochidis, splenicis, hydropicis, Ischiadicis, arthriticis. Præparatū est Fabulæ Libycæ. Ceræ libras iii. uisci quercini lib. ii. resinæ terebinthinæ lib. iii. retribuenti ab expressa myrobalano reliqui lib. i. spumæ nitri lib. i. floris lapidis Asij li. ammoniaci thymiamatis li. i. olei cyprini lib. iii. Acetū ad ammoniacum dissoluendum. Post hoc scribit rursus aliud sic. Aliud Fabulæ compositū ualde præclarū, ad easdem affectiones. myrrhæ stactæ lib. ii. bdellij onychis lib. ii. medullæ ceruinæ lib. ii. ammoniaci thymiamatis lib. ii. iridis illyricæ lib. ii. opopanax lib. i. galbani, styracis, utriusq; lib. i. mastiches lib. i. floris lapidis Asij lib. i. sueci sycomororum lib. i. canchryos lib. i. pipēris albi lib. i. ceræ terebinthinæ, utriusq; lib. v. tundendum est pharmacum, ita ut qui audit fecem ungenti trini adhibeat, quo mollius pharmacum fiat. Aliud deinceps Asclepiades scripsit hoc modo. Malagma quod & aurei coloris appellamus. Auripigmenti auricolaris, calcis uiuæ utriusq; sextantem. aluminis liquidi & scissi utriusq; sextantem. Arida tundimus & cribramus, & in pilam coniectis, acetū cyathos viii. affundimus, & probe trita liquefactis excipimus. Sunt autem hæc Ceræ, resinæ frictæ, & pinus, singulorum lib. ii. olei cōmunis cyathi. viii. hæc liquefacta frigeferi sinimus, & erasa tritis ammiscemus. Nos ad pharmaci præparationem etiā myrrhæ sextantem addimus. Alij etiā sandarachæ sextantem apponunt, aluminis liquidi sextante sublato: Nos autē coniectis omnibus præscriptis conficimus, & fit efficacius. Post præscriptū aliud subdidit hoc modo. Hoc usus est Andromachus: facit splenicis, hydropicis, & ad præcordia distenta: facit Ischiadicis, arthriticis, & ad inueteratos affectus. Cerę picis bœutię, utriusq; lib. ii. Nos pice resinam frictā indimus, resinæ pinus lib. i. olei cyathi. vii. auripigmenti auricolaris, aluminis scissi, calcis uiuæ, singulorū sextantē. Præpara ut dictū est. Nos apposuiimus ad pharmacū myrrhæ sextantē, uisci quercini trientem. Post celata ista quædam ad hydropicos & splenicos recenset, & inde rursus multi usus cōpositionem tradit, quam etiam Ischiadicis conuenire ait, hoc modo.

Andreae Malagma. Cōpositio admiranda ad ea quę uelis perforare, dissoluere, expurgare, & uelut excolare. educit ossa corrupta, aculeos, & infixa. Descriptum est etiā à Serapione Empirico. Facit & ad Ischiadicos, cōmodum est suppuratis, facit & ad induratas uiscerū affectiones. Est & acopon bonū diutinis resolutionibus, & distortis corporis particulis. Facit etiā ad corrosa ac corrupta, educit em̄ aliena, & ulcus ad cicatricē p̄ducit. Grani Cnidij purgati, nitri rubri, salis ammoniaci, aristolochiæ creticae, radicis cucumeris syluestris, terebinthine, singulorum drach. xx. piperis rotundi & longi, ammoniaci Thymiamatis, & ut quidā uolunt, amomi & xylobalsami, singulorū drach. x. thuris masculi, myrrhę, resinę siccę, uisci subacti, singulorū drach. x. succi mororū drach. x. cerę drach. xxx. adipis caprini drach. xv. fecis ungenti Irini quantū satis excipiendīs erit. Arida tunduntur & angustissimo cribro excernuntur, Liquefiscibilia uero singulim diligenter tunduntur, deinde omnia simul miscētur, ac rursus tundūtur ad mortā Irini fecē. Deinde ubi probe fuerint unita emollitā reponimus. Quod si uelis acopo uti, accipe pharmaci quadrantē, adipis anserini quadrantē, olei cyprini quadrantem, ac mixtis uitior. Postea uero consequenter sic scripsit.

Aliud ad easdem affectiones. Pyrethri drach. xx. grani cnidij, spumę nitri, utriusq; drach. xx. salis ammoniaci, aristolochiæ creticae tenuis corticis, radicis cucumeris syluestris, terebinthine, singulorū drach. xx. piperis rotundi & longi, ammoniaci thymiamatis, bdellij, xylobalsami, thuris, myrrhę, cardamomi, amomi, adipis caprini, resinę siccę singulorum drach. x. cerę drach. xxx. Visci probe subacti drach. viii. succi mororū drach. viii. fecis ungenti Irini quod sufficit his excipiendīs. Vini Italici quod satis est. Maceratis his quę dissoluere oportet, pro more apparato. In alio exemplari neq; xylobalsamum neq; Cardamomum, neq; Amomū reperi. Post hæc alia pharmaca prodidit, & deinde rursus Ischiadicorū meminit sic scribens. Aliud eiusdem Epithema. Ischiadicis & arthriticis auxiliatur confestim. Foenum græcum in uas fictile conficito, & ad ipsum poscam sufficientē affundito, & prunis impostum donec dissoluatur cōquito. Ad dissolutū uero mellis quod satis est inijce, ac rursus cōque, deinde ex empra diligenter tere, & in linteolum infarcta locis affectis impone, fasciāq; obligatos sine. Hoc autē ad bīduum & tridū faciūmus. Cæterū si in terendo pharmacum induretur, ex liquore quantum sufficit addimus, liquor autē tantus sit, ut trachile cataplasma reddatur. Aliud quod cōtinenter ad prædicta sequitur, hoc modo: Symphyti sesquilibram rasam, & minutim concisam, ac in mortariū testaceum coniectam, diligenter terito, & ad tritam mannę quadrantem addito, atq; ouorū crudorū recentium trium numero candidum unā cum luteo, & rursus terito, & ubi unita fuerint, his adipis suilli ueteris lib. i. adijeto, & conqussata diligenter atq; in linteolum infarcta imposito. Mitigar confestim. post præscriptum, aliud deinceps scripsit hoc modo. Aliud eiusdem Malagma, Ischiadicis statim in irritationibus imponitur, appellatur Didymæa, facit ad attrita, & omnem neruorū per consensum affectum. Dissoluit omnem duritiem. facit etiā ad alias inflamationes. Delet malignas cicatrices, facit ad luxata & collisa. facit & ad mamillarum affectiones malignas. Cere, uisci quercini, terebinthina, tridis sicca, myrrhę, galbani, singulorū drach. xl. viii. olei cyprini aut ungenti Aegyptiaci quod satis est. Galbanū in oleum cyprinū, aut ungentum Aegyptiū coniectum, ad ignē dissoluimus, & cerā molimus, ac reliquis mixtā probe tundimus, atq; his galbanū liquefactū cū cyprino inijcimus; ac rursus tundimus, malagma lenissimū tactui reddēdo, quo utimur. Cōsequēter etiā hoc Asclepiades subdidit. Aliud eiusdem ex Ario. Facit ad colicos supra quā dici potest, in ipsis uexationibus impositū, & pforas curat citā exulcerationē. Cere, picis liquidę, utriusque

usq; lib. i. sulphuris uiui, aluminis scissi, nitri rubri, singulorū lib. dimidiā. liquet-
scibilia liquefacito, arida uero tundito & per angustissimū cribrū concernito, &
ad liquefacta adijcito paulatim ea inspergēdo ac assidue mouendo, indeq; in pillā
translata ac tusa reponito, & utitor. Deinceps rursus aliud p̄didit hoc modo.

Aliud eiusdem Malagma ex Silphio, Ischiadicis ualde commodum. Ammij
drach. XII. silphij, seminis rutæ syluestris, baccarum lauri purgatarū, singulorū
drach. XIII. medullæ colocynthidis drach. ii. nitri drach. iiii. abrotoni thebaici
drach. iiii. cardamomi drach. iiii. ceræ ponticæ minæ octauā partem, picis, re-
sinæ, ammoniaci thymiamatis, singulorū minæ octauā partem. Liquida cum ari-
dis committito. Consequenter & hoc ab Aesclepiade scriptum est ita.

Aliud eiusdem, quo usus est Antipater. Silphij, rutæ syluestris siccæ, baccarū
lauri siccarū, spumæ nitri, medullæ colocynthidis, abrotoni thebaici, ammij, car-
damomi, singulorum drach. iiii. rutæ sariuæ uiridis, picis siccæ, resinæ terebinthi-
næ, ammoniaci thymiamatis, adipis uitulini, singulorū minæ octauā partem, gal-
bani drach. xvi. opopanacis drach. iiii. sulphuris uiui drach. iiii. olei cyprini her-
minas. iiii. Vfus tempore oportet prius coriandrū aridū usum cyprino exciper-
re, & ex eo coxendicē illinere, atq; post huius usum malagma ipsū imponere.
Post hoc rursus aliud scripsit hoc modo. Aliud eiusdē Malagma, in Ischiadicis
humores ex alto euocat ac transfert, liberatq; à tota affectione. Facit & dissolv-
tis, & tremenibus, & affectionibus inueteratis. Picis liquidæ Brutæ lib. iii. secis
aridæ ustæ lib. ii. nitri rubri sesquilibram, resinæ pini lib. i. ceræ lib. i. staphidis syl-
uestris lib. i. sulphuris uiui lib. i. pyrethri librā dimidiā, cardamomi sextariū i.
picem, ceram, resinā coquito, arida tundito & cribrato, ac cum liquefactis cōmit-
tito, & utitor. Post præscriptum adhuc aliud pharmacum subdidit ita habens.

Aliud eiusdem quo usus est Philocalus. Sinapis, fœni græci moliti, utriusque
sextarium dimidium, pyrethri, staphidis syluestris, nitri rubri, singulorū drach.
iiii. opopanacis drach. ii. galbani drach. ii. resinæ terebinthinæ lib. i. ceræ lib. i.
olei cyprini lib. i. arida cum liquidis committito & utitor.

Ischiadicorum cura à Damocrate conscripta, ex Iberide.

DAmocratis extat libellus Clinicus inscriptus, in quo uersibus Iambicis
quemadmodum solet de tribus disserit medicamentis. Ac primo quidem
eo quod ex herba, quam ipse Iberidem appellat, constat. Secundo ex semine dō-
lores sedante composito. Tertio uero purgatorio, & ab ipso Hiera appellato.
De primo (igū in Ischiadicorum curatione in eo libello hæc scripsit. In Iberide
inquit: medicū quendam amicum suum per hanc herbam curatū esse, quam her-
bam ut dixi, ipse Damocrates Iberidem appellat, ut qui ipse uisu herbam cognov-
rit, nomen autem eius nullum audierit, quum etiā id ipsum ignorarit is qui eum
usum eius docuit. Verum ex signis quæ scribit uidetur Iberidem appellare, quæ
à Græcis lepidium nominatur, à regione in qua amicus eius curatus est appella-
tione ducta. Describit autem ipsius signa per hos Iambos.

Herba hæc ubiq; multaq; frequens nascitur,
Monumenta iuxta antiqua, muros & ueteres,
Tritasq; quondam publice pedibus uias,
Quas iuxta aratrum duxit haud quis agricola,
Semper uirescens, folijs nascitur
Florentibus uere, attramen maioribus.
Caulē cubitalis longitudinis gerit
Paulò minorem aut rursus ampliorem, ab hoc
Acstate pendens folia, donec multa hyems
Sarmentitiam deducat hæc ad imaginem, &

Defecta & exiccata depereant gelu,
 Adnata radici tamen cernes alia.
 Aestate florem fert colore lacteo
 Multum tenuem uariumq; ualde cauliculus.
 Ad quem sequitur semen penitus sic exiguum,
 Visum fere ut fallens, oculos quoq; effugiat.
 Odorem habet radix at inde acerrimum,
 Vero similem quam maxime nasturtio.
 Per hos quidem uersus figuram herbae indicauit. Consequenter autem usum
 Hinc erutam larga satis cape copia (ipsum per huiusmodi
 Aestate, nam tunc optima & fortissima est
 Adhuc recens, siccata fit sed debilisior.
 Tusam hinc probe, (Nami difficulter tunditur)
 Pauca subactamq; excipies axungia,
 Crurique totum & maxime coxendici
 Adhibebis, & ligabis, & fines duas
 Horas multis, uiris sed quatuor.
 Hinc balneo inductos, nec ullo ex unguine,
 Nec smeigmate ullo pinguiore collines,
 Sudore sed modico exillente, in solum
 Merges, iubens perferre, nam mordacitas
 Ingens, caloris sensus atq; exoritur.
 Verum hinc rigatos leniter productos:
 Illati enim quamuis manibus sint plurius,
 Exhibet attramen suis pedibus ualens.
 Quicumq; consilium hoc bonum susceperit.
 Ad multum oleum miscabis hinc uinum modicum,
 Et concuties, & illinis lotos eo.
 Ac innox madore terro & pinguitudine,
 Totum reges crus mollibus tu uelleribus,
 Iubens obire assueta uitae munia,
 Quaecumq; uult, & non grauium suscipit.
 Hoc auxilium certum atque constans integre est,
 Et nullo alio adiungendo ei simul indigum.
 Quare dolore ablato adora radiculam,
 Cuius beneficio tibi sanitas data est.
 Quod si tamen inde affectionis uestigium
 Quoddam super sit, post repetes hoc praesidium,
 Diebus ut multum decem bis praetentis.

Hoc sane utendi modo & inueteratos capitis dolores, & alias omnes quacumque corporis parte inueteratas & agre solubiles affectiones ac resolutiones se curasse ait, & omnino uisita in quibus alij sinapismo appellato, & auxilio ex thapsia confiato utuntur, se per hanc herbam perfunctos dicit. Porro de hac iberide etiam Archigenes scribit in secundo pharmacorum secundum genus, lepidium ipsam appellans. Dicit autem & splenicis & ischiadicis ipsam conuenire:

Ad ischidas & perfrigerationes, Hygieni Hipparchi. Herbam Iberidem quam aliqui lepidium uocant, aut agriocardamum, id est, nasturtium syluestre colligito, & radicem eius tusam ac adipe porcino commollitam emplastrum uice imposito ad dolentem locum ad horas tres, indeq; in balneum mitito. Idem praesidium est ueteres

ueteres capitis dolores depellit, in consimili usu adhibitum, quem Damocrates medicus per uersus prodidit.

De podagricis & arthriticis affectionibus. Cap. III

Dictum antea est in sermone de Ischiade ex fluxionibus generari eiusmodi affectiones, irruentibus in locos iuncturarum, quare etiam curatio ipsarum iuxta eundem sit modum, nimirum ut irruentes fluxiones euacuentur. Influentibus igitur adhuc ipsis, scopum asserendorum auxiliorum communi rationi influentium humorum subijcere oportet, ita ut repellamus ac restringamus. Vbi uero amplius non influant, ut discutiamus tam illos lapsos. Ceterum materia pharmacorum per quae haec sunt multiformis est, quemadmodum etiam in alijs affectionibus, excogitantibus uidelicet à principio prudentioribus uiris iuxta quandam artificialem coniecturam modo hoc, modo aliud, eorumque optima per experientiam sunt iudicata. Quapropter uelut in alijs affectionibus, sic etiam in his, optima ex eis quae priores medici experientia cognouerunt adscribam.

Pharmaca ab Asclepiade ad praedictas affectiones in quarto exteriorum prodita. Quae Marcella inscribit.

Epithema podagricis, Arthriticis sedans dolorem. Vfus est in ipsis uexationibus. Succus papaueris drach. IIII. croci drach. I. cum lacte bubulo aut caprino terito, & adiecto pane interno diligenter leuigato, ut molle cataplasma fiat, & rosaceo admoto mollito, ac uitor leni cataplasmate, forinsecus betae aut lactucae folijs, custodiendi eius gratia, impositis. Quandoque opium & crocum cum lacte trita cerato rosaceo excipimus, & linteolo infarcta imponimus.

Aliud. Stryacis drach. II. opij drach. I. confice ac utere ut dictum est.

Aliud. Confestim à dolore liberat, uerum ante pharmaci impositionem ægrum lauare oportet, & tunc deterfis locis imponere. Succus absinthij pontici, croci, opij, singulorum drach. I. ceræ ponticae drach. IIII. ungenti Irini drach. V. uini cretici quantum sufficit. Opium, absinthium, crocum dissolue, & dissoluta liquidis excipe, & linteolo infarcta impone. Aliud. Seminis cicutæ expressi, drach. VI. croci drach. I. opij drach. I. passii cretici quod satis est. Trita, excipe rosaceo cerato.

Epithema podagricorum arthriticorum, facit ad maximas affectiones. Vfus est eo Erasistratus sicyonius. Radicis capparidis tursæ & cribratae choeniceum unum, feminis hyoscyami choeniceum dimidium, radicis chamaeleonis nigri choeniceis quartam partem, feminis cicutæ choeniceis quartam partem, radicis mandragoræ choeniceum I. radicis solani aut ut alij dorycnij choeniceis quartam partem. Omnia tursæ & cribrata mixta in uasculum figulinum reponito, & probe obturata seruat. Vfus uero tempore choeniceis quartam partem inde accipito, & passo tritam in uas fictile non picatum conijcito, & addita fecis uini aridae quarta heminae parte, ad primas posita diligenter mouendo coquito, donec bis aut ter efferveant, deinde ab igne ablata quam calidissima imposito, aut quomodo perferre ægri possunt. Verum ante huius cataplasmatum usum, pedes multa aqua frigida perfundere oportet, & spongijs detergere, atque ita pharmaci imponere. Supra uero cataplasma linteola tenuissima aceto imbuta imponant, & fascia circumdata ad horas duas pharmacum incumbere sinatur. Postea uero eo ablato excitatas bullas acubus perforare oportet. Ab his enim humor mucosus multus ac glutinosus profluet post cuius excretionem multa aqua frigida pedes proluantur, & rursus pharmacum ut dictum est imponatur, ita tamen ut pro aceto aqua potabili utamur, & ex ea rigatum linteolum pharmaco superindemus.

Aliud eiusdem. Hoc pro cucurbitis & hirundinibus utimur. Nam serosos sanguinis humores exugit, facit & ad rosos ac duritias, ut inde dissoluantur. Fatine

foeni græci sextarium unum. floris lapidis Asij sexta. i. lomenti fabæ nigrae mollis, farinæ lupinorum, utriusque sexta. i. Omnia mixta & aqua calida subacta, calida imponito, & fasciâ constringito. Oportet autem prius affectus locos perfundere, aut etiam in solio lauare. Quum uero fasciâ circumdata madidâ ac cruentâ factâ fuerint, pharvacum tollimus, & totis locis pastillo ex amygdalis amaris utimur, & malagmate quod crocū, iridem, & aristolochiam habet. Hoc ipsum uero inter malagmata ad podagram descripta habetur.

Pastillus podagricis, Arthriticis. Vfus eius est in ipsis irritationibus. Aloes lib. i. succi centaury sexuncem, thuris non secti trientem, myrrhae trientem. floris lapidis Asij sextantem, opij sextantē, succi mandragoræ sextantē, aluminis scissi sextantem. Excipe passo, & fac pastillos. Vsu expetente lacte dissolutos cū peninis illine, & supra illitionem lintecolum passo imbutum impone. Alius pastillus Iupiter appellatus. Aloes drach. xii. opij drach. viii. succi papaueris drach. vi. succi hyoscyami drach. vi. aconiti drach. iiii. hypocisthidis drach. vi. glaucij drach. viii. croci drach. xii. gummi drach. xxiij. malorū mandragoræ drach. xx. aceti heminas duas. Mala cum aceto coquisto, & expressa prædictis ammissecto, & ex dilutis ac probe leuigatis pastillos formato, eosq; in umbra siccato. Vfus ostensus est.

Malagma arthriticis, podagricis, ex cicuta & agarico accommodatum. Seminis cicutæ sextar. i. agarici sextar. i. foeni græci sexta. i. nitri unc. i. ceræ lib. i. resinæ frictæ lib. i. olei ueteris lib. i. medullæ ceruinæ trientem. Illyricæ trientē. Arida tusa per angustissimū cribrū cōcernito, liquecibilia uero eliquato, et frigestieri sinito, et sic crasa aridis cōmittito, et cōtusis ac repositis utitor.

Aliud eiusdem. Ceræ lib. i. olei ueteris aut sabini sexta. i. foeni græci sexta. i. cicutæ sextariū dimidiū. resinæ frictæ lib. i. nitri rubri dodrantem. floris lapidis Asij semissem. medullæ ceruinæ trientē. Illyricæ trientem. Præpara ut dictū est.

Aliud Malagma eiusdē ex tedis, Titi Cæsaris. facit podagricis & arthriticis. Emollit omnem duritiā. Visci quercini sesquialbrā. thuris lib. i. ceræ lib. i. tedarum pinguium lib. i. resinæ pinus lib. i. Liquecibilia coquito ac pinguis tedis moueto. Postquam uero omnis pinguitudo ab ipsis effluerit, ab igne ablatū liquorem excolato, atq; huic thus tenuissime tritum inspergito, assidueq; moueto donec ad compagem manus non inquinantē redigatur, & in mortarium translata reponito ac utitor. Aliud. Tedarū pinguium lib. i. thuris masculi lib. i. resinæ pinus lib. i. uisci quercini libram dimidiā. præpara ut prædictum est.

Malagma ex lapide Asio, podagricis, Arthriticis ualde præclarum. Liberat à tota affectione. Vfus est in cessationibus. Visci quercini, terebinthinæ, utriusq; lib. i. spumæ nitri, floris lapidis Asij, thuris, singulorū librā dimidiā, olei cypri ni lib. i. adipis quantū satis est. Arida tunduntur & cribrantur, ac cum aqua teruntur, ad cerati spissitudinem. Liquecibilia uero eliquantur, & mitis adijciuntur, quibus simul conquassatis ac repositis utimur.

Aliud. Visci lib. i. terebinthinæ lib. i. lapidis Asij, nitri, utriusq; trientem, manne quadrantē. cyprini sextantem. aquæ lixiij figulini quod satis est. Aliud, ad Arthriticos ualde præclarū, auxiliatur cōfestum, humores in alto absorbens. uisci lib. i. terebinthinæ lib. i. adipis taurini, floris lapidis Asij, utriusq; quadrantē calcis uiuæ quadrantem. manne quadrantē. cyprini lib. i. præpara ut dictū est.

Aliud Diodori. Adipis taurini drach. viii. spumæ nitri drach. iiii. floris lapidis Asij drach. ii. In alio exemplari drach. iiii. olei cyathos ii. arida cum liquidis committito. Hoc pharvacum ualde cōmodum est. Resorbet etiam collectiones circa articulos consistentes, & à doloribus liberat.



IANI CORNARIII ME DICI PHYSICI COMMENTARIORVM

MEDICORVM IN DECEM LIBROS GALENI DE COMPO-
sitione medicamentorum secundum locos conscriptorum, Libri decem.
In quibus omnes corrupti illorum librorum loci restituuntur, & omnes diffi-
ciles exponuntur, ampliusq; aliquot milia rerum ac locorum in Græcis ac
Latinis medicis obiter explicantur, emendantur, ac restituuntur.



BASILEAE ANNO M. D. XXXVII.

IANI CORNALLI ME

DICI PHYSICI CORNALLI VARIORUM

MEDICORUM IN DICI PHYSICI CORNALLI VARIORUM

EDITIONE MEDICORUM IN DICI PHYSICI CORNALLI VARIORUM

EDITIONE MEDICORUM IN DICI PHYSICI CORNALLI VARIORUM

EDITIONE MEDICORUM IN DICI PHYSICI CORNALLI VARIORUM



1820



EDITIONE MEDICORUM IN DICI PHYSICI CORNALLI VARIORUM

ILLVSTRIS AC POTENTIS PRIN

CIPIS AC DOMINO, D. PHILIPPO HESSORVM LANT

graui, Cantorum, Dicensium ac Nidensi principi ac comiti, &c.

Ianus Cornarius Medicus Physicus.

S. D.



QVVM primum Galeni medici haud dubie omnium post unicum Hippocratē praestantissimi libros decē quos de cōpositione medicamentorum localium inscripsit, in manus cōuertendi latinis gratia sumerē, uidebatur quidem mox à ptincipio opus magnū, uariū, plenum bonae frugis, & ut ipse Galenus aliquoties ait, postremae lectionis, & ob id etiam maioris quā prima fronte apparet difficultatis. Verū in operis iam inchoati progressu, quū alia omnia, tū in primis difficultas ita mihi increbescere uisa est, ut omnē etiam optime conuersi operis gratiā leuem apud terū medicarū studiosos futurā putarē, si non & difficiles locos, quantumuis clare à me redditos explicarē & uiciatos emendarem, corruptosq; restituerem, atq; hoc non simpliciter, sed indicata consilij ac facti mei ratione. quod ipsum ubi iam etiam operae premium esse mihi persuasissem, rettexit tamen operis futuri apud me aestimata magnitudo, ut pluriū dierū deliberationē mihi ipsi impetatem, quando sanē pro una conuertendi difficultate, non geminatā solum mihi ex conuerso pariter ac græco opere interpretando oborituram perspicerem, sed certe non minus quā decuplam, si tot loci obscuri, tot partim annorū, partim typographorum iniuria, aut potius correctioni praefectorū negligentia & aliquando temeritate corrupti, explicandi & ad plenū restituendi essent. Hoc em̄ in cōfesso est, quū omnia Galeni scripta nobis extēt corruptissīma hos libros nullis minus hac mendarū labe cōtaminatos esse. Ad hanc itaq; rem integre praestandā uidebā mihi in primis opus esse emendationibus exemplaribus, ex quorū collatione non desperabā auxilium uel certissimū nobis accessurū, & propterea collationis laborē, ut longe leniorē libentius omnino pertulissemus, quā quod alicubi omni exemplariū ope destituti, mera diuinatione uti coacti fuimus; cuius difficultatē uel inde aestimare licet, quod à diuis tanquā supra hominū captum sit, appellationē est sortita. Quare in paucissimis omnino hac usi, maiotē confidentiam in optimis quibusq; tū græcis, tū latinis medicis autoribus locauimus, atq; ex ipsorū collatione plerosq; omnes locos & conuertimus, & exposuimus, simul in integrum ex eorūndē fide restitutos. Cuius rei difficultas ab his tantū expendi potest, qui aliquando simile quid attentauerunt. Nos certe ut nō libenter iactamus operā nostrā, tum ne uanitatis suspicionē incurramus, tū ut ne beneficium nostrū studiosis exprobare uideāmur, Ita sane uisum fuit nullum ex omnibus Galeni operibus maiore periculo corruptum haberi ac legi, q̄ hoc ipsum de pharimacorū cōpositione, praesertim si his pharmacis tuto ac feliciter uti uelimus. quod ut ego mihi faciendum esse penitus decreui, circa ægros qui se in posterū nostrae curae contredent, Sic uelim etiā reliquos nē

ræ ueteris ac sinceræ medicinae græcæ studiosos à me persuasos, ut idẽ præ
 stare conarent; quo aliquando & uitiolissimis & ineptiss. pariterq; lectu re
 diolissimis Arabũ ac Barbarorũ medicorũ scriptis relictis, aut ad cotuos re
 legatis; ex græcorũ medicorũ exactissime cõscriptis medicamẽtis, circa æ
 gros adhibendis, certiorẽ salutis successum experimento ipso cognoscere
 tentarent, certissime cognituri unũ aliquod medicamentũ ex eorũ numero
 quæ Galenus ex priorũ medicorũ præscripto expendit, ita ut singulorum
 ipsum constituentũ uires ac facultates rimetur, maiori successu usurpari q;
 totã myropoliorũ hodiernorũ congeriẽ, de quorũ tamẽ efficacia uel in pri
 mis iudiciũ ex his Galeni libris cõtingere potest. Et propterea ego iam in
 quartũ supra decimũ annum per multo maximã Europæ partẽ peregrina
 tus, medicinamq; professus, atq; in præclaris multis urbibus medicatus, &
 non pauca etiã ex laudatis. hodie officinarũ pharmacis frustra expertas,
 non duxi aliquid utilius me facere posse, quã ut rerũ medicatũ studiosos
 hac parte iuarem, quo hos Galeni libros integre, tum græce, tum latine
 haberent. quod spero doctos medicos de horũ nostrorũ cõmentariorũ li
 bris pronunciaturus, ut qui id ipsum si nõ exactissime, & ut cuiusq; iudicio
 satisfiat (quis enim hoc se præstiturũ sperare audeat?) certe tamen diligen
 tissime conati sunt, ut tam eximĩũ opus integrũ extet, neq; id solũ, sed ut ali
 quot milia locorũ obscurorũ, itemq; corruptorum, tum in græcorũ, tum in
 latinorum medicorum libris quisq; intelligere ac emendare possit, quum
 non sit peior possessio, quã malus & corruptus liber, ex quo & animorũ
 & corporũ perniciẽs accidere potest. Hoc ipsum porro opus quũ iam inual
 gare destinassem & orbi communicare, non aliud nomen occurrebat mihi
 quod splendidius ac potentius uideret, siue nostra obscuritas esset illustran
 da, siue tenuitas defendenda ac protegenda, quã celsitudinis tuæ illustra
 tione princeps PHILIPPE. Nã quũ & pacis & belli gloria clariss. sis, fore
 confido ut hi cõmentariorum nostrorũ libri sub nominis tui præsidio pub
 licati, & rerũ medicarũ studiosos magis inuitent, & uiligatores amplius de
 terreãt à tam utili ut ego iudico, conatu nostro imperẽdõ. Quancquã quod
 hoc opus felici nominis tui auspicio prodire uoluerim, præter iam dictas ra
 tiones, & cõpnem illum ab antiquo iam receptũ morem, quẽ & græci & la
 tini scriptores usurpant, sua uidelicet scripta magnis regibus ac principi
 bus inscribendi, illa planẽ Heroica magnificẽtia tua me induxit ac impulit,
 quod unus tu omnĩũ Germaniæ principũ, in his difficilissimis tẽporibus, qui
 bus literæ & omnia bona studia ruinã grauissimã minabantur, his ipsis au
 xiliarem manum porrigere es dignatus, & quũ reliquæ Germaniæ Acade
 miæ frigeant ac torpeãt penitus, & magna ex parte sint desolata; partim fa
 tis ita uoluentibus, partim ob principũ illiberalitatẽ, Tu in regno tuo de in
 tegro nouam Academiã erexisti, eandemq; doctissimis uiris accersitis illu
 strasti, & sumptibus ac præmijs magnificẽtissime locupletasti. Quo bene
 ficio

ficio tuo ne dubites magnanime princeps, quin ipsas musas tibi obstrinxeris, certè studiosos omnes ita deuinxisti, ut temere literas uel philosophiæ studiū iactet, qui non cels. Tuæ clementem magnificentiā exosculetur, miretur ac laudibus uehat, atq; utinam ego uel leuiter saltem declarare C. T. possem, quàm sim erga Heroicū illud pectus tuum affectus, pro eo quod studiosi nomen obtinere me posse cōfido; Illud autē oro celsitudinem tuā ut interim dum luculentius quiddam aliquando præstare potuero, hinc aliquid saltem animi grati significationem intelligere uelit. Cæterū quod studiosorum iudicijs informandis adijciendum putauimus, hoc est, Ne putet nobis in his cōmentarijs quicquam cōmune esse cum quorundā huius seculi Onomasticis medicis, Pandectis medicis, thesauris medicis, scholijs etiā atq; epistolis medicis, alijsq; eiusmodi cētonibus, speciosis titulis inscriptis. His em̄ permittimus ut undecūq; & alba & nigra, numeroq; modoq; sine omni, tum lecta, tū audita, intellectaq; & non intellecta, omnia in unū chaos coaceruent ac confundant, iamq; nihili homines, sui tamen q̄ similis mos ad astra laudibus uehant, & mox non paulò præstantiores mordicus proscindant, & quod in alijs reprehendunt in sese longe grauius admittāt. Concedimus etiā ut scripta nostra hinc inde expilent, ex integris orationū ac præfationū nostrarum periodis, sibi præliminares epistolas concinnent, & si adeo placet, totum filū retextū sibi pro nouo symmate induāt, interim mei nusquā mentionē facientes: neq; enim sic legi laboro: modo sciant studiosi ueræ & synceræ ueteris medicinæ, talia onomastica nihil aliud quàm inanes bullas, & nomenclaturas maxima parte falsas esse, tales pandectas per antiphrasin accipiēdas esse, scholia & epistolas uere ociosas nugas esse, & quales podagricū molestū uidelicet oculū decent. Thesauros carbonēs, aut potius carbonū esse fauillas. Nobis cōtra in his cōmentarijs nihil uulgarē ac protritū annotare uisum fuit, sed obscurissimos quosq; locos tū horū librorū quos enarrandos suscepimus, tū etiā reliquorū græcorū ac latinorum scriptorū medicorū, aliquando etiā aliorū per occasionē oblatos, pro uiribus explicare annisi sumus. ideoq; omnia ut certa, aut ex ualidissima suspicionē pro certis agnita proposuimus, moxq; nō uulgariū quorumlibet, sed ueterū approbatorū autorū testimonijs & autoritate confirmauimus, aut certe opinionē nostrā firmissimis rationibus, aut omnino probabilibus persuasionibus approbauimus, ut certū sit nō leuē cognitionē, & in primis iudicandī de rebus medicis nīm hinc ad omnes, & præsertim eos qui postea græcos medicos, aut legendos, aut conuertendos in manus sument, profecturā, & ad illustris. Celsitud. tuam pro hoc beneficio non exiguā gratiā, quando neq; per meū sinistrū studiū, neq; per nominis C. T. usurpationē & prætextum, cuiquam fucus fiat. Viuat ac ualeat Illustris. Celsitudo tua.

Northusæ x. Martij. Anno Christi. M. D. XXXV.

IANI CORNARII MEDICI PHYSICI

COMMENTARIORVM MEDICORVM IN DECem libros Galeni de cōpositione medicamentorū secundum locos conscriptorū, Liber Primus.



ALENI præstantiss. medicī de cōpositione medicamentorum secundum locos libros, quos in Latinam linguā nuper conuertī, ea potissimū gratia cōmentarijs enarrare ac dilucidare operæpretiū duxi, ut interpretationi nostræ maior fides apud te, quisquis tandem es ueræ ueteris medicīnæ studiosus, habeat. neq; etiā dissimulare uolo, paucissima esse, & ferè nulla medica opera, quæ superiori ante nos seculo, atq; etiā hoc nostro, ex græcis latina facta sunt, quibus

per omnia tuto credere possis, adeo hinc inde quædam in ipsis reperire est, quæ uel ob difficultatem, uel ob interpretū supinitatē, atq; aliquando rei medicæ ignorantia, quandoq; etiā: quod negare nō possumus, & quæ unica est excusandi uia: ob uitata per ætatē exemplaria, perperā sunt reddita, ut præstaret ea in totū non esse, aut saltem nos cōmonitos ea uitare, aut certe caute uersare, atq; si ea ferulic felicitas esset, à græcis, ab ipsis uidelicet fontibus petere. Cuius rei ex his quæ Hippocratis & Galeni nomine latina cōtuleruntur, doctissimū quemq; medicū iudicem esse cupio. Omnia enim istorum scripta quæ latina habemus ubiq; pessime uersa sunt, tribus aut quatuor ad summū libellis exceptis, qui utique tolerari possunt, minime uero eam laudem merentur, quam pleriq; magni nominis uiri: quæ fucata omniū est impostura: epistolis præfixis sunt testati. De Dioscoride porro silere melius puto, cū nunquā magis bonū interpretē desiderarēt. Ammiratus uero semper sum mecū, quid tandem Ruellii moraretur, quod laudem quā in Dioscoride uertendo primus occupauit, eundem sub incudem reuocando, solidam sibi parare non satagat. At uero si præter hos quædam adhuc ex alijs græcis medicis latina leguntur, ea talia sunt ut ne nominari quidē primorum autorū suorum nominibus debeant, quā adeo nihil illorū nobis referant, & latina etiā non nisi characterū ipsarum literarum latinarum beneficio existant, atq; hæc sanè nulla calumniā refero, rem ipsam testem, & doctos medicos statuo, qui sciunt quā hæc nō singam. Quare ex re & necessarium omnino fore mihi uisum est, ut cōmentarijs adiecit translationem nostram declararem, atq; id ita facerem, ut & uerba, & sententia, atque ipsa etiā constructio, non nostra solum, sed & græca ipsius autoris *διὰ τὴν ἰσχυρίαν* ubi opus fuerit adducta, dilucida fiant. hæc enim tria Hermogenes in bono expositore requirit. Neq; uero prætermittamus, si quando res ita tulerit, etiā alios quosdam aliorū græcorum ac latinorum medicorum locos obiter explanare, atq; id uestri cōmodi gratia, qui cūq; ueterem ac sinceram medicinam: græcā putat amatis, reliquos nihil moror, neq; adeo spero aut uolo lectores, qui nondū Chaoniā pingui glandem mutauerunt arista. Verū hoc unū uos lecturos præmoneo, ex omnibus Galeni scriptis hos decē libros longe difficilimos esse, & postremæ omnino lectionis, & præter ceteros necessario prælectos habere oportet ejusdem undecim de simplicibus pharmaciis libros, & XIII. de curandi Methodo: quod si quis non fecerit, frustra ad horum librorum lectionem progredietur, quos iam inde ipsis Galeni uerbis enarrationem expetentibus, iuxta nostram interpretationē semper productis & præpositis, enarrare aggrediar.

Quod non solum affectus qui curatur curationem ipsam indicet, &c.) Quod
tam

iam dixi Methodi lectionem necessariam esse ad horum librorum lectionē progressuro, id ipsum mox in ipsa præfatione Galenus palam facit, ostendens quæ in ipsa tradiderit de indicationibus curationis, atq; his potissimis tribus. Prima enim omnium futuræ curationis indicatio ab ipso affectu, qui curandus est sumitur, Altera ab ægri temperamento, tertia ab ipsius partis affectæ natura. secundum hæc enim remedia ad morbi curationem adhibemus, quanquā sint & alia non pauca quæ remediorum adhibendorum indicationem faciant, sed non ita principaliter ut iam dicta, ueluti quæ quarto loco ab ipso Galeno recensentur, Aegri uires, & quinto Aer nos ambiens, sexto Anni tempus, septimo Regio, Octauo ætas, Nono uitæ munus, decimo consuetudo, undecimo morbi magnitudo, duodecimo affectæ partis positus, forma, utilitas & sensus subtilitas. Tertiodecimo humores sanandi; quæ omnia totam illorum librorum tractationem occupant. commemorat tamen harum indicationum partim etiam Cornelius Celsus lib. 5. cap. XXVI. & Hippoc. 1. epidemiorum, sectione tertia.

Nunc uero quomodo quis per se.]. propositio est totius futuri operis;

Ex Methodi ratione pharmacorum compositiones præparet.]. Ex Methodi ratione componimus pharmaca, quum non à magistro quopiam, nec ex ueterū præscriptis, edocti id facimus, sed ex ipsa rerum natura indicationibus acceptis sic Galenus lib. 6. Methodi tradente, ταύτη καὶ τέληα πάλαι φάρμακα πρὸς τῶν νοσούντων ἐξέτιον, ὅτε τῶν διασκευῶν πινὰ διασκεύαζοντο χρεώμενοι, ὅτε ἀναγνὼς τις γινώσκων κατὰ τὴν διασκεύην τὴν συγγραμμὰ τῶν προειρημένων, ἢ τῶν δὴ τὴν αὐτὴν χραιομένην ἀπὸ τῶν δυνάμεων ἐξ ἰδίας σοφίας, ἀλλ' ἐξ αὐτῆς τῆς τῶν πραγμάτων φύσεως ἐνδιακρινὺς ὁρμῆς, ὅπως ἐστὶν ἰδίῳ ἰατρῷ μεθόδῳ χραιομένη. Ex quibus uerbis manifestum sit quosdam ueterum ex propria sapientia compositiones à se præparatas δυνάμεις, id est, facultates seu potentias appellasse, atq; ita etiam eas appellare solet Galenus in septem libris quos de compositione pharmacorum secundum genera inscripsit, quorum hic mentionem facit. At uero quum ambigua apud nos significatio esset, si facultates uel potentias uertissem, simpliciter hoc loco δυνάμεις compositiones uerti, quando nihil aliud ea uoce Galenus uelit, & uideatur etiam eos qui primi ita appellarent subridere, nimirum quum ex propria sapientia ipsos hanc inscriptionem cōmentos esse tradat, & quanquā nihilo minus Galenus δυνάμεις subinde etiam in his libris uocet, nos tamen semper compositionis aut confectionis uocem pro ipsis amplexi sumus. putamus enim significantius dici, pro τῶν φάρμακων δυνάμει, tetrapharmacam compositionem, quam uim aut facultatem, ita tamen ut efficax compositio & probata accipiatur.

Pilosum esse iuxta primam rationem non multis inest.]. Duplex generatio pilorum est, Altera iuxta primam rationem, id est, secundum prouidentiam & arbitrium ipsius opificis, quomodo nobis mox pueris & recens natis, capitis, superciliorum, & palpebrarum pili producuntur, aptitudine quadam corporum ut tales, uel tales, gignerentur, prius per opificem deum præparata, uelut Galenus lib. 11. de utilitate partium tradit, ubi irrita etiam Moysi ac Iudæorum physiologia, qui uerbo & uoluntate dei omnia creata perhibent, per longum cauillatur, non sufficere deo uoluntatem, nisi adsit rei aptitudo. Altera uero per accidens cōgignit, & ex locorum natura ac temperamento necessario cōsequitur, quomodo menti, alarum, & pudendorū pili proueniunt. Qua similitudine etiam ex terra quædam secundum primā rationē, hoc est, uoluntate & arbitrio agricolæ generantur, sicut sunt tritūcum, hordeum, & reliqua cerealium semina. Quædam uero per accidens, id est, innutritum locis humorem necessario excreant, uelut herba quæ circa humectiores regiones enascuntur, quemadmo-

dum diffuse lib. 2. De temperamentis Galenus docet, si quis amplius de hac re cognouisse uelit.

Alijs uero herbis quæ iuxta humidiores regiones proueniunt. Græcū exemplar non *ἐν τῇ ὑγρῇ*, id est iuxta humidiores, sed *ἐν τῇ ἀνωτέρῃ*, id est, iuxta superiores habet, quomodo etiam uetus interpres legit, sed confessā menda est, quando sanè per ipsius humoris accidens ipse Galenus paulò post earū generationem a natura fieri tradit, quanquam id clarius ex XI. lib. de utilitate partium patet, ubi ait, *ὡς καὶ ἐν τῇ ἀνωτέρῃ* inquit id *ἀνωτέρῃ*.

Et pilī quidem palpebrarum ac superciliorum nō paruam utilitatem. Quæ sit pilorum in palpebris ac supercilijs utilitas supra citato XI. de utilitate partium libri loco Galenus commemorat. Nempe quod palpebrarum pilī uelut uallum quoddam oculis apertis obiecti sunt, ne quid minorum corpusculorum eis illabatur. Superciliorum uero pilī uelut murus quidam eosdem oculos protegunt, ac primū excipiunt ea quæ ex capite defluunt. Quare æquali semper magnitudine eos opifex deus produxit, & quanto sanè quis minores aut rariore quàm conuenit eos reddat, tanto plus utilitatem ipsorum corruperit, ita ut tum illabi, tum influere permittant, quæ prius prohibebant. Si uero maiores aut densiores quis eos efficiat, non iam ut uallum & murus oculos defendent, sed propugnaculum carceri non absimile reddetur, quod & occulet, & tenebras obfundet pupillis, quibus minime omnium tenebras obducere oportuit. Porro capitis & menti pilos ipse opifex deus auctiles fecit, atque id ob duplicem utilitatem. Alteram ut tegmen & uelamen partium essent. Alteram ut crassiora recrementa in ipsos expenderentur. Prior utilitas uariat, quum non æquali tegumento per omnes ætates, anni tempora, regiones, sexus, ac corporis dispositiones opus habeamus. quare pro alterationis occasione, præstat nos alias aliam eorundem pilorum magnitudinem facere, quod in superciliorum & palpebrarum pilis citra cladem: ut dixi: facere non licet. At uero pudendorum pilī quam necessariam ex locorum natura humecta generationem habeant, tamen etiam his opifex ad decorem uirtur: Nam uelant & ornant eas ipsas pudendorum partes in quibus enascuntur, uelut nates podicem, & præputiū uirile membrum. ex his itaque omnibus ordo dignitatis pilorum patet, nempe primum locum pilis palpebrarum & superciliorū deferri, Secundum capitis pilis, tertium menti & pudendorum.

Coloris ipsorū alteratio, uelut in uittigine alba, leuce græcis appellata, &c. Vitiligo alba Latinis, Leuce Græcis, nomen ab albo colore accipit. Quum enim in pilosis locis oboritur, pilo locos ipsos non denudat, sed canos omnino facit. Si uero loci pilosi, glabri & pilis nudi reddantur, incurabilis leuce censetur, ut tradit Aetius; quem nos nuper in Latinam linguam conuertimus, sermone XIII. cap. CXXXIII.

In Caput primum, de Alopecia & Ophiasis.

NOS autem propter quid sic appellari contigit non quærimus. His uerbis Galenus non damnat studiosam nominū inquisitionem, quā ferè semper nomina ipsa ea curiositate primum sint rebus imposita, ut ipsas sua uoce cognoscibiles reddant, quod sparsim Galenus etiam in scriptis suis testatur. Verum uituperat eos qui nominū studio rem ipsam & causam negligunt, quæ imprimis & necessario a medico sunt inuestiganda, quā nō nominū sed affectuū ac morborum ratio fiat. Attamen quā docēdi gratia necessario ipsis nominibus utamur, hic admonere uisum est, utrunque hoc malum Latinis Arearum appellatione uentū, & Alopecia latius proserpere, ophiasin uero ab occipitio incipere, duorum digitorum

digitorum latitudinem non excedere, ad utranq; aurē duobus capitibus proferre, donec se duo capita in priorem partē cōmittant, id quod in infanibus frequenter uidere est, autore Celso lib. 6. cap. 4. Male intelligunt Galenum & medicos Græcos, qui putant mutationem pilorum in uulpe ad fuluiorem colorem, Alopeciaz humanæ assimilari, quum nō solum fuluior & pallidior aliquando color cutis in homine ex ea affecto appareat, ex redundante flaua uel pallida bile, sed etiam albidior, ex pituita, & nigrior, ex bile atra. Sed hic error plerisque ex nō minū studio, & rei negligentia occupauit: Non enim pilī in aliū colorē transeunt, sed cutis ipsa pilis denudata, quo malo etiā uulpes certo anni tēpore infestatur.

Ego semper per hieram purgaui.] Notissimum est medicamentum uel hodie pharmacopolijs hiera, quanquam uariæ in Antidotarijs uulgatis sint descriptiones, & aliquæ etiam corruptæ, ut attentum medicum requirāt, qui eis tuto & scilicet uti uelit. Quæ ferē ubique præparatur, tum in eclegmatis forma, tum in pilularum globulos coacta, atq; etiam medicamenti simplicibus eā constituentibus in puluerem contritis, & in usum sepositis, Hierā magna & composita uulgo appellatur, ad alterius quæ simplex dicitur differentiam. Verum neutra earum cū hac hiera ex colocynthide concordat, sed cū hiera ex aloë, quæ priuatiuē picra appellatur, quæ in 2. huius operis habetur. Hæc autem ex colocynthide eadem uidetur cum ea quæ hiera fortissima Galeni inscribitur, sed sunt in his omnibus quædam simplicia addita, ut genuinæ Galeni descriptiones uulgo non extrent. Paulus Aegineta lib. 7. Hieræ componendæ formas sex numero tradit, Earum postrema Archigenis est ex colocynthide constans, quam hic Galenus probat. Apud Scribonium Largum compositio cap. 6. eadem penitus est, Pachij Antiochi nomine inscripta, nisi quod in Paulo pro *φύλαξ*, *πυλῆς* corrupte legitur, & in præparatione *ἀναβέλασσα μέλιτι* habetur, pro quo *ἀναβέλασσα μέλιτι*, id est, melle exceptam substituendum est. Porro prima hiera apud Paulum iudem sicut illa apud Scribonium Antiocho inscribitur, neq; ab Archigenis descriptione uariat, nisi quod *πρῶσιον* non habet.

Apophlegmatismis pituitam à capite detrahere.] Apophlegmatismi appellantur medicamenta quæ uel ore colluta, uel commanducata pituitam à capite detrahunt per sputum reiiciendam. Tale Dioscorides Pyrethrum aceto coctum collutum, aut crudum mansum esse perhibet. Illinuntur etiam quædam in eundem usum palato & columellæ. Tale est Sapo cum betæ succo apud Paulum libro primo cap. 46. ut rectissime Copus interpretes legit ac uertit, quamq; Græcū exēplar uulgatū *σάπων* p. sapone habeat, qd falsum esse ex 2. li. huius tractationis claret, ubi inter apophlegmatismos hæc Pauli uerba legunt, ab ipso ex Galeno transcripta. Tale est & Melantiū eodem Pauli loco. uerū Copus uitio utputo exemplaris qd secutus est, deceptus est, uelut ex eodē Galeni loco infra passim fit. In Pauli enim exēplari excuso itemq; Galeni codice legitur, *ὑποπρίον & πλάκας ἑγχεσάμεν ἐγγιστάτω τῇ ῥινὶ μελανδίῳ.* pro *ὑποπρίον* autē Copus Euphorbiā uertit, & sententiam penitus corruptit. Non longe ab hoc usu euariāt quæ *ἑρῖνα* & uulgo medicorum Nasalla appellantur, quæ in oblongam formam coacta naribus indita, aut liquida illita, aut etiam per instrumentum quod *ῥινὴ γόστῳ* uocant, infusa, sternutamenta ciunt, atq; ita mucū à cerebro prolestant. Talis est anagallidis utriusq; fremij, betæ, cucumeris syluestris foliorum succus.

Deinde localibus auxilijs uti.] Localia auxilia sunt quæ singulis partibus corporis destinata apte adhibentur. has enim *τόπαι*, id est, locos appellare consueuit, uelut ex principio librorum de locis affectis patet, & infra cap. 2. ubi ait, *ἅρτα τοῖς τοῖς μέρεσιν ὅτις τὸ τοῖς καὶ μερὶ καὶ τοῖς τοῖς.*

Oportet enim uelut in alijs, sic etiam in his affectioni mederi.] Galenus lib. 2.

Meth. per longū multis exemplis productis docet, affectus præter naturā tantū à nobis curari, nō symptomata siue accessiones quæ actionē laedunt. Nemo em̃ sanæ mentis medicus claudicationi medet̃, sed affectioni quæ claudicationē induxit, ueluti si ea sit inflāmatiō, ei medemur, quo fomētis et discussorijs medicamentis consumatur, ac omni modo soluitur. Ea em̃ soluta sponte sequitur ambulatio recta, neq; opus habemus eius correctione. Ita etiā hic, Nemo uitiatī capillī symptomatis curā molitur, sed humorū capillos corrumpentiū, qui ubi euacuati & correcti fuerint, symptoma uitiatī capillī consequenter ultro cessat.

Habent autē Catapotia hæc.] Eodem modo etiā Paulus lib. 7. cap. 5. horū catapotiorum descriptionē habet, nisi quod ἀλλήλῃς μ. α. legitur, quū μ. α. legi debeant, facili lapsu ob similitudinē numeri characterū, maxime si β. hoc modo. α. pingatur. Quintus autē excellens ante Galenum medicus: Nam eius discipulos Satyrum & Numisianū, Galenus se audisse & præceptores habuisse primo ἀπὸ τῶν σὺν ἡγεμονίᾳ testatur: & mastichen & bdellium deicere solitus fuit, quē in hoc etiam aliquandiu sequutus fuit Galenus. sed quur postea reiecerit ea, se in libris de cōpositiōe purgantiū pharmacorū reservaturū dicit, qui libri ad manus nostras nō peruenerūt. Porro Catapotia Græcis à deglutiendo nomen habent, sicut Latinis ab orbiculi facie pilulæ diminutiuā à pila forma dicuntur.

Difficulus enim eluuntur in his cuti impacti serosi humores.] Serosos humores Græci ὑδαρὲς uocant. Sunt autē omniū humorum & præcipue sanguinis tenues & acres superfuitares, quæ ob id quod tenuiū partium sunt, in profundum corporum in quæ impingūt, penetrant, & uelut aqua in spongia imbibuntur, ut Aetius sermone 9. cap. 10. tradit. Quod uero omniū sint humorū serosi humores Diocles apud Paulum lib. 1. cap. 100. indicat, qui sub æquinoctiū uernum ἀναίῃς ὑδαρὲς ἔειπεν, augescere inquit, & circa uergiliarum ortum αὐτὸς πάλιν ὑδαρὲς Nimirū augescere tum amara bilē. Aristoteles uero lib. hystoriæ animalīū tertio non tenues & acres solum, sed etiā crudos & nondum concoctos, aut etiā per segregationē à reliquis, serosos redditos humores, & præcipue sanguinē, ὑδαρὲς esse dicit. ὑδαρὲς δ' αὖτε inquit ἀπὸ τῶν αἵματι τῶν μὴ πρὸς τὴν ἀπορροήν, τὸ ἀπορροῦν. Sic & Galenus de elementis 1. τὸ πρὸς αἶμα ὑδαρὲς αἵματι, inquit, ἀπορροῦν, ὅτι τὸ γὰρ αἷμα. Quare quū uelut serū in lacte, ita hi humores in reliquis sint corporis humoribus omnibus ac succis, recte eos serosos latine appellauerimus, quū ὑδαρὲς iuxta eundē Aristotelem eodem loco in omni lacte sit, & alias ὑδαρὲς dicatur, quod propterea indicare uolui, ut sciāt si qui hæc legerint, nos id semper obseruasse in his quæ ex Græcis uertimus, ut ὑδαρὲς serosos humores dixerimus. Neq; enim nobis placet quod ferē om̃es eam uocem, per sanctem latinis reddiderunt, ex Plinio: ut apparet, ut id facerent inducti, qui aliquot locis ὑδαρὲς sanie appellauit, id quod alias cruorem latine dicere posses, sic libro 22. cap. 11. Quidā inassati io cineris sanie inungūt dixit, quū tamen paulo ante sanguinē hircinū appellasset. & 30. cap. 8. uerendorū fornicationibus uerrucisq; medetur arsetini pulmonis inassati sanies. Itaq; ambobus locis cruorē quē ex iocinere dum assatur destillat, sanie appellat, quod ex uerbis eius colligitur, quæ sequuntur, his. Volunt & oculos suffiri iocinere in olla decocto, quidā inassato, etiam si hoc nō Dioscorides lib. 2. item traderet. Cor. Celsus lib. 6. cap. 6. ὑδαρὲς hunc, sanguinē dixit, eundē eius usum quē Plinius & Dioscorides præscribens. At uero li. 30. cap. 15. idem Plinius ubi inquit: Oportet autē cineri misceri saniem punctis emissam ē cerebro uiperæ, sanie pro crudo cruore dixit, quomodo etiā ego apud Aetium ser. 8. cap. 10. πολλὰ μὲν γὰρ χυμῶν τῶν ὑδαρὲς, cochlearū magnarū terrestrium cruorem ueri, nisi mucum appellare quis malit. Nam ipse Aetius consequenter declarat, eum ipsum accipi debere his uerbis, αἵμα δὲ τῶν ὑδαρὲς χυμῶν τῶν χυμῶν, καὶ τὸ ἀπορροῦν αὐτῶν μυστῶν ἀπορροῦν τὸ φαρμάκον

φαρμάκῳ. Atq; hoc modo etiam Homerus sanguinis cruorem à Venere fauciatā
promanantem ἰχῶρα dixit Iliad. 5. *ῥῆι δ' ἄμβροτον αἷμα διῶο*

*ἰχῶρ, αἷος πῦρ τε ριζὴ μακάρων θιόων,
ὅν γὰρ σῆμα ἰδύσθ' ὁ κέρυδ' ἀέθουα ἄνωγ
τῶν κ' ἀναιμόνιος εἶσι, καὶ ἀθάνατοι βαλύνονται.* hoc est

Sanguinis effudit coelestem diuā cruorem,
Qualis diuorum compingit corpora sanguis,
Qui neq; frumento satiant nec corpora uino,
Quare etiam exangues, immortalesq; uocantur.

Ex quibus uerbis palam est nihil aliud quam cruorē simpliciter ἰχῶρα eū ap-
pellare, nō tamen eiusmodi qualis ab hominibus faucijs profundi solet, sed qua-
lis à dijs qui neq; edunt neq; bibunt, profluere potest. Nam hæc addidisse uideſ,
ne Veneris numen offenderet, si uel ut hominē aliquem fauciatā dixisset. Quare
ἰχῶρα dum intra ualā & in corpore sunt, serosi humores, iuxta feri seu ἰχῶρ in
lacie similitudinem, sano omnino intellectu dicuntur, Quā uero a credine sua &
tenuitate sub cutem progressi fuerint, eamq; excitato pruritu (: Nam & ficosos
faciei, & impetiginosos menti tumores, qui cito exulcerantur, hi ipsi maxime ge-
nerare solent, ut Galen. infra lib. 5. cap. 4. & 5. Et Aetius sermo. 8. cap. 14. & 16. tra-
dunt;) crosierint, non male sanies appellentur, quando sanē tum in puris speciem
tenuiorem abeunt, ac medium quiddam inter pus perfectum & sanguinem eua-
dunt, quam speciem etiā induunt, quando ex hircino aut arietino foetore, dum
in olla affatur promanant, ut non ita male Plinius sanies tum sint dictæ, quum ue-
rum id sit sanies significatum. & ita quoq; in ulceribus ἰχῶρας appellat Galenus
Metho. 3. καὶ δὲ inquit, πῶς τοῖς ἰλασίην ἰχῶρ μὲν καλεῖται τὸ λεπτὸν πρὶν ἤμαρ, ῥῆι δ'
δὲ ἰλαρὸς τὸ παχὺ, hoc est. Et sanē in ipsis ulceribus tenuē recrementum sanies ap-
pellat, crassum uero sordes. porro ἰχῶρ appellat etiā in lignis ardentibus exudans
humor, sic Diosc. lib. 1. de Cornu. ὁ δ' ἴσθ' ἡλκυὸν φύλων λευκομάρι ἰχῶρ ἡρμῶνα πρὸς λε-
χίνας καὶ παχέριον. Plinius sudorem dixit 21. cap. 8. Sudor uirgæ corni arboris
lamina ferrea candente exceptus, non cōtingent ligno, illitæq; inde ferrugo inci-
pientes Lichenas sanat. Idem auxiliū quod Diosc. tradidit, sed religiosius, & ex
alio autore descriptum, quāquā pro φύλων omnino φύλων apud Dioscoridem
legendum existimem. At uero & amurcā, oliuæ Plinius saniem esse dixit, lib. 15.
cap. 3. Sanies hæc est eius amara.

Supra hoc quod uitiatos humores discutiat. Aptissima medicamēta ad eua-
cuandū Alopecię & ophiasis uitiatū humorem, Galenus ea quæ attractoriā si-
mulq; discussoriā facultatē habent, tradit. Sunt autē ea necessario calida & tenuiū
partium. Calida enim attrahunt, atq; id eo amplius quo magis tenuiū partiū exi-
stunt. Talia quædam sponte naturæ esse Gal. lib. 5. cap. 16. de simpl. phar. facult. di-
cit, uelut sunt Dictamnū, Propolis, Thapsia. Quædam uero ex putrefactione ace-
scere faciente generari, uelut sunt fermentū, psoricū, & quorundam animalium
fimi. Thapsia porro utrunq; probe præstat. Nam & attrahit & attractū discutit,
si tamen per mixturā aliorum pharmacorum caliditas eius temperetur.

Ex reliquis græcis oleis citra olearū germīna apparatis. Apparet ex hoc lo-
co aliquas gentes olea sua non solum ex oliuis, sed etiam olearū germinibus ex-
primere in more habuisse, uelut hic de Hispanis dicit, atq; ea olea ad præsentem
usum improbat, nimirum quum adstringant, ut XI. Meth. Galenus item his uer-
bis tradit, ἴσθ' οὖ καὶ τὸ ἔλαιον σύφορ, ἐπαῖον δὲ, τὸ τε αὐτὸν ἀνομαζόμενον, ὅσ' αὖ ἄλλα
σκληροῦσι μετὰ θαλάω ἰλαίας. Dioscorides etiam idem fieri lib. 1. perhibet.
συνέχεται δὲ inquit, καὶ ἐκ τῶ λίωτος ἢ θαλάω, ἔλαιον quāquam λίωτος quidam
pro

pro *λίανω* non magna sensus diuersitate legere malunt, surculorū cortices pro ipsorum pinguitudine accipientes: Quomodo autem oleum quodcūq; his paruo simile fieri possit, docet Constantinus Cæsar de agricult. lib. 9. cap. 14. Vetus interpres pro *λίανω*, id est, citra olearum germina legisse *λίανω* uidetur, uertit enim quæ absq; sale construuntur, qui error non infrequens est grecis medicis, & maxime Galeno, ut uidelicet *λίανω* uox pro *λίανω* sit supposita, & uice uersa. At uero hic non est insulsi olei mentio apta. Rosaceū sanè citra salem apparatus, infra lib. 11. ad capitis dolorē ex ardore, & multis alijs locis, Galenus probat, & Dioscorides quādoq; id apparari cū sale, ne corrūpatur, dicit, quā grātia etiā alijs sal additur, sed ut dixi, hic nō est olei insulsi aut rosacei, mentio apta.

Si tamen nimis fluidum appareat, ceræ parum addatur. Ceræ natura alias calfactoria est, & uim molliendi ac explendi habet, uerū hic salte ut laurino crassiciem quandam præbeat, quo melius adhæreat, eius exiguum quid addi præcepit, quanquam paulo post etiam Euphorbio ceram modicā ammiscendam subiungit, quo uehemēs eius caliditas tēperet, si ex ipsius ceræ uncia una, & olei libra, ungentū incratū tenacius, et tamē liquidū fiat. At uero ubi triplū uel quadruplū etiam olei ad ceram additur, ceratū liquidum fit, quod nescio cur humidum potius, ex *κρηττός ὑγρῶς* appellare Linacer cū alibi, tum x. Meth. maluerit. Nam ad solidum parandum par oleo cera additur, aut certe non multo paucior, uerum de conuenienti mixtura ceræ ad oleum pro certis occasionibus ac tempore, docet Paulus Aegineta lib. 7. cap. 17.

Vnumquodq; aut proprium uigorem his qui ea sæpe uiderunt, indicat, & cognoscitur simpliciū quorundam, uelut sunt succi, semina, flores, radices, folia, & fructus, uigor ex odore, gustu, colore, & crassitudine, uerū hoc non contingit quibusuis, aut qui prius nō, aut raro, ea uiderunt, sed his qui antea multo usu exercitati, sæpe ea oculis lustrauerunt. Nam qui quæso præscribi possit gustus, aut odor, siue color aliquis rei, ut ex nudo præscripto mox ab aliquo percipi possit is esse qui descriptus est, qui prius rem ipsam nunquam uidisset.

Quanta distantia, quantoq; ordine id faciant. Quatuor ordines siue gradus medicamentorū simpliciū quā alibi, tum libro quinto simpliciū pharmacorū, Galenus facit, eosq; *ἐκείνους*, id est, distantias siue abscessus à temperatis appellat. Temperatū autem intelligit quod temperamento simile est corpori cui adhibetur, & quod neq; calfacit, neq; refrigerat, neq; humectat, neq; siccatur. Quod uero à temperamento digressum esse ad aliquā harum qualitatū, ratione assequi, & demonstrare licet, id ipsum primo ordine eius qualitatis esse dicit. In secundo aut quod euidenter aliquā harū qualitātū sensui exhibet. In tertio quod idē uehementer facit. In quarto quod ad summū est progressū, adeo ut si calidū sit urat, & crustas infligat, si frigidū mortificet. quin & in his singulis gradibus principiū, mediū ac finē facit ut summa ad duodenariū numerū extendatur, uelut amplius apud Galenū loco citato uidere est, & lib. 1. *ἐν γὰρ* & Paulum Aeginetam libro 7. cap. 4.

Nitrū molle usū, & quod Berenicariū appellatur. Nitrū optimū et maxime molle a tenuium partium Galenus, Berenicariū appellatū esse tradit, ab oppido troglodytarū Berenice: ut opinor: appellatione ducta, unde quondā in Aegyptū aduectū Pliniū Aegyptiū uocare existimo, & Constantinū Cæsarē lib. 6. de agricultura cap. 16. Alexandrinū. Idem etiam Berenicū infra lib. 6. uocat his uerbis, *καὶ ποτὶ καὶ αὐτὸ τὸ νίτρον ὅσον ἐστὶν λιπώματι, ἵνα μεταβαλεῖται ἐπὶ πικρῶν καὶ βαρύνων* & Methodi. VIII. *ὅταν δὲ καὶ τὸ μέν νίτρον λιπώματι, αὐτὸ πὶ βαρύνων, ὃ δὲ λιπώματι, καὶ αὐτὸ καὶ λαοὺ ἀκριβοῦς αὐτό.* Palam est itaq; Galenū non quod usum est nitrū Berenicarium appellare, sed tum Berenicariū per se, tum etiam aliud, aut ipsum adeo

ideo Berenicarū uſum, ſiquidem lapideſum ſit, in præſentem uſum probare, longeque falſus eſt uetus interpres qui Vernicē nominari à Galeno putat, quum quod hodie Vernicem uulgo appellamus minime ſit nitrū, Imò neque res ſimplex aut ſponte naturæ producta, ſed factitia, & eius uſum olim Bitumen præſtiſſe ex Plinio apparet, qui lib. 35. cap. 15. de Bitumine ita inquit. In reliquo uſu gramenti illinitur, ſignatq; ea contra ignes. Diximus & tingi ſolitas ex eo ſtatuas & illini. Placuit in ferrarijs ſabrorum officiis tingendo ferro, clauorumq; capitibus, ac multis alijs uſibus. Verū hanc erroris anſam præbuit ei pandectarū medicarū autor, qui Berenicū quidem Vernicem ſeu Bernicem exponit. Vernicē autem poſtea ſandaracham Arabiſ dicit tradit, aliam ab ea quā Græci *σανδαράχην* appellant. Nimirū gūmi electro ſive ſuccino non diſſimile, nō tamen ita durum, ita ut etiam in eius penuria, electrum pro ipſo maior tamen copia accipi poſſit, atq; hoc ex Serapione citat. Quin & Paulum capite de Vernice adducit, quem locum noſter Paulus nuſquā habet, ſicut nec alios pleroſq; qui nodidem citantur. Subdit etiā mox, ex lini ſemine ac uernice fieri quod Vernix appelletur, idē à piſcoribus ad conſeruandos ac illuſtrandos colores uſurpari ait, quod ſanè de huius temporis uulgo uocato uernice accipiendum eſt, quæ res factitia eſt ex gummi illo quod Arabibus ſandaracha itemq; ſandaros ac carabe dicitur, Græcis autem id quod electrum ſignificat, & quod latinis Succinū appellatur, atq; Vernicis quidem gummi appellatio ex Germanica uoce facta eſt. Succinū enim quod Plinius in (ſulſis ſepentrionalis Oceani gigni, & à Germanis Gleſſum appellari lib. 37. cap. 3. tradit, hodie magna copia ad litus Curieſe & Samlandiæ Oceanī æſtibus eſcitur, & tum à Liſuoniz, quos Eſſiuos dixiſſe Tacitus uidetur, tum Pruffiæ incolis mulierculis pro ornamento, inſtar corallij apud alios, circū colla appenditur ac geſtatur, credibileq; eſt gleſſum Plinij ac Taciti ætate appellatum à Germanis. Verū hodie ea uox aliud nobis, nempe uitri; ſonat, niſi tranſlucendi reſpectu primo ita ſit appellatum. hodie ſanè uulgo Germanorū iſtic habitantiū Verniſten & Berniſten uocatur, appellatione ut uidetur: ex eo quod æcenſum iedæ modo ac nidore ſagret: facta, quod ita fieri etiam Plinius ac Tacitus de eo teſtatur. In eodē portò Curienſis litoris tractu, maxime tamē in Dariſiaco Pruffiæ urbe, idipſum gūmi cum lini ſemine in id quod Vernicem uocant, rem pictoribus familiarem, & quod bituminis uſum hodie in pleriſq; locis, ut dixi, præbet, apparatus: Ita ut tum in ſimplici re, tum in facticia, Vernicis nomen apud ſuperius ſeculū, ex germanica uoce Berniſten ſive Verniſten, ob literarum V & B. uicinſitatem in pronuntiando, ſit factum: cuius tamen magna ignoratio apud pleroſq; omnes fuit, utpoſt quum uernicem cum Nitro Berenicatio, apud Galenū & græcos medicos cōfuderint, maximo omnino errore, uelut oſtendit.

Et aphrolitrum album, ſeu ac laxum. Quod hoc loco imprimis annotare neceſſarium duxi, hoc eſt, quod qui apud Galenum & græcos medicos aphrolitrum reperiſſit, falſam ſcripturam æſtimantes, aphronitrū ſerè omnes ſubſtituūc, quod ipſum ex aphrolitri ignorantia contingit. Sicut quoq; hoc loco factum eſt, ut *ἀφρονίτης* pro *ἀφρολίτης* ſuppoſititium legatur, quum contra *ἀφρολίτης* oporteat, ut ego uerti, & ut res ipſa poſtulat. Fecit enim antea Galenus ſpumæ nitrī mentionem, *νίτρος ἀφρός* appellans, moxq; etiam ipſius nitrī, quibus poſtremum addit & aphrolitrum, quod his poteſtate eſt propinquum, maxime ſi ſit uſum, aliàs autem mediā inter ſpumam nitrī & ſalem facultate præditum, quemadmodum Galenus 9. ſimpli. pharm. de metallicis clare docet. Quanquam etiam iſtic non ſit integra Galeni lectio. Capite namq; de Sale, amaram & extergentem uim ſpumæ nitrī (legitur tamen corrupte *ἀφρολίτης*) tribuit. Sal uero tanrū ab exter

gendi facultate deficere inquit, quantum adstrictoria ui abundat. In medio autem utriusq; Litrum esse. Nō longe post capite de Aphrolitro, manifestius adhuc indicari aliud esse ἀφρολίτρον, id est, Litri spumā, & ἀφρόνιστρον, id est, Nitri spumam. Medicamentum inquit, rescicandi ui præditum est Litri spuma, farinae triticeæ si nulli aspectu, nam & alba est, nō uelut petrae Asiae flos cinerea, Nitri uero spuma non farinae faciem præfert, neq; dissoluta est, sed coharens & compacta, exierit gendi uim habens, & mox subdit. Litri spuma eiusdē naturę ac facultatis est curā Litro, sed substantiā magis tenuium partium: dictumq; sanē paulo ante est (putat autem capite de Sale) Litri spumę facultatem in medio spumę nitri ac salis consistere. & addit, ἀφρολίτρον πλὴν γὰρ ἢ φουφικὸν διώκειται ὑπάρχει μίση, τοῖς δὲ ἁλοῖς καὶ ἢ σφουφικῇ, πάλιν πλάσσει δὲ ἢ φουφικῇ. quæ uerba ut ex superioribus euidentia est, in totā corrupta leguntur, quā non id quod Galen. uelit indicent. Quare eorū lectio sic in integrū per nos restituitur adscribetur, hoc modo habens. ἀφρόνιστρον ἢ γὰρ ἢ φουφικὸν διώκειται ὑπάρχει μίση, τοῖς δὲ ἁλοῖς καὶ ἢ σφουφικῇ τῷ δὲ ἀφρολίτρον ἀφρόνιστρον διώκειται ὡς, πάλιν ἢ σφουφικῇ ὁλίγῃ, πάλιν πλάσσει δὲ ἢ φουφικῇ. Quod uero ita legendū sit etiam postea, capite de Litro edocemur, quamquam & tum corrupte νίστρον pro λίτρον legatur. Repetit enim rursus, se supra de Litro dixisse, quod mediā inter spumam nitri, & salem, habeat facultatem, & si sit uisum, plus ad spumę nitri facultatem accedat. Quin & intra corpus, Litrum ad dissecādos & attenuandos crassos & tenaces humores longe efficacius quā sal assumi ait, uerum Nitri spumam neminem citra magnam urgentem necessitatem deuotare, ut quæ stomacho noceat, & magis quā Litrum dissecādi uim habeat. Quare etiam nos inquit, tum uisum, tum non uisum litro (rursus tamen νίστρον corrupte legitur) utimur, & præsertim eius spuma, in his qui à fungis acceptis strāgulantur. Porro libro 11. simp. phatōn, ubi rursus de Sale agit, etiam de Litro repetit, dicens se demonstrasse, hoc pharma cum mediā facultatem inter salem & nitri spumā habere, quo loco etiam ἀφρολίτρον pro ἀφρόνιστρον legitur. Ita etiam 8. Methodi, postquam multa extergentia recensuit, ἴτι δὲ μάλιστα inquit, ἢ ἀφρόνιστρον τοῦ νίστρον, καὶ τὸ νίστρον αὐτὸ καὶ τὸ ἀφρολίτρον, id est, præstat hoc amplius spuma nitri, & ipsum nitrum, & aphrolitrum siue spuma litri. Ita enim legendum est, & non aphronitrum, uelut græcum exemplar & Interpretes habent, quæ ratione etiam hic non aliter legendum esse indicaui.

Subactum autem intellige. Subactum dicit accipiendum esse quod ad multos dies in sole cum aceto frequenter sit tritum, Ita enim ipse uerbum καταργεῖται & participium καταργασμένος exponit, quanquam alias nō ita curioli apparatus, & late se extendentem habeāt significationē. Nam & εἶας & ἴσιν καταργασμένος alias sæpe habet, hoc est adipem ac uiscum simpliciter tritū ac dissolutum, quomodo etiam Celsus lib. 6. cap. 3. Emplastrum tetrapharmacum aceto subactum dicit. Usurpatur etiam de omni farina in panis massam coacta. Conueniuntq; huius coniugij uoces operæ singulari, in qua præcipue elaboratum lutum requiritur, conueniunt & arationi terræ.

Metasyncritica Græci appellant. Metasyncritica medicamēta Galenus lib. 3. simpl. pharma. obscura, & falsa, ac sectæ suæ minime conuenienti appellatione Methodicos uocare dicit, ea quæ meatuum miscellæ corporis statum præter naturam habentem transmutant, atq; id ipsum μεταστροφισμὸς eos item appellare, sicut quoq; effectum ipsorum μεταστροφισμὸς, negatq; huius appellationis usum alteri cuiuspiam sectæ conuenire, præterquam Methodicis, qui animalium corpora συγκεκμημένα id est miscellas appellant, atque inde μεταστροφισμὸς denominationem faciunt. Quando uero hæc ipsa Medicamenta partes fluxione laborantes diuturna manifeste iuuare palam est, propterea sanē id contingit, quod quomodo

frigida

frigida sit & humida earum affectio, calfaciētibz & resiccantibz opus habent, iuxta Galeni opinionem. Tale pharmacum à Dioscoride Thapsia describitur, his uerbis, *λεκτηται δὲ καὶ μετασυγκρίνεται ὁ ὕψιστος ὅτι ἔσται καὶ ἡ ῥίζα πάντων μέλαινα ἡ ἰσοδυναμοῦντων, ἔπου δὲ τὴν βάσιν ἐλκυσάς, ἢ μεταπυροπνέουσα.* hoc est, habet autem tum succus, tum radix, ex omnibus simili potentia præditis, uel maxime uim Metasyncriticā, ubi uidelicet ex alto quid attrahere oportet, aut meatuum statum transmutare. Quibus uerbis rogam Metasyncriticorum uim declarat, Nimirum quod ex alto corporum fluxiones euocent, & meatus transmurent. ita enim ipse exponit. Cornelius Celsus libro. 2. cap. 17. eandem uim his uerbis expressit, de balneo loquens, Vbi summam curam relaxari, euocariq; corruptum humorem, & habitum corporis mutari expedit. Porro hoc ipsum uereres interpretes Recorporare, & medicamenta ipsa Rescorpora dixerunt, existimantes se quam proxime uocem ipsam græcam reddere ac exprimere, sed uulgius Medicorum hodie neq; hanc uocem ea significatione accipit, sed putant per eam indicari quæ uires reficiunt, atq; ita corpus reparare uidentur, uerū hæc ipsa nō μετασυγκρίνεται sed ἀναλκῆσθαι dicuntur, & pars saltem aliqua τῆς μετασυγκρίνεται exiit. At uero illa ipsa Metasyncritus non tantum per ea medicamenta quæ proprie Metasyncritica appellantur cōringit, sed per alias etiam res quæ eandem habent facultatem, uelur sunt, Varia gestationum genera, deambulationes, uocis exercitia, unctiones, cucurbitæ, dropaces, insolationes, frictiones, psilothra, sinegmata, sinapismi, uomitus à raphanis, uirium refectrix diæta, balnea, uinū, uariis cibis, sed adscribā Pauli de hac re uerba lib. 3. cap. 7. 2. de fluxu muliebri, quo eius lectio in integrū restituiatur, quæ talis est, *γὰρ δὲ τῆς διαλύμασι, πόσις δὲ τῆς ὀνόσι, μετασυγκρίνεται ἀνέροις διαφόροις, πόσις τῶν αἰσθησίων, ἀλύμασι, σκύαις, εἰς πᾶσι κατὰ τῶν ὑπερβολῶν, ἡλικίαις, ῥήμασι, ψιλόθροις, σμύγμασι, σιναπιομοίς, ἐμειντοῖς, ἐν ῥαφάνιοις, ἀναλκῆσθαι ἐπιμελῆς, λουτρεῖς, αἶμα, σκυῖα, & προφῆς.* Ex his autē & Galenus aliqua paulò ante hunc locum recensuit, ueluti scarificationes, cucurbitas, cerata, uirium refectricem diætā, legendum est enim *λεκτοῖς, ἀναλκῆσθαι*, Non ut exemplar excusum habet, *λεκτοῖς ἐπιμελῆσθαι*, ur infra ex Sorani uerbis claret, ubi penitus eadem recensentur, & *λεκτοῖς, ἀναλκῆσθαι*, utraq; uox seorsum legitur.

Gallarum omphacitidum.] Gallarum genera duo Dioscorides lib. 2. facit his uerbis, *λεκτηὶ καὶ τῆς δὲ φρούς, ἢ μὲν τῆς ὀμφακίτης καλῶνται μικρὰ καὶ καὶ ὀνυλῶδες, εἰς ῥα, ἢ τρυπαντος, ἢ δ' ἴσως λῶα καὶ κούφῃ καὶ περρηγνῇ.* hoc est, Galla fructus est querucis, & altera ex his omphacitis appellatur parua, nodosa, solida, non perforata. Altera uero glabra leuis & perforata. Galenus aurem 7. simpl. pharm. alterā simpliciter omphacitin appellari ait, alteram uero flauam, & laxam ac magnam describit, & siccare quidem ur priorem tradit, sed tanto minus, quanto acerbe quælitatis minus quam prior complectitur. Ex quibus sanè uerbis pleriq; omnes qui omphacitin gallam apud græcos medicos, Galenum, Dioscoridem, Paulum, ac alios legunt, nobis immaturam uertunt, tanquam sanè ea ipsa, uoce ὀμφακίτης significetur, quum alias ἔμψαξ uua irem; oliua immatura, & ὀμφάκινος ex oliuis immaturis oleum appelletur. Verum nos non remere ita uertimus, sed semper omphacitin diximus, ur qui nō per hanc uocem immaturam Dioscoridi & Galeno ac Paulo dictam putamus, sed certum quoddam genus, quod Dioscorides & Galenus aliterum ex eis faciunt, quum immaturæ appellatio de utroque genere intelligi possit, quod non ad iustam maturitatem peruenit, atque ita accipio à Plinio dictum lib. 24. cap. 8. Immaturæ ex his ex aceto potæ lienem consumunt, Eadem crematæ & acro salso extinctæ menses sistūt, uuluasq; procidētes foru. Neq; enim aliud est quod Dioscorides & Galenus de utroq; genere dixerunt,

quod uidelicet *ἡ γαλλὰ* fiant si ignitis prunis urantur, & aceto aut uino, aut oxale
 mæ extinguantur. Quando igitur utraque Galla suo tempore immatura est, &
 dicitur, minime hæc certa alterius generis differentia putanda est, minimeq; pro
 omphacitide primo gallarum genere, immatura accipienda. Inquirendum itaq;
 est quod genus gallarum sit omphacitis appellatum, alterum enim genus nemi
 ni non est nouum, atque id conabimur ex descriptione quam Dioscorides ha
 bere uerere, singulis eius uerbis æstimatoris. *ὀμφακίτις* inquit, *καλὸν ποτὶ μὲν καὶ κα
 λὸν δὲ καὶ πικρὰ, ἀπὸ πρῶτου* &. Paruam itaq; primum dicit, mox nodosam, ita enim
 ego *καλὸν δὲ καὶ πικρὰ* interpreto, quum *καλὸν δὲ* sint tum digitorum ac brachiorum
 articuli ac iuncturæ, uelut Galenus lib. primo, *de τῷ πικρῷ ἀγρῶν* tradit, tum nodi
 & callosæ concretiones in digitis manuum, ac pedum, in sede item, ac uulue ore
 coactæ, quæ etiam *καλὸν δὲ καὶ πικρὰ* appellantur. quanquam non semel suspicatus
 sum *καλὸν δὲ* pro *καλὸν δὲ καὶ πικρὰ* esse legendum, atq; accipiendam ad calicis seu
 pocilli formam cadami. Est enim *καλὸν* poculi Cymbrici genus Hefychio auto
 re, Verum in hac re nihil assero, indicasse tantummodo hæsitacionem meam con
 tentus. Solidam deinde & non perforatam tradit, ut planè hæ differentiæ sint,
 quas Plinius dixit, Nimirum alteram solidam, alteram perforatam, illam mino
 rem, hanc maiorem. Nam albæ & nigræ differentiam Dioscor. non habet, & Ga
 lenus alterum genus, magnū scilicet, suluū esse dicit, quod fortasse primum
 candidius iuxta Plinium fuit. Sicut contra appellacionis Omphacitidis differen
 tiam Plinius nusquam habet. Habemus itaque iam Gallam omphacitis esse par
 uam, nodosam, solidam, non perforatam, quæ certe immatura dici Latinis non
 potest, sicut neq; etiam est, sed in suo genere perfecta. Quæ igitur talis est? Ego
 sane omphacitis gallam esse, & appellari à Galeno, ac describi à Dioscoride pu
 to, id quod cauum primum ex quercu enascitur, ex quo postea ipsa glans pro
 dit, eiq; innascitur, quanquam id non perpetuo contingat; ut ex eo glans pro
 ueniat atque in hanc opinionem induxit me Paulus qui libro 3. cap. de dysente
 ria, apertis uerbis docet *ὀμφακίτις*, id esse quod dixi. *ὀμφακίτις* inquit, legitur
 tamen in uulgaris exemplari *ὀμφακίτις, κακουργία*. *ὅτι δὲ καλὸν δὲ οὐ κακουργία*
τὸ πικρὸν βέλανθρον, ἀπὸ τοῦ βυζανθίου γένετα. hoc est, omphacitidis ustra, est aurem
 cauum illud ex quo glans quercina enascitur, quo coriarij utuntur. Euidens est
 descriptio rei quam uelit, & quæ hoc amplius addat, eo coriarios uri, planè hoc
 indicat quod hodie etiam usu uenire uidemus, quanquam utraque galla à tin
 ctoribus expetatur.

— Panniculi Cilicij usui. Quales fuerint cilicij uestes, ex quibus hic panniculum
 detritumustum Heraclides Tarentinus in usum curandarum alopeciarum assu
 mit M. Varro lib. 2. de re rust. ostendere uidetur, ubi de caprarum pilis agens ait,
 Tondetur quod magnis uillis sunt, in magna parte Phrygiæ, unde Cilicia & ex
 tera eius generis ferri solent. Sed quod primum ea non solum in Cilicia sit institu
 ta nomen id cilicas adiecisse dicunt. Quare apparet Cilicia substantiua uoce, ci
 licias uestes seu saga dici, quæ uidelicet à cilicibus parabantur, atque hoc ex lana
 caprina. Hoc autem loco passim est eundem Cilicij panniculi usum esse, qui albas
 est lanarum ustrarum, itemq; pilorum ustorum, quos etiam simul in pharmacum
 ammisceat. Acquirunt autem hæc ex ustura calfactoriam & resicatoriam faculta
 tem, ut Galenus lib. 11. simp. pharm. tradit. quare etiam panniculum Ciliciæ uer
 sitis detritæ ustrum similem facultatem habere colligimus, utpote ex pilis constan
 tem, etiam si *πέδι*, quam uocem panniculum uertimus: pro linteolo quoq; re
 nui, & aliquando detrito non infrequenter Græcis Medicis dictum reperitur.
 Velut etiam apud Strab. 15. de cultu Persarū, *πέδιον δὲ ἀπὸ λινῶν ποτὶ τὸν λινῶνα*
 : hoc

hoc est, linteum Sindonicum quoddā circum caput. Porro quemadmodum hoc loco ciliciz uestis panniculum Heraclides probat, ita infra nō longe post Cleopatra Ampelinæ uestis panniculum habet, in eundē planē usum, appellationibus utriusq; ut apparet, à regionibus ac urbibus patrīs deductis. Nam quod uetus interpres eo loco pro Ampelino panniculo, cortices uitis uertit, tanquam sanē uitis cortices ἀμπέλινον γένος per metaphorā sint appellati, mihi non placet, quum hicalias nullarū sit similis metaphorarum usus, & si hoc ita μεταφραστικῶς quis dicum uelit, similis metaphorā & λυκίσκος γένος exquirenda uidetur, qualē ego nullam esse uideo. Meminit Cilicij etiā Columella lib. 12. cap. 46. de conditura Inulæ, Quum eius radicem inquis, et terra erueris, aspero linteolo uel etiā cilicio detergi to quiquid arenæ inhærebit.

Muscarum capita contrita affrica.] Hoc loco dubiū sanē esse alicui possit, muscarum ne an muriū capita Archigenes affricari uelit, quum μυῖον quidē in græco exēplasi, id est, muriū legatur, uetus autē Interpres μυῖον, id est, muscarū uerterit, Plin. uero lib. 39. cap. 6. tum muscarū, tum muriū capita alopecias sanare ex græcis, urin confesso est, medicis tradat. Cæterū ut ne hic hereremus, Asclepiades fecit qui non ita longe post citantē Galeno, aperte muscarū recens captarū, & præsertim sanguinis ipsarū usum præscribit, talē utiq; qualē hic Cleopatra uoluit, At ueto capitū muriū usus non est nisi ustorū, sicut etiā paulo inferius eorundē torporum ustorū cinis probatur, & Galen. etiā de Theriaca ad Pisonē testatur, γίνεσθαι inquit, βορβόρον ἀπὸ ἀσφαλτὸς τῶν μυῶν, καθύστεται γὰρ μὴντὶ μίλιον χροῖον αἰ τὰς ἀλωπεκίας ἐκδοῦν δυνάμεν. quare quū hic de ustura non fiat mentio, uel inde. etiam certum est muscarū capita accipere debere. habet tamen muscarū etiam capita cōbusta, ad alopecias cōmoda Marcellus, ex græco utiq; μυῖον, pro μυῖον agnito, reddita. Habet etiā Cleopatra infra c. 2. muscas in ollula torrefacias, ut a neps sit μύων & μυῖον, tum lectio, tum usus. Cōsimilis porro hæsitatō etiā in his quæ perdendis muscis ac muribus, tum Plinio, tum Aetio æqualiter traduntur, contingere potest. Nos sanē apud Aetiū ferm. 13. cap. 42. Muscarū perdendarū pharmaca uertimus, quæ æqualiter etiam de muribus intelligi possunt, quantū exemplar quod sequutus sum τὰς μυῖας aperte haberet, Plinius namq; idē medicamentū, ueratū uidelicet album, ad utrūq; animal perdendum ualere scribit, Mures inquit, polentæ admixtum necat. Et mox, Muscæ quoq; necantur albo trito & cum lacte sparso.

Cum aceto, niri gleba, aut sepiæ testa, aut aspera squatina cure.] Nitri glebam hoc loco Archigenes ad friccionis usum propter habilitatem probat, quum aliās leue, perforatum ac ueluti spongiosum & in puluerem redactū ad eundem usum inspergi atq; ita affricari possit. Quare νιτρον βάλαν, non obolo ut uetus Interpres uertit hic legendum est, quum non pondus, sed rei habilitas per βάλαν, id est, glebæ uocem indicetur, atq; hoc paulo ante Cleopatra προκυντρώσας, & Plinius sapenum cero, nitro ante preparatas dixit. Cæterum eundem usum & aspera squatina cutis affricata contulerit, quam hic ἰχθυῖαν appellat, qua significatione etiā Hippocrates πῶς ἰχθυατικῶς ἐμβρόν usurpare uidetur quum ait, ἰχθυὸν πρὸς ἐλάνην πρὶν εὖ διακνύλους εἰλεῖν τοὺς δόκους, ἵνα καὶ ἐκ λιθίνου ἢ σιδήρεος. quanquam etiā eo loco unguem ferreum instrumentum significare possit, quod uidem ad extrahendū immortuū foetum conducit, propter similitudinē quam ad piscium squamas habet, ita appellatum: ut Galenus in glossis Hippocratis exponit.

In splenio impone.] Splenia & Splenas esse linteola non oblonga tantum, uelut Jescychius prodit, aut splenis ut alij, figura: sed quacūq; forma ad partiū corporis habilitatē aptata, quibus excepta uel illita medicamēta adhibētur, frequēs

est in Medicorum græcorum libris, & apud latinos eadem est significatio nō me-
dicis modo, sed alijs etiam scriptoribus ac poetis. Galenus Hippocratem ea ex-
cogitasse ad stabiliendas fracturas & metho. tradidit his uerbis, *ὅθεν ἐκ μὲν τῶν
φρυγίων, ὡς ἔνεστιν ἐν τοῖς ἰσχυροῦσι ἰσχυρὰ τὴν τῶν σπληνῶν ἰσχυρίαν*. & paulo
post ad ossa multifariam contracta, splenium ascie forma circū dare ex eiusdem
Hippocratis precepto iubet: *σπληνὰ* inquit, *σπερματικὰ ἢ σπερματικὰ ἢ ἰσχυρὰ*
πικρὰ καὶ ἄλκα. Apud Plinium 26. cap. 14. de gentiana legitur, uel succo uulneribus
ex ea factum lycium, Quo loco lycium pro splenio uel linamento dictum uideri
possit, uerum locus est corruptus & legendū est, uel succo uulneribus indito ue-
lut lycium, Id quod Dioscorides dixit, *ἐστὶ δὲ σπληνικὸν ἰσχυρὸν καὶ ἢ ἰσχυρὸν*.

Aut præpunctis pro more.] Morem pungendi alopecias per aciculas colli-
gatas supra tradidit, & infra repetet etiam Soranus, quem sanè etiam hic innuit
Archigenes.

Quidam nitri decimam ipsius cineris partem ammiscent.] Græcum exēplar
habet, *ἡμιστίαν τοῦ νιτρὸς ἐκ δέκατον τῆς τριγῆς μίσγνυσσι*, id est, quidam nitri ad de-
cimam cineris partem ammiscent. Verum nos legendum putamus, *ἡμιστίαν ἐκ
δέκατον τῆς τριγῆς μίσγνυσσι*, id est, Nitri decimam ipsius cineris partem. Quum
enim antea solius cineris corticis calami usum cum pice præscripserit, nunc uide-
tur eius uim per adiectionem nitri uelle acuere, & non contra, nitri uim per deci-
mæ partis cineris additionem temperare. Venus Interpres hic multa transiit,
sicut alias etā in toto opere plurima, ita ut dimidiū horum librorū uix uerterit.

Aut squamam stomomatis ferri] Stomoma ferrum est in usum aliquem for-
matum, hoc est instrumenti alicuius formam redactum ac chalybe roboratum, à
uerbo *σπῆμα*, quod robo ro ac quasi os & aciem firmo significat, uerbali forma
deducta appellatione. Sic Aetius ferm. 9. cap. 48. *πλάτυσμα σιδήρου σπῆμα*,
id est, laminam ex ferro stomomate, hoc est, per chalybem roborato, probat. Ser-
mone autem 10. cap. 11. rursus ferrum quod stomoma sit probat, & mox squamæ
ipsius utilitatem adscribit, addens simul quæ res sit stomomatis squama his uer-
bis. *ἴσα δὲ ἰσχυρὸν μὲν ἐστὶν ἐν τοῖς σιδήροις σπῆμα, ἢ δὲ τὸ σπῆμα σιδήρου λί-
πιδος, ἢ τὸ τῶν χαλκῶν ἐκ βελῶναι σιδήρου σπῆμα καὶ τὸ σπῆμα καὶ
ἐξ αἰσθητικῆς αἰσθητικῆς χροῖας διδόναι, τὴν γὰρ αὐτὴν ἐν σπληνὶ μανάναι*. In quib-
us uerbis palam ostendit squamam stomomatis ferri, esse eam quæ à ferro sto-
momate dum ignitur & malleo tunditur abijcitur. quod ipsum longe dissonat
ab eo quod Plinius tradit, Stomoma uidelicet non ferrum aliquod uocari, sed
squamæ aris alterum genus, ex summa scilicet lanugine decussum. Verba Pl-
nij sunt hæc lib. 34. cap. 2. Squamæ est alterum genus subtilius, ex summa scilicet
lanugine decussum, quod uocant Stomoma. confudit itaque Plinius (si mor-
do uera est hæc lectio) duo squamarum medicis usurpararum genera, quorū al-
terum ex clauis aris, idibus excutitur, alterū ex stomomate ferro ignito ac mal-
leo iusto itidem disparatur; atque hoc etiam Dioscorides libro quinto sentit, qui
seorsim primum de aris squama, postea de stomomatis squama tradit. Tamen
si uel unus Dioscorides Plinium in eam opinionem duxisse uideri possit, ut scilicet
putaret squamam ipsam, stomoma appellari. Quum enim Dioscorides sim-
pliciter hæc uerba *λεπιδὸς σπῆμα* *διναμὶς ἐν αὐτῇ τῇ τῶν χαλκῶν λιπιδὸς* pro-
dat, hoc est ad uerbum. Squamæ stomomatis uis eadem est qua squamæ aris, nec
que adijciat *σιδήρου* ad uocem *σπῆματος*, uideri possit culpam oscitantius le-
genti, cum alterum squamæ genus stomoma dixisse. uerum attentius conside-
ranti mox apparebit, *σπῆμα* uocem eadē ratione additam huic squamæ ge-
neri

neri, quæ χαλκῷ altero generi adiicit, Nimirū ut altera ex aerē, altera ex ferro stomomate decussa intelligatur. Porro Galenus libro 19. simpl. pharm. hanc differentia aperte demonstrat inquiring, *οὐκ ἔστι δὲ πάλανθ' ἢ τὸ σιδῆρον μέτερον αἰσίου, καὶ τόνος ἐν μέλλει ἢ τῷ σιδῆρτι* : *ἀλλ' οὐκ ἔστι τὸ χαλκὸν τῶν ἰσχυρῶν ἀμείνων ἀπὸ τῆς τοῦ χαλκοῦ κατὰ τὴν φύσιν αἰσίου μέλλει ἢ τὸ χαλκῷ, τόνος δ' ἐστὶ μέλλει ἢ αἰσίου*. In summa itaq; duo genera squamarū sunt, alterū aeris, alterū ferri. Vtriusq; autē rursus duæ sunt species. Squamæ aeris, altera aeris simplicis seu candidi, altera aeris rubri, quæ helitis appellatur. Sic etiā ferri squamæ, altera species ex simplici ferro est, altera ex ferro stomomate, quod est chalybe firmatū aut chalybs per se. Cornelius Celsus lib. 7. cap. 1. ferri squamæ alteram speciem tantum nouit. Libro autē 6. cap. 6. in Cleonis collyrio falsò legitur, squamæ eris quod *σῆμα* appellant, haud scio an nō ipsius Celsi culpa. est enim legendū, squamæ ferri quod *σῆμα* appellant, uelut ex supradictis palam est. Cæterum has squamarum species, & præsertim stomomatis ferri, nemo hætenus ex Latinis intellexit, quod equidem sciam. Omnes enim aeris squamam Stomoma uocāt, Dioscoridem male intelligentes, ut quem neq; Plinius (uelut indicaui) est assequutus, etiā si eo loco medicorum ignorantiam in his rebus grauitèr coarguat. At uero cum igno- rasse quid stomoma, & quid stomomatis squama esset, uel hoc indicio est: quod supra citati libri capite 15. squamæ ferri scōrism mentionem facit ex acie aut mucronibus decussæ, quæ sanè nihil aliud est quàm stomomatis squama, quum suprà ostenderim stomoma significare ferrum in aciem & mucronem firmatum & chalybē roboratum, aut chalybem ad eò per se. Verba Plinij hæc sunt, Squama quoq; ferri in usu est ex acie aut mucronibus. Porro quod dixi ferrum fieri stomoma per chalybem firmatum ac induratum, id ipsum Plinius eiusdem libri capite 14. his uerbis tradit. Ex omnibus autem generibus palma serico ferro est. Seres hoc cum uestibus suis pellibusq; mīstunt. Secunda Parthico, neque alia genera ferri ex mera acie temperantur, cæteris enim admiscetur. Aciem Plinius hic appellat quod chalybem hodie dicimus, ex qua mera duo illa genera ferri Sericum ac Parthicum à natura temperari dicit, uerum reliquis generibus ferri necesse esse aciem admisceri, quo uidelicet per eam firmen- tur, & in usum ali- quem aptentur. Quod autem Aciem Plinius dixerit quod hodie chalybem uocamus, ex ipsis ad eò linguis palam sit, Italica, Gallicæque ac Hispana, quæ chalybem, azzao, acier, acciel, appellant, omnibus his uocibus ex acie latina uetèri chalybis appellatione corruptis. Nos Germani græcam stomomatis appellationem aliqua parte exprimimus, stael appellantes.

[Aut hippopotami corium uestum illine.] Idem remedium etiam Plinius lib. 28. capite 8. habet, ne quis forte hippocampi legēdum existimet, de cuius ciuere paulo ante Archigenes mentionem fecit, maxime quā *ιπποτάμης* corrupta uoce in Græco legatur.

[Nuces amaras una cum corticibus.] Amaras nuces, hoc est *καρπὸς ἀμάρης*, hic Archigenes dixit quas suprà Crito & Cleopatra, amygdalas amaras appellant, id quod & Plinius & Celsus in usu habent.

[Scalpturam per acutum coelum assidue facimus.] In græco est, *τοῦ κορυφῶν μὴ τὸ δὲ σκελετὸν σκελετὸς φέρειν*. Est autem *σκελετὸν* coelum uel scalprium quo Alopectā irritare ac exasperare se dicit Asclepiades, id quod Celsus dixit, Quidam hæc genera scalpello exasperant.

[Post hæc uero etiam muscarum Asclepiades meminit.] Hoc loco in græco exemplari *θεραπεύονται* pro *δαρύνονται* corrupte legitur, & paulo post, καὶ φέ-

pro *συμψύξη*, & *παραφωτισμός* pro *ἀποφωτισμός*, his itaq; constitutis integra est lectio, eaq; sententia, quam nos reddidimus.

Præfatur quædā quæ iuxta propriæ sectæ ductum digessit.) Soranus Ephesius Methodicus fuit, & uel præcipuus post primum eius sectæ autorem Themisonem. Hunc itaque pro suæ sectæ ductu & instituto, quædam curandis alopecij præfatum esse dicit. Fuit autem sectæ eius summa, communem quandam omnium morborum indicationem esse, quum omnes affectus particulares, ad duo morborum genera reduci possint *συνῆς* & *σπάνιος*, id est ut Celsus exponit, Adstrictum & fluens. Imò & tertium quoddam genus ex his mixtum addiderunt. Hæc autem genera *κοινότητες*, hoc est, communitates appellabant. Contra hos Galenus libros 14. de curandi methodo scripsit, In quibus Thessalum Trallianum præcipue insequitur, qui artem Methodicam se sex mēsis traditurum quibusq; pollicebatur. Videtur tamen huic sectæ uel ipse Aristoteles occasiorem dedisse, Hic enim lib. 8. physicarum auscultationum ita inquit, *ἐν δὲ πλείοντι τῶν πλείοντων ἀρχὴ τὸν κοινότητος καὶ μέρους*.

Primum abstinentia proderit.) hoc loco pro abstinentia *συστάλη* Soranus habet, id est, cōtractionem, quod indicare uolui, quum non multi usus sit aliās hæc significatio, Nam infra lib. 2. *ἐν συστάλει* *προφῆς* dixit.

Spumæ nītri partem unam, Rhōis partes duas.) In græco exemplari Veneto, quod solum in his uertendis ad manum habuimus, corrupta lectio est hæc, *ἀφρονίτου μίϑ' ἑρ, λαζοῦ καὶ ῥῆος ἀμμονιεύου μίϑ' ἑρ*. Euenit autē hoc uirum ut pleraq; alia culpa correctoris, qui quum lectionem ueram assequi non posset, falsam quamcunq; arripere procliuus fuit, substituit. Legendum est autem pro *ῥῆος* uel falso, *ῥοῦ* *μίϑ' ἑρ* rectum, id est, Rhōis partes duas, cerę enim hoc loco nullus est usus, maxime uisæ. Indicaturq; locum uitiatū uel illud, quod cera & sal antimoniacus coniunguntur, neq; additur uox, quæ alias duobus aut pluribus adq; ei solet, *ἀντὶ* uidelicet, ut scilicet utriusq; pars una sumenda significaretur, quam quam uetus Interpres apertis uerbis rectam lectionem demonstraret, eam scilicet quam nos uertimus.

Septē atramentū illinito.) Sepias atramentū pro sanguine habere, quod ubi se apprehēdi sentiūt effundāt, eoq; aquas infuscēt, quo uidelicet abscondantur, auctor est & Aristoteles & Plutarchus, & Plinius lib. 9. cap. 29. Id ipsum atramentum etiam hic Alopecij illini iubet. Sequuntur mox Sphæritidis folia, exponit autem ipse Galenus, uel quem citat Soranus, uocem *σφαγγίης* significare cur pressum *σφαγγίς*, hoc est, pilulas ferētem. Vsurpauit ea significatione etiā Aetius serm. 12. cap. 44. uelut nos eo loco reddidimus. Sed Hermolaus lib. 2. corolla. cap. 397. non constare ait quæ herba sit sphæritidis Aetio, & cyclaminon posse interpretari suspicatur.

Alcyonij drachmam unam, sulphuris uiui drachmas VI.) Exemplar græcum hic sulphuris uiui drach. s. id est, dimidiā habet. Verū exiguum uidebatur nobis, id pondus esse, Alcyonij & muscarū ponderis respectu, quare cum ueteri Interprete s. pro. s. id est, sex pro dimidiā restituiimus, quādo alias magna uicinis picture utriusq; characteris, facilem præbuit ansam alterū pro altero substituēdi.

Passum illinito, ac deinde ferulam usā inspergito.) In græco hic *κατάπλαστον*, hoc est cataplasmatīs modo imposito, habetur. Verum quum hic nulla cuiusmodi forma medicamenti præscribatur, quæ in cataplasmata apte redigi possit, uisum est mihi *κατάπλαστον*, id est, inspergito legendum esse. hoc enim ferulæ uisæ magis conueniret, citra humoris admixtionem. Nisi planē quis tum passum ipsum

graphum. puto autem fuisse uocem non integre scriptam hoc modo, ἀσπυγέα. pro qua ἀσπυγέα expressit. Verum quod ἀσπυγέα ἰριδὸς putem legendum Aetius fecit, qui serm. 13. c. 3. in emplastro uenatorum utramq; iridem seorsim; & ex intervallo habet, iridem illyricam primum, postea iridem astragalitidem. Quamquam autem appellatio hæc neq; apud Dioscoridem, neq; Galenū, neque Paulum, neq; Pliniū sit de iridis aliqua specie, tamen res ipsa eiusq; uires descriptæ indicium præbent, iridem astragalitidem esse eam quæ ab his omnibus astragalus appellatur. Radix enim astragali rotunda, uelut raphanus grandis, & solida; & quæ difficulter contundatur, à Dioscoride describitur, & ab eodem ad uetera ulcera; arida inspergitur, quo uidelicet cicatricem, ut Galenus ait ducat. Iris autem Illyricæ radices ab eodem geniculatæ & solidæ describuntur, & ad explenda ulcera repurgandaq; accommodatæ: quare uicina est utriusque radicit forma & uis, atque inde etiā astragalus iris astragalitis appellatur. Cui accedit amplius Plinij testimonium, qui ex duobus iridis Illyricæ generibus, alteram raphanitidem à similitudine appellari dicit, quod conuenit cum eo quod Dioscorides dixit de astragalo, ἀσπυγέα ἰριδὸς ὀνυχίβου. Itaque etiam non multum retulerit, siue quis hoc loco iridis astragali, siue astragalitidis legat.

Constans & certa est huius pharmaci facultas, neq; citra effectum dilabitur. Hæc omnia uerba græcis duabus uocibus, ἀντιπύρρον & ἡ διώμας, comprehenduntur. Est autem ἀντιπύρρον idem quod Aetius Paulus itemq; Galenus alias ἀντιπύρρον, & ἀπαρτίβαντες dicunt. διώμας porro compositionem significat, sed cuius sit aliqua æstimatio & probata facultas, ut supra est indicatum.

Pericalamitidis unciā unā.] Aenigmaticum hoc pharmacum ipse Galenus sufficienter exponit, & nos etiam quo melius omnia intelligerentur primum ænigmatice uertimus.

Cum althææ siue hibisci radice.] Ita quidem legendum esse hic censeo, græcum exemplar habet, τὴ τῶν ἀλθææ τῶν ἰσίδων ρίζα, ex quibus uerbis ego nullam sententiam eruere possum, substitui itaque pro τῶν ἰσίδων ρίζα corrupto, integrum ἡντιπύρρον ρίζα. Althæam enim & præsertim eius radicem, hibiscum appellari testantur Dioscor. & Aet. 12. cap. 33. Plinius lib. 10. cap. 4. Hibiscum molochoe agrian uocari tradit, Galenus ἀντιπύρρον φαρμάκον althæam uocat. est autem althæa siue hibiscum malug sylvestris species ut iridem Dioscorides & Galenus habet. & mascula malua, itemq; ἀντιπύρρον φαρμάκον à Constant. Cæsare lib. 15. cap. 5. uocatur. Meminit porro hoc loco Galenus locum affectum primum ex linico, lo crudo lini præfricandum esse, deinde etiam althææ siue hibisci radicem affricandam esse, & postea pharmacum præscriptum illinendum. Quod itaque crudum ex lino linteolum dixi, ἀράλινον Galeno appellatur, & à quibusdam sudarium exponitur, erymo ab eo quod humeris circumdatur deducto, id est, ἐκ τοῦ περιπλάτου τοῦ ὑμῶν, & sanè hoc loco nihil uetat tale linteum accipi, sicut nequæ apud Aetium lib. 10. cap. 19. ubi defriciones per linteola ex lino crudo probat. Verum mihi ἀράς uox crudi significatione, hanc uocem ἀράλινον uidelicet, componere uidetur. Nam & crudum lin teolum frictioni cōtente faciendæ commodius esse apparet, quàm econtra quod longo usu demum est & emollitum. Hippocrates certe lib. 2. γυναικείων, quum iubet ποσσὶ ἀράλινον καθίνασθαι, sudarium penicilli loco indere non præcipit, sed penicillum ex crudo lino intortū, qui alias σπύρρον ποσσίδων, id est, linamētum intortum uocatur, uelut alibi ostendi, quomodo usurpat etiam Paulus lib. 6. cap. 5.

Succus is à cisthi foliō decerptus amico.] hoc loco in Rufi uersu uitiōse ὑποκαθάρτης legitur pro κισθῶ. nō enim cisthōs id est, hedera, sed cisthōs quæ alio nomine

mine Lada & Ledon appellat, frutex is est unde capræ & hirci folia decerpentes, barbas ac uillos laterū succo eorū imbuūt, unde postea homines depeccūt quod Ladanum uocatur. Verū in hunc errorem etiam Plinius dilapsus est, qui ob uocum cissi & cisthi uicinītatē, cisthum hunc hederæ speciem existimauit. At uero Ladanum non tantum ex barbīs hircorum depectū, sed alijs etiam modis inde colligi, hic aperte ostendit Galenus: quum dicit non manifestum esse, an hoc solum Ladanum quod ex hircorum barbīs depectitur, in presentem usum adhiberi uelit, & possibile esse per hanc speciem totum Ladani genus designari: Sed tamen nullum certum modum neq; hic, neq; alibi quod sciam, eius colligendi prouidit. Dioscorides certe unum aliquem amplius colligendi Ladani modū præscribit, qui funibus per frutices tractis cōtingit, ut scilicet eo modo agglutinata pinguitudo postea ex ipsis funibus deradatur, quem modum etiam Plinius lib. 12, cap. 17. tradit. Quin & tertium quendam modum eius colligendi Plinius lib. 16, cap. 8. habet, per neruos in arcu lanis circumdatos, atq; id fieri in Syria atq; Africa unde etiam Toxicum appelletur. Toxon enim arcum Græcis significat. Rufus porro apud Erembos populos Ladanum illud prouenire dicit. Sunt autem Erempi Aethiopię populi, qui & Troglodytæ, uroq; simili nominis etymo appellantur, siquidem ἱερμβες ἐξ ἡ ἱερὸν τλῶ ἱερὸν ἱερμβάνης appellatos uolūt, Sicut ἡ γλῶσσά τας ἐξ ἡ λατὰ τας πρῶγλας δίνετα. Ad hoc populos se peruenisse Menelaus apud Homerum 4. Odyss. gloriatur, Ἀθήστας ἱερμβῶν καὶ σκῆρας καὶ ἱερμβῶν. Posidonius apud Strabonem lib. 16, ἱερμβες & ἄρῆες eisdem esse dicit, facta leui nominum commutatione & corruptela, ἱερμβῶν nimirum ἀντὶ ἄρῆων λεγόμενων Galenus lib. 7. simp. pharm. cisthū qui & ladanum, in calidioribus regionibus nasci dicit, non alterius generis ab eo qui in Asia prouenit, sed ob regionis proprietatem, illud discussoriam habere caliditatem, & in hoc ab Asiano differre, quod non solum frigiditatem deposuerit, sed caliditatē assumpserit. Plinius lib. 12, cap. 17. apud Nebatzeros Arabas hoc fieri scripsit, atq; mox uerum Ladanum Cypri insulæ attribuit, quæ sub illius fide relinquo.

Quod Ladonidem Laurū appellet. Ladonidem Laurū appellari Galenus hic nemini dubiū esse dicit. At uero dubiū uideri queat, qua ratione eam appellationē nacta sit laurus, Num à Latona Apollinis matre propterea quod Apollo Daphnen puellam etiam in laurum iam mutatam, ut amicā amauit, ut sic laurus patronymica uoce ab illa appellata sit Ladonis, hoc quidē modo, ut à λατὼ quæ Latona græcis est, primū fiat λατωίδης patronymicum masculinū, Latoides, hoc est, Apollo, & ab hoc λατοίς femininum, Latois, hoc est Daphne, hoc quidem loco, ita ut postea Dorico more, mutato ὄν in α. & τ in δ. interserctōq; i. ex λατωίδης λαδωνίς formetur, quæ uox Latonæ nurū, id est, Daphnen ipsam significet, quæ quia in laurum est mutata, consequenter etiam laurus Ladonis, quem admodum Daphne, græcis appellet. An sit quidē Ladonis uox patronymica? sed non à Latona, uerū ἐξ ἡ λαδωνός, hoc est à Ladone fluuio parente ipsius Daphnēs dedūcta. Ladonis enim fluminis filiam, & non Pencē, pleriq; Græci fabulatores Daphnen faciūt. Sicut quoq; Philostratus & Cōstantinus cæsar lib. 11. cap. 3. de agricult. ἀδῶντος inquit, λαδωνίς ποταμὸν ἱσχυρὰ διγύεται ἐν πρηνεσίῃ. atq; hæc potestior huius appellationis Ladonidis Lauri ratio mihi probatur. Quamquā sint qui Amydæ filiā Daphnen faciūt, uelut Philarchus, & Diodorus Elaites, itemq; Parthenius de amatorijs affectionibus quem nuper græcè ac latinum faciūt à nobis publicauī.

Calliceros autem fœnum græcum. Hippocrates & Theophrastus fœnū græcum à similitudine quadā βένους & βελίους dixerūt, quanquam hac uoce etiam Anagallī

Anagallidem appellari Galenus in Hippocraticis glossis tradat, ex Menerhei auctoritate, qui de pharmacorum appellationibus scripsit: Vocatur autem idem foenum græcum ἀνὰ γαίης & ἀνὰ γαίης. Itemq; ἀνὰ γαίης separata compositione, ab eodem Hippocrate ἀνὰ γαίης ὡς πρὸς πρὸς. Quin & ἀνὰ γαίης idem appellat, quanquam etiam ad aliam quandam herbam hæc appellatio referatur, quam nō nominat Galenus. Ad harum itaq; appellationum similitudinē, is qui hoc pharmacum composuit, & ἀνὰ γαίης conscripsit, idem foenum græcum ἀνὰ γαίης appellauit. Porro in eodem ænigmatico medicamento λυγρὸν pro pro λυγρὸν habet, & ἐκαστὸν πρὸ ἑαυτοῦ dictum esse, satis apertum est ex Galeni interpretatione, ostenduntq; amplius ipsæ uoces. Nam altera canis morum, eodem modo sicut illa pro qua ponitur, canis rubum significat. Altera ab eo quod ἀνὰ γαίης, id est sp̄tis, Herinacei sunt armati, ducta uidetur.

In Caput Secundum de defluio Capillorum.

CEræ similem compagem habet.] Compagem hic diximus quod οὐσία Galenus uocat, & alij consistentiam aut etiam substantiam uertere solent, quidam etiam temperaturam, crassitudinemq; ac cōstitutionem, Nobis compagis uox uidetur propius οὐσία exprimeret, quando sanè οὐσία uerbum compingo & consolisignificat.

Ex contrarijs facultatibus mixtū adtractoria nimirū & eo attractoria.] Supra in Alopecijs medicamēta approbauit quæ adtraherent adtractūq; discerneret, quo nomine thapsiā uel in primis celebrauit, oleaq; Sabinū, uetus, & cicinū: quæ omnia hic improbat, & ab adstringendi siue coactoria uel, oleum hispanū ex oleorum uidelicet germinibus expressum laudat, qd̄ ipsum in Alopecijs damnauit.

Ad ipsam uero cutem præfectos & attonfos habentibus pilos.] Duplex depilandi caput genus hic indicat Galenus, alterū per rasurā, per nouaculam, quod φορδία dicitur, alterum per forficem quod supra pecūinem fieri uulgo hodie dicimus, hoc est, quum ad cutem quis tondetur, ut ait Celsus, & hoc tonsuræ genus hic, ὡς ἔχει λέγεται appellat. Est enim ὡς ἔχει πρὸς τὸν ἑαυτοῦ τὸν χυρτὶ, ut Hesych. exponit. Paulus lib. 2. cap. 43. πρὸς τὸν ἑαυτοῦ διὰ τὴν λευκλήν ὡς ἔχει, id est, primum tonderi caput oportet ad ipsam usq; cutem. Porro tonsuræ species per pecūinem, ut etiam Plautus dixit, non ægrotis tantum adhibetur, quum ob alias causas, tum commoditatis adhibendorum medicamētorum gratia, sed etiam sanis in usu est, à quibusdam pro capitis sanitate inducta, à quibusdā uero decoris ratione assumpta, ab alijs rursus in religionis symbolum instituta, & rursus alijs in stultitiæ significationem illata. Plerisque etiam quo uel maioribus, uel etiam sodalibus gratificentur, admittitur, quæ ratione hodie principum aulae ferè hanc tonsuram in usu habent. Neque noua res est, sic uulgo magnates plebemq; cum Senatu aulico tonsos esse, quū Antoninus Verus Commodi pater ea tonsura usus sit, & in gratiam eius, omnes familiares ipsi medici comam eodem modo totonderint, uelut quarto commentariorum in sextum epidemiorū Hippocratis Galenus annotauit, quo loco etiam hoc addit. Quod quum Lucius medicus Galeni præceptor, ipsos eo nomine insectatus, Mimologos & ridiculos imitatores appellasset, factum esse rursus ut medici eius & ille comam nutrierint.

Quod Rhomæ uocant foliatum.] Foliatum ungentum ex malabathri folio, quod ipsum etiam peculiariter folium appellatur, compositum fuisse atq; appellatum, satis constat ex Dioscoride, quanquā Plin. lib. 8. cap. 1. Nardinum & foliatum idem ungentum appellet. Cuius rei causā ex Dioscoride in Nardino ungento elici potest, ex eo quod nardinum ungentum tum cum folio, tum citra fo-

lium malabathri apparari scribit, & mox de malabathino ungento prodit eadem esse eius spissamēta quæ nardini, nisi quod plus myrrhæ in ipsum addat. Porro spicatum de quo item hic mentionem facit, à spica nardi nominatū, ex eaq; compositum fuisse nemini dubium est. Fuerunt itaq; diuersa ungenta, foliatū ex Malabathro, Nardinum ex optima nardo, & spicatum ex nardi spica, quorū ingentia precia Romæ tempore Galeni fuerunt, sicut etiam apud Plinium uidere est indicatum. Cæterum hoc loco Galenus ungentū nardinum, ter simpliciter nardum uocat, atque id etiam genere foeminino, habetenim *μικτὴν νάρδου τῆς ἀγίας*, quod nos diximus, cum optimo nardino. & mox, *πυκνὸν μετὰ νάρδος*, id est, liquefactio cum nardino. & rursus, *κρῆμα μετὰ μυρρίαν ἢ μετὰ νάρδος*, id est, cum myrteo aut nardino uti: quem modum loquendi etiam Dioscorides usurpauit de nardino ungento loquens, *διώκεται δὲ αὐτῆς λεπτωτέρῃ σφικμά*, &c. & mox, *ὅτι οὐδὲ ἐστὶ κρῆμα γλοιώδες*, id est, liquidum est & non strigmentosum. Nam de ipsa nardo hoc intelligi non potest. Et Tibullus Poeta,

Iamdudum syrio madefactus tempora nardo,

hoc est nardino ungento. & Horatius.

Nardo uina merebere, Nardi paruus onyx eliciet cadum.

Intra Calendas & Idus Iulias.] Hoc tempus, ut quo nondum plenam maturitatem nuces acceperint, sed acerbæ adhuc sint, & præcipue exterior earum cortex, medicamento conficiendo aptum indicat, utiurq; mensis ipsius latina appellatione, temporum uero ipsius mensis distinctiorum græca, quemadmodum adhuc hodie latini in usu habemus, *μετὰ τὸ καλανδῶν ἰδίων καὶ ἰδίων*, inquit. Iulius enim latinum mensis nomen est, Calende uero & Idus græcæ sunt uoces latinis receptæ. At uero quæ medici græci uariarum gentiū appellationes mensibus inditras in usu habeant, & Aegyptijs nominibus Aetius sermonis XII. sine utatur, habeatq; Plinius aliqua eiusmodi externa mensium nomina, uisum est mihi hoc loco sic ferente, aliquarum gentiū nomenclaturas mensibus impositas proferre, quas partim hinc inde in græcis

autoribus, oblatas ipse obseruauit, partim in ue-

tustissimo codice græco citra au-

tem relatas enotaui.

μῦθος ἰταλῶν

αἰδιώτης

πόμπος

δύσος

ξανθήος

ἀρτυμένη

δέσση

πύνημι

λίω

τορπιῶς

ὑπερβόρεται

δύ

ἐπιελῶ

μῦθος αἰγυπῶν

τυβί

μεχίρ

φαρμάκ

φαρμαδί

παχός

παιώ

ὑπέρ

μίσσει

δύ

παιώ

ἀθήρ

χρῆμα

μῦθος ἀθῶν

γαμῶν

ἐλαφβολῶν

μαυχιῶν

δαργυλῶν

συμφερούων

ἡγεμναῖων

μειγαρνῶν

βαστομῶν

μαυμαχταῖων

πυρρῶν

ἀνδρῶν

πρῶτον

μῦθος ἰβηρῶν

νισέρ

ισφ

σπιδναῖ

δαμνί

ἄβ

ἐλῶλ

βόρσι

μορσινῶ

χρῶλῶ

τιβῶ

σαβατ

ἄδισφ

μῦθος μακεδόνων

αἰτόνδρ

ὑφροχρ

ἰχθῶ

λιός

τῶρ

δίδυμι

κρηνῶ

λίω

παρθῶ

ξυός

σκορπί

τξότις

μῦθος κερῶν

ἀφροδύσι

ἀφροδύσι

αἰνῶ

ιοῦ

κρηνῶ

σεβαςός

ἀνκρητρεῖος

δυναρχία

πληντατ

ἀρχιδύς

ἰδί

ξυμῶ

μῦθος βιβυῶν

ἦρι

ἔρμι

μητρῶ

δανύσι

ἡρόκλα

δύ

βυθηαί

ερατεί

ἀφ

ποδύπ

ἡφροδύσι

δυνατῶ

μῦθος κρηναίων

πύξ

μάτα

ξανθή

μῖβ

ἀφροδύσι

ἀφροδύσι

τιβῶ

ἡφροδύσι

οἰνῶ

ἀφροδύσι

ἀφροδύσι

ἀφροδύσι

μῦθος ξυμῶν

ἡφροδύσι

ἡφροδύσι

μάτα

ἀφροδύσι

μάτα

ιοῦ

ἰδί

ἀφροδύσι

σημῶ

οἰνῶ

νομῶ

ἀφροδύσι

Vt inde in grauedinem, ac raucedinem, defluxumq; à capite ad fauces delaberentur.] Tria destillationis genera ex nimia capitis perfrigeratione oboriri solita hoc loco coniungit, quorum primum ad nares delabente humore *κρίζαν* appellat, id est grauedinem, alterum quo ad os humor delabitur, & mox ad asperam arteriam, indeq; ad pulmonem, *βρέχην* uocat, hoc est raucedinem. Et tertium quo item ad os ac fauces defluxus contingit, & mox ad stomachum siue gulam, atq; inde in uentriculum, *κατάρρεον* nominat comuni etiā alijs destillationibus appellatione, ut Galen. de locis affectis amplius docet lib. i. & Aet. serm. 8. cap. 3.

Cū uino maris expette.] Vinum maris expers, id est, *ἐδάλαστος* est cui aqua marina non est ammixta, opponit *παλαεσθίου*, qd' quomodo fieret alibi indicauit.

Vinum aut passum affundito.] In græco est *μίσαν αἶνον ἢ γλυκύν*. Est autē *γλυκύν* peculiare passi nomen apud græcos, quod quomodo & ex qua uua fieret, docere Dioscorides, Columella ac Plinius, neque idem est quod *αἶον γλυκύν*, id est, uinum dulce appellatur. Proinde Plinius aliquoties dulce citra uini adiectionem ipsum passum appellare solet, atq; id Græcorum imitatione.

Quomodo Comptoria ab exornatoria medicinæ parte differat.] Hoc loco Gale. distinguit inter compturā & uerū ornatū, compturā *κομμητοίαν* appellans, quam lenonum ac prauorum hominū esse dicit, ut quæ pulchritudinem a seipso inducere conetur, eamq; medicinæ partem esse negat, neq; bono uiro ac integro medico exercendam, nisi ad regum adeo ac magnorum principum imperium id facere cogatur. Ea etiā apud quasq; laudatissimas gentes semper, uiris præcipue probrosa fuit. A Philippo Macedonum rege Plutarchus tradit quendam capillorum tinctura superbientem, ex ordine iudicum, in quem nuper lectus erat, sermorum esse, hoc apophthegmate insuper à rege prolato, Non sperandā integritatem ab eo in gerendis rebus, qui etiā pilis lucum prætenderet. Ouidius quoque poeta eam compturam in uiris execratur. Sint procul à nobis, inquit, *lūenes* ut scemina compti, Fine colli modico forma uirilis amat. Porro uerum ornatum *ορμητοίαν*, id est, exornatoriā hic uocat, eamq; medicinæ partem esse peti debet, ut quæ naturalem corporis pulchritudinem custodit ac tuetur, neq; quicquā adscititium adducit, additq; uerum ornatū capillorum ac non fucatum, non solum ad pulchritudinem, sed etiam ad ipsarum partium sanitatem conferre. At uero conseruandis tam defluis capillis medicamēta apta *ἀσφυλακτικὰ* appellat. Quæ uero adhibentur antea quàm quicquam mali eiusmodi adsit, in cautionem uidetur licet ne accidant, ea *προφυλακτικὰ* appellat.

Cum acaciæ fructus, hoc est, siliquarū ipsius spinæ appellatarū, decocto.] Acacium in Aegypto nasci spinam arborosam & specie fructicis non rectam Dioscor. lib. i. tradit, huius fructum *βυζάνιον ἐκείνης*, hoc est, siliquas spinæ appellari Galenus hic ait, ad differentiā ut opinor siliquarū arboris ceratonix, quæ simpliciter *βυζάντια* uocantur. Acaciæ itaq; arboris siliquarū ad cōseruandos ac denigrandos pilos usus est, quod etiam Dioscor. de ipsis fatetur. At uero siliquarum arboris ceratonix in cibo usum Galenus improbauit, uirpote quæ sint edulsi mali succi & lignosum atq; ob id agre concessile, & propterea quod non facile secerantur non modice in cōmodant, quare præstiterat, inquit, eas non apportari ad nos ex orientalibus regionibus in quibus nascuntur. Hæ porro siliquæ item *φύλακτικα* appellantur, & uulgo corrupta uoce xylocaracta. Cæterū qd' ad medicinā pertinet ferè nullo in usu sunt hæ siliquæ, soluunt tamen uirides, uirpote humectiores aluum, quæ resiccatae sistunt, & tum quoq; stomacho utiliores esse aiunt, & urinam cientes Dioscorides, maxime eas quæ resecis acinis siue internis granis ipsarū edantur, ita enim existimo legendum, tamen si citra exemplaris uetustioris fidem id non asseuerantius adstruā, nempe pro eo quod habetur in uulgatis exemplaribus

ritus omnibus, τὰ ἐκ τῆς σιμφύλου συντεθιμένα quæ uerba nullâ certâ sententiâ exhibent, τὰ ἐκ τῆς σιμφύλου ἰδιόθιμα, ut sit id quod Plinius lib. 15. cap. 28. dixit: Quum in pluribus semina placeant, in siliqua damnantur. σιμφυλα porro grana eius sicut uinaceos, dici opinor, quanquam etiam solida retrimenta uuæ in torculari expressa, Galenus 2. de alimentis σιμφυλα uocet, & alios radices uuarum ex farmentis enascentes ita appellare tradat. sed σιμφυλα pro oliuarum nucleis siue ossiculis accipiuntur, Constantino Cæsare de agricul. lib. 6. cap. 11. teste, qui sic ait: εὐλόγηται δὲ καὶ ἐν σιμφύλῳ οὗ καὶ οὗτος τομίζον τῆς ἐλαίου μίαν δὲ περὶ τὴν, ἀλλὰ καὶ τὰ τῆς σιμφύλου γίγαστα. Gal. tamen loco iam citato, σιμφυλα quidem oliuarum etiam dici faretur ossicula, sed oleo iam expresso reliqua. Porro quum in solidis silis uuæ retrimentis σιμφύλοις appellatis, tum ipsæ uuæ ollares dictæ ferynantur, uelut alio loco declarauit, tum etiam oliuæ ipsæ componantur, ita ut aut equam exprimatur uicissim in uase cum oliuis reponatur, uelut item Constant. Cæsar lib. 9. de agricul. cap. 11. ait, σιμφυλα πρόσφατα καὶ τὸν ὄξιν περιέχοντα συνέμβεται αὐτῇ ἐγγύῳ τῶν ἐλαίων σιγάλλει, ὅταν πιεῖται. Videtur mihi omnino fieri posse ut eodem planè modo uelut oliuæ, etiam ipsæ siliquæ componantur ac adseruentur, easq; ipsas τὰ ἐκ τῆς σιμφύλου συντεθιμένα Dioscorides appellarit, hoc est, siliquas in retrimentis uuarum cōpositas & adseruatas, atq; hæc sententiâ mihi præ superiore probatur. At uero Hippocrates in lib. πρὸς πεισιν, ubi in cholera & uentris profusio uinum dulce, aut σιμφυλα γλυκύα, sitis leuandæ gratia exhibere iubet, dubios nos facit quid per σιμφυλα dulcia accipere debeamus. Ego tamen σιμφυλα eum dicere arbitror uuarū retrimenta non ad plenâ expressa, quæ uide licet probet in ore tenenda ac exugenda, aut ipsorum decoctū bibendum, quod coeliaci & profusiuus etiā infusum prodesse Diosco. lib. 5. testatur, καὶ δὲ ἀφ' ἑστέ τῆς σιμφύλου, inquit Diosc. συντετακτὸς καὶ τομίζοντος καὶ βίοντος ἀφ' ἑστέ σιγάλλου. Neq; ignoro interpretes eo loco uinaceos uenire, quum tamen de his paulo post subiungat, γίγαστα palam appellans. Quanquam omnino suspicer Hippocratis locum corruptū esse, & pro σιμφυλα γλυκύα legendum esse σιγάλλας γλυκύας existimem, id est, uuas passas dulces. Nam & hæc melius semper haberi possunt quàm σιμφυλα, & sitim mitigant, quū uim cōtemperandi habeant, & oris uentris morbus habetandi, uelut Galen. 2. de alimentis testatur, καὶ ἀποκρῖνον eis semper adesse dicens, de cuius uocis significatione alibi à me dictū est. Hippocratis autem locus sic habet. ὅταν δὲ ὁ ὄξιν, ἢ ὅταν θωχίως χαλῆν λάβῃ, ἢ διέσσεια, τὰ μὲν διασφαίρα συμφύρα ἀφ' ἑστέ σιγάλλου, καὶ ἢ δι' ὄξιν, αὐτοὺς διδοῖναι γλυκύα, ἢ σιμφυλα γλυκύα, &c.

Nardino aut myrteo, aut aliquo alio hedysmate excipe. Hedysmata appellat hic, & sæpe in sequentibus; ungenta per aromatum additionē iucundiora & odoratiora reddita, quanquā in glossis Hippocratis ἀρώματα etiā aromata ipsa appellari Galenus tradat. Quare hedysmata duplici significatione, modo p aromatis, modo pro ungentis odore aromatum imbutis, sunt accipienda. Plinius lib. 11. cap. 1. quum inquit de ungentis, Ratio faciendi duplex, succus & corpus, ille olei generibus ferè constat, hoc odorum, hæc stymmata uocant, illa hedysmata, Videtur olea ipsa in ungentis hedysmata appellare, & aromata siue odores stymmata, id est spissamenta, quod neq; hic, neq; alibi Galenus habet, sed hic ungenta ipsa ut dixi, ex succis siue oleis cōposita, ampliusq; aromatum odoribus, ad uoluptatem uentitū ampliozem, imbuta; hedysmata uocat. Stymmata autem odores siue aromata dici certū est, sed alios quàm qui hedysmata uocantur, quod ipsum ex Dioscoride patet, qui Amaracini compositione, oleum omphacinum & balaninum per xylobalsamum, iuncum rotundum odoratum, & calamū spissari quidem, hoc est σφάσαι tradit, odore aut imbuti, hoc est ἀνόνωδι, per amaracū, costū, amomū, nardum, carpobalsamū, & myrrham, Sed & hottenisia quædam, ab Hippocrate

φύλκι appellata, Galenus Hedyismata exponit in glossis Hippocratis, uelut est Coriandrū, menta, ruta, apium, quæ etiā eumentibus olera insuper addi gravis moris fuisse dicit, hoc est, ὅτι προσθαίκεται μίξη ab olitoribus addebantur. Verba Diosc. hæc sunt. σκευάζονται δὲ διὰ τὴν ἁρφακίαν ἱλαίς καὶ βαλαρίνου σφαρίδιον, συσταλάμα, χίνον, καλάρμα, ἰδωσμάτιον δὲ ἀμαράκον, καὶ σκῆνον, καὶ ἄμαρον, καὶ ῥόδον, καὶ πτελέσῃ καὶ σκῆνον. Et rursus in eandem sententiā in Nardino ugentio inquit. ὥς δὲ πλεὺς ἡ μύστικα τῶν βαλαρίνου ἱλαίῳ ἢ ἁρφακίῳ, πρὸς μὲν τὴν συνίμψιν ἱλαίς χίνον, πρὸς δὲ τὴν ἰδωσιν ἰδωσιν, ἀμαράκον, ῥόδον, σκῆνον, βάλαμον. Hic enim *ιδωσιν* pro *ιδωσιν* dixit. Et rursus in Cinamomino idem apertius dicit. *καμαράκον* δὲ ἔστι ἱλαίς βαλαρίνου καὶ σφαρίδιον συσταλάμα, καλάρμα, χίνον. ἰδωσμάτιον δὲ, *καμαράκον*, βαλαρίνον *καμαράκον*, δὲ. Quare quū & stymmata, & hedyismata certa aromata appellantur, quibus olea in ungentorum apparatu spissantur, & odorata redduntur, uocetq; hic Galenus ungenta ipsa, tum spissantis ipsorum oleis, tum odore imbutis, hedyismata, consideratione dignū uidetur, an ne Plinius simplicia olea hedyismata uocari dixerit, quomodo sanè etiā Galenus pinguedinem & adipem, carnū hedyismata esse dixit, 3. de alimentis, ubi ait, ἡ περιλειπὺς τὸ σῆμα πολλὰν ἰδίωσιν παρὰ τὴν στυμμάτην ἀποκαταλείπει, an potius pro corrupta lectiōe, integra substituēda sit: Hæc partim stymmata uocant, partim hedyismata, ut scilicet particula hæc, odorū genera demonstraret. Id uero minus admissum peccatū confitebitur, qui in eodem capite, duos errores quos neq; ipse Plinius excusare potest, obseruauerit quum inquit: Et è uilissimis hodie est, ob id creditum & id in uetustissimis esse, quod constat oleo myrteo, calamo, cupressu, cypro, lentisco, mali granati cortice. Pro *καμαράκον* enim, id est iunco odorato quadrato, cyprum quæ arbor ligustrum alias uocatur, ex Græco autore unde hæc cōuertit ut apparet, dixit, & pro *χίνον*, id est iunco rotundo odorato, lentiscum uertit, uocū *χίνον* καὶ *χίνον*, similitudine deceptus, ut ex Diosc. in oleo myrteo palam uidere est. Verum sunt in eodem capite plura quorum non est locus hic meminisse, ut cyprū cum cypero etiā alias magnarētū iniuriā confundere solet. Sic oleum cyperi pro cypri lib. 11. cap. 35. habetur.

Diligēter per saccū excolatū in hydriā reconde. *σικκίζω* et *σικκίζω* frequēs est apud Galenū uerbū, hoc est per saccū excolare, utitur enim frequenter in decoctionibus quæ crassiores per cocturā aut tertias ad dimidias redditæ sunt, quo liquidiores euadant, sicut etiā hoc loco. Ob eandem cōmoditatē etiā uina quondam per saccū trans mittebant. Martialis poeta lib. XII. epigr. Et ut liquidum potet Alauda merū, Turbida sollicito trans mittere Cæcuba sacco. Quin & ut uires uini castigarentur & frangerentur, idem faciebant. Plinius lib. 13. cap. 1. Vtilissimū omnibus sacco uiribus fractis, & 14. ca. 11. Quinimo ut plus capiamus, sacco franguntur uires. Martialis poeta colo niuario id etiā fieri solitū indicat in apophoretis. Setinos moneo nostra nūc frange trēntes, Pauperiore mero tingere lina potes. & li. 5. Sextantes Calliste duos infunde falerni, Tu super æstiuas Alcime funde nūes. Hoc enim modō uina bifariā, hoc est tum per colaturā, tum per nūem frangebantur, & quasi castrabantur, ut Plin. lib. 13. cap. 4. ait, nisi saccisq; castigari pro castrati sit legendum. Scribonius Largus contra falernū nō saccatum probat, cap. 12. Porro trans mittebant uina per saccū non solum ut liquidiora & castigatiora redderentur, sed etiā ut peregrinis saporibus in saccum additis, uina tum odore, tum sapore cōmendatiora fierent, atque id est quod Plinius dixit de Aniso: saccis quoq; additur, cū amaris nucibus uina cōmendat, meminit & Constantinus Cæsar lib. 7. de agricultura cap. ultimo. Talia uina hodie præparantur septentrionalibus maxime populis, uulgoq; claretū & Hippocras appellantur. Quondam uero conditorū non dissimilis ualde præparatio fuit, & propomati. de quibus loco ita ferente addam, *προπόματα* itaq; ex uino quondam fiebant, & melle despumato, ita ut in uini sextarios quatuor, unus mellis adderetur, atq; sic

mixtura fiebat citra cocturam, quæ tamen sufficienti tempore insolabatur. *κρηνη* autem appellabant eadem, ubi quædam aromatum species, uelut piper, cinamomum, zingiber, atq; etiã absinthiũ inderentur, quanquã aliquando etiã mel non ammiscabant, uelut pal. lib. 7. cap. 15. Paulus Aegineta ostendit, & Constan. Cæsar libro de agricultura octauo. Hodie tamen eiusmodi species in saccũ induntur, & uinũ superfusum per saccũ excolatur in Clareti cõfectionibus, uelut etiã Plinius fieri dixit. At uerò quia absinthiũ aliquando propomatis & conditis in-
debanur, inde adeo Absinthata etiã sunt appellata eiusmodi portiones, etiã si absinthiũ non reciperent. Sic Actius 9. cap. 16. absinthata aliquot recenset, quæ penitus nihil absinthij in se habent, sed ex uino & melle cõstant, additis aliquot aromatis, itemq; agarico aloeq; ac epithymo, quo uidelicet alio adstrictæ commo-
dent, humoresq; sibi proprios ducãt. Quod si eiusmodi purgatoria medicamen-
ta addita non essent, conditorũ ac propomatũ usus erat in frigidis corporũ tem-
peraturis. Sic Actius 8. cap. 18. in dentiũ dolore ex frigidityte oborto, uinũ exhibere iubet & mulsũ, & quod appellant, inquit, conditũ. Et Paulus lib. 3. His qui ob frigiditytem cibum auersantur uinum uetus dare iubet & conditum. At uero quomodo propomata ac condita absinthata siue absinthiata, uel rosata, uel uiol-
lata sua sponte ex uitibus procedant ac nascent Palladius lib. 3. cap. 31. docet. Sed quidam eo loco, nescio qua animi stupiditate, propomata olei genus esse expo-
nunt. Esse autem eum conditorum usum, ampliusq; latinam appellationem Græ-
cum etiam Palladiæ epigramma testatur, quod sic habet.

*Κρηνὶ πον μὲν δῶ, τὸ δὲ κρηνὶον πῶς ἐχ-
τὴνεται; ἢ φωνῇ διὰ γὰρ ἀδύναμιον
τῆς τῶν κρηνῶν. ὁ συμαίνων δὲ καλῶτα
ἐντὸς αὐτῶν ἐστὶν αὐτῶν συμαίνωντος ὁ δὲ
σκληρὸν αὐτῶν μὲν τοῦτ', ἐν γὰρ κρητὶχον μὲν ῥῆσιν
πῶν συμαίνων κρηνὶ τὸ δὲ λίγιστον ποτα.*

Conditio est mihi opus, conditi nomen at unde est?

Græcorum certe uox peregrina sonis.

An Rhomanorum uox hæc sit, noscere certo

Te scio qui latio es maximus eloquio.

Hoc mihi porrigito, stomachi nam quo premor ingens

Hoc potu morbus mox releuatus abit.

Porro calidis natura, febricitantibus, elephantiosis, itemq; colicis incõmodæ sunt *κρηνηματων* portiones, inuãt tamẽ calculosos. Sic Actius u. ca. 10. γὰρ ὁ κρηνηματων πρὸς φερεν ἐφ' ἧς λῆμα μὲν αὐτῶν κρηνὶ πον δὲ τῶν κρηνηματων ad uesicæ calculum arterendum propinat. Sed & uoluptatis gratia propomata frequẽter bibebãt. At uero quem-
admodũ hæc portiones ex uino & melle, & aromatis conficiebantur, Sic etiam ex
aqua & melle de spumato, incoctis in ipsis rosis, & quibuscũ succis, uelut ompba-
cũ, malorũ punicorũ, & cotoneorum, & myrti baccarũ, uarij usus portiones para-
bant, de quibus omnibus Paulus li. 7. cap. 15. agit & Diosc. li. 5. Nec dissimilis mul-
tum hodie in quibusdam locis potio sit, Hippocras fontis appellata, ex aque fon-
tanæ coctura, cum rōsis & cōriandro, ita ut colatus liquor cinamomo, & alijs si
ita libeat aromatis cõdiliatur, ac Zaccharo dulcoretur. Reliquarum usus ferẽ in-
tercidit, ueluti hydrosorani, hydromeli, Rhodomeli, omphacomelitos, melome-
litos, rhoeti, & aliarum aliarum, eorũq; loco tot syruporum, & aquarum di-
stillatarum innumera moles, ab Arabibus medicis transumpta & inducta est,
quorũ usum magna ex parte explosum esse optandum esset, ut aliquando ad Ga-
leni ac Græcorum medicorum præscripta reuerſi, uera auxilia sequeremur. Hi
enim tales syruporum compositiones, atq; aquarum distillationes penitus non

agnouerūt, non quodd tales excogitare nō potuerint, sed q̄ improbauerint, alias haud dubie de ipsis prodituri. Quid enim suæ naturæ seruare putandū est, in quibus nec sapor, nec odor adeo multus remanet: & quæ maxima ex parte præter fuliginem nihil spirent: quod in rerum decoctionibus non contingit, quarum usum adeo ut potiozem, medici græci prætulerunt.

[Spongiam marinā uistam tritam unam.] Exemplar græcū σφαῖραν θαλασσίαν id est sphaeram marinā habet, atq; ita etiā legit ac uertit interpres uetus, sed quid sit sphaera marina ingenue fateor me nescire, suspicatusq; sum locum uitiatū esse in cuius locū omnino spongiā substituendam aut per sphaeræ uocem (intelligendam adeo esse decerno. Est enim spongia marina uista commoda ad ea quæ destringere & spissare oportet, ut ait Plinius, hoc est, πᾶσι δὲ σμικρὰν ἢ σὺν ψαύτι ut Dioscorides, in quem usum etiā hic apparet assumpta.

Panniculī Cilicij uisti triti Cyath. III.] Habet quidem exemplar Græcum κίον μέλαν & κικανιδίος καὶ πικριμύτης, & interp. uetus Cilicij nigri uisti, sed uelut (u) praecapite primo in Heraclidæ compositionibus ῥέκος κιλίκιον legebatur, ita etiā hic legendum esse uidetur. Quid uero ῥέκος κιλίκιον siue κιλίκις, hoc est; panniculus Cilicij siue uestis Ciliciæ detritæ, mihi esse uideretur, & in quem usum assumi, tum etiā est indicatū. At uero μέλαν, hoc est, atramenti nullius confimilem hic usum esse scio, & hactenus etiā nusquam cōmeminit, neq; μέλαν κιλίκιον me alicubi legisse memini. Indici quidem Atramenti mentionem Plinius facit, sed eius inuentionem sibi inexploratam dicit. Scriptorium ambustis il lini prodidit Dioscorides, de quo dubito an hic locū habere possit, ut scilicet pro μέλαν & κιλίκις, fortassis sit legendum μέλαν & γραφικόν. Aut si adhuc fortius diuinare licet, pro μέλαν & κιλίκιον substituendū fortassis est μέλαν & σπῆλαις, nam huius supra capite primo in Alopecij usum habuit. at uero obstat his omnibus lectionibus, quod addit κικανιδίος καὶ πικριμύτης, quod ipsum de atramentis nullis intelligi posse uidetur, ut quæ simpliciter cum liquore aliquo diluta ilinuntur. Quare rursus ad primā coniecturam reuertendum esse duxi, atq; ῥέκος pro μέλαν & κιλίκις legendum, nisi quis μέλαν & uocem adiectiue dictam de colore Cilicij accipere malit, ut uidelicet Cilicij uox substantiue accipiat, pro sago uel ueste Ciliciæ.

In caput tertium, de tincturis capillorum.

Vocantq; hoc compositum pharmacum pisselæon, hoc est oleum picatum; quod omnino aliud est ab eo quod pissanthos, hoc est flos picis appellatur.] Pisselæon, hoc est oleum picatum uocari in Asia dicit oleum cum liquida pice permixtū, quod ipsum neq; Dioscorides, neq; Paulus, neq; Plinius, ubi de Pisselæo agunt, uolunt: sed pisselæon seu oleum picinum uocant id quod in pice liquida serosum superstat, & quod dum pice coquitur, pura supratensa lana excipitur ex sublato uapore. Verum hoc ipsum Galenus hic ad superioris differentiā, nō pisselæon uocari dicit, sed pissanthos, hoc est picis florē, & Paulus lib. III. ca. 74. δερρόπισσαυ idem appellat, hoc est picis serum. Scribonius autē Largus cap. 46. ait picis florem quod pisselæon appellant. Sic etiā Marcellus cap. 9. Galenus infra cap. 6. huius operis extra compositionem πῖκος ἢ γὰρ δερρόν dixit. Sic etiā Aetius 6. cap. 69. δύνειν inquit ἀπὸ τοῦ καὶ πικρὸς καὶ ἀλῆος λίαντος καὶ πῖκος δὲ μίξας ἐπὶ χυμῷ, id est, sulphur uiuum & staphidem siluestrem terito, & picis sero permixta ilinito. Interpres tamen Italus qui nobis hac parte uertenda successit, cum sero lactis & pice miscenda esse, falso conuertit.

Aliquando quidē in stupore attonitū, aut comitalē, &c. Recenset quæ mala mulierculis ex pharmacorū nimis adstringentiū usu oboriānt, inter quæ stuporē attonitū, et comitalē, græcis ἀποπληξία καὶ ἐπληξία appellatos morbos notos, deinde ueternū & soporē profundiorē & mētis apprehensionē, qui Græcis sunt

κατὰφροσύνη

καταφορά, κάρθ & πρῶτα κλεις. Qui omnes morbi à crasso frigido humore circa cerebrum densato oboriuntur, & sopor altior in eis plus aut minus occupat, ut Gal. lib. 3. Metho. his uerbis tradit: quod si uero humor ipse putrefcat, indeq; ferbris oritur, morbus ipse non amplius his nominibus, sed lethargus appellatur, sed audiamus Galenum. ἐπιγῆραι καὶ τῶν καὶ δερμῶναι προσκίτῃ τὸ πᾶνος τῷ λυγρῶτος χυμῷ, ὅστις ἐννυ μὲν τῷ σῶματι, κατὰφορὰς βαθείας ἐργάζεται, χωρὶς πυρετῶν, ὡς ἐνομαζομένη ἀρεπληξία & κάρθς καὶ κατὰφῶς. αὐτὸ δὲ καὶ αἰσιντοῖ ποτε, μετὰ πυρετῶν γίνεταί τε σπασμῶτα, καὶ κατὰφῶς τὸ πᾶνος νόσους ἀναγῶν. Ex quibus uerbis apparet κατὰφῶς uelut genus quoddam horum omnium malorum esse, utpote quum in ἀρεπληξία τε καὶ κάρθς καὶ κατὰφῶς sopor altior inuadat, & mens ipsa percellatur, unde etiam appellationes ipsæ sunt impositæ. Significat enim κατὰφῶς in somnum delationem, κάρθς uero à capite ducta appellatione, capitis percussione, κατὰφῶς autem mentis siue animi apprehensionem, sicut quoq; κατὰφῶς atq; κατὰφῶς de retentionem & occupationem tum mentis, tum corporis sensu ac motu priuari, atque idem ea corporis figura ægris permanentibus in qua fuerint correpti, siue sederint aut iacuerint, atq; hoc siue apertis siue clausis oculis per somnum acciderit, ut Paulus lib. 3. cap. 10. ait Qua significatione etiā ἀρεπληξία & ἀπληξία dicuntur: Nimirum quod mens & corpus corripiantur atq; feriantur. Quin & κῶμα κατὰφῶς species est, nisi quod aliquando κῶμα cum uigilijs occupat in phrenitide, si biliosus exuperat humor, & tunc ἀγρυπνῶν κῶμα uocatur; aliquando autem cum sopore & cataphora graui, si humor fuerit pituitosus, atq; tum κῶμα plane idem est quod κατὰφῶς & κατὰφῶς, ut Paulus quoq; Aegineta lib. 3. cap. 6. his uerbis tradit. αὐτὸ δὲ καὶ φλεγματικὸς χυμὸς ἀναμειχρῶς τῷ χολώδι, καθάπερ τὴν ἀέτιαν, ὅταν & τὴν ἐνομασίαν κίτταται σπασμῶν. ἀγρυπνῶν γὰρ κῶμα προεργαζομένη κατὰφῶς μὲν χολώδης καὶ παρὰ τῶν χυμῶν φρενιτῶν γὰρ οἱ ποτε τοὶ ἀγρυπνῶντες. τὸ δὲ αὖ φλεγματικὸς, καὶ μετὰ τῶν πῶν κατὰφῶς γίνεταί. αὐτὸ δὲ παλαιότερον γὰρ γαλανὸν κατὰφῶς τῶν προσηρόν τὸ πᾶνος, κατὰφῶς δὲ & κατὰφῶς αἰνῶν. Porro nos latini quum in his morbis explicandis pauperiem nostram necessario consueamur, Veterini & somni altioris, ac soporis nomine, ferè omnia hæc (præter stuporem attonitum, & Comitialem) mala appellamus. Distinctionem tamen inter somnum & soporem obseruauit Plinius lib. 11. cap. 18. Huius semine, inquit: somnū allici, sed modum seruandum ne sopor fiat. Quomodo Gal. de semine papaueris ait, ὅπῃ κῶμα δύναι, αὐτὸ δὲ καὶ πᾶνος ἀφῶν, καὶ κατὰφορῶν. Cæterum de differentia horum omnium morborū agit Galen. lib. 4. de locis affectis.

Aliqui periculū minus lubeat: utpote quū à minore causa lædantur: quæ frigidum temperamentū habet. Frigidi temperamenti mulierculas minus lædūt à frigidiorū & adstringentiū medicamentorū usu, ex Hippocratis autoritate, aut potius cōmuni & uniuersali ratione per Hippocrate pronuntiata probat. Quanquam contra Diodes & quidā alij medici senserint, Nimirū per similia morbos magis exacerbant, per cōtraria uero solui tradentes, ex eadem Hippocratis autoritate, itemq; rationibus quas cōstat Galenus in eius Aphorismi expositione, si quis longiorē eius sententiæ enarrationem legere desideret, 1. parti, aphorismo, 34.

Quanquam nondum tantæ delictæ scēminas occuparāt quantæ nunc sunt. Apparet ex hoc loco artem cōpōrtiam non multis annis ante Galenū ita cōmūnem Romæ fuisse, & sub ipsum adeo Cæsarum tempus cōepisse. Sub Augusto enim Cleōpatra & Heracles Tarenūnus uixerunt, qui primi de ea scripserūt, iam tum Romana grauitate paulatim pessum eunte, & moribus græcis inualecentibus, Nā Artemidorus de his tradit, ὅτι καὶ ἀλλοτρίους βασιλεῖς αὐτὸν γινώσκοντες χροῖσται lib. 1. cap. 19. de som. interpret. Inualuitq; is mos, adeo ut sub ipsam Vespasiano rum & Domitianī ætatem plerique omnes uiri & scēminæ comæ studio fuerint occupati

occupari, & ut Martialis poeta testatur, nō capilli tantū in feci sunt cuiq; sui, sed etiā peregrini ac repositicij in delicijs fuere, varijs coloribus imbuti, qui mos foeminae etiā hodie in urbibus quibusdam Gallicis & ad Oceanū magnum durat, ad eiusmodi computræ fucum, non unum aliquod capillitij genus, sed multa uarietate tincta reposita habentibus. Porro inter reliqua medicamenta flauedinem & crispitudinem pilis cōciliantia, etiā succus Carpasi illinendus habetur, de quo nobis alio relatum est loco.

Primi libri Critonis de ornatu capita.] Nudos tantum titulos rerum de quibus tractauit Crito, hic Galenus proponit, ut eo facilius quis ex his uelut indice singula in ipsius autoris libris tradita inuenire queat. Cæterum hi libri nobis in totum perierunt, ut si cui opus sit talibus uti, frustra Critonem requirat. Ex Oribasio itaq; & Aetio ac Paulo petendā sunt quæ his titulis indicantur. Porro in his capitibus pauca tantum circa lectionem dubia indicabo, uelut est quod primo libro Illitiones ex Stibio cum habere dicit, quas Græcis uerbis *σιμίοματις* ἰχθυῶν appellat, si modo uera est hæc lectio. Nam uetus interpres de his penitus siluit. Libro autem secundo caput inesse dicit, quod habeat conspersiones aromaticas uestium, hoc est, *καταπασματὰ ἀρωματικά πρὸς ἱματίους*, ut quidem ego legendū puto, sed exemplar Græcum *καταπασματὰ* habet, quorum forma uestibus conuenire minime uidetur. *καταπασματὰ* uero ex sicco aromatum puluere conflata, commodum inspergendi usum exhibent, uelut etiā quæ *καταπαστὴ* uocantur, de quibus alibi dixi. Quarto deinde libro titulū fuisse indicat, ad Apellas, quos Græci *λαποδάρκεις* appellauit, quibus uidelicet præputiū ex morbo, uel sectio ne deest, uelut Iudæis qui inde Recuti & Apellæ latinis uocantur. Reliqua alijs locis commodius explicabuntur.

In Caput quartum.

Quædam ex eis propriè psilothra appellantur.] Ex triplici differentia medicamentorum pilos corruptentium, prima psilothra appellari dicit, hoc est, depilatoria & pilos denutiantia uocabulo etiā lauinis medicis recepto. neq; certum quoddam unguentū generis est psilothrum appellatum, ut quidam existimauerunt, uerum quæcunq; medicamenta illij siue affricta pilos denudant psilothra dicuntur. Plinius lib. 24. cap. 9. Amerinæ nigrae semē cū spuma argenti pari pondere, a balneo illitum psilothrum est. Et lib. 26. cap. ultimum sine psilothrū nos quidem in muliebribus medicamentis tractamus, uerum etiā uiris in usu est. Efflicatissimum autem habetur Archezostis. Altera deinde Attenuatoria uocat, eiusdem generis cum illis, secundum magis & minus tantū inter se differentia. Tertij quorum usus est periculosus, Capillos extirpanda nominat, sed de his clarū nō docet Galenus quā uel me longius agere sit opus.

Et ob id similes non absumiles existunt.] Græcum exemplar habet, *ὅμοιοι τῷ φαινομένῳ, ὁμοίως*, hoc est, & ob id potēti apparēt, ut scilicet de uiris intelligat, nos tamen ad capilli reculimus, nihil uariante sentētia. Verū uetus interpres nō uidetur, sed *ὁμοίως* legisse uidetur. Veritē, Et prōinde Nemorales apparent. Nimirū eorū quæ erodentē & uistoriā habent facultatē.] Erodentē facultatē diximus quā græci *ὀνιφθαί*, quā uocē ut latinā etiā Plin. usurpauit li. 27. cap. 12. de Mybostij, uis ei septica & exulceratrix, ideoq; Aegilopas sanat, & lib. 34. cap. ultimo de Sandaracha. Summā eius dos septica. Vistoriam autem appellauimus *ὠιστορίαν* quā item Plinius Causticā uocat, ut eodem libro & capite de Arsernico. Itaq; & Causticis additur & psilothris.

Ex liquidis igitur est lixiuū tali us præditū.] Lixiuum quod hic *λοιμὸν σκωρὸν* uocat, ex lotio & excolatio cinere fit, aqua uidelicet infusa perstillante, unde & *σκωρὸν* appellatur. Cinerem autem siue *σέπρον* appellant Græci quicquid exu-

his corporibus relinquitur, siue hæc sunt lapidū, siue arborum, siue animalium partes. Quare omne lixiuū eius cineris cuius lotura est, natura madipiscitur. Vnde sanè quum non unum temperamentū omnis cinis habeat, neq; etiam lixiuū habebit, ut merito à Galeno reprehensus Dioscor. uideatur, qui omni lixiuū adstringentē naturam tribuit, quum non omnis cinis hanc naturā habeat, ut Galen. lib. 2. simp. pharm. docet. Cæterum hoc loco simpliciter & indeterminatē de lixiuio liquido loquitur quod depilandis corporis partibus conueniat, utpotē quod uitoriū habeat caliditatē, & ob substantiam tenuium partium existentem, quā ab uisura ipsius cineris fuligine cōtraxit, citra dolorem urat. At uero lixiuū siue lixiuū (Nam utroq; genere dicitur) uaria genera & nomina sunt, tum græcis tum latinis usurpata, ea ipsa breuiter explicabo. *κρηνη* itaq; *σπερμα*, quæ etiam *κρηνη σπερμα*, & *σπερμα* simpliciter appellatur, est lixiuū liquidū, uelut etiā hic accipitur, ut dixi, ex quocunq; cinere factū, Nam de ficulneo cinere lixiuū, Aetius serm. 12. cap. 27. *σπερμα* appellat. At uero id lixiuū in quod parandum calx ad cinerem alium quēcunq; additur, peculiariter *σπερμα σπερμα* dicitur, ut Paulus lib. 7. tradit. fortissimum autem lixiuū cōsetur quod ex sola calce paratur. Eadem autem quæ *σπερμα*, etiam *κρηνη*, id est lixiuū excolatū appellatur. Quin & *κρηνη σπερμα* τῶν πελοποννησίων, nihil aliud est quam lixiuū liquidū, cui τῶν πελοποννησίων ob id adiectū, quod sigulis in usu sit, ut Galen. 6. Methodi opere dicit. *μυστῆ* inquit: *ὅτι τῶν πελοποννησίων φάρμακον ἔχον ἄριστα νοσήσιν σπερμα*, *καταδὸς ἰκταρίων* & *κρηνη* *σπερμα*. Hoc est quum nullum medicamentū ad manū haberem, petiui lixiuū liquidū, ubi uidissem sigulū agro uicinū. atq; hoc est etiam quod Dioscor. lib. 6. de lacte coagulato *κρηνη σπερμα* dixit, maximo omniū interpretū tormento. Idem etiam Paulus lib. 3. cap. 2. habet, & rursus lib. 5. cap. 35. atq; alijs multis locis. Idem quoq; lixiuū infra sine 10. lib. huius operis *κρηνη σπερμα* uocat, Item 6. *κατὰ γῆν*, & sepe alias, Galeno, Aetio, Pauloq; hæc appellatio in usu est, ut nō sit opus plura exēpla producere. Neq; alia est *σπερμα* & *κρηνη* Aetio lib. 12. cap. 42. dicta quā *κρηνη* Galeno uocata. At uero *σπερμα σπερμα* κρηνη apud Paul. 6. cap. 9. uidetur esse lixiuū quod Saponarij in usu existit, uel certe quod cum sapone in usum uenit. quanq; Saponarij terram uulgo appellant *creta* tam timolā dictam. Porro quum *κρηνη* itemq; *σπερμα* uoces, etiam calcem ipsam significant, quam hoc loco paulo post *κρηνη* *καταδὸς* *βασει*, hoc est, uiuā & non extinctam uocat, ut quæ etiam priuatim *κατὰ γῆν* appelletur. Non infrequens est hic error, ut qui græca legunt ac uertunt, modo *κρηνη* itemq; *σπερμα* cū calcē significant, lixiuū accipiunt ac uertunt, modo quum lixiuū indicant, calcem interpretantur. Nolo aliorum erroribus coaceruandis horum commentariorum nostrorum paginas explere, sed quod hac parte necessarium est indicare nō preteribo. Vetus Interpres in his quæ sequuntur psilodris Critonis, tam *κρηνη*, id est, calcem, lixiuū uertit, tam *κατὰ γῆν* itidem calcem significantem, similiter lixiuū de calce dixit. Velut exempli gratia, In secunda compositione ubi habetur. Quod si uero tenuis capillus enascens subeat calcem coquito, id est, *κρηνη*. Vetus Interpres lixiuū coquito uertit, quum tamen antea nulla mentio lixiui facta sit, sed calcem quam prius *κατὰ γῆν* dixerat, nunc *κρηνη* appellat. Rursus compositione psilodri ulmi. Calcis uiuæ, id est, *κατὰ γῆν* sextarii unum legitur, ubi idem Interpres lixiuū de calce uertit. Quamquam leue fortassis peccatum hoc uidebitur, quando tum calx, tum lixiuū, corporis partes depilant: attamen rerum facies pereat, si liquidum pro arido sumatur, ut quid enim opus fuerat addere, Trita ac leuigata reponito, usus uero tempore in aqua dilutis uitor, si pro calce uiuā & arida, lixiuū fuisset sumendum.

Paulus certe lib. 3. cap. 52. ubi de ῥῖδῃ pharmacia tradit pro calce uina copulatim ῥοβίς ῥοβίς bis dixit. quod autem non sit per ῥοβίς ῥοβίς lixiuum ex calce, sed calx ipsa accipienda, Indicat id quod ipsam in aqua unā cum cimolia & arsenico coquere iubet, Aqua enim non fuisset opus, si lixiuum erat accipiendum, nisi quis aquam in aqua coquere uelit. Est enim hoc loco ῥοβίς substantiuū calcis significatione, cui adiectiuam uocem ῥοβίς adiecit, inextinctam significantem. Neq. enim accipiendum est ῥοβίς ῥοβίς cum dicere, utraq. uoce substantia, quibus utiq. lixiuum calcis significaretur. Cæterum latini scriptores ipsum lixiuium raro simplici appellatione proferunt, sed omnes ut plurimum cinerem lixiuium dicunt. Columella lib. 12. cap. 22. picis liquidæ Nemeturicę metretam adde in labrum aut in alueum, & in eodem infundito cineris lixiuiæ congios duos. Plinius 14. cap. 20. Cato iubet uina concinnari (hoc enim utitur uerbo) cineris lixiuij cum defruto cocti parte quadragesima. His tamen locis declarandi gratia cineris uox aiecta uideri potest, ut uidelicet non ex alia re quā ē cinere lixiuium accipiamus, quomodo etiam. cap. 16. lib. 12. Columel. dixit, præparatam lixiuiam cineris sarmenti calefieri conuenit. & paulo post. Sunt qui culmos fabæ exurant, & ex eo quod eremauerint cinere lixiuiam faciunt. quanquam paulo post hos locos, itemq. superiorem, lixiuiam simpliciter sine cineris additamento protulit. At uero Plinius quā inquit lib. 15. cap. 17. Quidam ut has faciant, in cinere lixiui tingunt protinus quā detraxere uitibus. Et lib. 28. cap. 18. Canum scabies sanantur bubulo sanguine recenti, iterumq. cum inarescat illito, & postero die abluto cinere lixiui. Videtur plane cinerem lixiuium copulatim pro lixiui dixisse. Sed & idem Plin. lib. 23. cap. 7. palam ex Dioscoride, uel inde unde etiam Dioscorides accepit, transtulit, lixiuium simpliciter cinerem haud scio quā bene appellādo. Cinis, inquit, non ex alia arbore acrior, purgat, cōglutinat, replet, adstringit &c. Quæ uerba Dioscorides lib. 1. de lixiui siculneo liquido, & non cinere ipso habet, ῥοβίς ῥοβίς inquit, ῥοβίς ῥοβίς, ῥοβίς ῥοβίς, ῥοβίς ῥοβίς &c. Et lib. 36. cap. 27. ex Varronis uerbis. Lix cinis est inquit: foci, Inde enim cinis luxatis potus medetur. Quo loco rursus cinerem foci qui Lix appellatur, luxatis potū mederi ait. At uero quomodo cinis potari possit si nō liquor ammiscetur, de quo quum siluit, certum est non cinerem, sed ipsum liquidum lixiuium luxatis potandū esse, quod Diosc. etiam ait, ῥοβίς ῥοβίς ῥοβίς ῥοβίς, ῥοβίς ῥοβίς, ῥοβίς ῥοβίς. Et lib. 20. cap. 17. de origano. Venena opij extinguit decoctū si cum cinete & uino bibatur. Id quod Diosc. ita dixit, ῥοβίς ῥοβίς ῥοβίς ῥοβίς ῥοβίς ῥοβίς ῥοβίς ῥοβίς ῥοβίς ῥοβίς. Et origanum aut thymum cum lixiui, aut aceto, aut passō. Plinius itaq. lixiuium id est ῥοβίς, cinerem simpliciter dixit. Sed & Columella lib. 12. cap. 22. postquam dixit cineris lixiuiū, & mox lixiuiū simpliciter, paulo post subdit. Cinis aut odorem picis aufert, & eluit spurcitiam, palam cineris uocem pro lixiui usurpans. Quare ex his locis apparet latinos quod nos hodie lixiuium dicimus, aliquando quidem lixiuium simpliciter dixisse, aliquando uero cinerem lixiuium appellasse, & aliquando cinerem tantū, satis dubijs uocibus an cinis ipse, uel lotura eius ab eis indicetur. Neq. enim ignorantia rei insimulare Plinium audeamus, quod cinerem pro lixiui dixit, ex eo quod ῥοβίς græcis tum cinis, tum lotura eius, hoc est, lixiuiū appelletur. Nam Columella ad cinerem respexisse uideri potest, ex quo dixit lixiuium parauim. Scribonij quoq. Largi libellus latinus cinerem lixiuiū, pro simplici lixiui multa locis habet. cap. 228. Hæc terere oportet ex cinere lixiui ex caprisco uel sarmentis, donec leuia passi habeant temperamentum. & cap. 230. Teruntur ex cinere lixiui, qua culinarij utuntur. Hic culinarij uocem adiecit, sicut græci πῦρ πῦρ πῦρ, nisi forte etiam hic pro culinarij, singulari sit legendum, aut coactuarij, uelut

uelut Marcellus cap. 14. in medicamento caustico, lixiuuium unde operantur coaciliarij habet, Videtur enim τὰς πωλοποιίας, id est, lutifigulos, coaciliarios appellasse. Et 232. Intestinum extremum quibus prolabitur & excidit, quoties prodierit utino calido, uel uerbenis, uel cinere lixiuuii lauare oportet & reponere. & paulo post nō solum lixiuuium, sed etiam lixiuuij cinerem in eundem usum probat his uerbis. Facit & cinis ex sarmentis cristrata adpersa. Utitur tamen aliquando lixiuuij uocē simplicī ut capite 182. Adiuuari autem debent qui his malis uexantur lixiuuiū ē cinere sarmentorum. Constantinus porro Cēsar lib. 10. cap. 29. κοινὰ βαλανεοποιῶν, id est, lixiuuium balnearum, probat ad punicarū arborum rigationem, atq; hæc quidem de lixiuuiorum appellationibus, hæcenus.

Quando aut picatione opus habet totum corpus. Ob picationem commodius in partibus pilosis faciendam, depilationem necessariam esse dicit, quā quum quidam per nouacula fieri non sustinet, per pharmaca depilatoria necessario contingit. Cæterum Picatio ipsa quam πικασιον appellat aliquando toti corpori iuxta Medicinæ rationem adhibetur, aliquando certis partibus. Nimirum ut exenatae reficiantur. Humectat enim calfacit, ac sanguinis copiam allicit, quo fit ut ad reparandam carnem, hoc est, ἐκ σάρκωσιν, ut Galen. lib. 14. Meth. ait, optimum pharmacum censeatur. Quo uero modo fieri, & quamdiu adherere picationem oporteat ibidem Galen. docet atq; amplius Aet. serm. 9. cap. 36.

Aut quando pharmacum Emplaston, hoc est quod meatus obducit, imponere uelimus. Ad Emplastri medicamenti impositionem depilatione locorum itidem opus esse ait Galen. Nimirum ut uis Emplastrici medicamenti minus impedire operationem suam perficiat. Sunt autē ἐμπλαστὰ quæ & ἐμπλαστικά quæ meatus corporum obstruunt & obducunt medicamēta, carentq; talia necessario omni acrimonia & mordacitate, atq; habent naturam terream, aut omnino uiscosam & tenacem, uelut sunt amyllum, pompholyx, cerusa, calx, alica, cimolia creta; & multa alia, ut 4. & 5. simp. pharm. Galenus docet. Eadem autem etiam ἐμψρακτικά appellantur, eisq; opposita sunt quæ ἐκφρακτικά & ἐκκαθαρτικά πόνειρ dicuntur.

Terræ quæ Romanis Selinusia appellatur. Terrā Selinusiā Romanis uel latinis uoce acceptū lara uocari ait, tanq; greci hanc appellationem nō habeant, aut tanq; nos non ab illis, sed illi à nobis hanc uocē mutuarint, hoc est enim quod dicit, γὰρ τὴν Λαλαμυθίαν ῥωμαῖοὶ σελινουσίας. Verum mihi quidem hæc appellatio speciei cuiusdam terræ, patrio nomine Selinusia, tum græcis, tum latinis indita uidetur, uelut etiam triticum Selinusium Plinius lib. 18. cap. 7. habet. Porro uires ejus extensoriæ sunt, unde & cutem erugat ac nitidā reddit, qua gratia etiam hic medicamenti depilatorijs componendis additur.

Ac oleo quod insulsum appellatur. Ita quidem exemplar græcū habet, hoc est, ἰλαῖον τὸ τὸ ἀνάλου καλαμυθίης, atque ita etiam legit uetus Interpres. uidetur autem hoc oleum uelut materiam indicare qua reliqua excepta contemperentur, si modo uera est hæc lectio, quæ etiā asterisco adscripto est suspecta. Cum sale autem olea preparari solita supra capite primo ostendi ad eorum conseruationem. Et ut Plin. 13. cap. 1. inquit, Sal adpersus olei naturam coerces. Cæterum ut suspicionem meam indicem: quū hoc loco lachrymæ uitis & hederae ac bryoniæ meminisset, suspicatus sum etiā hic lachrymæ eum mentionē facere, & nō ἰλαῖον τὸ τὸ ἀνάλου καλαμυθίης legendū esse, sed ἰλαῖον τὸ τὸ ἀγρίας καλαμυθίης, id est, olei syluestris appellatæ, ut scilicet lachryma ejus oleæ intelligat, cōsequentia uerborū ita ferente. Lachryma autem olei syluestris ἀγκυμύρ, id est, mordax pharmacū, lichenas ac lepras sanare à Dioscor. lib. 1. scribit, ut etiā hic sicut reliquæ lachrymæ pilos disperdēdi uim habere possit, Verū nihil affirmo, suspicionem meā cælare iniquū duxi.

In uas fictile non picatum coniecta coquito.] Vas fictile non picatum hoc loco Galenus ἀργύρου λευκαίου ἀρόνην dixit. Est autem ἀρόνην idem quod ἀρόνη τέρας, id est, nulla calce illitū, neq; ullo aliquo tectorio obductum. Nam à picis obli-
tione, picatorum & non picatorū fictilium appellatio facta est latinis, sicut à calce
græcis. quantū etiam ipse Dioscor. lib. 1. de fuligine resine, ἀρόνην τὸ τίς ἐστιν ἀρόνη
ἐστίν, exponat. Plin. lib. 29. cap. 4. de cantharidibus. Conducuntur in calice fictili non
picato, quo loco Dioscor. lib. 2. ἀρβαλὸν ὡς ἀρόνην ἀργύρου habet. At uero lib. 31.
cap. 6. de Thalassomelite ubi inquit, fictilίς uase & picato conducunt, Ibi Dioscor.
lib. 5. non κικρυμιένου quod τὸ ἀρόνην opponitur habet, sed πικροκυμένου, ap-
pellatione etiam ab ipsa illita pice deriuata. Quare autem uasa modo picata, mo-
do non picata in usum assumantur, facile indicant res ipsæ quæ in eis conducuntur
ac seruantur. ἀρόνη enim & non picata facile humorē & liquorē inditum in
se combibunt, & ob id aridis condendis aptiora uidentur, quàm quæ sunt picata.
Sed & in picem aromatis ac odoribus additis uasa bene olida redduntur.

In caput v. quæ pilos attenuant.

Nitrum ustum & Nitri spumâ, & aphrolitū spum osum.] Hoc loco rursus
ἀφρολίθου pro ἀφρολίθου legebatur, quod uisū quomodo in plerisq; Gale-
nialiorumq; medicorum græcorum locis inoleuisset, supra. cap. 1. ostendi.

Faciunt item Nigra appellata uasa Alexandriotica.] Vasa Alexandrina quæ
hic Nigra, id est, μίλανα Galenus uocari dicit, tusa & creta pilos attenuare, uel ob
hoc credere par est, quod per uisurā, extergendi uim fortē sint ad epta, quemad-
modum etiam reliquæ fictiliū uasorū ac clibanorū testæ. Cæterum ego uehemen-
ter dubito an sit hæc lectio uera, quod scilicet uasa Alexandrina, μίλανα, id est ni-
gra, priuatim appellētur, maxime quum in ueteri interprete, hæc uox corrupte,
ut pleraq; omnia, Calaina legatur. Quare suspicor omnino uitiatā lectionem, &
non τὴν μίλανα κλιβαῖνα σελίς τὴν κλιβαῖνα κλιβαῖνα recte legi, sed aut τὴν κλιβαῖνὴν
κλιβαῖνα legendum, ut accipiantur ex Callai lapide facta, Nam pretiosa fuisse
indicat id, quod pro pauperibus alia fictilia utenda demonstrat, Sed & testæ Cal-
lainæ tostæ trixæ infra lib. 5. ad dentes denigratos densifriciorū loco probantur.
aut certe τὴν κλιβαῖνὴν legendū, atq; accipiendū simpliciter lapidea uasa, utpote quæ
κλιβαῖνα à uoce κλίρ lapidē significante denominantur. Apud Aetii 6. cap. 65. hoc
loco τὴν κλιβαῖνὴν ἀρακὰ adhuc corruptius quàm hic leguntur, sed tamen ut κλιβα-
νὴ ex κλιβαῖνὴ uoce corrupta uideri queant. At uero Clibanorū testas dixi eorū
instrumentorū fictiliū in quibus aliquid sub textu coquitur & torretur, Ea enim
instrumenta κλιβαῖνοι appellantur, quantū etiam ex ære aut alia materia fieri possunt.
& panis qui in eis coquitur κλιβαῖνους uocatur. Neq; recte interpretantur
qui Clibanigen panē furnaceū dicunt, quū hic κλίβανος proprie uocetur & illo de-
terior habeatur. Aetius serm. 9. cap. 30. ἀπὸ πύου ἔσω μὲν φέρει μὲν κλιβαῖνους
κλιβαῖνους, ἀπὸ μὲν κλίβανος, hoc est, uelut nos in uersione eius diximus. Panis
neq; sit aridus, neq; calidus, in clibano coctus, aut si is non adsit, in furno. Hanc au-
tem inter Clibanū ac furnum differentiam etiam Plin. obseruauit lib. 20. cap. 9. de
Scylla loquens. Coquitur pluribus modis in olla quæ conijciatur in Clibanū aut
furnū. & Columella 12. cap. 15. & oblita uasa clibano uel furno torrefaciunt. Item
Cōstant. Cæsar lib. 4. cap. 31. Galen. lib. 1. de antidotis, in pastillis Theriacis. τὸ
κλίβανος ἀρρακὴ τὴν ὡς κλιβαῖνὴν ἀρρακὴν ὁ ἀρρακὴν κλιβαῖνους, ὡς κλίβανους. Quare ostē-
uo Methodi quum ait, κλίβανος δὲ ὁ κλιβαῖνους τὸ ἀρρακὴν ἀρρακὴν ἰσομα. non de pa-
nibus in furno coctis accipiendū est, uelut Linacæ reddidit, sed de his qui sub Cli-
bani textu coquuntur. Verum ut huius differentia certā cognitionē ex ipso Ga-
leno habeamus, eius uerba ex primo de alimentis adscribemus. κλίβανος μὲν αἰνός
ἀνὴρ

είσιν οὐ λελιθάνει, καὶ ἐν ἄλλῃ σφύρα, ἀπὸ τῆς αἰτίας τῆς καὶ παρασκευασμένης πρὸς τὴν ἔσφαρ. Ἐπεὶ δὲ αὐτὴ εἰς τὴν, ἡ αὐτὴν ἐργασίαν διπλασιάζει τὴν αἰτίαν. ἵνα δὲ οὐ ἀμείνως ἔσφαρται πρὸς αὐτὴν διὰ τοῦ πῦρ λελιθάνεται, ὅρα τὸ αὐτὸ ἐκλάσσει. Idē πρὸς ἀλγυμια sentit.

Aristolochias, canchry.] Canchry uidetur hic dicere Rosmarini semē, Nam hoc secandi ac extergendi uim habere Galen. 7. simp. phar. tradit, & ob id sine gmatīs ammisceri Dioscor. etiam prodidit. At uero κέχρυ, quod sine. r. pleriq; scribunt, & multis arboribus innascit autore Theophrasto, id ipsum pilulā Plin. dixit, in medicina urendi uim habentē, hic nullus usus esse uidetur, Sicut neque κέχρυ ordeī torrefacti significatione, locum hic habere possunt πρὸς κέχρυ enim plurali maxime numero, Hippocrates πρὸς κέχρυ γὰρ λέγει appellat, ut Galenus in glossis ipsius exponit. Et Strabo libro 15. usurpat πρὸς δὲ κέχρυ. Inquit, παρὶ ἀποπαρείσας ὡς ἡ ἄλλη φρέγδα, καὶ ἀπὸ ὧν ἵππου πρὸς κέχρυ. Verū Interpres, Velut milium in mortarijs uertit, neq; ἵππου, neq; κέχρυ uoce intellecta. Sed & apud Aetium 6. cap. 65. hoc loco κέχρυ, pro κέχρυ, id est, milium pro rosmarini semine, suppositum habetur.

Melissophyllum & Cydoniā herbā.] Cydoniā herbā uocat, ut ego quidem opinor, quā Alum Latinos itemq; Gallos uocare Plin. lib. 26. cap. 7. & 27. cap. 6. dixit, Venetos autē cotoneam, hoc est, ut hic ait Galen. λευκονία πῶν, à similitudine, ut puto, odoris ad mala cotonea appellata. Est autem hæc herba, eā quæ græcis symphyton petræū dicitur, quod ipsum διδάσκει γλυκύτε πρὸς τὴν γύνα. Dioscor. descripsit, hoc est, odoratū, gustu dulce, qua gratia etiā hic à Galenō ad reliqua medicamenta pilos attenuantia coniicitur, ut uidelicet eorū odorē commendat. Vetus Interpres hanc herbā in totū præterit, sicut multa hic alia. Paul. post aut in græco exēplari legebatur, ὑπερβαλὼς δὲ καὶ μαλακώδην ἢ φύλλον μαλακώδην, pro quo, Adde etiā foliū malabathri, dixi. Neq; enim diuersæ res sunt μαλακώδην & μαλακώδην φύλλον, quare altera appellatio abundat.

In caput VI. de furiis.

Dlata eis cōstituitur flatus expers.] Vicius flatus generās φουδία appellatur, cui opponitur ἀφους, quē hic flatus expersē dixi. Vocatur itaq; ἀφου & omnia edulia quæ flatū nullū in corporibus gignūt, sed nō hanc solū significationē ἀφου habēt, sed significant etiā tum edulia, tum pharmaca, quæ flatus iam generatos discutiūt, leuāt ac propellunt, qualia sunt quædā urinā mouētia semina. Aetius sem. 10. cap. 21. ἐπὶ μὲν οὖν τῇ συμπαρίτε μὲλλον τῇ ἀφύσας ἀπομύεται πρὸς ἀφου. Cornel. Cellus lib. 2. cap. 26. utriusq; significationis res his uerbis expressit. Minima inflatio fit ex uenatione, aucupio, piscibus, pomis, oleis, conchylijs, ouis uel mollibus uel sorbilibus, uino uetere. Foeniculū uero & anethū inflations etiā leuāt. Græci itaq; tum minime inflātia, tum inflations leuātia ἀφου una uoce dicūt, quemadmodū etiā ἐφλέγμεναι tum inflammatione carentes partes tum inflammationē arcētia pharmaca appellant, & ἁλῶνα medicamēta lenia & mordacitatis expertia dicunt, itemq; ea quæ acrimoniā atcent. Recenset aut hoc loco Galenus quædā edulia quæ nō sunt ἀφου, sed flatus gignunt, utpote crassi succi cibi, uelut sunt tubera, fungi, bulbī, legumina, &c. Verū pro tuberibus quæ ὕλη appellat, Vetus Interpres Sorba uertit, ut fortassis & pro ὕλη legerit. At uero consequenter ubi uertit, Sint aut cibi quibus uescuntur boni succi, in græco exemplari ὕλη corrupte legitur, pro quo uetus Interpres ὕλη legi, id est, uentri cōmoda. Verū ego ὕλη legere malo, hoc est boni succi.

Intinctus conferūt acetū cū sapa.] Intinctus hoc loco ὑπόμειναι dixi, id est, li quores in quos reliquos cibos intingimus ad saporis cōmendationē, ac gulæ irritamentū. Veluti alicubi mos est panē intingere, alicubi etiā ipsa obsonia carnes uidelicet ac pisces, in quē usum hic acetū cum sapa laudauit, atq; hæc etiā liqua-

mina ac liquamenta latinis appellantur. quanquā etiam embāmata, uocet Cōstū mella, itēq; Plin. Cāterū quā his liquoribus cōdiendis indūtur aromata siue sermina odorata, *ἀρωματισμένα* Græci uocāt, nōs cōdimenta, qualia hic cumini & scēti cūlū indicat. Plin. lib. 15. c. 25. Eadēq; origine aprorū sapor cōmendatur, plerūq; ad intinctus additis myrtis. Aliquādo *ἐμβόλματα* etiā *ἀπὸ τῶν ἀρωματιστῶν* accipiunt.

In caput VII. de phthiriasi.

Pediculorum generatio quibusdā in capite cōtingit. Generationē pediculorū in capite *φθίρσις* appellat, eamq; multis calidis humoribus acceptā refert, & ob id exsiccātia medicamenta requirere ait, quibus humor ex alto attrahatur ac euacuari queat. Videtur itaq; longe leuior huius mali curatio esse q̄ eius quo ex toto corpore pediculi erūpunt, in quo necessariō corrupti ac putrescentes penitus humores tot animalia producūt, quibus Syllam dictatōrē, & Alcmanem poetā, Plin. toto corpore exesos scribit. Quin & longe grauius malū est quo Pherecydes Syrius copia serpentū ex corpore eius erūpenie expirauit, eodē Plinio tradente, quanq̄ ego sanē idē phthiriasis symptoma Pherecydē occupasse credam, neq; aliud serpentū genus accipso q̄ pediculorū, ut etiam Q. Serenus poeta latinus testatur. Solent aut Græci *ῥάκη* simpliciter, & *ῥάκη* q̄ *τῆ βίβλη*, pediculos appellare, quos Plinius eorū imitatione serpentū uoce expressit. Sed de hac phthiriasi totius corporis Galenus hic nihil agit. Plin. tamen inter capitis, & reliqui corporis phthiriasin, nihil distinguere uidetur. Ei enim qua Sylla cōsumptus est, resisti uia taminiæ succo aut ueratri cum oleo corporibus peruncis, lib. 26. cap. 13. dicit, quod ipsum medicamentū etiā hic Galen. in fine huius capitis habet, ubi uerū. Aut ueratrū albū & staphidē syluestrem, & nitrū, pari pondere cum oleo in balneo adhibe. Nam Plin. eo loco quā nos staphidem syluestre diximus, uiam taminiā docet, quū tamen lib. 23. cap. 1. de labrusca dicat, Hanc potius crediderim esse quā uulguis uia taminiā uocat. Paulō ante aut dixerat, Astaphis agria siue staphis, quam uiam taminiā aliqui uocāt falsō, suum enim genus habet, &c. Videtur itaq; Plinius hac parte etiam sibi ipsi non cōstare. At uero Cor. Celsus lib. 3. cap. 31. uia taminiā *ακρία ἀγρία* græcis nominari aperte dicit, Scilicet bonius aut herbā pedicularē, quod pediculos necat, quibusdā appellari ait cap. 8. Ita & Marcellus sapientissime, sed tamen pediculariam legitur, quomodo etiam apud Pliniū legendū puto, & nō pituitariam, loco paulō ante citato. Porro phthiriasis in capite ac reliquis corporis partibus pilosis, ut ob humorū calidorum in eis locis redundantium copiam facile oritur, Ita etiam his medicamētis quæ hic ex Archigene Galen. tradit sanari potest. Verū phthiriasin quali Pherecydes infectus fuit, ex incurabilib. fuisse, & per numinū maximēq; Apollinis, itā immisissam, referūt Græci scriptores, & imprimis Aelianus. Quare haud scio an nō Galenus de hoc morbo itemq; Pherecida omnia ficta putarit, ut qui morbos à dijs imitti non credat, quemadmodū idē nūq; etiam Hippocratē fecisse, ostēdit idē Galenus primo cōmentariorum *ἐκ τῶν πύρρωνος* eiusdem. Cāterū quod hic ad finem habetur, Si nuditas pilorum adsit, sic accipiendum, quod aliquibus tantum hoc symptoma accedit, ut uidelicet caluescant.

In caput VIII. de Achoribus.

Propriam aut & singularem appellationē nacla. Achoras ulcuscula cutis capitis tenuia ex genere tumorū prater naturā esse ait, quod item in libro eius tituli, de tumoribus uidelicet prater naturā tradidit, sed appellationē hanc propriam ac singularem nacla esse dicit, ob accessionū quæ ad ea ulcuscula conquantur proprietatē. Nimirū quod tenuibus foraminibus cutis in eis eroditur, in quibus etiā tenuis humor modice tenax cōtineatur: atq; inde omnino appellatio *ἀχώρα* ducta uidetur, quod uidelicet nō amplū locū occupēt, sed angustis terminis

terminis conclusa, tenuem etiā humorē in se cōprehendant, à uerbo *χαρῖα*, & priuatiua particula *α*, uoce cōposita. His autē non dissimilis ualde affectio curis capitis est, in qua maiora sunt foramina, & melius humor, quæ *λεῖον*, hoc est, fauus à fauismellis similitudine appellatur. Videtur autē Plin. utrūq; genus, *Υλκεα* capitis uarietia dixisse, Nam appellationis *ἐχέου* nusq; meminit, sed *λεῖον* tamen fecit mentionē lib. 20. cap. 2. de pemonib. loquens. Radix sanat ulcera concreta in modū faui, quæ Ceria uocant. Ita enim legendū est, & nō, quē Cerion uocant, ut exēplaria uulgata habent, Nam ad ulcera relatio sit, nō faui, ut etiam lib. 23. cap. 7. de ramulis fici ait. Idē cū melle ulceribus quæ ceria uocantur illinuntur. Ceterū Galen. humorē horū ulcerū optimo melli assimilar hymettio uidelicet, ab Attica regionis mōte Hymetto appellato. Verus Interpres simpliciter melli quod in fauo est consimilem dixit, ut uel hymettion mel ignorasse, uel certe pro *ὕμης* legisse *τῆς* q̄ *κωρίω* uideri possit. Quod ipsum indicare uolui, ut admonerē satis absurdū esse, optimo melli ulcerū fordes cōferri. Paulus sanē lib. 3. cap. 3. pro eo quod hic legitur *ὕχου πᾶς τὴν πόδα χόουσι ὑμῆτιον μέλιτι πῆσπλησίαις*, habet *ὕχου τῆτος μελιτῶδες πῆσπλησίαις πῆς τῆ μελιτῶν κωρίω*, ut certe iuxta Paulū etiā in Galeno legendū sit, quū Paulus sua ex Galeno transcripserit. & nisi uehementer fallor, omnino pro *ὕμης*, legendū est *τῆς* q̄ *κωρίω*, facili lapsu eius qui castigatiōi græci exemplaris præfuit, ut si lectio obliterata fuit, alterū pro altero substituere, maxime quū uel præclara diuiniatio uisa sit primo aspectu si *ὕμης* legeretur. At uero hoc ipsum ulcerū genus quod *λεῖον* appellatur, etiā *μελικερί* dicitur cōposita ex melle & fauo uoce, estq; hæc appellatio frequentis. medicis græcis ipsiq; etiā Plinio, & ab illis *πίθος γήκερος μελιτῶδες ὕχου ἔχον* describit. Verum de *μελικερί*, quā saniei speciē, nō ulceris Cel. lib. 5. c. 26. esse tradit, eamq; ex ulceribus ubi nerui circa articulos læsi sunt, & inter hæc loca maxime ex genibus manare dicit, nō temere aliubi similia dicta reperiās. Omnes enim capitis ulcus *λεῖον* & *μελικερί* norūt, ex quo melli similis humor siue sanies aut fordes ferat. atq; ipse adeo Cel. eodē lib. c. 28. de Meliceride ulcere (legit̄ tamen corrupte Meliceria) eadē quæ hic Gale. tradit, nisi quod in duas species ipsum distinguit, & de altero ait, Raro fit nisi in scapulis. quā lectionē ut corruptā & omnino falsam expungendā censeo. & pro scapulis. capillis substituendū. Nā in locis pilosis, capite maxime ac mēto Meliceridas oriri. Aetius 3. cap. 15. tradit. Idē Cel. eodem lib. 18. c. Malagma Protarchi ad parotidas, & faui, & meliceridas recēset, quo loco pro meliceridas, mala ulcera primū, & mox melicera, utrūq; corrupte legitur.

Hoc ipso sanē pharmaca Metallica appellata. Metallica appellantur medicis medicamenta quæ in Metallis aut sponte nature, aut per fornacē gignuntur. Itēq; ea quæ ex his ipsis ab hominib; per quēcūq; modū fiūt, ut est cerusa, psoricon, sandyx fucus, autore Galeno lib. 9. de simp. Pharm. uiribus. Videntur aut ipsa Metalla ab inquirendo & perscrutando, hoc est *τῆς τῆ μεταλλῶ* appellata esse. Horū enim gratia in uiscera terræ imus, & in sedē manū opes quærimus, ut Plinius ait, Quāq; idem Plin. nō inde appellata metalla græcis putare uideatur, uerum quod nō solitarie, sed simul, & cū alijs eorū uenæ repertantur, dictaq; ob id *μέταλλα* quod cū alijs, hoc est *μετ' ἄλλων* uel *μετὰ τὰ ἄλλα*, id est, post alia repertantur. Plinij uerba lib. 33. cap. 6. hæc sunt. Et ubicūq; una inuenta uena est, nō procul inuenitur alia, hoc quidē & in omni ferē materia, unde Metalla græci uidētur dixisse. Quāq; uideo ita a cēpi hæc uerba posse, ut metalla ab inueniēdo dicta doceat, quod perscrutando & effodiendo in aliorum uiscinitate maxime contingit.

Pharmacū ex charta siccū aceto dilutū illinro. Medicamenta siccā itemq; ferē, id est, sicca & arida appellantur, quæ ulceribus & cū in sparguntur, unde & *μετὰ πῆσπλησίαις* dicūtur à Paulo lib. 7. c. 13. quāq; in Pauli exēplariis *μετὰ πῆσπλησίαις*

corrupte legat. atq; ulceribus quidē insperguntur incarnādīs, reprimēdē supercre-
scētī in eis carni, ad ducendū cicatricē, ad erodendū item ac urendū, & sanguinē
sistendū. Cui autē adhibentur extergendæ, repurgandæ, attenuandæ, & ad diseu-
tiendū si quid in ea præter naturā est excirant. Hoc itaq; loco medicamentū siccū
ex charta cōstans aceto dilutū, repellendis ac siccādīs humoribus achoras gene-
rātibus, aptū prodit. Nam si aridū tantū adaspergeretur, siccandi uim solam fortī-
ter obtineret, quāmodū lib. 5. Meth. sine de ipso testatur, & pluribus alijs locis.
Descriptionē autē medicamēti habet Galen. 5. p̄i yph. & Paulus loco supra citato.

Tale autem est parygrū appellatū. Parygrī emplastrī descriptionem Paulus
lib. 7. cap. 17. ex Oribasio recitat. Ex ipso autem Hera Galenus hic citat ac descri-
ptum habet lib. 7. p̄i yph., si quis legisse uelit. Id autem quū emplastrū sit per spe-
cillum latum ad ungenti formā redigere docet rosaceo adstillato. Est autem spe-
cillum latum à me dictum quod *σπῆλαιον* græci medici uocant. Nam quū *μῆλα*
per se specillum quoddam tandem significet, addita in compositionem uoce *σπῆ-
λαιον*, latum & ad gladij seu spathe formam factum indicatur. Sicut etiā alijs qui-
busdam uocibus additis, aliæ atq; aliæ specillorū formæ appellantur. *μῆλα* itaq;
ἱερὰ *ἀνὰ τὴν χεῖρα* *τὴν ἐν τῇ κεφαλῇ* græci describunt. Vnde & *μῆλα* uerbū est
πῶς *ἐν τῇ κεφαλῇ*, & *ἐν τῇ χεῖρ*, id est, specillo per tentare, ipsum uidelicet in uulnera
ulceraq; ac fistulas immittendo, itemq; specillū illinens modo inducere. à prior
re significato *μῆλα* à uulgo medicantium Tenta appellatur, à postertore spathe
la. Græcis medicis frequens est *ἐν τῇ κεφαλῇ* *μῆλα* quem ego in Galeno & Aetio
conuertendo subinde specilli cōcauum dixi. Celsus & Scribonius specillū aue-
sum dicere solent, ut lib. 5. cap. 28. de Therioma Celsus. Quicquid autē insper-
gitur, auerso specillo infundi debet. Et lib. 7. cap. 24. Nam quod paruulum est, su-
per inguen in aluum uel digito, uel auerso specillo repellendū est. Et Scribonius
cap. 227. Ac quarto die auriscalpio auerso, quam partē *ἐν τῇ κεφαλῇ* græci uocant,
sensim tentare, mouere ab alienatum oportet, quo celerius excidant hæmorrhoi-
des. Est autem auriscalpiū, specillum priuatim auribus destinatum, quod græcis
μῆλα & *μῆλα* appellatur. Galenus huius operis quod exponimus, lib. 3. de
corpuseulis in aurem delapsis. *μῆλα* *τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ* *τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ* *τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ*
τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ. At uero *μῆλα*, quod specilli nucleum sonat, græci medici uocāt
specilli summū ac ipsam cuspidem. Celsus aduersum specillum lib. 7. cap. 27, ap-
pellat. Vulnus, inquit, digitis uel aduerso specillo diducendum est, ut torquenti-
bus exitus detur. In summa itaq; *μῆλα* græcis specilli instrumenti nomen est, non
solum lati quo aliquid illinitur, & acuti quo aliquid finditur, & cōcaui quo ali-
quid ex alto extrahitur, sed etiā quo aliquid infunditur, atq; hoc citra aliquam
adfectionem, Nam superioribus *σπῆλαιον*, & *πῶς*, & *ἐν τῇ κεφαλῇ* aliquando adijciun-
tur, ad certam rei determinationem: quanquam etiā hæc inter se confundan-
tur, uelut alibi demonstrauī. Galenus huius operis lib. 2. de sternutatorijs, *ἐν τῇ κεφαλῇ*
τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ *τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ* *τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ* *τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ*. Hoc
enim in loco Galenus *μῆλα* instrumentum fusorium ad nares dixit, quod *μῆλα*
τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ uocari alio loco dixi.

In quibus Achores, aut papulæ feruidæ, aut eruptiones circa caput ulcerose
sunt. Archigenes hoc loco in curādīs achoribus, etiā aliā papularū ac pustularū
genera, tanq; eandē curā recipientia ammiscet. Vocat autē quas ego papulas fer-
uidas dixi, *ἐκ τῆς κεφαλῇ* ab ebulliēdo ac feruēdo, qua ratione etiā *ἐκ τῆς κεφαλῇ* alias
Galeno, Aetio, ac Paulo appellantur. *ἐκ τῆς κεφαλῇ* autē dixit quas ego eruptiones.
Ita enim Plinius ferē *ἐκ τῆς κεφαλῇ* & *ἐκ τῆς κεφαλῇ* uertere solet: quanquam aliquando
papularum uocem, aliquando pituitæ, aut etiā utramq; simul adijciat.

Pinguibus emplastris usu cognitis ammisceto. Emplastra pinguis dixi, que

αἰπότες græci dicūt, Celsus lenia interpretari mauult librō 5. cap. 19. Plin. græcam appellationē retinuit lib. 23. cap. 9. Additur in medicamēta quæ liparas uocāt. Ita etiā lib. 33. cap. 6. Videtur autē λιπαρὰ ἐμπλαστρα, id est, pinguis seu lenia emplastra dicta esse ob adipis suilli, aliorūq; pinguitudinē ac oleorū amixtionem, quum contra quæ hæc non habēt, uel omnino parū, ἐλπίπτετα græci medici appellent. Celsus de emplastris quæ cruentis protinus uulneribus injiciuntur supra citatō locō. Constant autē ex medicamentis non pinguibus ideōq; ἐλπίπτετα nominantur, quanquam alipenæ corrupte eo loco legatur. Aetius ferm. 13. cap. 126. de aris do spumæ nitri, sulphuris uiui, alcyonij uisti, & ueratri albi puluere inspergendo usuppat, συμπίπτεται δὲ, inquit, ἐλπίπτοντις.

Licebit & myrti baccas, aut ordeū uistū, &c.] Exēplar græcū Venetū hoc loco habet μίξας αὐτῷ μύρτα, ἢ κόγχατος ὀσρέων κεκρυμμένας. Venus autē Interpres legit et uertit, μίξας αὐτῷ μύρτα, ἢ κρυβίας κεκρυμμένας, ἢ λιθέρυγγοι, ἢ ἡμιμόλιον, ἢ κόγχατος ὀσρέων κεκρυμμένας. Defunt itaq; tria medicamēta simplicia, λιθὴν uidelicet κεκρυμμένην, λιθέρυγγοι, & ἡμιμόλιον, quæ omnino adscribēda censeo, sicut etiā uerti. Licebit & myrti baccas, aut ordeū uistū, aut argenti spumā, aut cerussam, aut ostreorū testas ammiscere, atq; hoc non tam ex ueteris Interpretis præscripto faciēdum est, quàm ex ipsius Galeni declaratione, quæ paulō post sequitur, in qua singulatim hæc omnia medicamenta in quem usum adhibeantur expendit ac ostendit.

Citra humorū in uniuerso corpore uitiationē, aut eorundem multitudinē redundantem.] Humores corporis humani duabus possimū affectionibus obnoxii fiunt, quarū altera κρυχυμία, altera πλῆθος & πληθώρα appellatur, priorem nos hic humorū uitiationē diximus, posteriorem, multitudinē eorundē redundantē, quidā uero plenitudinē dicere maluit. In hac itaq; copia humorū ex æquo redundat. In illa qualitas humorū est uitiatā, ita ut unus aliquis humor, siue pituita, siue bilis flaua, aut atra, siue serosi humores, reliquos excellent, quare non modo κρυχυμία, sed etiam πύστις appellatur. Galenus infra librō 2. de capitis dolore per consensum ad reliquū corpus καὶ ἐν τῷ πλῆθει τῷ μάλιστα ἢ τῷ πᾶσι φλέβας φλεβῶν τομώμενα. ἢ μᾶλλον πύστις, καὶ κρυχυμία φαρμάκων. Verū harum dispositio-num differentiā egregie explicat ipse Galen. 13. Meth. his uerbis, ὅταν τῷ γινώσκοντι μὲν ἀλλήλους ἀντιθέσιν οἱ χυμοὶ, πλῆθος τῷ πύσιν πληθύνειν ὀνομάζουσι. ὅταν ἡ ἑκάστη φανῇς χολῆς, ἢ μελαίνης, ἢ φλέγματος, ἢ τῷ ὅρῳ δυνάμει ὑγρῶν μίξων ἡρώτης τὸ σῶμα, κρυχυμίαν τὴν πύσιν καλεῖται. ἢ πύστιν τὴν πύσιν. Carterū clarius adhuc, (quantū quid potuit his uerbis apertius dicit) infra lib. 2. has dispositiones corporis explicat, & πληθώραν nō solū quatuor humoribus ex æquo auctis fieri, & appellari dicit, sed etiā aucto sanguine solo. quare etiā ea ipsa uerba adscribere nō pigebit, nō tam ad nominā q̃ ipsius rei intellectū uberiorē assequendū. ὅταν ἀναστρέφεται τις ἐν ὅλῳ τῷ σώματι πλεονεξία χυμῶν, ἢ ὀνομάζουσι οἱ πᾶσι τὴν ἐρασιέστατον πληθώραν. γίνεται ἡ αὐτὴ τῇ τελέσει χυμῶν ἀνάλογον ἀντιθέσιν, ἢ τῷ σώματι μόνον, ὡς ὅταν γινώσκῃ τὴν ἀλλαν ἀντιθέσιν χυμῶν, οὐ πᾶσι φλέγμα, ὡς χολῆς φανῇ, ὡς μελαίνης, ἢ χολῆς ἀντιθέσιν πύσιν, οὐ πᾶσι πύστις, ἀλλὰ μετὰ προσθίμης ὀνομάζουσι, πλῆθος φλέγματος, ἢ χολῆς φανῇ, ἢ μελαίνης φανῇ, ἢ πύσιν φανῇ. Ex his itaq; uerbis palām est, κρυχυμίαν, quam alibi πύστιν ab ipso uocari ostendit, etiam πλῆθος appellari, sed non simpliciter, uerum cum adiectione pituitæ, uel bilis flauæ aut nigra.

Ad rugas anī intumescētes, rimasq; ac fissuras sedis.] Rugas anī intumescētes dixi, σολιδας ab Apollonio appellatas, Sicut rimas & fissuras conuertit, ῥυτίδες ab eodē appellatas, Plinius etiā fissā appellare solet. Meminit autē tum σολιδας, tum medicamentū ad eas, quod hoc loco ex plūbi succo habetur, Galenus 9. sim. phar. ubi de plumbo agit. Meminit & Paulus lib. 4. c. 26. & 6. c. 72. ubi ait, τὰς ἡνυδαλωμένας σολιδώσας ἐπαναστήσας ἐόντι. Id est, cōdylomata eminetiæ sunt rugosæ. Et

Galen. sanè in glos Hippo. exponit uocē *σολιδώματα* significare *φύματα*, id est rugosius. Sed omnium lucidissime *σολιδωρ* significationem docet. Aëtius 14. c. 2. his uerbis. *Ἐκ δὲ λεγόμενον προσόλωμα ὃν ἴσθα γινώσκῃ ἵπποκράτης πηλὴν σαρκῶν ὃν τῷ διαφθάλμῳ σολιδωρ πρὸς ἐπιανεστέλης καὶ διουγκυτέλης πρὸς φύσιν. σολιδωδὲς γὰρ ἰδανὴ τὸν ὅλῳ στυγερόντα ἔχει τὰς φύσεις. ὅσαρ δὲ πηλὴν διουγκυδὴ ἢ σολιδωδὴ τὰ γινώσκοντες λέγουσι.* Id est, Quod condyloma appellatur in sede sit, ruga aliqua corporis in ano re duplicatorum insurgente, & præter naturam intumescere. Quum enim sinuosus sit anus coagmetatas rugas ac plicas habet. Vbi uero amplius intumu erit ruga, tunc sanè sit condyloma. Ex his itaq; uerbis palam sit quid sint *σολιδωρ*, & quæ *σολιδωδὲς* *ἔλκος* & *πέδη*, medici græci dicant. Sequitur autē paulo post ulcera serpendo exedentia, cancroisq; & maligna, quorum prima *φαιγδαενία* ab exedendo appellatur. Plinius etiā græca uoce retenta phagedænas appellat. Nō solum autē ulceris nomen phagedæna apud græcos est, ut quidā pertinaciter adstruit, nisi aliter reperiri affirmantes, sed stomachi etiā affectus, quo uehementer excitato appetitus, immodice cibum sumit, ac nō mansa etiā deuorat. Plin. lib. 2. c. cap. 11. Phagedænis quod nomen sine modo edentium est, & aliās ulcerum, tithymalli medentur, cum sesamidis sumpti. His enim uerbis dupliciter phagedænam esse declarat, & ad eam quæ sine modo edentium est, medicamentum prodit tithymallos cum sesamo sumptos. Nam hoc ulceri phagedænae cōuenire nō potest, intra corpus sumptum. Quamq; quid aliqua exēplaria pro edentium, esuriendum habent, neq; id etiā huic senectutis repugnat. Quare etiā aliās distinctionis gratia ulcerum phagedænas dicere solet, ut lib. 20. c. 5. de semine staphylini. Phagedænas ulcerum sistit recēs cum melle impositum. Et 28. cap. 18. Ea uero quæ phagedænas uocant in ulcerum genere corii bubuli cinis cum melle. At uero quū Galen. de Tithymallis intra corpus sumēdis nullam mentionem faciat, ut qui quarti ordinis sint calfacientium, qui urēdi uim habentium existit, multū dubito an sit hæc Plinij lectio uera ac integra, & nō potius penitus corrupta, & similiter ut alię quas recitauī, de phagedæna ulcere intelligenda. Maxime quū & Dioscor. & Galen. phagedænica nominatim recensentur à tithymallis sanari forinsecus impositis, atq; hoc propterea quod uehementer calfaciunt & extergent, si modo in tempore & iusta mēsurā quis adhibeat. Nisi quis omnino iuxta Dioscoridis præscriptum, tithymalli succum ad humoris frigidi & aciditatis obiectēdi appetentiā excitātis purgationē, à Plinio proditū ex aliquo græco scriptore uelit; cū sesamidis autē ea ratione sumi iussisse, quā Dioscor. cū cruina farina misceat atq; in catapota formari prodidit. Nimirū ut ita eorū uehementia obtundatur, ne qua in transglutendo læsio partium cōingat. Hoc ipsum enim nisi Plinij lectio defenderit, nō desuero eam ipsam à quopiam uitiatā suspicari, & legendum potius Phagedænis quod nomen sine modo exedentium est, & alijs ulcerum, tithymalli medetur cū sesamidis impositi. Caterū ut ad id unde digressus sum reuertar, Cælius Aurelianus lib. 3. de morbis diuturnis proprio capite de phagedæne stomachi curatione tradit; quamq; autem omnia in eo ipso autore corruptissima, temporum iniuria legantur, tamē palā uidere est, eundē omnino affectū per phagedæne appellationē indicari, qui aliās græcis medicis, & præsertim Aetio serm. 9. cap. 11. *κωιδωρ* ἱρίσις appellatur, qui à *βουδίσω* appellato etiā alius est, de quo eodem libro cap. 5. seorsum Aetius agit. Verum ne forte hanc appellationē in Plinio ut supposititiā, aut in Cælio ut barbaram repudiemus (hic enim unicus ex Metho dicæ sectæ imitatoribus, quā Galen. quū alibi, tum in libris de curandi methodo insectatur ac damnat superest) autor libri diffinitionum græcarum qui Galenus esse putatur, ita de hac affectione tradit. *φαιγδαενία ἐστὶν κακοσμία καὶ ὅν ἂν ἐρεχμίδος πηλὴς προφῇ, καὶ λαμβάνοντες ἀμύχαν ἢ κρατῶν αὐτῶν, ἐπὶ ἐφελκόντες πάλιν ἱρίσις γινώσκουσι.* Quin & ipse Galen. cōment. 3. in 6. librum popularium morborum Hippocratis planè hoc

hoc indicat his uerbis. *πνίς γὰρ μὴν ἔχουσιν φαιγεύσθαι τὰς τῶν πηλῶν βρωμάτων ἰδίαι*

αἰετς, ἃς καὶ αὐτὰς ὑποκαταχρύμει γὰρ αὐτὰς ἀνέστρας ἀνέστρας στίβων ἐμολογῶτα καὶ πρὸς ἡμῶν.
Iuxta hanc cōmensurationem.] Commensurationem dixi græcorum *συμμε*
τρῖαν, quamquam etiā Plin. symmetrie uocabulo ut latino utatur. Plin. lib. episto-

larum 2. ad Luperçū, congruentiam æqualitatemq; dicere maluit, de statuarum

partibus auulsi loquens. hīc quum mensurarum & ponderum ratio habēda sit,

commensurationem dicere malui.

Lipara seu pinguis cōpositio ad achoras, psydacas, papulas feruidas, intertri-
gines.] De achorum & papularū feruidarum ratione iam ante dixi. Nunc uero
etiam de psydacis & intertriginibus uidendū. *Ψύδακας* & *Ψυδῶναι* appellant
medici græci pustulas paruas uelut bullas quasdā supra cutem emīnētes, unde
etiā aliquādo *φλυκκίτις* & *φλύκταναι* ἴσδὲ dicuntur, & *φλύσσις* ab Hippocrate
quæ appellationes ab ebullitione & feruore, hoc est *ἐκ τῷ φλύον* sunt factæ. Sicut
Ψύδακας & *Ψύδων* denominatæ uidentur, quoddā frigore quocq; eiusmodi obo-
riantur. Hippocrates easdē pustulas quas alij *Ψυδῶναι* uocant, *φλυζῶναι* apel-
lat, ut Galen. exponit. Idem *ἐκ τῷ φλύον* appellatione ducta. atq; hæc est quam
Celsus lib. 5. de pustularū generibus describit: Phlyzacion autem paulo durior
pustula est subalbida, acuta, ex qua ipsa quod exprimitur humidum est. Ita enim
legendum in Celfo est, non phyzacion, neque psydration, ut aliqui putauerunt,
quum ex Hippocrate hanc uocē, sicut pleraq; omnia Celsus transferi perit, quan-
quam quod ad rem attinet, nihil interest *Ψυδῶναι* an phlyzacion legatur. Pau-
lus lib. 3. cap. 3. *Ψυδῶναι* ita depingit. *Ψυδῶναι* μὲν ἐστὶ μικρὰ ὑπερβολὴ φλυκκίτιον
ἀραιὰ ὑπερβύσσει ὅτι ὑπερβύσσει. Intertrigines autē sunt latinis & maxime Plinio
dictæ, *ὑπερβύσσει* græcorum, ab attritu partium in quibus contingunt, utrisq;
appellationibus sumptis, uelut etiā alio loco indicaui.

Mānæ thuris tantundē.] Mānæ thuris appellatur grana & micæ quæ ex ma-
gnis thuris glebis unā cum ipsius thuris cortice excutuntur: & in hoc ipso mānæ
præstat thuri, q̄ ex ammixto cortice modicum quiddā adstringētis facultatis est
adepta, ut Galen. infra lib. 4. docet his uerbis. *γινώσκοντες ὅτι καλῶς ἰδίαις μάναν τὸ*
ὑποστῆσαι τὸ ὑπερβύσσει ὅτι τὸ μεγάλη φορτία λιβάνου, συμμεινῶν γὰρ αὐτῷ βόσσο
ματὶ πῶς μικρὰ λιβάνου φλύει, ὡς διαφύσσει τὸ λιβάνου τὸ τοῖσιν φέρμασιν τῇ προσε-
ληφθέναι βραχὺ πρὸς αὐτὸν. Idē penitus lib. 13. Meth. dict. Dioscorides mannā albā
purā & granulofam probat, ita enim *ἐγγονδρον* accipio, Verū uim eius remissio-
rem thure facit, cuius contrarium ex Galeno ostendī. Galen. lib. Meth. 3. cephalū
cum medicamentū aridum recēset his uerbis. *σύγκομμα ὃ ἐξ ἵριος καὶ ἀειπλοχίας ὁρῶ*
εἶναι καὶ καὶ λιβάνου τὸ μόνον. Sed lectio corrupta est in græco exēplari, legitur enim
λιβάνου καὶ καὶ μόνον, quæ res fecit ut Interpres uerterit, Componitur ex iride, &
aristolochia, & eruo, & thure, & manna, id est cortice thuris: gemino errore pro-
pter unicam syllabā tantū particulam admissio. pro manna enim thuris primū
thus per se uertit, & mox etiā eius mannam adiecit, cui quum apponeret, corti-
cem thuris per eam significari, alterum errorem incidit, Mannam corticē thuris
interpretando, quū micæ aut grana oportuit, aut mannam simpliciter ut Græci
dicere, sed ita interpretatus est ut corticē tanq̄ à thure diuersū aliquid, in medi-
camentū addi indicaret, quū inter ipsum thus eiusq; micæ nihil differre putaret.
At uero ipsum thus solū, aut eius aded mannā in hoc medicamentū cōijci debe-
re ex præcedētibus ac sequētibus apparet. Quod autē alterū pro altero aliquādo
uixit per, ex lib. Meth. 5. patet, ubi ait *ἢ μάναν ὃ αὐτὸ λιβάνου πρὸς ἱεράλιν.* καὶ ἢ *ἐν τῇ*
πύλιν ἢ *φάρμακον ἢ μάναν τὸ λιβάνου.* ὃ λιβάνου τὸ ἐκ πλαστικῆς τῆς μάναν. Quod
uero ad carnem gignendā illo loco thuris mannam potius q̄ ipsum thus indica-
rit ex 5. Meth. ad finem hæc uerba indicant. *μετὰ τὸ φρυγῶνα τῶν ἀρρωσίων τοῖς μάναν*

νας αὐτῆς ὑποῦτον μικτόν, ὡς αὐτὰρ εἰς ἡβήσω σκεπτός, Scribonius porro Largus mannā thuris sepenumero pollinem thuris appellat. Paulus uero lib. 3. cap. 22. de cicariciis & albuginibus oculorum μάστιγαν appellat etiā μαμμηγῆ, atq; ita etiam Actius uocat. ferm. 12. cap. 4. 4. sine.

Leuce emplastrū albū inexuperabile.] Albū hoc emplastrū λευκόν, hoc est, inexuperabile ab efficacia & uictoria quā de affectu superato refert, appellatur. Albū autē à colore, quē propter cerussam habet, dicitur. Leuce autē græcis quīη πασας genere foemīn. dicunt. Coloris autē gratia cerussam in emplastra alba inijci, Galen. lib. 1. cōpositionis pharm. κατὰ γῆν prodit, scēq; ob uim adstringendi ac refrigerādī, quas sanē uires ego potius respexerim q̄ colorē. Variantur autē emplastrorū colores aliquādo, ut ne ab alijs noscant. Sic Galen. 6. Meth. Emplastrū à se inuentū ab aliquibus per sinopidē, ab alijs per ochrā fucatū dicit, ne Galeni esse putaretur. Ferē autē nigra fiunt ex pice & resina, atq; adhuc magis ex bitumine, Ex æ rugine autē & chalcātō ac squama eris uiridīa, ex minio siue rubrica sinopide rubra, ex cerussa alba. Ex ærugine etiā Melina, sed hoc si moderāte coquat cōtingit, Nam ex cruda uiridis color accedit, Sicut ex ea quē plurimū coquitur, duplicis coloris siue adspēctus emplastra reddūtur. unde & διχρῆμα & διπρόσωπον uocātur. Quin & fulua ob eiusdē æruginis nimīā cocturā fiunt quæ κατὰ ἀνπελλῆται. Cæterū emplastri huius albi descriptio in græco exēplari nō est integra. Deest enim post enumerationē eorū quæ ipsum cōstituunt, cōponendī modus & forma, quē partim ex rei usu, partim ex ueteri Interprete, qui tamē & ipse in te gram lectionē non habet, restituumus, his adiectis uerbis. πρὸς τὴν τὴν αὐτῆς, τὸ δὲ ἵαμα ἐν λιπαρῶν & ψυμῶν ἀς κατὰ γῆν ἡλικίαν ἐν αὐτῆς αὐτῆς. His enim uerbis interpositis, recte sequetur, ὅταν δὲ μεταβῇ καὶ &c. Porro Melina emplastra quę sequūtur, æruginem quidē nō habēt, unde color luteus aut melinus eis accedat. Verū is color ex sandaracha primo emplastro, alteri ex atramēto sutorio contingit. Leucio autē primū inscribitur, qui & Lucius est, quomodo Græci δὲ pro uelut, uelut λευκός pro Lucullus. Fuit is præceptor Galeni, unde in libris τῆς γῆς saepe ipsum κατὰ γῆν appellat, quemadmodū etiam aliū, quem Publīū uocat.

Smegmata ad achoras, furfures, asperitates, & scabies.] In horū smegmatum primo, Retrinēta quę ab expressa myrobalano reliqua sunt habentur, quæ sanē ab ipso Critone, μυροβαλάνος πῖσμα appellantur. quanq̄ πῖσμα uox non retrimenta tantū à succo expresso cuiuscūq; tandem rei reliqua, sed etiā ipsum succū sepenumero græcis medicis significet. Quemadmodum etiam ἐκ πῖσμα ἰσχυρὸν ἐπιθῆμα, modo pro retrinētis, modo pro succis accipiunt, adeo ut in hac ambigua significatione, rei ipsius usum intueri oporteat, ad uerā significationē cognoscendā, pro retrinētis itaq; hic accipi, palam est ex smegmatum usu, quæ aliter carī extersionis gratia debent, & ex Dioscoride lib. 4. de glande ungētaria apparet, ubi ait. δὲ δὲ κατὰ γῆν ἐν ἡλικίαν αὐτῆς ἐκ πῖσμα μύνηται σμύματι δὲ πρὸς τραχύτητας & λιγὸς μὲν ὀδὸς. In consimili etiam smegmatis usu Actius ferm. 1. cap. 128. habet, atq; ita etiam infra lib. 2. in Epithemate Charicidis ad uenterem capitis dolorē, ἰσχυρὸς πῖσμα accipiendū, pro ungenti uidelicet Irini sece, quę alias μύγμα uocatur, ut etiā Plin. testatur. Sed & myrobalani pīssima Cellus lib. 6. c. 5. appellat τὸ πῖσμα & μυροβαλάνος. Galen. lib. 6. simpl. phar. hoc πῖσμα μυροβαλάνος sic describit. δὲ δὲ ἐκ πῖσμα ἐπιθῆμα τὸ γινώσκον ἐκ κληρῶν, atq; ita etiā li. Meth. 12. usurpauit τῆς κατὰ γῆν αὐτῆς ἢ μυροβαλάνος πῖσμα ἢ ἐν, ἢ χυμὸς τὸ αὐτῆς, &c. μύγμα. Verū Interpres Linacer hoc nō intellexit, quū uerū, cataplasmati uero id quod ex ungento & palmulis fit, myrobalani pīssima uocat, & irini, & iunci florē, &c. miscēbis. quum simpliciter id quod à myrobalano expressa reliquum est, dicere ipsum oportuerat. Sed in hūc errorē inductus à Cor. Celsō uidetur, apud quem

lib. 4. cap. 9. de lienis morbo corruptissime legiſ. ſit ex unguento & palmulis quod myrobalanū uocant. Legendū autē eſt, ſit ex unguentarijs glandibus quas *μυροβαλάνες* uocāt. Sic enim Dioſcor. de myrobalano habet. *ἄνθ' μετ' ἰφυκράτε πιδόσα λία ὅπου ἀναχμῆς ἰλκὴ σπλῆνα τήνδ' ἐν καταπλάσσει δ' ἐν αὐτ' μετὰ μέλιτος ἐλθίτω.* Ne que enim ad Martialis locū in apophor. eum reſpexiſſe opinor. Quod nec Vergilius nec carmine debet Homerus. Hoc ex ungento conſtat & ex balano. Non enim uult Poeta Myrobalanum rem compoſitam ex unguento & balano eſſe, ſed ipſam rei ſimplicis uocē, ex hac cōpoſitione cōſtare. Aetius 13. ſerm. cap. 21. de retrimētis expreſſorū fraxini foliorū uſurpauit. *ἄνα μέλιτος φύλλα κόψας & χυλίσας, διδόν πίνε τὸν χυλόν, τὸ δ' ἀπὸ δαίμα κατὰ πλάττει τὸ δόγμα.* At uero pro ſucco uſurpat Dioſc. lib. 1. de baccis lauri. *τὸ δ' πίνε μετ' ἀταλγίας ἐν δυοκαίαις βροθῶ.* Ita Galenus infra lib. 2. ex Archigene pro capite rigando *ἀναφύων ἐκπίεσμα* habet, & lib. 3. in auris inflammatione ex Apollonio, *βαλεῖτε πίνε μετὰ φοτίδων ὕδαρ χυλόν γὰρ ἔχει.* Sic eodē libro Archigenes ad aurium dolores *καρύνων πικρῶν ἀπὸ δαίματος* pro ſucco, & oleo ex amygdalis amaris expreſſo debet. Et Dioſcor. lib. 1. de malo punico, *ὅλκρον τὸ ἀπὸ δαίμα τ' πυρῶν ἐλκὸς ἐν μεγρ' μέλιτι.* In his itaq; omnibus locis uſus ipſe indicat ſuccū accipi oportere & nō retrimēta à ſucco expreſſo relicta. Verū lib. 2. de ſæno græco ubi ait, *σμίξι δ' ὁ τριῖας καὶ πύρα ἐν ἁλῶναι τὸ ἀπὸ δαίμα αὐτ' ἐν ὕδαρ ἐλκός,* certū eſt recrementū ab expreſſo ſæni græci ſucco reſiduū per *ἀπὸ δαίμα* indicari, uſpote quod craſſum & terreū exteſioni eſt aptū, neq; curandū quid hic & in pleriq; alijs locis Interpretes reddāt. Porro in altero ex ordine ſmegmate, in græco exemplari *κατὰ πιν* legitur iunci quadratū ſignificatōe, qui hic locū nō habet, quare *ὕπερ* pro eo ſubſtituendū eſt liguſtri arboris ſignificato, Nā & uetus alcannā pro ea dixit, arabū uſus uocabulo, & ex Galeno amplius apparet q̄ eius arboris folia & ramulos mixtarū uirtū eſſe prodidit lib. 7. ſimpl. phar. diſcuſſoria nimirū & adſtringētis, unde tū ad ſmegmata, tū peculiariter ad achoras cōuenire ſuprà etiā demōſtratū eſt. In eodē ſmegmate græci exemplar *σπιδίον* habet adiectione aſterifco, quo indicat ſe lectionē nō potuiſſe aſſequi, qui preſuit operi caſtigando inter excudendū, Verū *σπιδίον*, hoc loco ualidius eſſe uidet, ut qd nimitū caſticiat & reſecat ex 4. aded ordine à tēperatis, unde maiorē extergēdi uim q̄ hic opus eſt habet. Legendū itaq; pro ſtruthio *καρύνει*, Nam hoc in ſmegma addi ſuprà in alopecijs, & in ſequentibus poſt paulo ſmegmatis habet, & Dioſc. lib. 5. teſtaſ. Veterē etiā Interpretē ita legiſſe palū eſt, qui pro eo ſpūmam maris uertit, quomodo aliās ſemper alcyoniū uertere ſolet.

Fecis uini uſtæ, quā Romani ſeculā, nos tryga appellamus. Crito hoc loco ad euidentiore rei cognitionē, latinā & græcā appellationē ſimul expreſſit, *τρύγας αἶνον* inquit, *ἐκκαυμένην, ἢ ζυμῶν φέκλαν καλῶν.* Eſt enim *φέκλα* uox latina à græcis uſurpata, quomō etiā alias latinas uoces, uelut *ἔφυγγεν* ſiue *ἔφυγαν* *ἔφυγον*, *λίαν* uſurpare ſolēt. Eſtq; *φέκλα* uox nō à primitiua fecis, ſed à diminutiua ſeculę uoce formata. Legiſ tamē apud Paul. ſepiſſime *σφέκλα*, addita amplius *σ* litera ad caput uocis, exponiſ q̄ ab eodē lib. 7. cap. 13. *ἡνὶ ἐν τριῖ αἶν ἐκκαυμένη.* quibus uerbis indicaſ, nō ſimpliciter fecē uini, ſed eam quæ uſta eſt *σφέκλα* dici. Apud eundē li. 3. c. 18. *σφέκλας* uox corrupta legiſ, pro genuina et eius loco reponēda *σφέκλεις*.

Soranus quidem (ſgitur uelut in implicata affectione eiufmodi remedia adhibet.) Implicatā affectionē hic Galen. dicit *παραμυμνὴν πάθος*, & quod ſupra capite 1. ubi de Sorano & Methodica ſecū dixi, Mixtum appellaui, Nimirum ubi utriusq; genus morbi cōmixtū & cōplicatū uidetur, adſtrictū uidelicet & fluens. Ad hæc enim duo genera reliquos omnes morbos Methodici reducebāt. Galen. *ὅτι ἀνέστην, ἐν πᾶν νόσους, φασὶν ἢ στεγνὸν ἢ ῥεῖον ἢ ἄν, ἢ ἔξ ἀμφὶν ἐκ παραμυμνῶν.*

Aut fece Rhodia.] *ῥοδίου πρῶτα* fecem Rhodiam hic Soranus dicit, quam supra Archigenes *ῥῖνον ῥοδίου πρῶτα* uocauit. Nam de uini fece intelligendum est, non de ungenti uel olei rosacei fece, quod uetus Interpres existimauit.

In Caput IX. ad psydracia & achoras, pustulasq; ulcerosas helcydria græcis appellatas, & eruptiones in capite.

DE reliquis appellationibus supra dictum est, Verū de his pustulis quæ *ἰκνύσθαι* græcis appellantur, nunc uidendum. Pustulas itaq; quæ *ἰκνύσθαι* ipse Galenus hic appellauit, Paulus Aegineta libro tertio, capite 3. sic describit, *πρὸς πῖν* inquit, *ὅτι τῇ ἰσθαλῇ ἰκνύσθαι πικρὰ καὶ ἰσχυρὰ μικρὰς πηκτικὰς βλαβὰς ἀφ' ἧν ἰκνύσθαι ἐκτίθενται, πορρὲς δὲ ἰσθαλῶν, &c.* His uerbis Paulus pustulas quæ ad paruorum papillarum similitudinem densæ ac rubræ sunt, & à quibus sanies eliquatur, *ἰκνύσθαι* appellari dicit, atq; hæc sunt, nisi uehementer fallor, quas Celsus libro 5. ita describit. Nonnunquam maiores pustulæ liquidæ, aut pallidæ, aut nigræ aut aliter naturali colore mutato, subestq; his humor, ubi hæc sunt ruptæ, infra quasi exulcerata caro apparet, *ἰκνύσθαι* græcè nominantur. hæcenus Celsus. Verum corrupta est lectio, & pro *ἰκνύσθαι*, *ἰκνύσθαι* habetur.

Finis primi libri commentariorum medicorum.

IANI CORNARIi MEDICI PHYSICI

COMMENTARIORVM MEDICORVM, IN DECem libros Galeni de Compositione medicamentorum secundum locos conscriptorum, Liber II

In caput primum de omni capitis dolore.



Vandoq; etiā ob causam aliquā externā & laceffentē, pro cataracticen Græci appellant.] Duo præcipua sunt causarū genera, altera *προηγμένη* antecedens & interna, uelut hic enumeratur à Galeno intēperies simplex, humorū qualitas uisitata, humorū multitudo, altera *παραπράξις* hic appellatur, nos externā & laceffentē diximus, utpote quæ ubi antecedētem internam causam laceffierit, abscedit, uelut hic ardor, frigiditas, ebrietas, et plaga recēsent. Significat enim

παραπράξιν itemq; *κατάρξιν*, auspicari & quasi irritare ac prouocare: ut Paulus lib. 3. cap. 78. *κατάρξα δὲ τῷ πῖντος ὡς τὸ πάλιν ἡσθῆναι ἀντηρῆναι, καὶ πρὸς πῖντος συγχρῖναι, καὶ ἀποδοτικῶν ἰσχυρῶν χυμῶν, ψυχρῶν καὶ πικρῶν, &c.* & paulo post, *προηγμένης μὲν δὲ τῷ σώματι καὶ τῷ χρόνῳ πρὸς τὴν ὕλην, τῇ δὲ παραπράξει δὲ τῷ σώματι πρὸς τὴν ὕλην.* Quibus uerbis utrunq; causarum genus explicatur, præcedentem nimirū in corpore esse ac quiescere, donec ab externa aliqua irritetur, quæ primam affectionis tētationem auspicatur. Hanc uulgo primūnam appellant. Galen. sæpe aliās *παραπράξιν* dicit, non antecedentem seu antegressam, ut quidam ex doctis existimauit, nam hæc *προηγμένη*, ut dixi, appellatur & interna est, sed hanc quam laceffentem diximus & externam. Confundit tamen hanc differentia Aetius serm. 8. cap. 59. *προηγμένης δὲ τῷ σώματι* appellans externam & laceffentem, hoc est *παραπράξιν*. Alio dicit inquit, *πρὸς τὴν ὕλην πρὸς τὴν ὕλην*. Et 12. cap. 1. *παραπράξιν δὲ τῷ πῖντος ὡς τὸ πάλιν ἡσθῆναι ἀντηρῆναι, καὶ πρὸς πῖντος συγχρῖναι, καὶ ἀποδοτικῶν ἰσχυρῶν χυμῶν, ψυχρῶν καὶ πικρῶν, &c.* Et 12. cap. 1. *παραπράξιν δὲ τῷ πῖντος ὡς τὸ πάλιν ἡσθῆναι ἀντηρῆναι, καὶ πρὸς πῖντος συγχρῖναι, καὶ ἀποδοτικῶν ἰσχυρῶν χυμῶν, ψυχρῶν καὶ πικρῶν, &c.* hic enim *παραπράξιν* de interno dolore ischiadis initium dante usurpat

usurpat. Distinguit autē manifeste Galenus 4. ὁρίωνος principio, τὸ ἑστὶν αὐτὸ τὸ
 σπῆμα τοῦ αἵματος, τὸ ἐννομεῖται πρὸς τὸν αἵματι, καὶ τὸ ἐκαστὸν τὸν αἵματι
 πρὸς τὸν αἵματι αἵματι.

Ob multitudinem fanè instrumentaliū partium morbos faciunt.] Partium corporis aliæ sunt simplices, quæ in similes partes diuiduntur, uelut caro in carnes, ut Aristoteles primo historiæ animalium tradit, unde etiam ὁμοιομερῆ, id est, similes appellantur. Sunt autem hæ, ossa, Cartilagines, nerui, ligamenta, arteriæ, uenæ, membranæ, carò. Aliæ compositiæ, ex simplicibus uidelicet constantes, quæ in dissimiles partes diuiduntur, uelut manus in manus diuidi non potest, neq; facies in facies, unde etiam ἡτεροιομερῆ, id est, dissimiles uocantur. Quin & ἑτερογενῆ μέρη, itemq; ὁργανικά, id est, diuersi generis & instrumentales hæ ipsæ compositiæ partes appellantur: uelut contra illæ priores simplices ὁμογενῆ, id est, eiusdem generis dicuntur, itemq; συσπλόγη, & διηρητὰ συζυγία, atq; εἰρηπ & σώματ' ὁμοια συμφυῆτα, uelut 1. de facultatibus naturalibus Galenus declarat. Hoc itaq; loco Galenus ob humorum multitudinem in instrumentaliūbus quidem partibus morbos fieri prodiit, nullum uero in similaribus partibus, sed solum affectiones iuxta intemperiem simplicem, uelut caliditatem, frigiditatem, siccitatem, humiditatem, quod etiam 7. Meth. clare docet hic uerbis. οὐδ' οὐδὲ τὸ πρῶτον ἀπέναντον ἑπανιγχεῖσθαι τῷ τῷ λόγῳ νόσους, ἀλλὰ τῶν ὁμοιομερῶν ἑγμάνων, ὡς πρῶτον εἰσὶν αἱ τῆς ζωῆς ὁρίσσεις. οὐδ' ἀπαρτίζονται γὰρ ἐν αἷματι πραγματώσεις οὔτε ἐκ τῶν ὁργανικῶν μορίων ὁρίσσειαν τὴν λείαν. εἰς ἐφθελμὸν δὲ τῷ ἡπατὶ σκίλος. εἰς αἵμα γὰρ οὔτε αἷμα σκίλος, ἀλλὰ τὸ μυώδες τὸ αὐτῷ γίνεται τὸ λευκὸν τῆς φήρυγας, ὅτε ἐφθελμὸς τὸ λεῖπρον, ἀλλὰ τὸ λευκοπλευσάδ' οὐκ ἐπὶ τῶν αἰμάτων ἀπέναντον ὁρῶντων ἀνέλεγον. Apparet itaq; ex his uerbis instrumentales partes motus quidem & operationes complere, uerum primam actionem in similaribus esse, ueluti uerbi gratia, Crus quidem ambulare, uerum dominium eius actionis in musculoso ipsius cruris genere esse.

Tum per multam & assiduam affectionis agrorum inspectionem.] hoc modo
doutert id quod in Græco est, *ιστάλαν τὴν πᾶσαν καὶ συνολῶς τῆς τῶν καμίνωνται*
διαθέσεις. Significat enim *ιστάλαν* hoc loco inspectionem & perlustrationem,
re oculis subiecta, uelut etiam apud Aristotelem 2. de gener. anima. *ἀλλὰ καὶ τῶν*
ἐκ τῶν ἐπορίων καὶ τῶν ἀνέκδοτων. non autem narrationem aut expositionem rei ge-
nita, quomodo alias in usu est historia vocabulum.

Aur lanam siue lintēolū rosaceo tingito. Hoc loco *fax* linteolum dixi, potest tamen etiā pro panniculo laneo uelitis detritae hie accipi, sicut etiā paulo post ad capitis dolorem ex frigore, ubi ait. Vtere etiam lanis ac linteolis in eo madefactis. Celsus. lib. 6. cap. 6. Linteolo an lana excipiatur, nihil refert.

Cum polentæ flore imponito.] *παιπάλων* *ἄλφιτων* polentæ florem dixi, *ἄλφιτα* enim non pro alia farina medici usurpant, quàm ordeacea fricta, ut Gale- nus lib. i. de alimentis habet: quāquā Hippocrates etiam *ἄλφιτα* *πύρινα*, *κρεῖτα* *πύρινα* *καὶ* *ὀρόβου* *καὶ* *καρυάιδου* dicat. Lingua alias cōmuni quælibet farina *ἄλφιτων* appellatur, *παιπάλων* autem florem appellavi. Est enim *παιπάλων* itemq; *πάλων*, *καυδός* *καὶ* *λαγύσταβιον* & *ἄλφιτον*, quod nos pollinem etiam appellamus. Videtur autem hūc polentæ usus ad refrigerationem assumptus esse, quam mediocriter in primo videlicet ordine exhibet. Nam propter fricturam amplius ordeo resic- cat, quāquam alias velut matetæ quædam, iū polentæ pollini, cum reliquæ fa- rina, alijs medicamentis ammisceantur, velut etia oleum & cera quibusdam ad- di solent. Verum ad refrigerationem ac sitis extinctionem, polentam sapæ, uinō dulci & uino mulso dilutis, itemq; ipsi aquæ, inspergi ac bibi per ætatem, à qui-

busdam duabus aut tribus ante balneum horis Galenus loco ante citato tradit. Quod ipsum etiā Aetius serm. 9. cap. n. *οὐκ ἔστι χαλκός* dicit his uerbis, *ἀδύνατον ἔστι πρὸς ἀλφειῶν ἀνελόναι ἀπὸ τῆς μεταδίδου τοῦ βαρυμελέως αἵματος καὶ ἀδύνατον*. Ceterū Plinius nitrosas & amaras aquas per polentam inspersam mitigari scribit; quin & in uinarios saccos eadem de causa polentā addi, quo uidelicet uis uini perire castrigetur, uelut alibi dixi. quanquā sint qui uinarios saccos legere malint, ut uideret nitiis uitia per polentam corrigenda intelligamus inter excolandum, atque haud scio, an nō hęc lectio Plinij sit genuina. Verba Plinij hęc sunt lib. 14. cap. 1. Nitroscæ aut amaræ aquæ polenta addita mitigatur, ut intra duas horas bibi possint. Qua de causa & in saccos uinarios additur polenta. Martialis poeta saccū uinarium inter apophoreta habet. Attenuare nives norunt & linthea nostra Frigidior colo non salit unda tuo. Paulus Aegineta lib. 1. cap. 5. de aquis inquit, *πρὸς δὲ καὶ ἰσθμῶν συμφέρεται τὸ διδάσκει καὶ ἁλινὰ καὶ ἀσφαλτάδια*, id est ad uerbum. Quādam colare expedit, limosas uidelicet & salās ac bituminosas. Verum interpretis eius libri Copus Basiliensis aliter legisse uidetur. Verit enim neq; nō prodest quādam aquas percolare, ut limosam, ut salām, idē cum polenta: tanquā sane pro *καὶ ἀσφαλτάδια* legerit *μὴ ἁλινὰ*. Aut igitur hęc Copi est uera lectio, & pro ea ob literarum uiciniam, *καὶ ἀσφαλτάδια* in uulgaro exemplari est suppositicia aut certe Copus ad Pliniana uerba respexit, atq; pro eo quod *καὶ ἀσφαλτάδια* in uulgari codice legimus, ipse *μὴ ἁλινὰ* supposuit. Quod autem ad rem attinet, utraq; lectio probam sententiā exhibet, utram tandem quis arripere malit.

Amplius autem & fomenta, clamor, contentio, omnisq; mentis perturbatio, & percussio. In bona autem animi habitatione & firmitate degendum. Hoc loco percussioem dixi *ἰκτεσιν* Græcorum, quæ sit ubi mens percellitur, & quasi extra se ponitur, unde etiam Græca uox *ἐκ τῆς ἰκτεσίνος* uidelicet est facta, quam exemplar græcum *ἰκτεσιν* habet nullo huc pertinente sensu. Quod autē dixi, in bona animi habitatione & firmitate degendum in græcō est *ἐν ἀνδρείᾳ διαστῆναι*. Videtur enim *ἀνδρεία* nihil aliud significare quā bonam animi habitationem & firmitatem ac tonum rectum, uelut ipsa uocis compositio declarat, si modo hęc lectio integra est. Vetus interpret uidetur aliter legisse, uertit enim, in spirabilibus bene locis cōuersandum est, quasi *ἐν ἀνδρείᾳ* legisset, & sanē ipsa uocis *διαστῆναι* significatio locum postulare uidetur, in quo sit degendum aut conuersandum. Quod si non esset, suspicaretur potius *ἐν ἀνδρείᾳ* legendum esse, quomodo etiam paulō post, ad capitis dolorē ex frigore habet, sed tamen exemplaris præscriptum sequutus, quam reddidi genuinam lectionem esse opinor.

Si lauri folia tenera in aqua fuerint incocta, aut sanfuci, aut cyperi. Cyperi folia accipio hic eius qui iuncus odoratus quadrans nobis est, non cyperi arboris, quæ ligustrum latinis dicitur. nam cyperi folia calfaciendi uim habent, sicut etiam eiusdem radicēs, de quibus paulō ante mentionem feci ubi ait, Cyperum tusum adipe anserino ammixto capiti illinito. Eū aut cyperi usum etiā Dioscorid. tradit. *αἰνιπύς* inquit, *καὶ μελέωνται διευρύνονται καὶ αἱ σὺν μετὰ μέγαν ἀνδρείαν*.

Affectionem capitis iam iuxta habitum, non simplicem modo contactum. Affectiones quęcūq; leuiter in corpore nostro hærent, ac facile exolui possunt, *ἐν χύμῳ* & *ἐν χύμῳ γυνήναι* græci medici dicunt. Contra uero *ἐν ἴσῳ* & *ἐν ἴσῳ* quæ in habitum cesserunt, ac difficulter exoluuntur, quomodo enī hic, *ἀνδρείαν* *ἀνδρείαν* *ἴσῳ* *ἴσῳ*, *ἐν ἴσῳ* *ἐν ἴσῳ* *ἐν ἴσῳ* *ἐν ἴσῳ*, *καὶ ἀνδρείαν*. Quod nos reddentes *ἴσῳ* habitū diximus, *χύμῳ* autem simplicem modo contactū. Verū hanc differentiam per egregiam similitudinem ad lignum in sole simpliciter calfactū, & aliud lignū usq; eo calefactū, ut iam ardeat & fumū edat, Galenus expli-

eat de febre hectica lib. 8. Methodi his uerbis *ἡσυχάζειν τὰς μὲν θύλακας*
ἐκ τῆς πυρετῆς, τὰς δὲ μεθυστικὰς ἐκ τῆς συγχυσεως iis quæ de feb. diacritica lib. 8.
αὐτῶν τῆς πυρετῆς, τὰς μὲν θύλακας, ἐκ τῆς, τὰς δὲ θύλακας, χυσεως inuoluntate, ἢ
 laxitate inuoluntate, τὰς μὲν πυρετῆς θύλακας ἐκ τῆς διακρίσεως, ἢ τῆς συγχυσεως, ἢ
 laxitatis, τὰς δὲ μεθυστικὰς ἐκ τῆς συγχυσεως, ἢ τῆς laxitatis, hoc est, siue in ha-
 bitum mutata sint, siue leuiter tantum hæserint.

Quam Erasistrati sectatores plethoran, hoc est, plenitudinē uocant. Modus
 est loquendi graecorū *ὡς ἐν ἐνστάσει* ἢ *πλεθὺς* per *ἐνστάσει* plenitudinem, quo ipsum Era-
 sistratū indicant. Velut etiam xl. Meth. ait *οἱ πλεθὺς τὸν ἀνθρώπου καλῶς ἐνστάσει*
ἐκ τῆς πλεθῆς, id est, Aristoteles oppositionem uocat non contrarietatem. Verū
 ego Erasistrati sectatores hoc loco uertere malui. Nam contra hos priuatum πλεθὺς
 φλεβοπνίξας scripsit Galenus, & πλεθὺς πλῆθος eōs uel in primis exagitat: quanquā
 etiam πλεθὺς φλεβοπνίξας contra ipsum adeo Erasistratum scripserit, ut nihil referat
 utrum accipias, quum sectatores nihil à magistro desiderint.

Refrigerabis aut quæcumq; adhibere uoles in aqua uehementer frigida collo-
 cara, quæ si non adsit, niuem uasculo circumpones. Duos refrigerationis medicā-
 mentorū modos hoc loco Galenus docet, per positionē uidelicet in aquā frigi-
 dam, & per niuem circum uasculū appositionē, in quorū penuria, etiā tertium postea
 subdit, expositionē sub diuinū per integrā noctē, quam Græci significare solent
 uerbo *ἀνυκνέειν*. Cæterum refrigerandi per niuem modus, ita ut ea uasculo cir-
 cumponeretur, ut quasi per eā uasa adobruerentur, ualde frequens Romæ fuit,
 & per eam nō solum uina, & aliquos præsertim ex lacte cibos, itemq; fructus, res
 frigerare solebant, uerū etiam aquā prius coctā, quam inde decoctā appellabat.
 Galenus lib. 7. Methodi. *ὅτι φέρεται μὲν δὲ μόνον τὸ πρὸς τοὺς ἰσχυροὺς τῶν ὀργάνων, ἀλλὰ καὶ τὸ*
ἐπὶ τὰς χύλας ἐν τῇ πυρετῇ, ὡς ἐν τῇ πλεθῇ ἐκ τῆς συγχυσεως, ἢ τῆς laxitatis, πρὸς τὴν κατὰ τὴν
ὡς αὐτὴν πρὸς τὴν κατὰ τὴν πλεθῇ. Quo loco interpretes Linæcer non intellexit, quæ
 esset quā Romani decoctā appellaret. *Διούκτις* enim biscoctā uertit, quasi hæc
 uox idem quod *διούκτις* significaret, & quasi ex *δι-* græca, & *ούκτις* latīna parte
 composita esset, quod contra grammaticorū primū præcepta est, uetantissī dūer-
 sarum linguarū uoces in compositionē unam misceri, deinde cū re ipsa pugnat.
 Nam nullius hic aquæ bis coctæ Galenus mentionē facit, sed tantū eius quæ se-
 mel decoctā, aut præcalfacta est, ac rursus per niuem refrigerata. *Διούκτις* enim
 hic latīna uox est, hoc est decoctā, u. pro latīno e. longo, sicut græci in usu habēt
 expresso, non u. uelut exemplaria habent. Vsurpatur etiā apud Athenasī lib. 3.
ὅτι τὰς δὲ χύλας, inquit, δὲ χύλας τῶν ὀργάνων διούκτις, αὐτὴν λέγουσιν ἀνυκνέειν
γλουκνέειν ἀνυκνέειν, ὡς αὐτὴν πρὸς τὴν κατὰ τὴν πλεθῇ. Quod aut decoctæ eiusmodi usus fuerit Romæ Plī-
 nius li. 3. cap. 3. ostendit. Neronis principis: inquit, inuentū est decoquere aquā:
 uitroq; demissam in niues refrigerare, ita uoluptas frigoris cōtingit sine uitio ni-
 uis. Omnē unq; decoctā unioiē esse conuenit, ita calfactā magis refrigerari sub-
 tilissimo inuenio. Martial. poeta Apophoreis. Lagna Niuaria. Spoletina bibbis
 uel Maris condita cellis. Quo tibi decoctæ nobile frigus aquar. Ac ueto refrige-
 ratio per aquā frigidam tripliciter fieri potest, uel simpliciter ut hic ait in aqua ue-
 hementer frigida uasculo collocato, uel ut uas in puteo suspensum aquā contin-
 gat, quanquā etiam si non contingat refrigeratio accedat, uel ut etiā aqua destil-
 lans se uas illudat, qui modus efficacissimus existit, uelut Galen. 2. simpliciter phar-
 macorum & 2. Methodi palam docet.

Ego in sexcentis hoc medendi modo usus. *ἀνυκνέειν* græci dicunt, hoc est,

in x. Milib. pro magna & incerta multitudine, prouerbiali schemate, pro quo ego in sexcentis uertis. Nam & hæc forma latinis, similiter ut illa græcis usurpatur. Eodem modo ^{supra} ~~supra~~ aduerbialiter dicitur, quod nos sexcenties. Trentius tamen milies, p eo uidet dixisse in Eunūcho. Narra obsecro, plus milites auduit.

Sic etiam mali punici, & mali cotonei, & melsii.] Græci malum punicum *ῥαῖον* appellant, Malum autē cotoneum siue cydonium, simpliciter *μήλον*, id est, malum uocant, quomodo etiam hoc loco, *ὅτι δὲ καὶ ῥαῖον, καὶ μήλον, καὶ μεσσίον* habetur, ut generis nomenclatura, species cotoneorum quasi per excellentiā in- dicetur, atq; id etiā in his quæ ex hoc malo fiunt faciunt. Oleum enim melsinū dicunt ex malis cotoneis, item uinum melinum & maleum siue *μελίτην* ex ἡδὲ malis factum, quod tamen etiam Cydonites uocatur.

[Nam & incontracta minimeq; arefacta, & decolor ipsorum facies apparet.]
Supra eorum qui ex ardore caput dolent, cutem ad primum contactum aridior
rem, oculosq; rubros esse dixit, hinc itaq; ex frigiditate caput dolentium cōtraria
signa facit, faciem videlicet incontractam, minimeq; arefactam, quam ἀσύντηκτον
ἔνθ' Græce dixit. Est enim ἀσύντηκτον quod non contractum est, neq; præ aridi-
tate confidit, opponiturq; τῇ συμπατητικότητι, itemq; παραπατητικότητι. Galenus lib. i.
comp. pharm. ἐστὶ γὰρ λυβόντις ὁ δὲ τῷ μέρει ἐστὶ τῶν ὑποδαίμων ὅν τ' ἐκ μέρους αὐτῶν ἐκπίπτει
καὶ, ἐκτείνῃ παραπατητικότητι καὶ φάρσιν καὶ ἀντίκμα πάσσιν, id est, coacta & fedata, Acti-
us ferm. 2. cap. 30. de uua alba arefacta. ἀνιδρώσι στεφάνῃ λυβὸν καὶ συμπατητικότητι
μὲν ἀσύν, id est, μακροβίον. Significat tamen etiam συμπατητικότητι quod paratum
ac promptum habemus, & quod nobis obligit. Idem Aetius eodem loco. πᾶσι
τῇ ἀνιδρώσει ἐρεῖα συμπατητικότητι ἐστὶ μέγχι τὸν αὐτὸν ὁρᾶμεν ὅν χαμῶνι μέλυσσι, id est, prom-
ptas & paratas habere oportet.

[Et quandoq; à Raphano uomitus.] Vomiti cieri per raphanū sumptū ante reliquum cibum dicit Diosc. lib. 2. utpote qui hoc modo cibū eleuet, & ad euomendum protrudat. A reliquo autē cibo sumptum, distributionē ciborū in corpore iuuare perhibet, his uerbis ἡ ραφανή ἀνακαταβάλλει τὴν τροφήν καὶ αὐτὰ ἐκ τοῦ σώματος ἐκβάλλει. Verum Galenus lib. 2. de alimentis, se mirari ait tum medicos, tum vulgus, quī raphanos crudos à coena ἀποφάσκειν γινώσκοντες id est bonæ concoctionis gratia edunt, quibus uerbis ipsum Dioscoridem, sicut in plerisque alijs locis, norat.

Ex quibus optima in septimo libro huiusmodi tractationis. J. Galenus septē libros de comp. pharmacorū secundū genera scripsit, & ante hos decem libros de comp. pharm. secundum locos quos iam enarramus, edidit. In quorum septimo hic autē tradidisse medicamenta Metasyncretica à Methodicis appellata, ea itaq; isthinc petenda sunt. Rario uero appellationis supra lib. nobis prodita est.

Quin & ipsa brassicæ folia calida macerata, capitibus circumposita ac obligata naturaliter ebrietati resistunt.] Quædam res naturali odio ac discordia dissident, ut eodem etiâ loco uiuere ac nasci nolint. Quibusdam rursus eiusmodi amicitia à natura insita est, ut mutuo conc hæreant, cuiusmodi multas Plinius lib. 14. cap. 1. & Constant. Cæsar lib. 15. cap. 1. recenset, atque hanc rerum concordiam ac discordiam amicitiamq; & odium, pacemq; & bellum, Græci *συμμιξία* & *ἀντιμιξία* uocant, quomodo etiâ hic brassicam *φασβίαν ἀντιμιξίαν τῇ μένῃ*. Id est, naturaliter ebrietati resistere dixit. Plinius lib. 34. cap. 15. de ferro. A rubigine uindictæ cerussa & gypso & liquida pice, hæc est temperatura à Græcis antipathia dicta. Fit autem naturaliter, quod iuxta nulli rei temperamentum neq; simplex neq; compositum, sed ex natura proprietate contingit. Meminit huius contrarietatis brassicæ ad uinum uinumq; ac ebrietatem etiâ Plin. lib. 10. cap. 9. itemq; lib. 17. cap. 14. sine, sed eo loco

raphanū ex Theophrasto ut apparet uentis, quam brassicā oportuit, uelut etiam
alibi indicatū. Sed idem error admissus est & lib. 4. cap. 32. ubi ex Aristotelis li. 5.
hist. animal. raphanū pro brassica dictū, idem raphanum reddidit, quam brassi-
cam debuit, uelut ipse Aristot. exponit. Sales aromatū cōdimentis ad sapore
edulcati. Sales cōdimentarij quos hic ἄλας ἀρωματικές ab aromatū o donis si-
pellauit, sūt ex salis generibus quibusdam, & aromatīs atq; seminibus o donis si-
mul tritis ac cōmissis. Tales sunt Theriaci appellati ac descripti à Galeno ad Pi-
sonē de theriaca, Verū corruptissima est de his Galeni lectio, restitui autē potest
ex Aetij ferm. 9. cap. 97. unde etiā Paulo quis opem ferre possit, quē eos uem ad
finē 7. li. descriptos habet. Tales sunt etiā Sales Iamblichō inscripti, quorū sape
mentionē facit Paulus. Item Sales Pollentis, & sal dodecatheos, quē nos duode-
cimanū diximus, quorū compositiones habentur apud Aetium ferm. 9. cap. 14.
quanquā hic à XII. deorum magnorū potentia appellatus esse uideri potest.
Quin & mala Cestiana appellata in urbe Romana. Mala Cestiana esse Ro-
mā Galeni seculo dicta, quē hodie uulgo pōma Arantia appellantur, ex hoc uel
maxime mihi persuadeo, quod ea frequenter cum malis punicis Galenus cōiun-
git tanquā non multū uiribus & potentia ab illis deficient, quod certe experien-
tia etiā hodie cognoscere cuiq; datur, quū punicorū penuria, Arantia in plenisq;
locis in usum ueniāt, ad corroborandum uidelicet os uentris, in quē sanē usum
etiā hic à Galeno approbantur, sed tamen magis cocta, quo uidelicet per coctū-
ram austerum saporem, & ob eū nimiam adstringendi uim deponant, quanquā
sint etiā in hoc genere quā penitus dulcia existant. Ceterū cocturę modū planē
pomis Arantijs aprū hic tradit, per uaporē scilicet ab aqua calida sublatum. Reli-
quis enim pomorum generibus hac coctura uix suffecerit, sed uel farina aut fer-
mento oblita assantur, uel in ipsa aqua coquuntur. Quemadmodum contra de
punicis negare eorum ullam cocturā fieri Galenus secundo de alimentis, ἡ δὲ πικρὴ
ἐστὶν, ἡ δὲ ὀψιόντα μὲν τὰ σακχάρη, ἡ δὲ ὀψιόντα δὲ ἡ δολιχὴ, ἡ δὲ ἀτμῶ. Quod uero dicit
XII. Galenum Cestiana mala punicis frequenter coniungere, itemq; cotoneis, alijs
quot locis indicabo. 7. Metho. Ὁ βαλβὴν ἰδιῶν διδωσκέ, ἢ τὴν μῆλα λευκάνια, ἢ λευ-
κάνια, & ἢ ἢ. Methodi. ἢ ἢ τὴν αὐτὴν τῶν ἡμετέριων μῆλων, ἢ πῶς τὰ λευκάνια
& ἢ πῶς τὰ λευκάνια, ἢ τῶν αὐτῶν τὰ πικρὰ ὅσα ἐστὶν τῶν ἡμετέριων πῶς ἀποδοχὴν
ἢ πῶς. Sic etiā infra lib. 6. cap. 1. & cap. ultimo πῶς ὀφθαλμοῦ habet, & lib. 9. cap. 5. in
cōfectione ex fructibus, & plenisq; alijs locis, ex quibus apparet ea poma Romae
fuisse magna copā uelut hodie in Mediolanensī ditione uident. Verū Cestia-
norum appellatio penitus exoleuit, & neq; uulgo neq; apud autores etiā reliqua
est. Plinius tamen lib. 15. cap. 14. ubi de generibus malorū ait. Ergo habet originē
à Mario Cestioq; & Manlio, &c. uidetur Cestiana à Cestio esse appellata indica-
te, uelut Matiana à Mario, nam antea dixerat, conditoribus suis æternā memo-
riam propagasse, tanquā ob egregiū aliquod in uita factū. Legitur tamen in uul-
garis exemplaribus Gestio pro Cestio. Verum nusquā describit Mali Cestiani
figuram, uelut Coroneorū & punicorū atq; aliorū prodit, Galenus quoq; quē
de alimentis lib. 4. de omnibus fructibus diligenter tradat, quale tamen sit Cestia-
num nō perhibet, utpote quod, uelut ex supra indicatis locis apparet, tanquam
uulgare pomū ac omnibus notū reliquit. Ego itaq; Cestianū itemq; Matianum
malum idem esse opinor, à conditoribus ac per insitionē propagatoribus diuer-
sis appellationibus acceptis, quanquā utraq; appellatio exoleuerit, & Arantio-
rum nomen pro eis uulgo successerit, nisi quod Matianorū nomen Hispanorū
linguā adhuc referre uidetur, quā omniū pomorū genera Manzana dicuntur,
quanquā non dubitandum esse purem, poma Matiana in poma arantia esse cor-
rupta. Porro quod quidam punicorum appellationē Arantijs tribuunt, & Gra-
eca uocāt quā uere punica sunt, ex Plinio redarguitur, qui lib. 8. cap. 9. ait. Sed

circa Carthaginem punicum malum cognominis sibi uendicat, aliqui granatum appellant. Quare idem pomum est punicum & Granatum appellatum, at hoc quod Arantium appellatur non longe ab eo uelut dixi, uiribus diuersum, & propterea in eundem etiam usum assumitur, & quondam Cestianum itemq; Matianum appellabatur. Quod itaque Sueton. in Domitiano scribit, prandebat ad satietatem, ut non temere super coenam præter Martianum malum, & modicā in ampulla posuicula sumeret: Ego de nullo alio pomo accipio, quā de Arantio hodie appellato, siue Matianum, siue Martianū, ut uulgo exemplaria habent, legat, à Martio mense ut puto facta denominatione, in quo maturescit. Hoc enim uidetur corroborandi stomachi gratia sumplisse. Quod si cui tamen Cestiana & Matiana diuersæ malorum species uideantur, ex eo quod Columella eodem loco tanquam diuersa nominat, quanquā Sestiana, nō Cestiana legantur lib. 1. cap. 4. s. suo sensu fruatur, ego meas coniecturas pro oraculis nō prodo. Abstinentium uero à glandibus palmarum.] Græcum exemplar habet hic ἀπὸ χιθων δὲ βελάνων φαινίκων, quasi distinctum sint tñ glandes, tum palmæ siue palmæ fructus accipiendi, atq; ita existimauit uetus interpres. Verum citra diu istolen legendum, accipiendiq; palmæ fructus, qui etiam δακτυλῶς appellantur, & composita uoce φαίνικβέλανον, de quibus palam tradit Dioscorides, quod capitis dolorem inducant, αὐτὸ δὲ φαίνικβέλανον inquit συνηκόνθηται τυγχάνουσι τῶν πυρίων, λευκαλλγῶς δὲ αὐτοῦ, καὶ πλείονες βρεθῆσαι μὲν σκετοῖ. Et Plinius 12. cap. 11. Quod relinquitur phœnicobalanus uocatur & nigrescit, uescentesq; inebriat, & de eadem etiam lib. 13. cap. 5. repetit, palma inquit, quæ fert phœnicobalanum probatissima in Aegypto, &c. sed pro phœnicobalanū, legitur in omnibus exemplaribus myrobalanum, quod falsum esse nemo adhuc animaduertit, ex tot qui hūc locum citauerunt. De phœnicobalano enim hæc accipienda, quæ palmæ fructus est, Myrobalanum enim alia quā palma arbor fert, nimirum myricæ arboris similis, ut Diosco. lib. 4. tradit. Quin & uerba quæ Plinius eo loco subiungit, aliu & menses sistit in uino austero, Dioscorides de pœnicobalano lib. 1. habet, πινὼν δὲ αὐτὸ οἶνον αὐτὸν πρὸς διαφόροις τε καὶ ῥῶν γυναικῶν, quanquā & hoc loco ῥῶν γυναικῶν, falso menses reddidit, uelut alibi satis declarauit. Idem Plinius lib. 13. cap. 4. ubi palmarum genera recenset, etiam patet quoddam ex eis appellari tradit. Tertium inquit ex his genus Pateton nimio liquore abundat, rumpitq; se pomi ipsius etiam in sua matre ebrietas calcatis similis. Sunt itaq; palmæ πικρὴ quæ solem passæ diutius, quā sint alias nimio liquore refertæ: rumpuntur, ut ob id quasi calcatæ uideantur, atq; hoc genus sapientissime apud Galenum Actium & Paulum φαίνικας πικρὰς, hoc est, palmæ passæ & quasi calcatæ appellantur, quomodo etiam πεφθόλας πικρὰς dicuntur Actio ut alibi indicaui. Galenus Methodi 2. καὶ μὲν δὲ αὐτὸ τὸ δὲ τῶν φαίνικων ἐπίθεται τῶν λιπαρῶν, οὐ μόνον δὲ αὐτὰς ἀπὸ τῶν ἀγρῶν φάσμασιν. Verum interpres Linacer aut nō intellexit quæ essent πικρὰ palmulæ, aut certe temere uocē uerā & genuinā mutauit, nam pro πικρὰ τῶν δακτυλῶν substituit. Ita em uertit. Iam uero quod ex pinguibus sit palmulis quās δακτυλῶς Græce uocat, salutare medicamen est. Cæterū hæc obiter, quod uero huc pertinet, βελάνων φαίνικων hic soluta cōpositione dixit, q̄ φαίνικβέλανον composita uoce appellant. De glandibus aut uulgaribus, hoc est quercinis, cum non hic facere mentionē, ex hoc colligere est, qd nullus cōsimilis fructus hic cōmeminuit, quanquā etiā quod sequit de ipsis uerū sit, qd uidelicet capitis dolore inducāt, experientia itemq; Dioscoride teste. Palam etiā ex libro ἀποθεσίων patet, ubi simpliciter legi, φαίνικων δὲ πικρὰς ἀπὸ χιθων, additurq; eadē ratio quæ hic habetur, nimirum quod proprietas quandam habeāt capitis dolorem inducendū.

Permittendus est eis potus ex uinis aquosis.] de uinorū aquosorū cum quantitate tñ qualitate in potu cōuenienti Gal. li. 7. Meth. docet, ubi etiā horū generū quæ hic habentur mentionē facit, si cui de ipsis amplius cognoscere libeat.

Et mollius lanarū fasciculi a ceto & rosaceo conspersi.] Fasciculū dixi hoc loco globosā lanę conuolutū, quē alias etiā lanā conuolutā appellauī. Est em̃ ea signifi-
ficatio πάλμας uocis ἀπ' τ' πάλμ, hoc est à constringendo & cōuoluendo appel-
late. idem etiā σφινγισιός à cōplicando siue plicatura dicitur, unde & σφινγην φάρος
Galenus x. Meth. dixit bis complicatū idem etiā σφιγγισιός non ita longe ante
dixit, & infra lib. 4. πάλμας ιέρως. Paulus uero etiā σύσφιγμα ὁ ιέρως li. 3. ca. 7. Celsus
hapsum lanę dicere solet, ut lib. 7. ca. 17. cū multo is oleo perungendus, inducen-
dusq; hapsum lanę mollis, tepido oleo repletus. Diosc. li. de amaracino ungētō.
ὅτι πρὸς τῇ οὐρίστροφίᾳ καὶ κούστρον καὶ πάλμασαν ἡρακλῆος βλεβερυμελου καὶ ἀποδάμνου. Gal.
xiii. Metho. τὸ δ' ἐλάω λινάων παύδαυσι φάρμακα πάλμας ἰλασαι θυριὰς βλεβερυμέας. Idem s.
Metho. πάλμας μίξε τὴν ἀποθροχμήν ἄται θυριὰν ὑδρὸς φάρην ἢ βλεβερυμέαν μέλι ἰλασαι καὶ τὸ
ἀποδάμνον ἀποδείδου, τὸ πάλμας δ' ἐκαστοῦ μαλίστα, ἀποδάμνον καὶ λινάων καὶ σφίν-
γιον ἀπομάλιναι βλεβερυμελου καὶ ἐκάστου αὐτὸν ἰσοῖσθαι ἥτοι σφινγισιόν ἢ σφινγισιόνα ἀποδάμνον καὶ λινάων.
Quo loco interpretes Linnæcer uertit, incingi illi peniculus possit fomētū debet, et
post, ex eo peniculū eodē modo imbutū uentri incingere. Tanquā uidelicet πάλ-
μας, hoc est lana cōuoluta, siue ut ipse dixit peniculus, nō imponendū & indu-
cendū tantū sit, uelut uerba ἀποδάμνον et ἀποδάμνον indicāt, sed etiā incingēdū, atq;
id fecisse uidet, ppterca qđ gręca lexica uocē πάλμας, ζώνην et μάστιγα interpretant,
& quod etiā ipse Gal. paulō infra de eadē lana cōuoluta, hoc est, πάλμας πάλμας re-
petens, ζώνην ipsam appellat, his uerbis καὶ φορέτω καὶ τὰ καμνίσματα τὴν ζώνην, ἵνα γ' ὁ
ἐλκετος στρεφώται, ἱγχαρὲς δὲ κορυφαίαν ἀντὶ τὴν παντήν, hoc est ueluti idē interpretes uertit. Si
uero qui affligitur cinctū non panē siue ob consuetudinē, siue delicias cingi recu-
set, licet cerato idem efficias. Verū Galenus neq; per πάλμας neq; per ζώνην, cin-
ctum maxime arctiorē indicare uoluit, quē agri aut ex more, aut ob delicias fer-
re nō possint, sed simplicē tantū impositionē ac nudā circundationē, qua neq; mi-
nimū ager cōstringatur, sed ut inhærere tantū lanę fasciculus possit. Quod autē
dixit, Si uero agri uel ob cōsuetudinem uel ob delicias, zonā, id est, lanę oleo im-
butę circulū nō ferāt, id nō ad cinctū arctiorē respiciēdo dixit, quis em̃ adeo deli-
catus est, ut hūc grauius ferat, si nō penitus uiolēter fiat, sed ad olei siue unguētī
impuriore usum, si ita in lana ex eis madēte adhibeātur, atq; ob id subdit idē per
ceratū effici posse, utpote qđ per cereę ammixtionē solidius reddat, eademq; tum
olea, tñ ungenta cōplecti possit, neq; tamen ita corpus foedare. Nā liquidorū oleo-
rum itemq; aliarū illi osionū usum pleriq; auersantur, & Emplastrā aut cerata sibi
adhiberi malunt, quod Aetius s. cap. 16. his uerbis expressit. ἐπιθεῖν δ' οὐκ εἰς πολλοὺς πόνους
μέλι τ' ἐπιχρίσκειν διηλεκτικὴ παρασκευασία, ἀερωμένη δ' πᾶσι τ' ἐμπλοσφύνει, αὐτὴν δ' οὐκ ἐξή-
κουνται ἐπεργυνάμενοι ἀποδέξειν, οὐτε φαρισμαλὶα περιέθενται τὴν χύτην, συναψάντων δὲ οὐ καὶ
πᾶσι τοῖς σκληρότεροις, quę uerba ex Galeni lib. 5. huius operis transcripsit.

Postquam ulceris labia fibulis impositis constrinxerimus.] Tres modos adducendi & glutinandi oras ulcerū Gal. Meth. tradit, Sutura uidelicet, fibulas, et deligaturā, his uerbis, ἢ γὰρ ἀσφάλιν ἐκ πύλλων τοῖς βλάβουσιν ἐκ δ' αὖτις ἀπὸ χυμῶν ἢ ποταμῶν, ἢ λίαν τόνου ἢ πικρῆς, στυφάσης ἀπὸ τὰυτῶ τῆ ἀνεκρήψεως. Celsus li. 5. Sutura si plaga in molli parte est probat, uelut fronte, auricula ima, naso imò, bucca, palpebra. Si uero in carne uulnus est hiatq; fibulas imponēdas tradit. Reliquis deligatura per fasciā sufficit, aut etiā cū illis simul adhibet. Hoc itaq; loco Gal. ἀπὸ νεκρῶν ἐκ τῶν πύλλων ἢ ἀσφαλιν, hoc est ut uertit, postq; ulceris labia fibulis impositis constrinxerimus dixit, uerbo ἀπὸ νεκρῶν ἢ ἀπὸ πύλλων, hoc est, ἢ ἐκ τῶν νεκρῶν ἢ ἐκ τῶν πύλλων, factio. Sunt etiā ἀπὸ χυμῶν, ἀσφάλιν quibus oras uulnerū siue ulcerū cōtrahuntur, ne maior cicatrix fiat latinis fibule itēq; hamuli appellati. Quanquā etiā loci in collo p quos cōstrictos suffocari cōtingit ἀπὸ πύλλων Hiesychio appellātur. Verū Paulus Aegineta li. 4. ca. 1. lucte genus quo colla mutuo petuntur ad strangulationē minandam, ἀπὸ πύλλων appellasse uideri quēat, ὃ γινεσθῆναι inquit, πύλλων, τῆ ἢ ἀπὸ πύλλων, τῆ ὃ πύλλων.

facti. Verū ego nō uideo quomodo se quis plumbeis pilis manu utraq; detentis librare possit, ut uel expeditius uel certius assiliat, aut fossam aut aliud impedimentū transiliat. Ego itaq; nō ἀλκίως eo Luctari loco, sed ἀλκίως legendū existimo. Atq; ἀλκίως adminicula auxiliaria accipio, quibus suffultus aliquis fossam transilire cōmodius possit, cuius generis sunt hastæ & cuspides, palicq; ac ridicæ & assilæ oblongiores, quorū usus etiā hodie uulgo ad fossam salu transmittendam est receptus. Aut certe ἀλκίως sunt cuspides qui ad utrunq; extremum plumbeā pilam annexā habent, quibus etiā num hodie funambuli utūtur, eisq; per funes extensos inambulantes se librant, ac quasi sustentāt. atq; in hanc opinionē inducor à Galeno, qui lib. 4. ὑγιᾶν inter uelocia gymnasia recenset exercitiū, quod sit per manus æqualiter p̄ductas, citra adminiculorū auxiliariorū detentionē, ita ut motus ipsarū ad densitatē simulq; uelocitatē tendat, siue quis in pugnū contrahat, siue simpliciter ipsas expandere uelit. Sed melius est ipsa Galeni audire uerba. ὃ μὲν δὲ ὃ δὲ δὲ χερῶν ὅταν ἴδῃ γυμνάσιον ἀμείνονον γυμνασθεῖσθαι, καὶ εἰς τὸ λυγρὸν ἀλκίως, ἀλλὰ οὐδὲν αὐτὸς τὸν λυγρὸν αὐτῷ αὐτὸς πυνόμεναι. ἔνα δὲ τὰ χεῖρ, ὅτι πρὶν ἵδῃ τὸν αὐτὸν χερῶν πυνόμεναι ἀναχέειν ἀπὸ τοῦ. Quod itaq; Gale. dixit λυγρὸν τὸ λυγρὸν ἀλκίως, intelligo citra auxiliariorū adminiculorū detentionē, cuspidē uidelicet in extremis plumbatorū. Si quis enī eos ipsos alcteras detineat, nō minus exerceri posset, de quo tamen exercitiū, ut noto eo tēpore nō meminit Gal. inter multa adeo quæ isthic recenset. Hanc igit inter halteras & alcteras differentiam uisum est hoc loco annotare. Sed & illud adijciatur, ἀλκίως etiā ἀρτίως dici liquidis literis α. & ρ. inuicem succedentibus, ita ut ἀρτὸ τὸ ἀρτὸ, id est ab eleuādo, utraq; uox sit deriuata, uideturq; iuxta hanc originationē utraq; uox citra aspiratōnē esse scribenda, citra quam etiā ἀλκίως scribuntur, ἀρτὸ τὸ ἀλκίως, id est, quod auxilio sint ad saltū faciendum. Verum confusionē & rerū & uocum, inde faciā apparet, quod ἀλκίως, ἀρτὸ τὸ ἀρτὸ deriuat, crediti sunt atq; sic ἀλκίως ἀρτὸ ἀλκίως inoleuerūt ac recepti sunt, & uerū ἀλκίως tū nominis scripta, tū usu suo abolitā ac ignoratā. Declarat autē hanc rem uel maxime Artemidorus lib. 4. cap. 57. de somniorū interpretatiōe, qui de arteribus siue alteribus sic ait, ἀρτίως δὲ ὃ τὰ ἰδία τὸ τῶν γυμνάσιον, τὸ μὲν παρὸν ἀπαρτῶν ὃ πίνεσθαι, ἀλλὰ δὲ πρὸς μετὰ τῶν ἰδίων πυνόμεσθαι, ἢ τὸ πρὸς τὸ γυμνάσιον, ὅτι ἀλλο ἢ παρὰ τὸν χερῶν, hoc est, uelut in eius uersione reddidimus, Arteres & gymnasia ipsorū propria, in præsens quidem in prosperū actionū successum, & labores, rursus autē actiones cum quietē prædicunt. Est enim huiusmodi exercitiū nihil aliud quàm manū p̄paratio. De Alcteribus autē sic eiusdem libri cap. 59. τὸ δὲ πρὸς τὸν δούλον, ἢ πρὸς τὸν τῶν ἰδίων ἀρτῶν μὲν πρὸς, &c. σημαίνει, σημαίνει δὲ αὐτὸς τὸ ἀρτῶν αὐτῶν τὸ πρὸς τὸ πρὸς τὸ ἀλκίως, hoc est Quinquertium siue pentathlos, hoc est, quinq; gymnicorū certaminū generibus exerceri, obseruauī in omnibus primū quidem peregrinationē, &c. significare, Sape uero & anxietates & curas supra prædicta, ob saltus qui alctērū adminiculo sunt. ἀλκίως hic usum τὸ ἀλκίως dixit, palamq; est utroq; loco de diuersis rebus ac exercitijs ipsū loqui. Sed nunc ad institutū reuertamur, ubi de hoc saltē admonueto, alias à supradictis esse fibulās, quarū Martialis poeta frequēter meminit. In fibulandī autē per eas modum & usum docet Celsus lib. 7. cap. 25. ferē ut superuacuum. Nullus certe Græcus medicus eius mentionem, quod equidem sciam, fecit.

[Iuxta concarnationis modum curare oportet.] Plagam quæ usq; ad pelliculam caluariam ambientem penetrat, post ipsius pelliculæ diductionem ossisq; scalpturam, per concarnationis modum curandam esse docet, hoc est ut ipse inquit, τὸ συνσπινόμεν, quod sit per eorum quæ carnem gignunt atidorum insper-

forum usum. Sic Paulus lib. 6. cap. 7. καὶ τὴν ὑπὸ συνάγκην αὐτῶν ἢ διεσπασμένην, καὶ αὐτοὶ σπασμένοις ἐσίν.

Empiricorū simili transiitione usus, non indicatione dogmaticorū.] Empirici medici transiitione ad simile uelut instrumēto utebant, atq; per eam ab affectu ad affectū consimilem, idem auxiliū transferebant, uelut hic à phrenitidis & lethargicis Apollonius, acetum rosaceo misceri, ad capitis plagā aut casum transtulit. Ita etiam à loco ad locum simili transiitione utebantur, uelut à brachio ad femur, Amplius ab auxiliō prægnoito ad simile perueniūt, uelut in profluuiō uentris, à malo ad mespilum. Verum dogmatici contra naturæ perscrutationē ut necessariam præceperunt, tū in curando corpore, tum in causis omnibus cognoscendis, quibus quotidie corpus ipsum sanius aut ægrius redditur, atque ultra hæc aeris, aquarum, regionum, studiorum, ciborum, potuum, consuetudinūq; naturam medico perspectam esse uolunt, quæ omnia Apollonius hoc loco uelut Empiricus reliquit.

Per symptomatum concursus syndromas ab ipsis appellatos.] Symptomata accessiones seu accessoria mala sunt quæ ad iustum morbum συμπτῶσαι, hoc est accedunt. Sunt autē hæc duplicia: Quædam enim actiones lædunt quæ tum συμπτώματα, tum πάλιν appellantur. quædā uero actiones non lædunt, uelut pallor & tumor, quæ symptomata quidem uocare licet, uerum in sanis appellantur συμπεσόντα, in ægris autem συμπτώματα. Sunt autem eadem etiā πάλιν, itemq; διαβήσας, & in hoc à prioribus differunt, quod illæ διαβήσας non sunt, & proprie rea curam non requirunt, sicut etiam neq; curationis indicationē faciunt. actionem enim læsam nemo curat, sed ipsum affectum, & propterea πάλιν quidē ἐπὶ μόνῃ & διαίρεται appellant, quæ ut latini ab affectibus quæ διαβήσας græcis sunt, distinguamus, iam uitia, iam passionēs, iam mala appellare solemus. atq; hæc est summa omnium quæ Galenus in primo & secundo Methodi contra Thessalū & reliquos Methodicos, de differentiā πάλιν καὶ διαβήσας ἢ νοσήσας, hoc est uitiorum, affectuum & morborum habet, quanquā etiā ἐπὶ τῷ πάλιν ὄνομα κατὰ τὸ νοσήσας ἀφίρεται οἱ παλαιὸι ad finem isthuc Galenus addat. Horū itaq; symptomatum concursus Empirici syndromas appellat, uelut hic Galenus habet, itemq; 1. Meth. 3. τῶν 30 inquit ἀφίρεται ὀνόμαζον αὐτὸ τὸ πάλιν συμπτώματα ἀφίρεται. Quod autem dixi latinos item distinguere ac uitare ne πάλιν affectus siue affectiones dicant, tam frequens est apud Pliniū ut certos locos indicare nō sit opus. Testiū enim uitia, & uirilium ac genitalium mala, nihil aliud quàm διαβήσας πάλιν existūt. Quin & quæ desideria ab eodem dicuntur, πάλιν esse uidentur, uelut lib. 11. cap. 24. de melle inquit: faucibus, tonsillis, angine omnibusq; oris desiderijs utilisimum, nisi quis malit pro διαβήσας, desideria dicta esse. Verū quum ueteres etiam πάλιν, ut ipse Galenus ait, νόσους dixerint, non magnopere deliquerit, qui etiā πάλιν affectus seu affectiones uerterit. à quo factio neq; nimium in hoc opere uertendo abhorruimus, quā ea distinctio, quam Galenus in primo & secundo Methodi tradit, eò saltē spectare uideatur, ut intelligamus πάλιν maxime quod ipse διαίρεται appellat, & quod actionē lædit, curationem non expetere, neq; indicare, sed διαβήσας quæ proprie affectus appellatur. Nam illam ipsam distinctionem neq; ipse Galenus perpetuo obseruauit, sicut neq; illam de qua paulo superius dixi, quod συμπεσόντα in sanis appellant, quæ in ægris συμπτώματα. Nam subinde inter se cōfundit, uelut in libris de dyspnœa uidere est. In principio autē huius operis qd enarramus, sic ait, ὅτι μὲν ὁ μόνος τὸ διεσπασμένον πάλιν ὁ δὲ ὁ δὲ τὸν διεσπασμένον, quod cōtra hoc est quod 1. Meth. dixit, καὶ τὴν ὑπὸ αὐτῶν καὶ διεσπασμένην καὶ τὴν αὐτοὺς λαμβάνειν συμπτώματα, &c. Quare palam est etiā isthuc ipsum

πρόσθετον ἐν τῷ ὀσμῇ ueterum more πῖος dixisse, sicut nos quū affectū uertū
mus uocem πῖος, facimus: quod ipsum etiam Gal. 1. de locis affectis testatur.

Vngento Mendefio caputilline. J Mendesium ungentū quo modo fieret do-
cet Dioscorides & Paulus. Meminit eius etiam Plinius. Mendefiū dictū est, quod
in praefectura Mendefiorum in Aegypto inuentum esset, & laudatissimum fie-
ret, atq; hoc est quod Paulus lib. 7. cap. 12. ait. ἕξθη ὅς ἐστι τὸ ἀγνῶστον ὑπάρχον ὡς
καὶ ὁ πῖος δὲν ἵστανται. Id est, dictū est Mendesium, propterea quod in Aegypto in-
uentum sit ubi etiam Mendes nutritur. Quanquam ego pro πρίστου legendum
putem ὁ πρίστου, id est colitur. Est autem Mendes hircus, itemq; Pan deus, Aegy-
ptia uoce ac lingua uocatus, quem hirci effigie Mendefij uenerabātur, ut etiam
ipsi inde appellacione inuenerint, uelut apparet. Hippocrates porro uinū Men-
dazum saepe probat, qđ non à Mendefijs in Aegypto, sed Thraciæ urbe Mendæ
appellata nomen inuenit. At uero infra cap. 1. huius libri, Galenus Mendesium
etiam Megaleum uocari dicit, utroq; cognomine à Megalo accepto, qui scilicet
Mendefius patria fuerit. Sed & Aegyptiū idem à tota regione appellatum est.
Dioscorides Megaleū suo tempore defecisse dicit, & aliud à Mendefio facit.

Coriandri semen & anethi trita ac melle mixta imposito. J Ita quidem habet
exemplar Græcum, λείνας ἐν μέλιτι μίξας ὑπετάλαινασι. Verū ineptus uidetur hoc
loco mellis usus esse. Suspicio itaq; pro melle omnino oleū, hoc est pro καὶ μέλιτι
legendū esse ἐν σπῶν ἰατρῇ, maxime quū neq; in præcedētib; neq; sequētib; mel-
lis sit usus, & quū Galenus in his medicamentis expendendis, nullā mellis men-
tionem Apollonio factā repetat, sed blitum cū oleo tritū, tum huic, tum alijs cō-
positionibus ut longe diuersis conferat, blitum humectare ac frigefacere debili-
ter perhibens. Ricini uero semen & Coriandri ac Melanthij calfacere, nulla pe-
nitus facta mentione liquorum, qui his ammiscuntur, quum tamen hos etiam di-
uerfos Apollonius tradiderit, utpote qui Ricini semen ex aqua tritum imponi
iussit, Melanthium autem ex oleo, Coriandrum uero & anethum ex melle, si
tamen hæc est uera lectio, & nō potius pro melle oleū iuxta meā suspicionem
substituendum. Vetus interpres oleum & mel, ambo mixta habet.

Vtuncq; enim doleant longe minor ipsorum dolor est quā eorum qui colū,
aut auris, aut oculi, aut dentis dolore vexantur. J Differentiam quandam dolo-
rum magnitudinis iuxta locos ipsos in quibus contingunt facit, Coli dolorem
omnibus præferens, mox auris, deinde oculi, post dentis dolores, ut longe maio-
res quā capitis dolor est ostendens, addito etiam signo, Nimirum quod nemo
capitis dolore affectus, ex animi deliquio mortuus sit, aut seipsum peremerit,
quod in coli dolore quosdam fecisse constat. Verum de hac re etiam Plinij uerbis
adserbam, quæ ipse ex ueterū & auiorum iudicio protulit lib. 25. cap. 3. Qui gra-
uissimi ex his sint discernere, stultitia prope uideri potest, quum suus cuiq; ad
præsens quisque atrocissimus uideatur. Et de hoc tamen indicauere aut exper-
imento, a sperrimos cruciatus esse calculorum à stillicidio uesciæ, proximum sto-
machicæritum eorum qui capite doleant, non ob alios serè morte conscita. His
uerbis Plinius ob calculi cruciatum, itemq; stomachi, ac capitis dolorem, quos-
dam sibi mortem consciauisse perhibet, quod ipsum ob capitis dolorem unquam
factum esse Galenus negat, sicut neq; temere quenquam ex eo in animi deliqui-
um delapsū esse, quod ipsum uerissimilius est accidere his qui stomachi dolore
afficiuntur. Verum Plinius ad omnes capitis morbos, uelut phrenitidē, Maniā,
ac delirium respexisse uidetur, Galenus uero ut qui exprofesso medicus, mor-
bos ac dolores distinguat, de simplici capitis dolore dixit, ex quacunque tan-
dem causa oborto.

sensum, quod par erat facere, explicuit. Est autem locus ipse satis obscurus, & qui ex Cercida poeta, qui unâ cū scriptis & nomine perijt, intelligi non possit, quem sanè ego sic interpretandum existimo. Hec inuenit quidem uera Methodus, ob signat autem experientia: Thessalus uero unâ cum suis sophistis in alto throno desidentis inter arietinæ frontis uiros, uelut Cercidas ait, magni nominis fiet, ob id quod longo sermone adstruat, omnis ulceris recentis eandem curatione esse, quæ nullam indicatione ex particulæ natura sumat. Puto enim pro *ὃν κριμύφους ἀνδράσιν*, legendum esse *ὃν κριμύφους ἀνδράσιν*, quos arietinæ frontis interpreteris. Est enim *κριμύ μέτωπον* promontoriū Scythiæ, inde appellatum, quod quiescentem illic Phryxum, de Barbarorum eò cum armis confcendentium ac Phryxum adorti uolentium aduentu, Aries quo Phryxus in Colchidem uectus est, ex prospectu eos cōtuitus, humana usus uoce commonefecit ac excitauit, uelut Parthenius in libro de fluminibus tradir, qui nuper ex officina Frobeniana editus, Plutarcho tamen falsò inscriptus est. Vt autem Parthenij esse credam, facit ipse libri stilus qui Plutarchum non refert, sed uebementer ei similis est, quo Parthenius in eo libello utitur, qui *πρὸς ἑσθίωνων περιμέτρων* inscribitur, qui ex eadem officina ante triennij græcè unâ cum nostra uersione latina editus est. Cui coniecturæ accedit, quod hoc genus argumenti multos libros ipsum Partheniū scripsisse constat, fuitq; facilis error alicui, ex obliteratis literis *παρταρχος* pro *παρθενίος* substituere. Quamquam & ad marginem manu scripti todis hæc uerba adscripta indicant, nō recentem suppositione esse, *Ἡ δὲ ἀντιγράφων ἔστι, πρὸς γὰρ ἐκ πολλοῦ πάρος μεταφράσεις, ἢτε διὰ τὴν καὶ ἡ φράσις, ὅτι μὴ ἔστιν αὖ πλὴν ταρχος*. Verum ut ad *κριμύ μέτωπον* redeamus, Est & aliud promontorium Cretæ eiusdem nominis, de quo hæc Arietis fabula nō fertur. At uero ab illo *κριμύ μέτωπον ἀνδράσιν* dicti uidetur, qui dura & arietina fronte omnibus contra sentientibus se opponunt, ad conceptæ semel opinionis defensione, quod Thessali eiusq; socios, quos aliquando etiā Thessalicos asinos appellat, Galen. facere perhibet hoc loco, ubi ipsos inter arietinæ frōtis sui similes uidelicet uiros desidere ait. Nam & alias græcis prouerbio *πρὸς κριμύ μέτωπον πρὸς ἀνδράσιν* dicuntur, qui cum eiusmodi pertinacibus ac impudentibus sophistis, ueris rationibus, ac argumentis probabilibus contendunt, nimirum arietina fronte illis se opponentibus caput offendentes. Neq; refert siue de uerū arietis fronte, siue promontorio inde appellato *κριμύ μέτωπον* intelligas, quum ad neutrum tutum sit impingere. Atq; hanc meam cōiecturam de hoc Galeni loco hic obiter explicare uolui. Ceterum non ita ineptus sensus etiam ex *κριμύφους ἀνδράσιν* erui queat, Sonat etenim *κριμύφους* per u. in penultima scriptum, Arietinum mucū, ut sint *κριμύφους ἀνδράσιν* arietino mucō opplati: Est enim aries animal pituitosum ac stupidum; quod non alio utiq; sensu accipi potest, neq; alia dicti argutia, siue allusione, à Cercida poeta est usurpatum, quàm ut mentis hebetudinem & proinde stoliditatem hac uoce exprobratam uelit, quando sanè alias eiusmodi homines nasturtium edere, aut anticyras nauigare prouerbialiter iube mus, quo uidelicet nares ipsorum ac cerebrum, mucō per nasturtium liberentur, & per ueratum anticyræ purgentur, quo animi eorum uegetiores reddantur, & per ueratum anticyræ & si hanc sententiam sequi uelis, *ὃν κριμύφους ἀνδράσιν*, non ad *κριμύφους*, sed ad uerbum *ἀνδράσιν* referendum erit, ut accipiamus Thessalum cum socijs in alto throno desidentem, apud stupidos homines celebrem futurū, &c. Quod si uero *ὃν κριμύφους* per a. in penultima legere libeat, ut *κριμύφους* sit ex ariete mixtus, Ratio compositionis hoc prohibere uidetur, quæ *κριμύφους* potius q̃ *κριμύφους* dixerit, Quod si tamen legeretur *ὃν κριμύφους* uel *κριμύφους ἀνδράσιν*, significationem exhibeat, Thessalum cum socijs inter semarietes uiros

desidere, aut etiam in pretio esse. atq; ita Cercidas nouo cōposito uocabulo, homines semibrutos & pecuina mente præditos, attamen feroces & peruicaces, *καρπίνους ἀνδρας* appellasse uideri queat, quā lectionem & sententiam si quis præ superioribus eligat, uelut etiā uetus Interpres fecisse uidetur, non repugno. Ego obiter tantum ut dixi, de hoc loco ut non bona fide ab interprete relicto, studiosos Galeni cōmonefacere uolui. Est autem dimeter Iambicus, aut octometri hemistichium, quocunq; modo legas.

Quemadmodum alij in suffusionum symptomata ob huiusmodi humores incidunt. Non solum capitis dolor ex humoribus in stomacho malignos uapores excitantibus oboritur, sed etiam suffusionis symptoma siue accessio quibusdam inde contingit, quo oculorum acies per suffusionis uehementiam obfuscatur, la enim *εὐρύνοια* est effectus, ut infra lib. 4. amplius audiemus.

Modicum panem eis præbebimus circa tertiam aut quartam horam. j Horæ ueteribus duplices in usu fuerunt, atq; hæ ex mathematica disciplina ordinatæ. Aequinoctiales siue æquidiales quæ græcis *ισμμεωνικæ*, ex quorū uiginti quatuor numero dies naturalis constituitur, duodecim à solis exortu usq; in occasum, & ob occasu rursus totidem usq; ad exortum matutinum, æquali spacio distributis, connumeratis, ita ut uigesima quarta diei pars hora sit una, atq; hoc ex æquinoctialis motu, in quo singulis signis binæ horæ assignantur, ita ut quindecim gradus per unam horam cōficiantur. Verum hæ horæ tantum per æquinoctium utrumq; durabant, & hoc modo accipiendæ sunt æquinoctiales horæ tum apud Græcos, tum apud Latinos scriptores, ut Galen. 7. Meth. *συμμετρικὰ δὲ ἐστὶ τὰ πρὸς τὸν ὁρίζοντα πρὸς τὸ δόξαι τὸν ὁρίζοντα, ὅθεν ἡ ἡμέρα καὶ ἡ νύξ ἀρῶνται*. Indicat enim his uerbis tempus horarum quatuor aut quinque æquinoctialiū siue æqualiū, etiam si extra æquinoctij tempus æger sit balneandus. Extra autem tempus æquinoctij, Inæquales horæ distinguebant tum noctem tum diem, Ita ut utraq; in duodecim horas diuideretur, sed omnino inæqualiter, iuxta dierum ac noctium incrementum, Nam siue dies prolongaretur siue nox, omnino tamen XII. horæ singulis assignabatur, necessariū ob temporis rationem inæquales. Sic ut quantum brumalibus diurnis demeretur, tantum nocturnis accederet, & quantum solstitialibus æstiuis diurnis adderetur, tantum ipsidem nocturnis demeretur. Hæ autem horæ *ῥητορικὰ* & *κατοικητικὰ*, hoc est, temporales appellabantur, atq; hoc modo etiam solaris atq; horologijs distinctæ proponebantur. Cæterum quociens sine determinatione de horis apud autores sit mentio, inæquales & tēporales intelligendæ sunt, uelut apud Galenū 5. Meth. quum ait *τὴν τρίτην γυμνασίου νυκτίου ἀρῶμενος ἀπὸ τῆς ἡμέρας πρὸς τὸν ὁρίζοντα, ἡμετέραν δὲ τὴν ἐν τῷ ὁρίζοντι ἡμέραν ἀπὸς τὴν νύκτα*. & hoc ad eū quem iam exponimus loco, quo circa tertiam aut quartam horam diei panem præbere iubet, à solis uidelicet emerfu numerandi exordio factio, Nō uelut hodie solemus, quibus tertia aut quarta hora à media nocte & meridie incipiendo numeratur, atq; illo modo etiam apud Plinīū undecima, diei penultima accipienda est, libro 2. cap. 25. ubi ait de sidere crinito. Id oriebatur circa undecimā horā diei clarumq; & omnibus terris conspicuū fuit. Neq; enim de undecima hora diei, iuxta nostrū hodiernū horologiū intelligendū est, quæ est quinta diei, quum sexta diei ipsa merides apud ueteres fuerit. At uero quū *ἡμέρα* *ισμμεωνικὴ* dicūt Græci simpliciter tempus per horā indicant æquinoctiale, quomodo etiā *ἡμέρα* *ῥητορικὴ* pro tēpora hyemali, & *ἡμέρα* *κατοικητικὴ* pro æstate dicitur. Accipitur autē sæpenumero hora etiā pro die, quo modo frequētius à medicis græcis Galeo & Actio usurpatur, q̄ ut uno aut altero loco adscripto ostendere libeat. Sed & Ciceronē in Verrē horas pro dieb. usurpasse, Asconius Pedianus annotauit.

Quorum

Quorum optimum remedium est ex aloe pharmacū, quod aliqui picram, alii qui hierā appellant.] Hæc descriptio uidetur esse, ex qua tum simplex, tum composita hiera, quæ hodieq; in pharmacopolijs extant, excerpta & confecta uidetur, sed pluribus simplicibus additis, & pondere omnium immutato, itemq; dosi. Ego hanc Galeni descriptionem uehementer probō, atq; aliquando hoc modo præparatā in usu habeo. Aetius serm. 9. cap. 10. penitus eandem prodit, & ex Galeno ut fateatur, trāscripsit, addita etiam alia Themisonis paululum ab ea uariāte. Et meo iudicio consultius fecissent barbari Arabes medici, si nihil de hac atque alijs immutassent. Referuntur autem omnes literarum descriptiones infra huius operis libro octauo.

Præstat autem & Carpesium pro Asaro conijcere.] Carpesium esse cubebas satis notā hodie pharmacopolijs semina, Serapio, Auicenna atq; Arabes omnes cōstanter affirmant, atq; ita etiam uetus Interpres hoc loco conuertit. Verum iuxta Carpesij apud Galenum descriptionem longe alia res est *καρπύσιον* à cubebis Arabum appellatis. Pro cinamomo enim Quintum usurpasse illius penuria dicitur, ueritatem non adeo tenuium partium esse uelut cinamomū, Imò etiam ab optima cassā deficere, quā alias duplo pondere pro cinamomo Galenus usurpare solet. Duo autem carpesij genera ibidem Galen. facit Ponticū & Laeticū, utrisq; appellationibus à quibuscūq; Pamphylia montibus in quibus proueniūt deductis Idem etiā. 1. de antidotis facit his uerbis, *πλάσιν ὃν τὸ σίσιον τὸ παραφυλάει τὸ καρπύσιον τὸ γονάριον. λέγεται δ' ἐστὶ τὰ κάραρον, παραπλάσια τῆς ἀκριβοῦς τοῦ καυμάτου, καὶ καλῶν οἰσπύκων, τὸ μὲν ἑτερον αὐτῶν λαρτικόν, τὸ δ' ἑτερον ποντικόν ὅπου καὶ βιλπίον ἴσιν. ἑκατέρω δ' ἀπὸ τῶν ἡ ἐπανυμία καὶ ὁ φύνται.* Vtrinque autem corrupta est lectio. Nam hic τὸ πικρόν pro ποντικόν, & 7. simplicium. pharm. ὃν σὺν pro σίσιον habetur. Theophrastus, Dioscorides ac Plinius nihil de Carpesio habent, quæ causa fuit, cur Serapio *ἑξυμυρίων* apud Dioscoridem, idem quod *καρπύσιον* apud Galenum esse existimaret, quod ipsum Hermolaus Barbarus, & post eum Nicolaus Leoniceus damnauit. Cæterum Galenus hoc loco Carpesium pro Asaro, uelut præstantius conijcere iubet, aut ambo simul; unde apparet earundem uirium esse. Dioscorides certe *ἀκέρων* & *φού* ambo *ἀγρίων* uocabatur tradit. Galenus uero 7. simp. phar. de Carpesio dixit *ὁμοίον μὲν ἑκατέρω τῶ καυμάτου φῶ, κατέρε τὴν γούσιν καὶ τὴν διούσιν.* Quare patet Asarum, & pinu, & carpesium eiusdē facultatis esse. Porro carpassi succus omnino alia res est, & letale uenenū intra corpus acceptus, quanquam pharmacis extra imponēdis non ineptus sit, uelut Galen. supra lib. 1. cap. 3. ex Archigene ad flauos & crispis faciendos pilos usurpauit, & uelut idem 1. de antidotis tradit, circa optimā myrrhā *ὀπυκάρπιον* reperiri assētens. τὸ δ' *ὀπυκάρπιον* inquit, *ἀναρτικόν* ἐστὶ, καὶ πολλὰς κατέπνευ τεχνηρὸν τοῖς Πιρμύτις (subis) χρίνας ἀρδανόντας οἶδα, ὅτι τὴν ἄγνοιαν *ὀπυκάρπιον* ἐχέσθαι σμύρνης. &c. atq; ea gratia apud Dioscor. lib. 6. & Aet. serm. 13. & Paulum lib. 5. inter uenena recensetur, non ut huius carpesij succus, sed apud Paulum falsò *καρπύσιον* pro *καρπύσιον* legitur. Est enim *καρπύσιον* idem quod carpesium, uelut Aetius serm. 11. cap. 13. usurpat. Apud Plinium autem lib. 32. cap. 5. sine, succus carpathij pro carpassi legitur, quemadmodum eodem libro cap. 9. & lib. 28. cap. 10. opocarpation pro opocarpason habetur.

Ut igitur à postremo exordiar, opinor ipsum resinā quæ sua sponte emanat dicere.] Archigenes in fine dictionis suæ dixerat, aut tale aliquod aliud calfactum; per quæ uerba dicit se Galenus opinari, ipsam resinam sua sponte fluērem insinuare, item capnelæon Ciliciæ, & reliqua quæ subiungit. Cæterum capnelæon qualiter in Cilicia fuerit apparatū quærere aliquis possit, & suspicari idem

esse *καπνίλαιον*, cum eo quod Aetius serm. 9. cap. 44. & serm. 12. c. 44. *καπνίσαιον* appellat. priore loco, *λάδιον* inquit, *καὶ σύντακτον ἀναλυσέας παρὸς τὸ μέτρον καὶ τὸ καπνίσαιον λεγόμενον ἔλαιον*, id est, ut ego uerti, oleo suffumigabili appellato dissoluto. Neque enim aliter uertendum uidebatur quam uelut uox ipsa sonat. *καπνίσαιον* enim suffumigabile est, uelut etiam eodē loco *τροχιότης ὑποκαπνιστός*, id est, passibilis suffumigabilis habet. Possit itē suspicari quispiā fieri potuisse ut ex Capno, quem fumū terræ dicimus, oleum in Cilicia paratum sit, quod *καπνίλαιον* Galenus dixerit. Verum, cur hoc *καπνίσαιον* dicere Aetius maluerit dubium sit, nisi lectio sit mēdosa, quod tamen mirum sit duobus locis accidisse, aut nisi penitus diuersum sit *καπνίσαιον ἔλαιον* a *καπνίλαιον*. At uero ut hēcitationes ille omnes adimantur Galenus facit, qui lib. 3. *κατὰ φάρμακον*, *καπνίλαιον* nō certum olei genus in Cilicia faci esse scribit, sed resinā quæ sponte profluit, quæ alijs *ἀντιφύοντες*, in Lacedæmone uero *σπυγέροντες* dicatur, in Ciliciā *καπνίλαιον* uocari. *καὶ τὴν ἀντιφύοντιον* inquit, *καλὰ πρὸς τὸν πυρὸς ἐκ χειρὸς μηχανῆς, καλὸν δὲ αὐτὰς ὅτι λαμβάνεται μὲν ἢ καὶ τῶν ἀλλοῦς χειρὸς πορροῦντες, ὅτι ἐν λιλύαια ἡ καπνίλαιον οὐρανῶσι τῶν πικρῶν ἐκτίθεται*. Videtur autem capnētum, hoc est, oleum fumosum, a fumo quem edit igni admodum, appellatum. Verum *καπνίσαιον ἔλαιον* penitus alia res est, & quomodo fiat, Aetius lib. 1. tradit. Legitur autem in græco exemplari hoc loco *καπνίλαιον* corrupte, uelut etiam paulo ante corrupte legitur, *καὶ τὸ φάρμακον σκληρὰ ἔχοντες ἔλαιον*, legendum est enim *ἔλαιον*, hoc est, Irinum quod in Pamphylia oppido Perga apparatus, uelut Dioscor. lib. 1. testatur, quemadmodū Syracinum & Amaracinum in Cyzico, ut idem Dioscor. testatur. Porro Syriacū unguentum paulo post Comagenū dici ab Archigene putat, propterea quod ex Syria apportaretur, cuius pars Comagene appellatur, ut utraq; appellatio patria existat. Fiebat autem Comagenū ex adipē anserino cum cinnamo in uase æreo multa niue obruto, ac rigore gelido macerato, ut Plinius lib. 10. cap. 22. tradit, aut ut idem lib. 29. cap. 3. repetit, ex adipē anseris in Comagene Syriæ parte cum cinnamo, casia, pipere alio, herba quæ Comagene uocatur, obrutis niue uasis odore iucundo, &c.

Propter infirmitatem uero comprehensiuæ facultatis.] Comprehensiuā facultatem dixi, quā *πρόσθελλοντες* Galenus appellat, estq; ea quæ cibos ac potus in uētre arte cōplectitur & obuoluit, quo promptius cōcoquantur. Nam ubi ipsa fuerit infirma, & alias inopia etiā caloris adest, per hanc quidē uapores & flatus uentrosi generantur, per illam uero partium capitis affectarū interna capacitās infiat, ac expletur.

Omnia secundum rationem facienti.] Hic aphorismus Hippocratis est in secundo aphorif. quinquagesimus secundus, cuius sententia satis manifesta est, non oportere uidelicet a rationali uia curandorū morborū temere digredi ad aliud, quod uel experimento, uel autoritate aliorum cōmendetur, etiam si nulla utilitas inde consequatur, quod ipsum ut quis faciat, non modicæ scientiæ opus esse Galenus in expositione etus aphorismi ait, simileq; addit affectū ægre concoctilis ad petram, quæ multis guttarum icibus impetentibus eam uix tandem post longum tempus cauatur.

Aceti uero repulsoriam simul & attenuatoriā, imò & diffusoriam habet facultatē, utpote in temperatura a tenuitū partium frigiditate exuperatū.] Quod dixi exuperatū, in græco est *ὑπερκατέμειλον*, quod passiuæ uocis participium est, a uerbo *ὑπερκατέμειλον*, exuperare & præcellere, ut Galen. lib. 8. simpl. pharm. de aceto itidem loquens, *ἄφες* inquit, *μικτὸς ποτὶς ὑπερκατέμειλον* ἢ *δερμὶς, ἀμφοτέρωθεν ὑπερκατέμειλον* δὲ τῶν *δερμῶν* ἢ *ψυχρῶν*, id est, præcellit & exuperat. *ὑπερκατέμειλον* autē exuperatū & subiugatū significat, sicut *ὑπερκατέμειλον* dicuntur qui alicuius imperio subditi

subditi sunt, ac potestate eius exuperati. Galeni uerba sic habent in præsentī locō. τὸ δὲ ὄψος ἀκρεσυτικὸν τὴν ἀμα καὶ λιπώτικὴν, ἀλλὰ καὶ διαφορευτικὴν ἔχει διώμαρ, ὡς αὐτὴν πικρατὸν μὲν ἐν τῇ κρέσει, λιπώμαρ δὲ ψυχρότατη. Hæc eo libētius adscribo, ut tum eius uerbi, tum ei consimiliū, sed tamen significatione diuersorū significatio à studiōsis diligenter expendatur, quādo hac parte magni uiri sunt decepti. Aliud est enim ἀκρεσυτικὸν, id est retentū, ut Aetius 9. cap. 35. τὸ χαλῶδες μετὰ τὴν ἀβυσσὸν ἀκρεσυτικὸν μεγάλως βλάπτει. hoc est biliosus humor retentus uel suppressus, à uerbo ἀκρεσυτικὸν quod coerceo significat. Diosc. lib. 4. de symphyto petræο, καὶ ἐν τῷ σκόλλας ἀκρεσυτικὸν κατὰ πλοσσίονον, hernias coerces cataplasmatīs modo impositū. Eiusdē cū hoc uerbo ἀκρεσυτικὸν est significationis uerbū ἐπικρατυτικὸν à quo Galen. 11. simp. phar. ἐπικρατυτικὸν διώμαρ dixit, id est, facultatē coercēda ac retinēde alui, de iure gallinarū ac gallorū loquens. ὁ γὰρ μὴ τὴν ἀλεκτηρίδιον ἀπλὴς ζυμὸς ἐπικρατυτικὸς ἐστὶ διωμάριος, ὡς αὐτὸν δὲ τὸν ἀλεκτηρίδιον ἀλεκτηρίδιον ἐπικρατυτικὸν. Vt autē ἐπικρατυτικὸς uocē in Galeno rectē legi, atque eo sensu accipi credamus, Paulus facit, qui lib. 7. hunc Galeni locum quasi exponit, his uerbis. καὶ ὁ τῷ πλοσσίον δὲ ἀλεκτηρίδιος ζυμὸς τῶν ἀλσιν ὡς πλοσσίον ἐπικρατυτικὸς γίνεται, ὁ δὲ τῷ ἀλεκτηρίδιος τὸν ἀντικρὺν ἐπικρατυτικὸν. At uero nisi Pauli uerba palām declararent, ἐπικρατυτικὸν διώμαρ Galenum τῷ ἐπικρατυτικὸν opposuisse, quare hæc in iure galli ueteris plurimum falsi, illa in iure gallinarū simplici existat, dubitarem an ἐπικρατυτικὸς uox rectē in eo Galeni loco legatur, & potius ἐπικρατυτικὸς legendum suspicarer, atq; hoc ex Dioscoride inductus, qui lib. 2. palām ait, Ius gallinæ simpliciter præparatū dari gratia contemperandi uitiosos humores, & in ardore stomachi, quanquā locus ipse corruptus sit. & τὸ νόστος pro τῷ ἀλεκτηρίδιος legatur. Sic autē legi in Dioscor. debet. ὁ δὲ ζυμὸς τῷ ἀλεκτηρίδιος μάλα ἐστὶν ἀνικρατυτικὸς χάρις φαυλοτάτων, καὶ ὡς πλοσσίον ἀνικρατυτικὸν λιπὸς σκευάσας. ad quæ uerba mox etiam ipse Dioscor. uelut Galen. & Paulus, de iure galli antiqui large falsi subiungit, quod uidelicet ad alui purgationē exhibeat, ut planē eadē res ab omnibus tribus tradi uideatur, quod scilicet ius gallinæ simplex uim contemperandi uitiatos humores habeat, quod sanē uerum esse ipsum experimentū testatur. Quare merito Galeni ac Pauli locos habemus suspectos, in quibus uim retinēdi ac sistēdi alui in gallinæ iure esse pronunciauerūt. Quod si quis tamē de iure pulli gallinæ Dioscoridem dixisse adstruat, Galenū uero & Paulum de iure gallinæ, huic probandum erit diuersam esse eorū iusculorum facultatem. Ego sanē eandem esse, experimēto doctus asseuerare non dubitem, nimirum acres ac biliosos humores mitigandi ac contemperandi. Et si diuersæ facultatis essent, de pulli iure utiq; Galenus & Paulus non siluissent, quare hinc ad eodē palām sit non τὸ νόστος, sed τῷ ἀλεκτηρίδιος apud Dioscor. legendū esse, utpote quū idē locus ab omnibus tribus tractetur. Et sanē nisi penitus fallor, Dioscoridis sententiā uera esse mihi uidetur, eandemq; omnino arbitror à Galeno expressam esse, nimirum si ἀνικρατυτικὸς pro ἀνικρατυτικὸν legatur, Paulum uero ἀνικρατυτικὸν legisse, atq; sic Galeni locū perueruisse. Ceterum uelut hoc Galeni loco, sic etiam 2. de aliment. facul. ubi de uis pastis agit, ἐπικρατυτικὸν pro ἐπικρατυτικὸν suppositū est in his uerbis, πὺ γὰρ μὴ ἐπικρατυτικὸν ἐπικρατυτικὸν γὰρ γλυκύσας ἀνικρατυτικὸν καὶ τὸ μετρίως ἐν πλοσσίον, ὡς δὲ ἀνικρατυτικὸν τῷ διωμάριον τῷ μετρίως κατὰ τὸ σόμα τῷ καλῶς ἀμβλυνοσι, δὲ ὡς. Id est, Vis contemperandi & uis moderate extergendi, propter has enim uires paruos oris uentris morfus hebetant. Quod si tamen ἐπικρατυτικὸν hoc loco pro ἐπικρατυτικὸν, & superiore ἐπικρατυτικὸν pro ἐπικρατυτικὸν legas, utrobique uerā & eandem sententiā habebis. Aque enim ἐπικρατυτικὸν ab ἐπικρατυτικὸν deducitur, sicut ἐπικρατυτικὸν, hoc

à κρίεσθαι, à futuro κρίεσθαι, illud à κρίεσθαι, à futuro κρίεσθαι. Sic etiā κατακρατις
& κατακρασινός à κατακραίνοντι. Aetius 9. cap. 37. in fine de lactis potu. οὐτω γὰρ δι-
είρηται, ἅμα σαρτὸν & κατακρατινὸν γίνετ' ἡ συνήθεια, id est, sistit ac temperat flux-
iones. Galen. 12. Meth. de uinis fuluis. πίνετω ἢ τῇ ἡδὴ τῇ γαστρίᾳ καὶ φλέβῃς οἱ ὑπο-
συναίροντες μέλλον, ὅτι καὶ μέλλον διεκρίνεσθαι, ἐπικρασεῖσθαι δ' εἰσι καὶ βρεψτικοί. hoc est, te-
peramentū inducentes. Aetius 11. cap. 19. in cura dysuriae iubet προσῆς κατακρασε-
σθαι χυμῶν. Galenus 4. ὑγροῦν de succo aliciae. Ἀλχημὸς μὲν ἐν δὴν, καὶ δὲ τὸ πρὸς τῇ
κοχυμίας ἀνκρασινός. Habetur tamen in uulgato exemplari ἀνκρασινός. Sed suffi-
ciunt hi loci ad harum uocum significationem discernendam. Declarat autē ma-
nifeste quid ἐπικρασις significet Galenus 9. Meth. ubi in contrarijs indicationi-
bus paulatim uiniatum humorem euacuare, & bonum uicissim paulatim appo-
nere docet, his uerbis. χρὴ γὰρ διλοῦντι ἡδὴ τὰς πικρὰς φαντασίας ἡ δὲ δόξα, κατὰ
βραχὺ μὲν ἐκκινῶν τὸ μεθυστικόν, ἡδὴ βραχὺ δ' αὐτὸ αὐτὸ τὸ χρεῖν ἐπιβῆναι, καλῶς ἢ ἐπικρα-
σις ὑπο τῶν κερτῶν, ἢ τοῦτον διεκρίνει τὴν κοχυμίας, hoc est, eiusmodi curatio con-
temperamentum uocatur.

Vltra hoc quod non solum ea quae circa uentrem & Mesarē sunt euacuat, Mesarēum membrana est ex uenis, arterijs, ac nervis cōtexta, per cuius uasa ex uentriculo in hepar alimentī distributio contingit. Idem etiā μεσεντήριον appellatur à situ uidelicet inter uentrem intestinaq; ac ipsum hepar medio, uelut in anatōmicis lib. 6. Galenus tradit. Vasa autē tum uenarū tum arteriarum μεσεντήρια ab eadem mēbrana dicuntur. Hoc itaq; loco Galenus per ualidū & fortem clysterem magnā reuulsionē, quam ἀντίκαστρον græci uocant, fieri dicit eorū quae ad caput feruntur, & per eundem non solum uentrē & Mesarē euacuari, sed etiā ea quae circa sima hepatis hærent, insinuans scilicet, euacuationē ex Mesarēo faciam gibba hepatis nō exinanire, eousq; enim ipsum Mesarēum non protenditur. Hippocrates μεσεντήριον appellauit, parvis uocabulo pro toto usus. Est enim μεσεντήριον proprie ea pars mesenterij ex qua intestina crassa pendēt. Neq; tamen altera pars mesenterij unde tenuia intestina pendent, nomen aliquod priuatim habet, ut uidelicet μεσεντήριον, uel simili uocabulo appelletur. Totū uero Mesenterium in unū quoddā spinæ uerticulum, post septū trāuersum sub uentrē situm, procedit, indeq; ex ligamento nervoso dependet, uelut Galen. in 4 comment. in 6. epidem. Hippoc. declarat in hanc sententiam. τὰ κολὰ ἐκαστὰ κινῶν, μέζον ἢ καὶ ἄρτηται ἐν τῷ μεσεντήριον, ταῦτα δὲ ἐκ ἐνδύων ἀπὸ γαστρίδος, καὶ τῶν γαστρίων.

De his qui ob biliosum humorem caput dolent. Ante hunc titulum Galeni exemplar græcū ab Asclepiade scripta ad dolores capitis auxilia habet, uerum ea ipsa ipsdē penitus uerbis in sequenti capite huius secundi libri secundo, de cephalaea rursus habentur, atq; à Galeno expenduntur, ac examinantur in quem usum, & qua ratione ab Asclepiade præscripta uideantur, quod ipsum hoc loco facere Galenus neglexit, ut uel ob hoc suspicari libeat, hunc non esse iustum eorum locum. Nam aliās temere repeteretur in tam breui maxime interstinio, duarum uidelicet paginarū. Quare hoc loco ea reliquimus; quae si quis omnino huc referre uelit, per me quidem licebit, ut idem penitus his legat ac habeat in eodem libro. Galenum sanē non putamus eadem his tradidisse, quanquam alias nimius in plerisq; uideatur, sed per oscitantiam à quodam his inserta esse, quod etiam uetus Interpres animaduertit, qui hoc quidem loco ea ipsa conuersa habet, & in sequenti capite præteriuisset, sed nos hic præterire maluimus, & sequenti capite ponere, quod Galenus ea ipsa tunc ut dixi, expendat, quod hoc loco nō fit, sed uix da tantum Asclepiadē uerba apponuntur.

Binenda frons pastillo croceo aut Trigono appellato. J. Pastillorū & crocei
 & trigoni descriptiones sunt apud Paulū lib. 7. cap. 12. & infra libro 7. cap. 5. alter
 à croco quem recipit, alter à forma & figura triangulari uidetur appellatus. Ha-
 bent autem ambo uim dolorem sedandi, *ἀναισθησι* Græci appellant, & stuporem
 inducendi, quam isdem *νεκρωτικὴ* & *καρποτικὴ* dicunt, ab opij ammissione, &
 in hoc usu Trigonus pastillus, itemq; qui ex seminibus constat, ac ab isdem *ἀναισθητικῶν*
 nomen habet, à Galeno lib. 12. Meth. laudatur. Is *ἀναισθητικὸν* inquit, *καὶ ἐκ τῶν
 σπέρματων* *ἀναισθητικῶν* *ἐκ τῶν σπέρματων καὶ τῶν τριγώνων, μετρίως καὶ μὴ ὡς τὸ πλεονέκτημα
 καὶ περισσεύματα νεκρῶν, ἀναισθητικὰ ἢ ὡς τὸ μέλι.* hoc est, Sūt & alia multa medica-
 menta, ex seminibus appellata, itemq; Trigona, moderatiora quidem ad indu-
 cendum subito stuporem, uerum in posterum periculi minoris. Sed Linacer In-
 terpres *τρίγωνα*, ex pastinaca pisce confecta, nulla omnino necessitate coactus
 interpretatus est, quā simpliciter dixisse Trigona satis erat. Verum existimauit
 hunc pastillum Trigoni ē pastinaca pisce cōfici, qui *τρίγων* Græcis appellatur,
 & si iam hoc etiam ita haberet *τρίγωνον* uocari pastillū oportebat, non *τρίγωνον*
 quod triangularem sonat. Quod autem ex pastinaca pisce hic pastillus non fue-
 rit factus, Pauli uerba de eo adscribā, ex quibus id patebit. *τρίγωνον. σελήνη σπέρμα
 μα, ὡς σελήνη σπέρμα ἐνὲ δισαχ. β. αἰώνου δισαχ. διπλῆς δισαχ. γ. ὡς αἰ. λ. α.* Quod est. Tri-
 gonis pastillus componitur. Apij seminis, hyoscyami seminis, utriusque drach-
 m. anisi drach. iiii. opij drach. iiii. ex aqua terito ac formato. Cæterum ut Linacer
τρίγωνον ex pastinaca pisce confici soliti existimaret, ex eo accidit, quod pastina-
 ca piscis uim habet torporem ac stuporem inducendi. In hunc usum enim Cel-
 sus lib. 5. cap. 9. habet. Et plani piscis inquit, quem pastinacā nostri, *τρίγωνα* Græ-
 ci uocant, aculeus torretur, deinde cōteritur, resinaq; excipitur, quæ denti circū-
 data, hunc soluit. Videtur enim Celsus ob id pastinacā probare quod stupor-
 em inducēdo, atq; ita compagem laxando, dentem euocet, quod etiam Plinius
 lib. 32. cap. 7. ait. Conteris is & cū elleboro albo illitus dētes sine uexatione extra-
 hit. Quin Aetius quoq; serm. 13. cap. 37. ex quorundā relatione tradit caudā pastī-
 nae quæ scūm alicui intulit, ablatam & in quercū suspensā, arbore arefacere,
 percussū autē ea hominē sanari, atq; id *ἀντισπαστικὸν λήγν* euenire. At uero quan-
 do in pastinacæ piscis mentionem incidimus, obiter locum apud Celsū emen-
 dabimus in quo falsò marinæ pastinacæ in potu probātur. Sic enim legitur apud
 eum libro 5. cap. 27. aduersus icūs Italarum serpentium. Aduersus quos, in-
 quit, satis proficit herba beronica, uel cantabrica, uel cētaurion, uel argemonia,
 uel trixago, uel personina, uel marinæ pastinacæ singulæ binæ ue tritzæ, & cum
 uino potui data, & super uulnus impositzæ. Hactenus Celsus. Quo loco non est
 marinæ pastinacæ legendum, sed syluestris, aut quod magis suspicor: agriz aut
 erranz, quæ facilius potuere in marinā transire, Nisi quis omnino marinā
 pro syluestri dictā uelit, quomodo etiam lactuca marina ab eodem pro sylue-
 stri est dicta lib. 2. cap. 12. quod omnium maxime mihi arridet. Quid enim mari-
 nam pastinacā piscem uenenum quis in potu sumat? aut corpori pro remedio
 admoueat? cuius contactus etiam periculosus est, ut Dioscor. in 6. Paulus lib.
 quinto. & Aetius loco supra citato produnt. Verum pastinacā syluestrem in
 potu ad uenenatorū animalium icūs ualere, Dioscor. lib. 3. ait *ἀρμύρα ἢ πίμασι καὶ
 πῶς δρεῖται διζύματα καὶ πληγὰς τοῖς ἀπὸ λαβίνταις φασὶ μὴ ἀρκεῖν* *ὑπὸ δρεῖται.* Lo-
 quitur de staphylino syluestri, quæ latinis pastinaca est.

De dolore capitis per confensum.) Supra *ဓမ္မာနန္ဒီယေ* ၆၃ *သံကဏ္ဍီယေ* *တရိ* in-
ter se expofuimus. Hoc autem loco *ဓမ္မာနန္ဒီယေ* opponitur *ဘိက္ခုနီယေ* *သံကဏ္ဍီယေ* ၆၃

idiomatice appellatur. Est enim affectus per *συμπέλας* in aliqua particula corporis, quando in aliqua alia quidem *πρότερον* & per se est, ad ipsam uero ob uiciniam, aut connexum & dependentiam, siue cognationem deriuatur. & ob id per consensum capitis dolorem dicimus esse, quo caput alteri alicui parti, aut corpori uelut coafficitur, atq; hic supra recitatis doloribus per primum capitis affectum *πρωτοπάλαι* siue *ιδιωματικῶς* contingentibus opponitur. Imo *συμπέλας* ad *πρωτοπάλαι* uelut umbra ad lumen consequitur.

Et forbitiones ex alica. Sorbitiones ex alica maxime lota, quā *χόνδρον* *πλήρες* appellant, quomodo parādā sint, ne uiscositas eius aegros offendat, Galen. lib. 4. de aliment. docet, & Paul. lib. 4. cap. 78. Cōsimilem autē coquendi modū perhibet Paulus alicae, pisanā ac bromi eodem loco. Exhibebantur autē eiusmodi sorbitiones in omnibus morbis acutis, usu adeo uulgarī ac omnibus noto, ut Galen. in Theffalicoꝝ methodi ignarorū remedia in morbis acutis esse 13. Meth. prodāt. Fomentū olei calētis, sorbitionē alicae, & cataplasma ex pane & melle. Ceterū ut certō discamus alicā esse latinis *χόνδρον* græcorū, ex autoribus aliquot locos expēdemus. Diosc. itaq; lib. 2. de chondro ita tradit, *ὁ χόνδρος γένεσις ἴσ' ἐξ ἑλκυσσίνης ἀμύγδαλον ζῆας, τοῦ αἰσίου τοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρου καὶ ἐπὶ τοῦ ἀντιπαρακρίτου πρὸς πυλινάς*. Quibus uerbis aperte rem faciūciā esse chondrū perhibet, ex zea duo grana habēte faciā. Neq; discor dat ab eo quod 1. de alimentis. Galen. tradit, *ἡ ζέα τ. πρῶτον ἐστὶν ὁ χόνδρος*, quibus uerbis generis triticeī chondrum faciū, quod nō aliud sonat, q̄ ex triticeo genere ipsum fieri. Neq; enim certā & naturalem tritici speciem his uerbis chondrum esse dixit, ut quidā intellexerūt, quod ipsum ex eodē libro cōsequenter de typhis olyra & zea manifestū sit, ubi multa alia semina dictis cōsimilia esse ait, quæ tamen eandē speciem non habeāt, & quādā media inter ordēs & typhen, quædam inter olyras & typhen, aut inter tritici & olyrā media esse perhibet, & quædam simplicem appellationem habere: *ἀλλ' οὐκ ἴσται* inquit, *ἡ ἰταλία ὅτι τὸ πρῶτον πρὸς τὴν ζέαν*, per quæ uerba nihil aliud quā simpliciter zeam appellatā, ipsum indicare intelligo, ex qua uidelicet chondrū in Italia faciēbāt, uelut etiā Dioscorides dixit. *Est enim zea quoq; tritici species, ex qua & tritico mixtā speciem ζεινπορ* ibidem appellari in Bithynia ait. Sicut aliā item cōpositā speciem Cappadoces *χυμένωδον* uocant. Quare iuxta Diosc. itemq; Galenū chondrus ex zea tritici seu frumenti specie fit, quæ hodie per Gallias ac Germanias ubi enascitur Spelta appellatur, in quibusdā etiā Germaniæ locis Tinkel uocatur. *Estq; chondrus id quod ex ea decorticata & in grana plura cōtusa, leguminis loco cū fuscis bubule, aliquando etiā lacte, quandoq; uino coctū edūt, quomodo etiā græcis parare chondrū in more fuisse existimo, & inde etiā nomen inditū, χόνδρος enim alias grani siue grumum significat.* Vnde Germani corrupta uoce ex grumis grupen uocant. Funt autē apud Germanos ubi zea seu spelta non nascitur, eiusmodi grumi ex ferē omnibus frugū generibus consimiles chondro, quī tūdem grupen appellantur, cum additione nominis rei ex qua fiunt, uueytzene grupen ex tritico, getstene grupen ex ordeo, haberne grupen ex auena siue bromo, atque hoc modo etiā græcos ex frugū generibus omnibus parasse, ex Galeno, Aetio, ac Paulo colligere licet. Galen. enim loco supra citato, ubi de chondro loquitur, uarie ipsum per cocturā parari tradit, Nimirū ex aqua aliquādo solā coqui, ac ex uino mulso sumi, (de quo etiā Martialis testatur in Xenijs. Nos alicam, inquit, mulsum poterit tibi mittere diues. Si tibi noluerit mittere diues eme.) aut uino dulci siue etiā adstringente, prout occasio usus exigit, aliquando uero oleo & sale condiri, aceto insuper affuso, quo modo preparatum *χόνδρον* condituram faciām

factam dicunt, quidam uero ægrum ex *χόνδρου σπισάνης* nutritum esse aiunt. Alii
 qui autem ueterum uelut Diocles & Philotimus *σπισάνη* uocabantur hoc modo pa-
 ratum chondrum appellant, atque ea gratia chondri nomen apud ueteres in ra-
 tio usu esse. Hæc Galenus, Ego tamen etiam apud Hippocratem *σπισάνη* uocabatur
 reperio *πῶς πρὸς τὸν*, ubi ait, *ἐὰν τις τὴν ἀλιανὰν ἐλθῇ ἀπομάστιξεν, ὁ ἰσθίωνος χόνδρου*
σπισάνη uocabitur, &c. Verum ex Galeni uerbis aperte apparet, chondrum nō ex
 uno frugum genere paratum græcis itemq; Romanis ac in Italia esse, sed tamen
 qui ex zea & ex tritico siue frumento fieret, peculiariter chondrum appellatum.
 Quod enim chondropsisanam, & psisanam pyrinen, id est, triticeam a ueteribus
 chondrum dictum ait, ad nihil aliud spectat, quam quod chondrus instar psisanæ
 primum decorticaretur & cōminueretur, atq; postea quoq; eodem ut psisana mo-
 do cōdiretur. Est autē psisana propria ordeī decorticati appellatio, *ἢ τὴν σπισάνην*,
 hoc est, a pinsendo & decorticādo appellatiōe ducta, quæ tamē ut generalis usur-
 patur, & si cum alijs frugum generibus copulatur, alia atq; alia psisanæ genera si-
 gnificantur, uelut *χόνδρου σπισάνης*, significat ex zea decorticata psisanam, quam
 grupen ex spelta aut tünckel germani appellant. *σπισάνη* uero uocabatur, id est, tri-
 ticea psisana, uocyrene grupen significat. Ita ut rum chondrus, tum psisana ge-
 neralia nomina esse uideantur omnium frugum siccatarum, decorticatarum, ac
 in grumos iusarum. Atq; hoc sanē modo alicā apud Plinium lib. i. cap. ii. etiam
 generale uocabulum est omnium quemadmodum apud græcos chondrus, cuius
 uox latinis non est usurpata. Primum enim ait Plinius alicā sit ex zea quā *se-*
men appellauimus, Tūditur granum eius in pila lignea, Nam lapidis duricia con-
 teritur, Nobilius ut notum est pilo uinctorum pœnali opera, primori inest pyxis
 ferrea, excussis inde tunicis, iterum iisdem armamētis nudata conciditur medul-
 la. Ita fiunt alicæ tria genera, Minimum, ac secundarium, grandissimū uero aphæ-
 rema appellant, haecenus Plinius ostēdit planē eum alicæ parandæ modum, qui
 & hodie ubiq; Germanis frequētis est. Verum ex tribus generibus quæ fieri ex
 zea ait, Minimum accipio quod in farinam penitus redigitur, Secundariū quod
 grumofum est, grandissimū uero à quo parum quid detusum est, & tunice sal-
 tem excussæ, unde etiam *ἀφάρκη* à cortice uidelicet siue tunicis ablatis est appel-
 latum, atq; hæc tria genera alicæ ex zea factæ iuxta contusionis magnitudinem
 distincta sunt. Sunt autem & alia eius genera iuxta materiæ ex qua fit diuersita-
 tem. Sic sequitur in Plinio, Alicā adulterina sit maxime è zea quæ in Africa de-
 generat, &c. & ad finem capitīs idem Plinius ait, Alia ratio ubiq; adulterandi: ex
 tritico candidissima atq; grandissima eligunt grana, & semicocā in ollis postea
 arefaciunt sole ad inirium, rursusq; leniter adpersa molis frangūt &c. Quare ex
 his Plinij uerbis apparet, Alicam ex zea tum uera, tum degenerāte, itemq; ex tri-
 tico fieri, ueluti etiam supra de chondro audiuius, ut planē græcis idem sit *χόν-*
δρος, quæ alicā latinis & Plinio appellatur. Cæterū quod Paulus Aegineta lib. i.
 cap. 78 inrer chondrum & alicam distinguit, quantum sanē ego cōiectura asse-
 qui possum, ob nihil aliud facit, quā ut certam speciem chondri, & certā itidem
 alicę demonstraret. & chondrum quidem ex tritico factum accipit, quem Galenus
 chondropsisanam & pyrinen psisanam dixit, Alicam uero propriē ex zea para-
 tam. Ita enim inquit. *Τσπισάνη ὀνομαζομένη ὁ μὲν χόνδρος τρεφόμενος τὴν ὀλίσχου*
χυμῷ γινώσκεις, ἂν δὲ μὲν πλεονὲς μοχλὸς ἐκτόπος παχυμυελὸς αἰνὰς μὲν
να, ἀσπῆς δὲ οὐχ ὡς αὐτὸν ἴσον καλῶς ἐκβλήντ, παραπλοσίος σπισάνη. ὁ δὲ ἄλλος τὴν
μὲν ἄλλαν χόνδρου παρτοικερ, μάλλον δὲ γαστρί, ἐστὶν ἐφελκτικός. Quod enim bene alere
 & tenacē succū gignere dicit chondrū, etiam Galen. de eo dixit, quod uero lotus
 prauus sit, propterea quod facile denset, & incoctus maneat, & quod meliorē ait
 succum

succū eius, si integre probe coquatur, uelut pitfana, idem Galenus eodem loco, primo uidelicet de alimētis, ubi de chondro agit, tradit: ut nō recte à quibusdā hoc loco in Paulo πλῆρες pro παντός legatur. Et ob id etiā fallitur qui Paulum de frugum aliqua specie, hoc est, farre hic loqui aiunt, ex qua uidelicet alica, quæ ἄλις ab eo latina usurpata uocē dicitur, paretur. Nam quod alicam chondro in reliquis similem, nisi quod magis uentrem cohibeat, dicit non quod chondrus integrum & naturale semen per se sit, alica uero ex eo tuso paretur, ostēdit: sed magis quod ambo facticia sint, & alica ex zea ut dixi, chondrus uero ex tritico fiat, & ob id similitudinē inter se habeant. Alicam uero ob id magis uentrem cohibere credendū est, quod ex zea fiat, quæ uires per omnia medias inter triticum & ordeum habet. Quando uero ordeum in primo ordine refrigerat, & arefacit, triticum autem neq; siccet neq; humectet manifeste, sed tamen in primo gradu calfaciat, cōsequitur zeam, & ex ea factam alicam, moderate siccandi ac refrigerandi facultate prædita esse, quæ causa est cur uentrē cohibeat & adstringat, tametsi ex siccatura quoq; ei quid harū uirium accedat. At uero ut tum chondrum, tum alicam, utraq; facticia esse apud Paulum itidem uelut apud Dioscoridē & Galenum credā, facit quod idem Paulus plerisq; locis ambo, ut cōsimilis usus ac facultatis cōiungit, uelut lib. 3. cap. 31. ἐστὶ δὲ οἱ ἀπὸ παντὸς ἐκ ψυχροῦ, ἢ ἄλις, ἢ χόνδρος μετατρεψὶς ψυχρότατον χυλῶν. & 3. cap. 62. προφῆν δὲ διοσκῶν χόνδρον παντὶ δὲ ἔφυκε τὸ ἄλυσαν ἢ ἄλικα. Porro Aetius aliquando cōiunctim χόνδρον ἄλικας dicit, ut ne quis occasionem habeat, diuersam rem à chondro alicam putādi. Sic term. 9. cap. 10. προφῆν δὲ διδόναι χόνδρον ἄλικα μὲν οἷν λαλῶν καὶ λιπρῶν καὶ ἐκποσύνοντος. & eodem sermone cap. 12. χόνδρον πῦρ δὲ ἐν αὐτῷ ψίχας ἢ χόνδρον ἄλικας ἐν αὐτῷ ἐμειλῆται. & eodem serm. cap. 29. ἰσοκύβητον οὖν καὶ τὸν ἀπὸ τῆς αὐτῆς μὲν καλῶσας τὰ λευκὰ βελανιττα, πρᾶφῆναι δὲ χόνδρον ἄλικας μὲν ὀφθαλμοῦ ἐν φρεσὶν καὶ σπινθὴρ τῶν αὐτῶν. Qui locus itidem apud Galenum 10. Methodi legitur, sed pro χόνδρον ἄλικας, simpliciter χόνδρον habetur. Galenus enim latinam appellationem usurpare uitauit, quod Aetio ex re esse uisum fuit, ut uidelicet utraq; tum græca, tum latina appellatione coniunctis, certius res ipsa indicaretur. Ceterum quemadmodum χόνδρος & χονδροπισσάνη; & πυρενα πησιάνη; ex zea & tritico fiebant, & πησιάνη; simplex ex ordeo, sic πρᾶγος ex olyra parabatur, ut Galen. 1. de alimentis ait. πῦρ δὲ οὐλοῦσας πῦρ ὅταν ᾖ καὶ πῖσιναι, τὸ ὀνομαζόμενον πρᾶγον πῖσιναι. Et βρόμος ex auena, ut Paulus lib. 1. cap. 78. quum ait. πρᾶγος οὖν ἐστὶ πησιάνη; καὶ ὁ βρόμος καὶ ὁ χόνδρος ἐψύχαι, ostēdit: & oryza ex typhē ut Plin. lib. 18. cap. 10. testatur, & ob hanc sanē faciiciam harum rerū similitudinē Græci dictionarij χόνδρον per πρᾶγον item per ἄλικα exponunt. Sic enim Hesychius ait. χόνδρος πρᾶγος ὅτι καὶ ἄλις. Quamq; Galen. & Paulus, & Plin. etiā, atq; Dioscorides, natia semina frumen tacea. & non faciicia, his nominibus prodāt. Tametsi quod Dioscor. ait. πρᾶγος τὸ ἄλυσαν μὲν πρᾶγος οὖν τῷ χόνδρῳ ὅμοιον, planē exprimat faciiciā rem tragum esse, ut qui chōdro in figura similis sit, et ex olyra zea genere factus, quā chōdrus ut idē, uelut supra indicaui, ait, ex uera zea fiat. Quod ipsum etiā Plinius ait his uerbis 18. cap. 7. Pitfanae cōficiendæ ratio uulgata est. Simili modo ex tritici semine tragum sit in Campania tantum & Aegypto: Nisi quod ex tritico fieri & non olyra prodāt, ut uel ex eo loco appareat confusissimas semper fuisse frumentaceorum generum appellationes, eandem rem alijs aliter uocantibus, uelut etiam Galenus primo de alimentis iam sæpe citato libro ostēdit. Porro quod dixi aliquos existimare apud Galenum & Paulum locis supra citatis, chondrum frumenti & tritici certam speciem & naturalem, nominatimq; far esse, & non rem faciiciā, falluntur mea quidem opinione, Nam neque his locis aliud quā faciicia

[illegible]

Acetum mulfum in potu præbendo tum simplex, tum Iulianicū.] Oxymel-
lis siue acetum mulfum cōpositio recitatur à Plinio 14. cap. 17. & lib. 23. cap. 2. isdem
ferè uerbis, nisi quod posteriore loco aqua marina pro pluuiâ falsò legitur. Pau-
lus lib. 7. cap. 11. aliter componit simplex oxymeli quàm Plin. tradit. & eodem li-
bro cap. 5. etiam oxymellis Iuliani conficiendi modū docet. Pharmacopolia ho-
die neutrum eo modo præparant, & corruptissima est in uulgatis antidotarijs de-
scriptio oxymellis Iuliani. Possit autē ex Paulo corrigi, si quis in usum uentere ue-
lit. Temperatissima uero quomodo fiat acetum mulfum confectio, Galenus in cōsilio
puero ex comitiali morbo laboranti destinato præscribit.

Illinenda frons ex cyphi in frigidioribus, ex crocomagmate in calidioribus.]
Cypheos cōpositiones plures fuisse Dioscorides ait, qui lib. 1. unam recenset. Ae-
tius serm. 13. duas habet, alteram ex rebus XXXVI. alteram XXVIII. cōstantem,
quas etiam Paulus lib. 7. cap. 22. ponit omnes calidas & propterea in frigidiori-
bus habitudinibus in capitis dolore in febribus fronti recte illinuntur, uelut etiā
Aetius perhibet. Crocomagma uero quod eodem loco Dioscor. describit cōtra
calidioribus habitudinibus cōuenit, utpote quod ob crocū adstringendū ui præ-
ditū, & ob hoc terrestre ac frigidū, modice refrigerat. Nam aliās etiam nim in cro-
co, tum in crocomagmate calida facultas prædominatur.

Arbuti fructus Memecylon græcis appellatus.] Arbutus ῥόμας græcis est,
quæ arbor unā cū fructu suo Memecylo græcis appellato, acerbæ qualitatis est,
& stomacho incommodat, ac capitis dolorem inducit, ut Galen. 7. simp. phar. de ea
prodit, & Dioscor. lib. 1. quod ipsum etiam hoc loco de ipso fructu Galenus per-
hibet, eaq; prout in capitis dolore febrili uiſandum censet. Verum Plinius lib.
15. cap. 24. ait. Vnedo pomum inhonorum, ut cui nomen ex argumēto sit unum
tantum edendi, duobus tamen hoc nominibus appellant Græci Comarū & Me-
mecylon, ex quo apparet totidem esse genera & apud nos, alio nomine arbutus
uocatur. Quibus uerbis Plinius quatuor uoces Vnedonem, Comarum, Meme-
cylon, & arbutum, unū arbori ac fructui tradit, cuius tamē duo genera esse putat,
atque ita etiam lib. 23. cap. 8. sentit. Arbutus, inquit, siue unedo fructum fert dissu-
cilem concoctioni & stomacho inutillem. At uero ῥόμας & arbutum eandem
arborem esse, eiusq; fructum Memecylon uocari, ex supra citatis Galeni ac Dio-
scoridis locis clarum est. Vnedonem autem alium esse fructum, & non Comari
siue arbuti, sed arboris epimelidis appellatæ, ex eodem Galeno ostendemus. Se-
xtio namq; simp. phar. de Epimelide, ἄμυγλις inquit, acerba planta est, & ut dicitur
repositis syluestris malus, appellatur autē à ruralibus in Italia ῥόμας, hoc est unedo,
ac plurimum in calabria nascitur. fructus eius acerbus, stomacho incommo-
dus, & capitis dolorem inducens. Nam peregrina quedam qualitas ei est ammi-
xta. Quæ uerba ex Galeno etiam Paulus transcripsit, ut dubitari nō debeat, quin
alia arbor sit ἄμυγλις, quæ unā cum fructu suo in Italia unedo appellatur, & alia
arbutus, cuius fructus Memecylon græcis dicitur. atq; hoc propterea quod di-
uersis locis eorundē mentio fiat, & hoc ab his autoribus qui æque ut Plin. in Ita-
lia uixerunt, quanquā Plinius innuat potius quàm exprimat, duo unedonis ge-
nera esse, ut uidelicet alterum de Memecylo, alterum de unedone accipi possit.
Sed tamen mox leuiter satis dictum cōfundit quum ait, alio nomine arbutus uo-
catur. Quare certū est ipsum existimasse arbutū & unedonem latinis esse, quod
comarus & memecylon græcis, atq; id ut opinor, ob similem uim quæ de meme-
cylo & unedone proditur. Verum ex Galeni uerbis ostenditur unedonem epi-
melidis fructum esse, Memecylon autem arbuti. Neq; refert fructū & arborum
appellationes singulatim inter se in suo genere cōfundi. Quin & lib. 2. de alimen-
tis

tis idem Galenus manifeste inter Comarum arbore, cuius fructus Memecylon appellatur, & inter arbutum aut sentium potius, quae Epimelidas fert & in Italia unedo appellatur, distinguit ut certū sit duo diuersa genera Vnedonem & Memecylon esse, quorum *ἀνδρομήνη* Galenum fuisse credo, Plinium uero ut nō adeo circa has es curiosum, ex Graecis tantū transcripsisse; & in his uelut multis alijs eos non assequutum esse. Porro Dioscorides lib. 1. alterum genus Mespilin in Italia nasci prodit, quod ab aliquibus *ἀνδρομήνη* uocetur, ut ex eius uerbis Epimelis & unedo ex mespilorum genere sint, Arbutus uero & comarus ac memecylon sui generis, & ab eis diuersi existant. Epimelis certe frequentissima est hodie ad syluam Hercyniam, fructusq; eius unedo, uulgo eltzbehr appellatur. Hippocrates autem *γυναικίον* & *ἀνδρομήνη* uocat, uelut Galenus in glossis eiusdem testatur.

In caput ille Cephalaëa.

Manifestum igitur est hanc affectionem consimilem aptitudinem capitis ut facile lædatur, uelut in cephalalgicis habere. *κεφαλαία* græcis à *κεφαλή* tum affectus magnitudine tum temporis diuturnitate distinguitur, alia consimilis aptitudo capitis, ut facile lædatur in utrisq; adest, nisi quod in cephalæa maior partium capitis affectionum debilitas coniungit, atq; hæc aptitudo græcis *ὀνέθη* appellatur, uelut contra dispositio corporis aut capitis quæ non facile, aut minimum lædatur, *ἀνέθη* & *εὐέθη* dicitur. Porro quæ sequuntur dolorum discrimina, ad loci affecti cognitionem pertinent, de quibus fusillime Galenus in secundo librorum hoc titulo inscriptorum tractauit.

Propterea quod oculorum tunicae ex cerebri involucris habeant ortum.] De tunicis oculorum itemq; humoribus, quot sint, unde oriatur, & quem præbeant usum ad visum, doctissime tradit Galenus lib. 10. de usu partium humani corporis, tamen ista exemplar graecum corruptissimum sit, ut pleriq; omnes eius libri. At vero in immensum excrecat horum commentariorum magnitudo si eiusmodi omnia explicare uelim, & tamen alio loco commodius hæc res tractabitur.

Per clysteres itaq; reuulsio fit, & ligaturis extremis [arū.] Ostendit aliquos mo-
dos reuellendi materiam quæ ad caput in cephalica repit, uelut sunt clysteris ad-
motio, ligatura extremarum partium, & multa infernarum partium confictio
sanguinis detractio è cubito, itemq; ex naribus, & etiauatua per hieram exca-
tam; hæc enim omnia auxilia materiam à capite detrahunt ac reuellūt. Fit autem
ἀντιώσθησις quam reuulsionem diximus, in contrariam, (sicut deriuatio quæ *ὑπο-
χρηστική* dicitur, in uicinam partem,) atq; hoc secundum omnes differentias loca-
les, uelut Galenus lib. 5. Meth. ait, ἡ δὲ ἀντιώσθησις γίνεται δύο μὲν ἐπὶ τοῖς κέστοι καὶ
στέρματι οὗ ἐκ τῆς αἵματος καὶ μὴ ἐκ τῆς σφύρας καὶ ἐκ τῆς κεφαλῆς καὶ ἐκ τῆς
καρδίας καὶ ἐκ τῆς πλάτης καὶ ἐκ τῆς κοιλίας καὶ ἐκ τῆς ποδός. & in comment. super aph. 68.
partic. 5. ἡ δὲ ἀντιώσθησις γίνεται τέσσαρες μάλιστα μὲν δύο καὶ ὅσον ἐξ ἑκαστοῦ ἢ ἐκ πάντων
ἐκ τῆς κεφαλῆς καὶ ἐκ τῆς καρδίας καὶ ἐκ τῆς πλάτης καὶ ἐκ τῆς κοιλίας καὶ ἐκ τῆς ποδός. Verū
hoc loco differētiā ab internis ad externa reliquit, sicut priore, ab anteriore par-
te retrorsum, ac uice uersa. & in cōment. ad 70. τοῦτο δὲ ἀντιώσθησις, reliquit differentiā è late-
re in latus: ut sint ex toto octo locales differentiæ apud Galenū, reliquis sex tan-
tum numerantibus, ea quæ ab internis ad externa relinquit. Porro reuulsio fit in
his quæ adhuc influunt, deriuatio uero fluxionum est quæ iam aliquam partem
apprehenderunt, uelut Galenus secundo ad Glauconem ostendit.

Deinde hieram dabimus exacutam.) Hieram exacutam dicit quæ non simpliciter per se, sed cum additione alicuius medicamenti fortioris & amplius laetiscentis, exhibetur. Quemadmodum in superiore libro de Alopecia, dixit se aliquando ueratrum nigrum addere, si atra bilis sit expurganda, aut scammonia si amara

bilis sit euacuāda, atq; hoc significant græca uerba, τὸν ἰσθμὸν ἐφωσάντας θορότας. Sicyoniam enim hic ἐφωσάν acuere ad materiam amplius irritandam ac lacessendam, quum alias ἐφωσάν etiam acidum facere significet. Galen. 5. simp. phar. ἡ δὲ ἰσθμὸς θορός ἐφωσάντος ἔχει τὸν θρόνον, id est, alia uero ex putrefactione acidum faciente generatur. Aetius ser. 9. cap. 21. φυλάττειν ἡμῶν τὸ γαστήρ, ἐφ' ὅν ὁ σπασμὸς ἐκφύεται αὐτὸ πικρύνει, id est, Vitandū lac in quibus stomachus ipsum acidū facere cōsuevit.

Discutit autem oleum dulcissimum calidum, & magis inueteratū, itemq; Sicyonium. Sicyoniū oleum maxime in Sicyonia parari scribit Dioscor. lib. 1. ut patriam appellationem inde habeat, docetq; eius faciendi modum ex oleo albo, ita ut dimidium eius aquæ affundatur, cum qua his effertuescat, nulla mentione facta cucumeris ex quo incoctio fiat, & unde alij Sicyonium appellatum putant, ἐξ σικίνου uidelicet, hoc est à cucumere appellatione ducta. Paulus namq; lib. 3. cap. 7. sic ait αἶμα δὲ κνίσι καὶ βλαστωσὶς σπέρμα φνέσκουσιν, καὶ ὁ χυλὸς ἔλκεται, καὶ τὸ δὲ αἷμα ἢ σπέρμα ἐκ τῶν ἐν τῷ αἵματι σικινάδων σικινάδων ἐλαίου. Quibus uerbis Sicyoniū oleum ex elaterio, ipso uidelicet cucumeris syluestris succo, aut eiusdem radicibus componi tradit. Aetius autem ferm. 9. cap. 27. non quidem Sicyonii mentionem facit, sed alias olei in quo syluestris cucumeris radix sit incocta, καὶ λαμβάνει, inquit, πικρὸν γίνεσθαι σικινάδων αἵματι ἐλαίου, ὃν ὁ σπέρμα ἀγρίου ἔχει φασφύεται. Indicauit itaq; Aetius his uerbis Sicyonium simplex, quod ex incoctis oleo radicibus cucumeris syluestris fiebat, Paulus uero tum cōpositum Sicyonium oleū, tum id quod ex elaterij succo itidem cōpositum est, significat, quorum omnium descriptiones idem Paulus lib. 7. cap. 20. habet.

Cōscienda etiam ad ea crocodiliadis maximæ iuxta aquas nascentis radix. Crocodiliadem hic uocat, quam ipse in 7. simpl. phar. itemq; Dioscorides crocodilon appellant, radicem calida & sicca ui præditam, unde & discussoriam facultatem habeat, & propterea in crassis & frigidis capitis humoribus discutienti commode adhibeatur. Verum hoc loco de maxima & iuxta aquas nascente crocodiliadis radicē, hoc est, τῆς παρὰ τὰ ὕδατα φουδρῆς λεροστικιάδος ἐν μεγάλῃ mentionem facit, ad differentiam, ut puto, chamaeleonis nigri, cui similem esse Dioscorides perhibet, qui item longam & leuem crocodilij radicē depingit, sed in syluosis locis, hoc est ἐν τόποις θυμαλίστοις nasci prodit, quum Galenus contra, hoc loco circa aquas nasci tradat, Nisi forte in Dioscoride pro θυμαλίστοις, sit legendum ὕδατος δένδρ. Plin. certe in sabuletis nasci dixit, quasi ἐκμαλίστοις apud Dioscoridem, aut alium quendam græcum autorem, unde ea transcripsit, legisset.

Maxime etiam profunt sub aquario uase nascentes Aselli, Millepedæ appellati. Animalia quæ græcis ὄναι, & ὄνισκος, & πολυπόδες, hoc est, aselli, & Latinis millepedæ ac multipedæ appellantur, satis nota sunt, ut quæ non solum sub hydryis & aquarijs uasis, uelut hic ait, nascuntur, sed ubiq; in locis humectis, uelut cellariorum parietibus & fenestris pluuiæ aut tempestate madefactis proueniūt, itemq; in sterquilinijs generantur, & ad contactum se in globum contrahunt, coloris alias fusci & ad gryseum declinantis. Dioscorides etiam κοβαλίδας appellat. Galen. κνέμους, id est, fabas à similitudine Asianos uocare dicit. Marcellus uero Cutiones, ob cutis ut uidetur, duritiā & soliditatem, cap. 8. & 9. nominat. Verum significantissime ea Galenus infra lib. 3. describit, his uerbis. ζῶν δὲ πολύποδος ὃν τοῖς ὕδασι ἐγγύς καὶ ὃν τῆς κνέμους μορφῆς, κατὰ δὲ τῆς τῶν δακτύλων ἐπερίσσης σφαιροειδούς. Et Plin. 29. cap. ult. Millepeda ab alijs centipeda aut multipeda dicta, animal est ē uermibus terræ pilosum, multis pedibus, arcuatiō tepens, tactuq; cōtrahens se, oniscus Græci uocant, alij tilon. Quare manifestariū incutunt errorem qui ὄνισκος uermes terrenos esse credunt, propterea quod hi in

hi in Italia Nisculi, quasi corrupta ex græcis uoce, uulgo appellantur, quum uermes terreni longe alia animalia sint quam Millepedæ, & γάρ τῆρας, hoc est, intestini terræ græcis dicantur. Plinio autem & latinis uermes terreni, & de utroq; genere scorum Galenus lib. 11. simpl. pharm. & Dioscor. lib. 2. agant. Porro uermes terreni similes sunt lumbricis, qui aluo & intestinis innascuntur, ἰλμυθὸς τρογγύλαι, id est, rotundi græcis appellati. Quare quidā permiserunt sibi etiam uermes terrenos lumbricos appellare, magno errore si quis in rei medicæ usu, pro uerme terreno lumbricum ex aluo humana adsumat, quum uermes terreni exigendis ex aluo lumbricis, in potu ab Aetio præbeantur. Non autem lumbricorum tantum rotundorum species uentri & intestinis innascitur, sed etiam ἰλμυρ πλατέας, id est, lumbricus latus, & Ascariides, uelut euidentiss. ab Aetio serm. 9. cap. 39. & sequentibus duobus docetur. Lumbrici autem lati ab eodem ac reliquis græcis medicis καίτοι appellantur, hoc est institæ, à similitudine quam ad institæ habent, quâ ratione etiam πλατέας ab iisdem uocantur, quod instar fasciarum sint lati ac longi. Cuius generis nuper unum à quodam Northusensi ciue exegi longitudinis cubitorum decem, quæ pars saltem fuit dimidiata unius antea ab eodem progressi. Nam aut integri, inquit Aetius, excernuntur ut incredibilem magnitudinis de se præbeant adspectum, aut etiam prodeunt in partes concisi. Et semel sanè exoluti, non amplius secundario cōgregantur id quod & ab Hippoc. indicatū est lib. 4. de morbis quum ait, καὶ ἀπὸ τρογγύλαι τίεσσιν, ἀπὸ πλατέας, εὐκῆτι. ut non mirum uideri possit proditum esse à Plinio lib. 11. cap. 33. intra hominem tæniæ tricennum pedum, aliquando & plurium longitudine nasci. Illud potius mirum uideri debet, eo Plinij loco, & multis alijs ubi de tænijs mentionē facit, neminem hæcenus, ex tot doctis uiris quibus Plin. familiarissimus fuit, animaduertisse, tineas falsò pro tænijs irrepsisse. Neq; enim tinea legendæ sunt apud Plinium, quoties de uermibus & lumbricis intra hominem dicit, sed tæniæ uoce græca, quâ de lato lumbrico græcos medicos usurpare dixi, atq; ad eò etiam reliquos scriptores. Sic Constant. Caesar lib. 11. agricul. cap. 27. de nasturtij semine, μετὰ δὲ ἰλμυθῶν οἶνον ποίνουσιν ἰλμυθας & ταινίας ἐξέχει, id est, lumbricos & tænijs exigit. Ita Plin. quoq; lib. 27. cap. 9. de duobus filicis generibus: pellunt interancorum animalia, ex his tænijs cum melle. & paulò post. Melius tænijs cum scammonij pari pondere. Longe enim diuersa res est tinea uestium à tænijs alui, de qua re obiter stuidiosos admonere uolui.

Aut de transmutatione in diuersam speciem quippiam diceret.) Transmutatio in diuersam & aliam speciem μεταστροφῆς hic à Galeno appellatur, qua significatur alia affectio ad priorem accessisse, aut priorē ad eò in aliam degenerasse ac transiuisse, ut ob id etiam alia à priore curatio sit instituenda.

Quemadmodū enim Hippocrates ait, leue & lene milium existit.) Hæc uerba de Milio Hippocrates lib. 2. πρὸς ἰατροὺς ὁμιλίῃ habet, ubi in lateris dolore siccū fomētum adhibere iubet ex sale & milio torrefactis ac laneo marsupio exceptis. His uerbis πνεῦμα δὲ ξηρὸν, ἥλιος, ἕλγχει πικρὸν γὰρ καὶ ὀνίσις μαρμαρίσσειν ἔπειτα διατρεῖται καὶ γὰρ κούφον καὶ πρῶτον ἐκ γυγθός, quod Plinius leuissimum mollissimumq; est, dixit, lib. 22. cap. 25.

Cataplasmatis uero utere ordeacea cruda farina.) ἀμάλυνος & soluta compositio δὲ ἀμύ λύνος dicitur à Galeno & reliquis græcis medicis, cruda ordeacea farina per se nullā alia re ammixta, nisi etiam hæc ipsa certis uocibus additis singulatim exprimitur. Imò non solum cruda ordeacea farina per ἀμάλυνος accipitur, sed etiam triticea, atq; propterea aliquando uocem adijcere solent, quæ certā farinæ speciem indicet, uelut hoc loco Galen. habet μαλακώματι καὶ κριθῶν ἀμύ λύνος.

ubi *κρυβίς* adiecit ut certū esset eum de ordeacea cruda farina dicere, quæ tamen etiam per nudam *ἀμύρ λόνου* significatur, ut paulo post. *ἢ τῆ ἀμύρ λόνου δι' ἐξυμύλινου* *ζυμύλινου*, id est, aut cruda ordeacea farina cum aceto mulso apparatus. Infra lib. 4. huius operis de Chemosi, tum ordei, tum tritici appellationes ad *ἀμύρλινου* adijciuntur, *ἢ τῆ ἀμύρλινου κρυβίς* ἢ *πυρένης* ἢ *γλυκὴ ἐμφυλάς*, id est, aut cruda farina ordeacea siue triticea in passio cocta. Quin *ἀμύρ λόνου* non solum de farina cruda ordeacea & triticea usurpatur, sed de omni cruda farina in uniuersum. Sic Galenus infra lib. 5. cap. 3. *κρὸς ἀμύρ λόνου ἐπιτεχνίαν*, *ἢ ὅς κρυβίον ἀλλόγου*, ἢ *ὅς λινοπύρενον*, ἢ *τὸ λίκον*, ἢ *τὸ μίγμα ἐκ τῶν τριῶν*. Quod autē dixi significari per hanc uocē crudā farinam per se, nulla alia re ammixta, ex hoc palam sit, quod ubiq; in eius usu res & liquores adduntur, cum quibus ea ipsa farina subigi excipiq; ac parari & coqui debeat. Neq; accipiendū *ἀμύρ λόνου* semper significare crudam ordeaceā farinam aqua ac oleo subactā, quod in corruptissimō *ἀλκυων* libello Galeno indigno legiunt. Hippoc. 2. de morbis *ἐκ τῶν τε κατὰ πλάσσειν ἢ ἐν ἑσθλῇ, ἀμύρλινου ἢ οἷου καὶ ἐλάϊου ἐφ' ὧν χλυσίμ.* & infra lib. 5. cap. 9. de fomentis dentium. *ἢ ὡς ἀπὸ βιμύλινου ὅς τ' ἔχει ὁ δὲ τριῶν, ἢ τὸ δι' ἀμύρ λόνου ὅς τε κρυβίς, ὅς τε λινοπύρενος*. Videtur autē *ἀμύρ λόνου* appellata ad differentiam *ἀλκυων*, hoc est polentæ, quæ ex ordeo tosto fiebat, atq; hoc est quod Plinius lib. 22. cap. 25. ait, Polenta à farina ordei distat eo quod torretur. Verum polentæ parandæ modos Plin. lib. 18. cap. 7. tradit. Porro non dissimilem polentæ parandæ modū Aetius serm. 10. cap. 29. tradit, sed sic paratū ordeū *βυλιν* appellari ait. *τὸν εὐδαρδῆνον* *ἢ* inquit, *τὸ εὐδαρδῆνον* *ἢ* *τὸ λεγόμενον βυλιν*. *ἢ* *τὸ κρυβί* *ἢ* *ἐργαμένον* *ἢ* *βλαπτόμενον* *ἢ* *πεφρυγμένον* *ἢ* *τὸν γλυκυστῆνον*. *ἢ* *κατὰ πλάσσειν*. hoc est uelut nos uertimus. Ex eorū quæ tumores cohibent numero, est & id quod Byne appellatur: Est autē ordeum madefactū quod germen emisit, & deinde unā cū enatis *ligulis* tostū est: si tritū pro cataplasmate imponatur. His uerbis Aetius planè describit ordeī præparationē, quomodo per omnem Germaniam ac Galiam ad zythum siue ceruisiā, ut uocāt, coquendā parare solent, Neq; scio alium qui bynen, hunc paradi modū appellet, uulgo nostrati Maliz appellatur, digno literis nomine, utpote cuius beneficio sit, ut Bacchi indignationē ac numen à nobis auersum mitius feramus. Alludit autē ad bynen appellatio germanica ipsius ceruisiæ. Vna enim tantum litera mutata, byre dicimus.

Nilei quidē igitur pharmacū quod ad emplastrī formam paratum est.) Nilei pharmacū emplastriforme à Paulo lib. 7. cap. 18. inter malagmata recēsetur & infra lib. 8. cap. 5. ab Asclepiade. Est & aliud eiusdem Nilei siue Nili medicamentum oculare forma collyrii ex rosīs cōstans, ad cuius differentiam illud *ἐκ πλεστωδὲς* dixi, hoc uero idem Paulus eodē libro cap. 16. habet, & Aetius serm. 8. cap. 1. meminit. Porro *ἐκ πλεστωδὲς* medicamentū dicitur, quod in massæ formā coactum, comode ita per se imponi potest, aut etiā in malagmatis formā dilui ac liquoribus additis resolui, atq; hæc est propria emplastrī medicamenti forma, & inde appellatio, quam tamen adiecta litera *β*. non emplastrū, sed emplastrū, rum Græci tum Latini, per usum inualefcentem appellare cœperunt, ut Galen. lib. 1. compositionis phar. *ἢ β*. ostendit.

In solā Alexandria Perseæ arbore uidī.) Perseam arborem Galenus hoc loco se in solā Alexandria Aegypti uidisse ait. Quod ipsum satis cōmonstrat aliam arborem Perseam esse, q̃ quæ Persica poma fert, quam Galeni seculo certū est per omnem Italiam Asiamq; ac Græciā notissimā ac frequētissimā fuisse. Verum hoc adhuc manifestius sit ex libro eiusdē de alimētis, ubi primū de persicis, et postea seorsim de Persio malo tradit hæc uerba. *ὁ δὲν ἐστὶν τὸ φυτόν ἐκ τῆς Ἀφρικανικῆς τῆς μεγάλου ἢ καὶ ἀπὸ τῆς Ἰνδίας, ἢ κατὰ τὴν αὐτὴν τοῦ μεγάλου ἢ τῆς Ἰνδίας τῆς μικρῆς*

σαυ, ὅς ἀναστῆναι τὴν φασγάνου, εἰς αὐτὸν πῦρ ἢ κρημνίσῃται, ἐλάδω δὲ τὴν γινώσκοντα πικρὸς
 ἐλάδω δὲ τὴν πικρὸς τὴν καὶ μέλαις, ὅς ἐστι τὸ μέλαις ἐστίν. Hoc est, uidi & hac plantam in
 Alexandria, quæ & ipsa magna arbor exsistit. Narrant autem quidam fructum eius
 adeo uisiosum ac pniciosum in Persis esse, ut in cibo acceptus interficiat. In Aeg-
 yptum uero translaturum, comestibilem factum esse, ut quæ eodem modo, uelut pū-
 ra & mala edatur, quorum etiam magnitudinē habet. Quin & libris simp. pharm.
 seorsim de persica malo, & de perseæ arbore tradit, quod etiam ante eum Diosco-
 rides fecit. Atq; hanc diuersitatem etiam Plinius indicauit, quum lib. 15. cap. 13. sic
 inquit. Persicæ arbores sero & cum difficultate transiere, ut quæ in Rhodo nihil
 ferat, quod primū ab Aegypto earū fuerat hospitium. Falsum est uenenata cū cru-
 ciatu in Persis gigni, & poenarum causa à regibus translata in Aegyptum, & ter-
 ra mitigata. Id enim de Perseæ diligentiores tradunt, quæ in totum alia est, myxis
 rubescētibus similis, nec extra orientem nasci uoluit. Eam quoq; eruditiores ne-
 gauerunt ex Perside propter supplicia translata, sed à Perseo Memphi lata, &c.
 Cæterum quod Plinius hic non ex Perside translata, sed à Perseo Memphi fa-
 tam ait, Id Nicæder in Alexipharmacis ad Mycenæ transferet. Nimirum non in
 Memphi Perseum Perseam plantasse, sed Mycenæ, his uersibus tradens,

Hancq; nuces poterint Perseæ pellere noxam.
Dura, si tritas oleo albo in pocula uertas;
Hanc quondam Perseus linquens Cepheia rura,
Quando Medusæum curuo caput abstulit ense;
Grata Mycenæis consequit munera in aruis.
Quanquam hoc loco Perseæ nukes à Nicandro pro persicorum nucleis dictæ ui
detur, Nam Dioscor lib.6. contra Cerusiam exhibere iubet, ita etiam
Paulus lib.5.cap.59.Sicut hoc loco cōtra eandem Nicanter *περσικὰ κέρα* habet,
ut ipse adeò Nicander inter perseam & malum persicā nihil discriminis nouerit,
& uel contra ipsum imprimis dictum esse credibile sit quod Plinius scripsit.Por/
rò idem Nicander in Theriacis de Cranscolapte phalangij genere s. ait, id Pha/
lanx muscæ circa faces noctiu obuolitanti simile esse, & Perseæ folijs innutriti,
πῆλινος, inquit, *περσικὸς ἰκανοφύκτος πετάλιον*. quod ipsum etiā Dioscorides de Per/
sea arbore tradit, *ἐφ' οὗ*, inquit, *τὴ λεγόμενῃ κραναίᾳ λατρεῖ φελανχία θυερίσιμα*. Verū
ex hoc loco nihil argui potest, quod perseæ eadem arbor sit quæ malus persica,
quod ex Alexipharmacis tamen citato antea loco apparet ipsum Nicandrū exi/
stimasse. At uero Interpres Nicandri hoc loco Sofstratū citat, qui scripserit Per/
seam Rhodaceneam uocari, & ex Aethiopia in Aegyptum transplantatam esse,
sed adscribam eius uerba, *λεγει δ' ἐπὶ Σόστρατῳ ὅτι τῇ πόλει Βιάντων ἢ Δακίαν τὴν παρ'
είαν ἀρ' ροδακκίαν καλοῦσι, αὐτὴν δὲ ἀδιωπίαν εἰς Αἰγυπτὸν μεταφυτεύθηναι*. His itaq;
uerbis indicatur, tum Sofstratum, tum interpretem Nicandri Perseam & malum
persicam, eandem arborem putasse. Nam Rhodacenea non est alia quàm malus
persica, & fructus etiam, hoc est ipsa mala persica, Rhodacena appellantur. Pau/
lus lib.1.cap.31.Postquam mala persica mali humoris facileq; accescentia ac corru/
pibilia dixit, subdit *τὴ δ' προκαρκία τε καὶ ροδακκία καὶ αρμίνια ἐρηθίζονται πρὸ πόνου*
καρ. οὗτε γὰρ ἀβύνεται, οὐτε ἀσθενεῖται διαφθάρηται, hoc est, Præcocia uero & Rhoda/
cina & Armenia, meliora sunt Persicis, neq; enim acescūt, neq; similiter corruptu/
puntur.Quanquam in exemplari græco uulgato *ἀσθενεῖται* pro *ροδακκία* falsò le-

gantur, quod etiam ex doctissimo eius libri interprete Copo uidere est, qui *ῥοδάκη* in suo exemplari & legit, & uertit. Cæterum præcocia & Rhodacena itemq; Armenia ex genere Persicorum esse Galen. lib. 2. de alimentis apertis uerbis dicit, unde hæc etiam Paul. transcripsit, Tamen in Galeno præcociorum tantum & Armeniacorum, non etiam Rhodacenorum nomen legatur, At uero uelut apud Pauli *ῥοδάκη* falso pro *ῥοδάκη* legitur, Sic etiam apud Plin. Duracina pro Rhodacenis, tribus locis suppositiua habentur. Velut lib. 15. c. 12. Sed Persicorum palma Duracenis, legendum est Rhodacenis, & eiusdem libri cap. 28. Spumeus malis, nullus Persicis, quæ præsertim Duracina abundant succo, sed quis eius ullum dixerit colore ubi sit Rhodacena pro Duracina legendum est. Eteodem cap. paulo inferius. Quorundam generi utraq; est natura, ut Persicis. Etenim Duracinis adhaeret corpus, è lignoq; auelli nequit, quæ cæteris facile separet. Vbi rursum pro Duracinis, Rhodacenis substituendum. Suspico autem in Paulo *ῥοδάκη* à quopiam ex Plinio esse substituta pro *ῥοδάκη*, quæ multo rectius quis ex uera Pauli lectione, *ῥοδάκη* etiam ad Plinium transtulerit, atq; ipsa pro Duracinis substituerit, uelut satis est commensuratum, quæ iuxta Sosistratum Rhodacenea persicæ mali genus appelletur, quæ utiq; etiam *ῥοδάκη* appellanda esset, si *ῥοδάκη* recte apud utrumq; autorem Paulum inquam & Plinium legerentur. Verum quod apud Plin. Duracina leguntur pro Rhodacenis, non utiq; ipsi Plinio imputandum est, sed alicui semidocto, qui non intellecta, neq; alicubi lecta, Rhodacenorum appellatione, mox in eam suspensionem uenit, Duracina legi debere, ob ossium uidelicet duritiam, Quomodo uidelicet Duracina uua, & Duracina cerasa apud eundem Plinium leguntur, Non quidem ob ossiculorum aut granorum duritiam, uelut ille existimasse uidetur, sed propter ipsius fructus densitatem, qui Actius ueteribus omnibus appellat uelut alio loco ostendi. Neq; recens est hæc suppositio, ut alicui clario nomini imputari possit, quando etiam Palladius Plinium, ut puto sequutus, aut similiter à quopiam corruptus, cū alibi, tum lib. 12. cap. 7. Duracina & non Rhodacena inter malorum persicorum genera recenseat, ut inde etiam ad posterum Duracinarum appellatio sit propagata uelut genuina. Porro meminit Rhodacene arboris Actius serm. 13. c. 118, uelut alibi de Hypno citauit, fructus uero Rhodacenorum meminit etiam lib. 1. de persica malo agens, ubi aperte Rhodacenon appellari eius fructum testatur. Et Paulus lib. 3. cap. 6. sed tamen idem in *ῥοδάκη* pro *ῥοδάκη* falsò legitur. Quemadmodum etiam apud Constantinum Cæsarem lib. 10. agricul. *ῥοδάκη* pro Persicorum genere leguntur, Sed in ea tamē tractatione semel *ῥοδάκη* scriptum habetur, quod recte legi, pro suppositiua in præcedentibus *ῥοδάκη* tam puto satis declarauit. Nempe *ῥοδάκη* appellationem ex *ῥοδάκη* arbore Sosistrato & Actio dicta, ductam esse, & hanc ipsam non à latinis duracinis grecos mutatos esse, sed latinos ex grecis Rhodacenis, in Rhodacena dixisse. Verum per ignorantiam, aut nimiam sedulitatem aliquorum erymi studiosorum, Rhodacena in Duracina transiisse. Videtur autem mihi appellatio ea omnino à Rhodo deducta esse, quod primum ab Aegypto persicarum arborum fuit hospitium, ueluti Plinius dixit. Quomodo Damascena à Damasco sunt appellata.

At uero in uehementer inueteratis Sinapi ut moris est adhibere, & perire. Vltima auxilia in capitis dolore penitus inueterato sunt Sinapismus & ustura. Imponitur autem sinapi in omni antiquato dolore, ubi ex alio ad superficiem extrahere uelimus, atq; id aliquando sicubus ammixtis facimus, ita ut imposita sinapi ad rubefactionem locorum, aut etiam ulcerationem, Quomodo sanè etiam in capitis dolore inueterato adhibendum est, qd Gal. hic *ἡ ἐκ τῆς σινάπιδος*, hoc est pro consuetudine sinapi imponere dixit. Quod si neq; sic cesset dolor, ustio per ferramentum igne cā defacta faciēda in locis ubi maxime dolor hæret, uelut etiam Cor. Celsus lib. 4. cap. 1. tradidit.

Ad eiusmodi pharmaca uelut ad sacrā appellatā anchorā cōfugiūt. Ad sacrā anchoram

anchora cōfugere prouerbio dicitur, quod supremū auxiliū, rebus planē des-
peratis, festinat. Translatione à nautis sumpta quī anchora sacra appellatā non ei-
ciūt, nisi in extremo periculo. Nā ubi ea electa est, tota nauis eo fulcro sustentat,
quod ipsum si tēpestare urgente arenis impactū hereat, aut à rudētibz nauticis
auellatur, ita ut recipi intra nauē nō possit, nihil reliqui est quo fulcra nauis pos-
sit, quo minus à uētis subuertat, nisi procellarū tēpestare mitigata in portū aliquē
secūdo nēto ac fato appellere cōtingat. Et propterea non nisi summo discrimine
ea anchora eiici, in alias necessitates alijs tribus aut quatuor paratis, quæ si etiā
electæ recipi nō possint, quāuis horrida res sit, tamē non penitus desperata, quā
aliarū copia super sit, quibus rebus urgētibus electis rursus nauis stabiliri queat.
In summa Sacra nō eiicitur, nisi in reliquis parū fiduciæ sit, & discrimē ultimū co-
gat, adeo ut quū ego sexies Oceanū magnū tum orientālē, tum occidentālē, ultra
citraq; trāsmiserim, nō nisi semel eiici uiderim, in Amasis ostiū, nautis eō defuge-
re ex immēso Oceano cōpulsis, quū tam unā ex uulgaribus anchoris abruptā re-
liquissent, & in duabus reliquis tantū prēdij nō sperarēt. Hoc itaq; loco Galen.
medicos affectiois rudes ad pharmaca ultima, uelut ad sacra anchora, mox festi-
nare ait, quū tamē ea ipsa non nisi in frigida intēperie uel p se, uel etiā similiter frī-
gidis humoribus ammixtis, adhibēda sunt, & tamē sic per ignorantia eōsdē sæpe
proficere ait, atq; hoc ppter ea qd pleriq; homines ob uitiatā diētā in huiusmodi
affectioes collabātur. Eiusdē Archigenis amuleta quæ capiti coronæ modo
circūposita. *περίκεφαλα* itemq; *περίσπονδα* dicunt quæ corporis partibz quibuscūq;
circūligata, eas à noxa tutantur, malaq; amoliūtur, ut *περίσπονδα* id significet quiddē
quod latinis Amuletū, sed tamē Amuleti uox nō ex *περίσπονδα*, sed ex *ἀρπύ-
ρα* facta est. Sunt enim *ἀρπύρα* magis speciali uoce appellata, ea quæ appen-
sa alligataq; incantamenta magica & uenenorū insidias arcant aut inefficaces red-
dunt. *περίκεφαλα* uero generalē significationē habent, à circūligando aut circūpo-
nendo, atq; in hoc amplius ab *ἀρπύρα* differūt, qd hæc mirabili quadā cōtrarie-
tate, quæ homines lateat, suū effectū prēbēt, illa uero iuxta medicā rationē. Quo-
modo sanē hic Gal. ex Archigene adducit *περίκεφαλα* ad dolorē capitis sedandū
efficacia, si capiti obligentur aut coronæ modo imponantur, Reprobat enim ipse
Galen. ex his quæ Archigenes tradit, ea quæ nō medica aliqua uis, sed portētoſa
amoliēdi ratione ab illo sunt p̄dita, atq; propterea *περίκεφαλα* quæ obligamēta so-
nant, in dolore capitis rectissime per coronas latinis redditur. Nā ipse Galen. ea
ἐκείνη & *ἐκείνη* iubet, hoc est circūdare, & coronæ modo imponere, ut planē ge-
neralē quandā medicā rationē in his corollis esse indicet, quæ per cōtactū capitis
cōtingat, & nō mirificā amoliēdi uim, per p̄sentis rei utcūq; appensæ naturalem
contrarietate contingētē, quæ ut superstitioſa, est à Galeno reprobata. Quin &
Dioscor. lib. 4. de Hippoglossō quū ait, *ὅτι καὶ ἡ ἵππος περίκεφαλα τῷ χύσπον καφαλαγ-
σι*, nihil aliud uult qd Hippoglossum coronæ modo impositā aut obligatā capitis
doloribus p̄desse, & rectissime eū locū Plin. intellexit & uertit li. 27. c. 11. Capitis
dolorē corona ex his imposita minuit. *περίκεφαλα* enim coronā dixit, Nā hæc signifi-
cat potus qd mōstrosam amolitionē, atq; hoc modo etiā de philanthropo idem
Plin. 24. c. 19. dixit. Ex hac corona imposita capitis dolores sedātur, qd auxilium
etiā Gal. hoc loco ex Archigene producit, *ἐπεὶ*, inquit, *μετ' ἀλγος τῇ φυλὰν ἀντι-
δοτῶν ἐφ' ἑαυτὴν ἐκείνη*, hoc est philanthropo herba coronari iubet. Ceterū mirificā
amolitionis significatione *περίκεφαλα* ipse Dioscor. eodē libro de uerbenacā supi-
na usurpauit. *καὶ τὸ αὐτὸ ἐν τῇ βοτάνῃ ἐστὶ τὸ ἀλγος ὅτι καὶ ἀντιδοτῶν ἐφ' ἑαυτὴν*, hoc est appellant ipsam herbam sacram propterea quod comoda sit
in expiationibus ad amuleta. Hoc enim loco non aliqua medica uis uerbenacæ
ostēditur, sed planē superstitioſa efficacia, qua externas incantationes expiet &

amoueat. Cuius efficaciz res, frequentissime apud Pliniū amuleta appellantur.

Deinde philanthropo herba coronari iubet, & palmulæ masculæ cortice summo. Philanthropos herba est quæ & Aparine Dioscoridi, Galeno, iteq; Plinio dicitur. Verū quæ ego hic palmulæ masculæ corticē summū dixi, φάνικος ἄφρονος σελίνου Archigenes uocauit, est enim σελίνου, τὸ ἐν ἄκρῳ τοῦ φάνικου φλοιῷ δὲ γυναικίῳ, ut Hesychius tradit. Hoc est, Sebenium est corticosum id quod in summa palma enascitur. Quibus uerbis indicatur, σελίνου plane id significare quod ἐλάτη λέγεται in palma dicitur, quod ipsum Dioscorides παρὰ τὸ ἐλάτημα, id est, operimentum fructus palmæ recentis & adhuc florētis esse dicit. Galen. uero. s. simp. phar. ἀφροσίμα, hoc est, indumentū seu tectoriū uocat, quantū in exēplari uulgaro ἀφροσίμα, pro ἀφροσίμα corrupte legatur. Videturq; σελίνου diminutiuā forma τὸ σελίνου factū esse. σελίνου enim pannus asperior qualis est qui à balneo circū datur ad corpora abstergenda, à medicis græcis appellatur, Onbasio & Aetio ser. 12. cap. 11. item Marcello latino medico, ac Palladio. Quantū apud Hesychiū non σελίνα sed σέλανα legantur, exponanturq; σκεπάσματα & περιβόλαια, hoc est, operimenta et amicula, ut ex Sago latino facta uideantur σέλανα. Verū ad similitudinem σελίνου uelamenti à balneo, σελίνου operimentū palmulæ dictū esse diminutiuā forma apparet. Porro nō solū hic summus cortex palmulæ dictū appellatur, sed ipsum adeo recens palmulæ fructus germen ut Galen. ait, ὃ δὲ ἡμεῖς ἐλάτην τὸ ἐκ παλίου ἐλέαμα & φάνικος. Idem Dioscor. αἱ ἐκ τῶν ἄκρων ἐλάται καὶ ἐκ τῶν κερμάτων ἐλάται καὶ ἐκ τῶν σελίνων. hoc est, contentus in ipso cortice fructus tūdem elate dicitur. Cæterum quod à Galeno ὑγίαινας in eadem palmula dicitur, id ab eodē. 2. de alimentis, uertex & summitas palmæ appellatur. καὶ ἐκ τῶν ἰσθμῶν τῶν κερμάτων & φάνικος, καὶ ἡμεῖς τῶν ὑγίαινων αἱ. At uero quod à Dioscoride ὑγίαινον uocatur, omnino aliud est, medium uidelicet in eius ligno, tertium à cortice. ὑγίαινον enim uocabulo etiā alias mediū alicuius rei, & quasi coreultū aut medulla appellatur, quomodo græci medici etiā ὑγίαινον & σελίνα scilla internam partem uocant. Ipse autem Plinius palmulæ ὑγίαινας, cerebrum dixit.

Amplius uero & Oesypū, hoc est, lanæ sordes, atq; ipsæ adēo lanæ sordibus sudoris succidæ. Oesypus & Oesypum neutro genere ut Plinius dixit, sunt fordes pecudum sudorū, foeminum & alarum adherentes lanis, Quæ lanæ sordibus propterea appellatur quod sudoris sordibus & succo sint imbutæ, Græcis autem ἰσθμῶν σινυπῶν & σινυπῶν, hoc est, fordida, & Oesypo imbuta, & τῶν σινυπῶν appellacionibus factis. Sonat autem ipsa uox σινυπῶν ouium sordes, quæ quo modo ex ipsis lanis eluantur Dioscorides lib. 2. docet, & Plinius lib. 29. cap. 2. Cæterum quod annotatu dignissimum uisum est. Apud græcos medicos ferē omnes, & in plerisq; omnibus locis in quibus σινυπῶν mentio fit, σινυπῶν legitur, & similiter σινυπῶν ἰσθμῶν legitur pro σινυπῶν. Neq; apud græcos solū, sed etiā apud Latinos, Pliniū iniquā & Celsū, hyssopū aliquot locis pro Oesypo legitur, magno omnino errore, si quis hyssopū herbā, pro Oesypo lanæ sordibus accipiat, aut uicissim Oesypū pro hyssopo exhibeat, quā diuersissimæ res sint genere, forma, uiribus, & tota natura. Et tamē Interpretes omnes qui nobis hactenus græca transferulerunt, ubiq; ex uitiatis exemplaribus græcis hyssopum pro Oesypo reddiderunt, neq; quisquam in hunc diem admonuit de suspecta lectione, sed simpliciter σινυπῶν pro σινυπῶν, falsū in græcis exemplaribus excusum, itidem Latinis iraderunt, ut uidelicet etiā Latini hyssopum pro Oesypo legamus, sed magno omnino errore usurpemus, si ita contingat uti. Ego aliquot saltem locos indicabo, quos maxime cupiam emendatos, & qui excusari queant per exemplarium græcorum corruptionem, sed tamen ut Interpretes se uix à supinitate & se finabunda negligentia defendere possint, etiā si ignorantiz suspicionē effugiant.

Apud

Apud Galenum itaq; lib. 11. simp. pharm. πούτε ἐξ ὧν ὁ σισυππῆς legitur falsò pro σισυππῆς. & ibidem σισυππῆς ὁ σισυππῆς, & rursus, ἐχρησάτο ὁ σισυππῆς falsò habetur pro σισυππῆς, quod utrinq; est substituendū. Sic etiā apud eundē 13. Meth. legitur ὁ χυρὸν ὁ σισυππῆς ὁ σισυππῆς τῶντε λειπόμενα 19. τῶντε λειπόμενα μινυῖται, ubi pro τῶντε σισυππῆς legendū est τῶντε σισυππῆς σισυππῆς, uelut ex eiusdē operis lib. 14. appareret, ubi ait ὁ σισυππῆς ὁ σισυππῆς σισυππῆς ἀπαρτὸς ἀλλὰ καὶ ἡ γὰρ μὴ λείπει, γινώσκεις, quamquam ibidem paulò post etiam ὁ σισυππῆς pro σισυππῆς sit excusum. Sic etiā hoc opere de comp. pharm. secundū locos, frequentissime ὁ σισυππῆς pro σισυππῆς expressum est, uelut infra lib. 9. cap. 6. in pharmacis sedis aliquoties, & hoc a deò loco quem iam interpretamur, habetur ἐπὶ σισυππῆς, quod nos diximus amplius autem & Oesypū, &c. Porro apud Paulum & Aetii itemq; Oribasii quem tamen totum notidū uidi, tam frequens est ὁ σισυππῆς pro σισυππῆς, ut ex tam multis locis nō libeat paucos indicare, admonitos tantū uolumus medicinā studiosos, eamq; exercentes, ut si in has uoces incidunt, diligenter perpendant utra ex his duabus ad præsentem & subsequētiā tractationē cōueniat, Quā hac parte etiam Plinius non sit integer, atq; haud scio an alicui alteri quā illi ipsi ea fraus sit imputanda. Nam ut apud Græcos facile fuerit ab σισυππῆς in ὁ σισυππῆς ob literarū uicinītatē prolabi: Ita non est in eum lapsus in latinis proclititas, quā hyssopus planè aliter quā Oesypus scribatur, nisi quis omnino per temerariā ignorantiam incitatus, pro Oesypo sibi ignoto, hyssopum substituisset, Verum eò magis inclināt suspicio ipsum Pliniū ex ὁ σισυππῆς in græcis lecta ac iam tum eius æuo corrupta uoce, hyssopum bona fide uertisse, hoc est errorē ex errore propagasse, nō quidē per ignorantiam, Nam etiā aliquot locis integre Oesypū descripsit, sed per supinitatē & oscitantīā, aut certe præscriptæ lectiōnis reuerentiā, quam mutare religio ipsi fuit. Sic itaq; lib. 29. cap. 9. habes. Medicorū aliqui admixto anseris adipe, tauro rumq; seuo & hyssopo ad podagras uti iubent. Quo loco Oesypo pro hyssopo substituendū est. Nam hyssopi herbę hoc loco nullus est usus. Et eodē lib. cap. 19. Mulierū purgationes adiunat fel taurinū lana succida appositū, Olympias Thebana addidit hyssopū & nitrū. Hic rursus Oesypum pro hyssopū substituēdum est. Oesypus enim ἐμφύει ὑπὸ λινῶν αὐτὸ ἐξ ὧν ποιεῖται ἡ ὀλμπιάς, inquit Dioscor. hoc est fœtus & menses in lana appositus ducit. Et lib. 29. cap. 6. fel anserinū sanguis anati, contulsis oculis, ita ut postea hyssopo & melle inungantur. Quo loco item Oesypo pro hyssopo legendū est, ut ex eodē Dioscoride itēq; Galeno patet, qui in hunc usum Oesypū & non hyssopū habent. Et lib. 26. cap. 14. Sicut ad ulcera manantia hyssopū. legendū est Oesypū, Verū suffecerint hi loci his qui Plinium studiose legūt, & aliquādo imitari solent. Neq; enim cū his sentio qui Pliniū penitus ē medicorū numero reijciunt, de quibus tamē ipse Plinius non multū sit sollicitus, Verū ego sentio plerq; esse apud Plinium quæ rectissime possint in usum assumi, & quæ felicius quis æmuletur, q̃ uulgares aliquot practicos, ut hodie uocant, quā omnia sua ex græcis medicis descripserit, & plerq; in his Galeni libris reperiuntur, prius à Plinio tradita. Nimirū quā uterq; & Plin. & Gal. alter latine, alter græce, ex prioribus medicis sua trāscripserint, uelut ambo ingenue testatur. Quin & Cor. Celsus eadē labe contaminatus est, sed quæ nō ipsius Celsi culpa, sed allicius transcribētis & temere mutātis uitio cōtingit. Celsus enim ex pro falsò medicinā scripsit, neq; Oesypum ignorare potuit. Locus est lib. 5. cap. 19. in Enneapharmaco emplastro, ubi ait. Constat ex nouem rebus, cera, melle, seruo, resina, myrrha, rosa, medulla uel ceruina uel uitulina uel bubula, hyssopo, butyro, &c. ubi pro hyssopo nullius in hoc emplastro usus, Oesypo locandum est. Quomāmodum inter easdem nouem res per rosam, rosaceum accipiēdum est, forte

forte quod integram uocem scriba aliquis decurtarit, qui satis manifestum puta-
uit, hoc loco rosaceum accipiendum esse, etiam si non integre scribatur. Quan-
quam rosa pro rosaceo nō solum hoc loco, sed per totum Celsi itemq; Scribonij
opus legatur & aliquoties etiam apud Plinij, eodem scribēdi compedio, quam-
uis satis dispendioso, quā etiā doctis rosam ipsam consiēdā esse uideri ali-
quoties possit. Porro ex Oesypo pharmacum compositum sit, quod Græci medi-
ci aliquando *εἰσὺν πρὸ φάρμακον*, aliquando *εἰσὺν πρὸ καὶ φάρμακον*, aliquando *εἰσὺν πρὸ καὶ
φάρμακον*, aliquando *εἰσὺν πρὸ ὕλην* uocant, atq; hæ appellaciones omnes à forma
medicamenti, quod ad cerati liquidī modū paratur, sunt deductæ. Componendi
autem modum docet Paulus lib. 7. Sed tum in hoc Pauli loco, tum in alijs plerisq;
que omnibus eidem *εἰσὺν πρὸ* pro *εἰσὺν πρὸ* falso legitur. Sunt autē promiscui etiam
Oesypus per se, & pharmacum ex eo constans, uelut Galen. lib. 4. Meib. tradit
his uerbis. καὶ πῖνον καὶ ἂν δὲ αὐτὸ καὶ τὴν αἵματι γινώσκουσιν ὅτι φάρμακον, καὶ
χρῶνται γὰρ πᾶσι πῖνον κατὰ τὴν ὅτι ἔστιν ὁ δὲ φάρμακον τῶν φάρμακων, καὶ τῶν τε
αὐτῶν ὅταν εἰσὺν πρὸ μὴ πρὸ, ἀλλὰ ὅταν εἰσὺν πρὸ. Quin & hodie in aliquibus pharmacopoe-
ijs hyssopus humida habetur pyxidibus inscripta, & humidam ad differentiam
hyssopi herbæ aridæ dici uolunt, qui forte de re ipsa nihil sciunt, quā non hyssopo
humida ea res, hoc est lanarum sordes sit appellāda, sed Oesypus liquidus,
ut iam plus satis est ostensum. Hippocrates porro lanas succidas etiā *εἰς πῖνον*
σε uocat, & *εἰς πῖνον*, Nā & πῖνος uox Oesypī ac sordis significationē habet.

Et per futuræ adductionem, tanquam non sit denudatum curabimus.] Dupli-
cem hoc loco Galenus capitū vulnerum adducendi modū ostendit, quorū al-
terum *ἐκ τῆς αἵματι* appellat, alterum *κατὰ τὴν αἵματι*. Modus per *ἐκ τῆς αἵματι*, hamu-
lis seu fibulis impositis sit. Nam his caro hians adducitur, uelut etiā supra ex Cel-
so ostendit. Modus uero *κατὰ τὴν αἵματι*, quem per futuræ adductionē appellauimus,
per acum sit quæ uulnerum oras propius iungit, unde etiam *κατὰ τὴν αἵματι*, quasi di-
cas iuxta acum siue acus admotionē, fieri is modus dicitur. Est enim *δύω* à uer-
bo *δύω*, quod acuo & acum trāsigo significat, & nō à *δύω* periota, quod tango
est, unde etiam *δύω* tactus uel cōtactus, quæ uox hoc loco nullum locum habet,
quod tamen uetus existimauit Interpres. Porro si futurę non teneant, nec perma-
neant, tertium curationis modum *κατὰ τὴν αἵματι* adhibendum præscribit, qui
sit aridis pharmacis carnē gignentibus inspersis, uelut iudē supra indicauī. Quæ
uero sint talia, & qua facultate prædita, eorumq; differentiam, Galen. lib. 3. Meib.
& Paulus lib. 7. cap. 13. habet. faciūt enim omnino ut caro concreseat, & cicatrix
inducatur, unde quoq; appellationem hæc curatio accepit. Appellatur autem
& *συνέκρυσσις*, ubi in uisio herniæ carnosæ, quæ *συνέκρυσσις* Græci, & uulgus chil-
rurgorum nostrate Carnosel uocāt, partes sciori, tunice uidelicet, aut uasæ, aut
testes, cum carne enata coalescunt & concrescunt, uelut Paulus lib. 6. cap. 63. de-
clarat. Quin & naturalis ossiū *συνέκρυσσις*, Galeno in libro de ossibus appellatur,
quando carniū interuentu ex natura coalescūt. Etenim iuxta *σύνεσις*, quæ est
naturalis ossiū unio, ossa quædā inuicem uniantur ac coalescunt, fungosiora ui-
delicet, & molliora. Quædam uero aliorū corporū interuentu eam ipsam unio-
nem habēt atq; hoc tripliciter, aut carne, aut neruis, aut cartilagine mediāte, quæ
rum *συνέκρυσσις* prima *συνέκρυσσις*, altera *συνέκρυσσις*, tertia *συνέκρυσσις* appella-
tur: concartationem & conneruationem ac conchardullagationē ad græcorum
imitationem nobis appellare liceat. De naturali autem *συνέκρυσσι* ac unione hæc
accipienda sunt, & nō ea quæ in fractis sit, quæ callo superinducto reduniantur.

Linamentum conuulsū cum aceto & oleo imposito.] Linamentum cōuul-
sum Galenus hoc loco *πλῆκτρον* dixit, alias etiā *μὲν πλῆκτρον* appellat. Sunt autē
item

tem *μοτῶν καὶ μοτῶν* linamenta quæ in uulnera induntur, & quibus oræ uulnerym ulcerumq; ac sinuum obturantur. Verum medicamenta quæ his ipsis linamentis excepta simul induntur *ἑμμοτῶν* appellantur. Galenus lib. 5. τῶν κατὰ γῆρας ὁδῶν γονίης τε καὶ λευμῆς πρὸς τῶν ἰατρῶν ἑμμοτῶν, ὅσα μοτῶν ὑγχινομένων προσφερόμενα. Ab eis etiam uerba formantur *μοτῶν* ac *ἑμμοτῶν*, linamentis & penicillis inditis curare. Et *ἑμμοτος* cui eiusmodi *μοτῶν* & penicilli inditi sunt appellatur, hoc est, qui uulneratus est; & alias *ἡρωματίας* dicitur. In libello *διαγωγῆς* inter Galeni spurios connumerato, quinq; *μοτῶν* recensentur species ex ipso Galeno hinc inde collectæ, de quibus infra lib. 3. agam.

Aliud; Myrrhæ trientem, euphorbiæ trientē. &c.] Hoc loco uetus interpres, Euphorbiæ drach. III. uertit, atq; hoc modo etiam legi debere suspicor, quum nimirum uideatur euphorbiæ rei adeo uehemēter calidæ & urentis pondus, trientis uidelicet, hoc est quatuor unciamum. Noli tamen mutare lectionem, sed tantum suspicionem meam indicare, ut si quis uti uelit, in tam sortum medicamentorum usu considerate agat. Quia & oleum hoc loco quod his rebus temperandis additur, in ueteri interprete recens legitur, tanquam *πρίσκατον*, & non *γλῶκινον*, ut nostrum exemplar habet, legerit, ut forte *ἀδυνῶ* pro *γλῶκινον* legendum sit.

Resinæ frictæ sesquilibram.] Resinam frictam officinæ hodie colophoniam appellant, quæquam à colophone hoc nomen habeat, unde quondam aduehebatur Dioscoride teste, sed liquida, nō tosta siue fricta, ad quam hodie colophoniam appellatio est contracta. Græci citra resinæ additionem, *φρυκτῶν*, hoc est frictam, simpliciter apellare solent, atq; hoc ob fricturam siue tosturam quam accepit, uelut etiam Galenus hoc loco facit. Porro quomodo urere ac torrere conueniat omnem resinam liquidam, docet Dioscor. lib. 1. At uero liquida resina tum pinus tum piceæ, nō solum ex colophone, sed etiam ex Gallia Tyrreniaq; apportabatur, eodem autore attestante. Quare Galenus subinde τῶν ἐκ τῆς λαρεμίων ὑγρῶν appellat. Hoc est liquidam ex dolijs siue amphoris resinam. Nimirum quod in dolijs ac amphoris afferretur. Sic Methodi lib. 6. inopia terebinthinæ, ammisceri posse ait liquidam ex dolijs, itemq; frictam. καὶ μάλιστα inquit, ὃ μὴ περιουσιᾶς τῆς μωδίας, ἀτ' ἐκ τῶν λαρεμίων ὑγρῶν, καὶ ἡ φρυκτὴ καλῶς αὖ μωδίων. Verum interpres Linacer, humidam pineam τῶν τῶν λαρεμίων ὑγρῶν uertit, humidam pro liquida ut afolet, dicendo. Nam etiam ceratum humidum pro liquido reddit, uelut alibi commettini. Et Galenus sanè liquidam pini seu piceæ resinam pro terebinthinâ succedere uult, ut in re non sit aberratū ab interprete, sed tamen adijcere oportebat, ex dolijs uel doliorum, uelut Galenus appellat, de quibus quum siluerit, uidetur *ὑγρῶν τῶν λαρεμίων* appellationem non intellexisse. Meminis autē eiusdem Galen. lib. 4. de sanit. tutela. ubi item reliquarum penuria hac utēdum esse ait his uerbis. ἀρῶν δὲ τῶν, ἢ τῶν ἐκ τῶν λαρεμίων, μωδίων πινυμένων. & φρυκτῶν ἑμμοτῶν. Palladius eam ipsam resinam locularem appellauit, lib. 3. cap. 25. de Cydoniorum arbore loquēs. Si arbor agra est, inquit, amurca aquæ æqualiter mista radicibus debet affundi, aut calx uiuat temperata cum creta, uel resina locularis pici liquidæ mista trunco arboris adlini. Quanquam pro loculari, legendum suspicer Lagunculari, ut uidelicet ὁ ἐκ τῶν λαρεμίων, hoc est, doliaris siue ex dolijs, resina laguncularis ab ipso sit appellata.

Saponem betæ succo dilutum.] Hoc medicamentū est quod suprâ lib. 1. Paulum ex Galeno transcripsisse demonstraui, quanquam in Pauli exemplari græco uulgato lib. 1. cap. 45. σίγησι pro saponem legatur. Verum saponem legendum esse ex hoc loco patet, quæ ad uerbū Paulus transcripsit, Amplius aut & ex Copi translatione manifestum sit, qui Saponem in suo exemplari legit & conuertit.

Ob id ipsum ne consterneris.] In græco est *μη συνιδῆς*, quod ne cōsterneris diximus. Significat enim *συνίζουαι* peregrinus & alienus fio, ac quasi mentē à re aliā qua ab alieno, & proinde cōsternor, animoq; uelut renouor, quæ significatio non temere reperitur apud autores, quā alias *συνίζουαι* hospitio excipi, & muneribus donari significet. Constantinus Cæsar actiua uoce usus est lib. de agricultura 2. cap. 46. *συνίζε γὰρ καὶ παρὰ τῆς ἡμετέρας χεῖρας μεταβιβάλλει τὰς μελισσὰς αὐτοῦ.* Et passiuā item lib. 9. cap. 5. *ἂν παρὰ τὴν ἑαυτοῦ εἶναι τὸ φυτόν, καὶ τὴν φύσιν αὐτοῦ γινώσκοντι μόνον καὶ ῥημάτων, ἀλλὰ οὐκ αἰσθύνονται κατασκευάζειν, ὥστε μὴ συνίζουσι τὸ μέλλον ἐν αὐτῷ κατατίθεται φύτι.* ne consterneretur ob nouitatem & perturbetur.

Id autem alternis diebus facito.] *παρὰ ἡμέραν*, hoc est alternis diebus fit, quod per uices dierum contingit. Idem etiam significat. *παρὰ μέαν*, ad intelligitur enim *ἡμέραν*. Aetius serm. 9. cap. 6. *παρὰ τὸ σόμειν δὲ τῆς μακρῆς ἀντίστασιν οὐ παρὰ μέαν*, hoc est, Inediam alternis diebus. Dicitur & *παρὰ μέαν*: eodem sensu, Paulus lib. 3. cap. 10. *καὶ πρὸς τὴν ἀσθένειαν οὐ μὲν καὶ ἡμέραν, ἀλλὰ οὐκ ἡμέραν.* Quin & *μέαν παρὰ μέαν* eodem sensu accipiendum est. Aetius serm. 8. cap. 67. *καὶ διδόναι μέαν παρὰ μέαν.* Idem Aetius serm. 12. cap. 37. hoc ipsum *παρὰ μέαν* idem significare indicat quod *συντιπῶς*, id est, tertio quoq; die. Sic enim ait, *γυναικὶς δὲ τοῦ τριημέρου μου σφοδρότης οὐ μὲν παρὰ μέαν συντιπῶς*, hoc est, alternis & tertio quoq; die. Eodem modo *παρὰ μέαν* significat *παραπλῆκως*, id est, quarto quoq; die, uel etiam anno, si *ἐν* explicentur. Constant. Cæsar. lib. 4. cap. 1. *παρὰ μέαν ἐν αὐτοῖς διατείνει.*

In calidæ solium ægrum immittet.] Solium hoc loco dixi, *ἡλιασπὴν* uocatā Galeno ab inscensu & defectu, alias labrum, ac lauacrū, & piscina, atq; uulgo medicorum etiam Tina appellatur. Nimirum uas in quo aliquis desidens lauari potest, qualia etiam hodie in balnearum ædibus habentur. Græci etiam *κλυμῆστραν* dicunt ab innatādo, quanq; hæc longior & spatiosior piscina fuerit, & τῷ πύλλῳ με κρῶ, id est, alueolo uel folio paruo opponitur à Galeno, qui alias etiā *Ἀφαινήν* & paulo post *μακρὴν* uocat. Sic enim exēplar ipsum habet *καὶ διὰ τὴν μακρὴν καὶ ἀπὸ τῆς ἡμέρας*, hoc est ut ego uerti, In calidæ labrū demitto ac lauato. Sed *μακρὴν* pro cista siue arca, aut potius alueolo panario, usurpat etiā Artemidorus de somniorū interpret. lib. 5. ubi ait, *ἐὰν δὲ τις ᾖ τῷ μακρῷ τῷ λεγομένῳ καὶ δόπτῳ, μετὰ ἀμαθίαν ἀνδρὶ πῖνον βασιλοφύλον φέρεται.* Verū pro folio balnearū itē accipit Damocrates, citante Galeno, infra lib. 10. huius operis. *μακρῶς δὲ νεπίδος γινώμενης ἀπὸ τῶν μακρῶν λιπῶν.* Potest tamen & *κλυστήριον* solij usum præbere. Apud Gellium portò 13. cap. 24. *μάκτρα* & nō *μακρὰ* legitur, in uersu ex Aristophane citato, *χρῆσθαι σὺν μάκτρῳ*, ὅς δὲ βούλα *κλυστήριον*. Ita etiam apud Pollucē lib. 2, quum tamen uersus Damocratis *μάκτραν* non ferat, & *μακρὴν* æque ut *μάκτραν* senarius Aristophanis admittat. Quare *αντίτρον* *μάκτραν* ab illis legi, qui uocē à uerbo *μάκτρα* deducūt, quod subigere *μαλίστα* ac emollire significat, quod ipsum in Mactra illis appellata fieri solet. Contra autem *μακρὰν* legendū esse, Galeni & Artemidori lectio testatur, & mihi quidem uidetur *μακρῶς* appellatio figuram rei oblongiorem referre.

Quæ Aeneas per experientiam pituitam detrahentia tradidit.] Videtur hic Aeneas medicus Galeni sodalis & amicus fuisse, à quo se pharmaca subscripta per manus accepisse fatetur, ab eodem per experientiam cognita. Verum in primo pharmaco, Saponis lib. 6. id est, *σάπωνος* λιβ. 5. legitur. Vetus tamen Saponis sesquilibram habet, & sic etiam legendum existimo, quum sex librarum pondus nimium uideatur reliquorum comparisonē: potuitq; fieri ut ex uera quondam scriptura *σάπωνος* λιβ. 5. quæ Saponis sesquilibra significatur, primum perierit & postea character 5. qui dimidium significat, in eum transierit, qui senarium numerum refert, ob similitudinem ut apparet.

Aquam mulsam sæpe gargarissandā præbeto.] *ἀνασχυλίσαντα* hic Galen. habet, quod dixi gargarissandam præbeto. Videntur autem *ἀνασχυλίσαντα* & *πυλίσαντα* iremque *ἀνασχυλίσαντα* uerba facticia esse à sono ipso qui sit dum aliquid gargarissamus. Nam & gargarissare facticia uox est latinis itidem ut græcis qui *γάργαιον* dicunt. Paulus lib. 3. cap. 5. *ἰσχυρὰ, σφόδρα, μέγα, ὅτι ἄλως ἀνασχυλίσαντα*, hoc est, uisā cribrata ac mixta in sole gargarissa, & cap. 18. eiusdem libri, *ὡφελὲς δὲ καὶ ἀνασχυλίσαντος ἐστὶ τῆς δριμύτους*, id est, gargarissimus rerum acriū. Porro alia uerba sunt græcis *ἀνασχυλίσαντα* & *ἀνασχυλίσαντα*, ne quis similitudine aliqua decipiatur, quæ significant concha aut testa excipere, *πύλη* enim testam ac conchā græcis sonat. Dioscor. lib. i. de Sicyonio o leo. *ψύλλας ἀνασχυλίσαντα ἐλάσσειν*, hoc est, refrigeratum oleum conchis excipito, aut in testas diffundito ac reponito.

Atque ita sensim in eorū usu progredior.] *ἐκ πρῶτης ἀνασχυλίσαντος* fieri dicūt græci quod sensim ac pedetentim fit, & semper cū ulteriore progressu ac additamento. Sic hoc loco Galenus *ἵππος ἐκ πρῶτης ἀνασχυλίσαντος*, ait, hoc est, ita sensim progrediendo uxor. Hippoc. i. Epidem. *ἡδύμενα καὶ μέγιστα ὅτι ἐκ πρῶτης ἀνασχυλίσαντος, καὶ βίαια*.

Porro parabili sæpe pharmaco usus sum &c.] Hic locus ad uerbū a Paulo lib. i. cap. 4. c. transcriptus ex Galeno, quāquā corruptus legatur in exemplari græco uulgato, & corruptius adhuc exēplar Copus habuit, qui pro *ὁμοειδὲς*, hoc est, parabili, conuertit *euphorbio*. Legit enim *ὁμοειδὲς δὲ πικρῶς ἐξοσμύου*, uelut supra lib. i. cap. i. indicauī.

Incipit III. De Hemierania.

Hemierania dimidia pars capitis affectio est, uelut etiam ipsum nomen indicat à uoce *ἡμισυν* & *ἡμίσυν* compositione facta. Eadem etiam *ἡμισυναντία* appellatur, ob alterius tantum partis affectionem. Pharmaca porro quæ huic malo adhibentur, priuatim etiam hemieranica dicuntur.

Porro de euphorbij facultate iam mihi relatum est.] Supra lib. i. cap. i. de euphorbij facultate retulit, quem locum hic in memoriam nobis reuocat.

Laseris siue succi Medici drach. III.] In græco exemplari hic habetur *ὁππὺ μὲν δισσὺ δραχμῶν*, hoc est, succi Medici drach. III. Ego autem ad certiore rei intellectum, etiam laseris uocem adieci, quæ item succum Medicū significat, sed tamen ut optimum Laser Cyrenaicum sit, unde etiam succus Cyrenaicus appellatur: secundo autem loco Medicus & deinde Syriacus succus, siue Laser Medicum & Syriacum habeatur, uelut Dioscor. lib. 3. tradit. Hodie in pharmacopolijs Asa foetida appellatur, & dulcis asa eiusdem generis est, sed minus graui odore prædita. quidam asam dulcem succum silphij, foetidā uero gummi eiusdem esse purant. Sicut contra alij, omnes illos succos perijisse constanter credunt, neque nos quicquid certi asseuerare possumus, aut uolumus, nihilo minus tamen utraq; asa pro occasione, illorum succorum loco usuri, maxime quum etiam Aristophanis interpres *ὅτι ἡμισυν* silphio ingratum & iniucundum odorem tribuat. Verum quod indicare hoc loco operæpretiū uisum fuit, hoc est. Vox *ὁππὺ* se sola posita, quasi per excellentiam de Cyrenaico, Medico ac Syriaco dicitur. Sicut contra in neutro genere, uox *ὁππὺ* solitarie posita succum papaueris significat, per præfationem ita græcis usu factio. Quare uetus Interpretes hoc loco deceptus est per *ὁππὺ* enim *μολυβδῶν*, ipsum papaueris succū, hoc est, opium intellexit, quod falsissimum esse apparer, quum opij papaueris succi hic ineptus sit usus, & *ὁππὺς μολυβδῶν* nihil aliud sit quàm silphij succus apud Medos siue Parthos, unde aliquando etiam Parthicus succus dicitur, nascentis, qui Cyrenaico debilisior est, ut etiam Plin. lib. 19. cap. 3. ostendit.

Verum in corporibus molli ac tenero sensu præditis.] In græco exemplari le-

giture corrupte, *ἀλλ' ὅτι ἀνωδιότης οὐκ ἐστίν*, Legendū est autē *ἀνωδιότης*, id est, mor-
libus & tenero præditis sensu, uelut res ipsa ostēdit, quū minus in his curādis de
euphorbio addi iubeat, et cōtra amplius de eo cōiūctendū esset, si *ἀνωδιότης* lege-
retur, qua uoce sensus expertes & stupidi corporis significātur. Quāq; etiā de
ponderē euphorbij. augēdo Galen. dixisset non tamen *ἀνωδιότης*, sed *ἀνωδιότη-
της* legendū esset, hoc est, hebeti sensu præditis. Nam hi *ἀνωδιότητες* opponuntur,
& alias in *ἀνωδιότητες* curatio ipsa penitus est desperata.

Quod ad finem huius libri admonere opere pretiū uisum est, iam subscribam.
Ordinem in ipso tum capitū generalium, tum titulorum particularium confu-
sum esse, & nō singula suo loco posita, atq; ea confusio nō nuper facta est, quū
eniam Vetus Interpres hunc ordinem græci Veneti exemplaris habeat, Titulus
enim de his qui ob biliosum humorem caput dolent, & qui sequitur, De dolore
capitis per consensum; & qui deinde est, De capitis in febribus dolore, & quod
deinceps sequitur caput, de Cephalæa capitis dolore antiquo, quod tōtius libri
huius secundi generale caput est, usq; ad Titulū sequentiem, Archigenis de Apo-
phlegmatismis: Hæc omnia iustum & sibi propriū non habēt hic locum, sed post
Titulū Archigenis de apophlegmatismis, & cataplasmata in capitis dolore eius-
dem Archigenis, & post titulum, Archigenis de his qui ex ebrietate caput dolēt,
& titulum Eiusdē Archigenis Amuleta quæ capiti coronæ modo &c. & post titu-
lum, Archigenis de fissuris & cōtusionibus in capite factis, & post ea Quæ Ascle-
piades ad capitis dolorem in primo exteriorum scripsit, & post omnia stemuta-
toris, & Quæ māsa caput purgens, & post titulū, Quæ Criso in primo de phar-
macis scripsit, & post titulum, Quæ Aeneas per experientiam pituitam detrahen-
tia tradidit, & post titulum, De usu omnium fortium pharmacorum; tandem lo-
cari debent, ita ut post finem capitis de Cephalæa, mox sequatur Caput genera-
le huius libri Tertium, de Hemicrania. Eo uero loco quem titulus occupat, de his
qui ob biliosum humore caput dolent, mox ad præcedentes Archigenis irriga-
tiones ac siltiones, Archigenis Apophlegmatismi sequi oportet, quod ipsum
Galen. manifeste ostendit, mox in principio ubi apophlegmatismos hos expen-
dit, quum ait, Archigenes autem calidā & flatuosam affectionem se curaturum
pollicitus est non frigidam & pituitosam. Hæc enim uerba indicāt hos apophle-
gmatismos ad superiorem affectionem, quam dicit ipse calidam & flatuosam per-
tinere, & non ad Cephalæam, quæ proximo loco falsò antecedit.

Finis secundi libri commentariorum medicorum.

IANI CORNARIi MEDICI PHYSICI

COMMENTARIORVM MEDICORVM, IN DE-
cem libros Galeni de Compositione medicamentorum
secundum locos conscriporum, Liber III

In caput primum de Aurium affectionibus.



IN quibusdam medicatis aquis oboriuntur. Medicatas aquas
hic dixi *ἢ καὶ φαρμακώδεις ὀνομασθαι*, hoc est, quæ aliqua medicamen-
taria qualitate participant, uelut sunt sulphurentæ, aluminosæ,
nitrosæ, bituminosæ & quæ tum æs, tum ferrum olent, de
quorum usu compendio, ut omnia, Paulus lib. 1. cap. 52. tradit,
Plinius lib. 8. epistolarum ad Gallum de lacu Vadimonis: odor
saporq;

saporē medicatus, inquit. Plin. in naturali historia 31. cap. 6. Nec uero omnes quę sunt calidę, medicatas esse credendum est.

Prodest etiam amaracinum oleum eis infundi, & optimum nardum. Optimum nardū Galen. hic *ἀγρίων νάρδ' αὖ* dixit, sed nō pro ipsa Nardo herba, uerum pro ungento nardino, quomodo etiam alias saepe solet, uelut lib. 1. ostendi.

Idem etiam Tetrapharmacum appellatur. Emplastrum Basilicū, hoc est regium, quod apud maximos & præstantissimos quosq; homines in usu esset, appellatum fuit. Idem etiam Tetrapharmacū uocari hic Galen. ait, uelut etiam Paulus & Aetius, itemq; apud nos Celsus ac Scribonius uocāt, à quatuor nimirum simplicium ipsum cōstituentium æquali mixtura, cerę uidelicet & colophonię, picisq; ac adipis taurini. Ex his enim simul coctis emplastri forma cōficiuntur apta inflammatis, puri uidelicet mouendo, ut Celsus ait, & ex hoc loco satis apparet. Est autem aliud adhuc pharmacum nō emplastri forma, aut usu, sed delingibile, item Tetrapharmacum appellatum, & alias etiam *ἀντίδοτος ὁσπ' τρισάκων*, itemq; Mysteriū dictum, quod item ex quatuor rebus cōstat, gentiana uidelicet & myrrha, aristolochia, & baccis lauri tritis ac melle exceptis, ut Aetius 8. cap. 63. tradit, quanquam falsò zingiberi pro myrrha legatur, tum hoc loco, tum plerisq; alijs, exemplaris quod sequuti sumus uisio. Verum apud eundem 12. cap. 47. integra lectio ac compositio eius est, quod annotare operę pretium duxi, ne quis hoc ad emplastrum, & antidotum æquiuoco decipiantur.

Vt per aurifusoria specilla ad lucernam reposita infundi possint. Specilla aurifusoria Galeno *ἀντρυχόρια* hic dicuntur, uelut *μυτρυχόρια*, ac *ἐντρυχόρια* ab eodem, & medicis omnibus uocantur, quę nos utrifusoria, & narifusoria appellare possimus. Celsus *ἀντρυχόρια*, alias strigiles, alias oriculares clysteres appellat. Tradit autem Celsus inter alia medicamenta aurium, etiam hoc ipsum, quod hic Galen. habet, ex castorei ac opij: quod papaueris lachrymā uocat, panibus portionibus contritis affuso passo. Nisi quod Galenus pro passo & uinis dulcibus, sapam ad dolorem leniendum probat, quę sit musto ad tertias decoctio, ut alibi ostendi. Porro differūt *ἀντρυχόρια* à *μυλωρία*, quę paulò post auricularia specilla dixi, quod hæc auriscalpia expurgandis à quacunq; re illapsa, auribus apta sint, illa uero ad infundendum aliquid & instillandum comparata.

Quemadmodum illi faciunt qui spissamenta, stymmata gręcis appellata addunt, quo uidelicet per multum tempus ipsum rosaceum odoratū permaneat. Strymmata esse oleorum ac succorum spissamenta odorata lib. 1. ostendi, uerū alia quàm quę hedysmata appellantur. Hęc enim uox aliquando pro quibuscūq; odoramentis, aliquādo pro tota composita re, ex aromatibus & oleis siue succis constante, hoc est, pro ipsis ungentis accipitur, illa uero ad spissandum quidem assumentur, uerū itidem odoris gratia, & ut diutius integra & illæsa permaneant, in ungenta induntur, uelut Galenus hic docet, & 2. lib. *κατὰ γένος* ubi ait. *τὸ ἰλαυνθῶν τὴν ἐπιπλοὴν ἰσχυροποιεῖ καὶ τοὺς συμμάκτους, ἀπὸ τῆς ποσειδῶνος ἡ τε τοῦ ἀνδριανῆος ὀνίκερος ἢ τοῦ μέλιτος πικρὸν ὁσμύρας ἐπιπλοὴν τὴν σκινυαδύνητα.* Videntur itaq; proprie hæc res stymmata dici, quę præter odorem, etiam ad strictionē uim in ungenta deponūt, quo diutius incorrupta perseuerent. Sic Aetius 9. cap. 49. in pastillo magno, spissamenta ex decoctio rubi, myrti, florum mali punicej, radice capparis, folijs salicis, & alijs quibusdam habet. Et eodem capite non longe post, Spissamenta arida in puluerem redacta habet, item flores mali punici, gallas, malicorium, myrtum, lentiscum, & alia eius genera adstringendī ui prædita: atque hoc sanè modo stymmata in oleo rosaceo sunt, lentiscus, calamus, & aspalathus iuxta Dioscoridis traditionem.

Aut Cassiam illo non praesente, tum eam quae zigeros, tum quae Motodes appellatur.] Duas species Cassiae Galenus hic indicat, quae commodè in auricularia pharmaca miscentur, alteramque zigeron, (uel ut exemplar habet γίγερρον) appellari dicit, barbara uidelicet appellatione, uelut etiam Dioscorides testatur, qui ait quòd μέλαινα καὶ μπόρφυρος παχὺαί ζιγέρ, id est, nigra & purpuram colore referens, crassa, ziger uocetur, Alteram uero Motode uocat, haud scio qua nominis ratione; Nam hanc appellationem neque Dioscor. neque Plinius, neque quisquam alius, quod sciam, habet: Nisi ipse adeò Galen. lib. de antidotis, ubi genera cassiarum recensens, maxime laudari ait eam quae gizi dissyllabo barbaro nomine uocat, indeque eam quae Moto appellatur. ἡ παρὰ τὴν μὲν γίγι μάστιγι παρὰ τὸν γίγι πλὴν μοτῶ κελουμένη. Ex quo loco apparet utranque appellationem barbaram esse, & isthic Moto barbara uoce, hic Motode graeca inclinatione dictum esse. Imò Galen. eodem loco γίγι, & non ζιγέρ, legendum esse docet contra Dioscor. lectionem, sed in hac parte nihil contentiosus asserendum, quum alterutra uox barbara, alterutrum tempore in usu fuisse possit, & postea in exemplanibus corrupta esse. Quod si non esset, uehementer dubitem an hoc Galeni loco, μοτῶδης recte legatur & non potius βαλσαμῶδης legendum sit, uelut Plinius. 12. cap. 19. habet. Alia est Balsamodes, inquit, ab odore simili appellata, sed amara, ideoque uisior medicis, sicut nigra ungentis. Proclius enim fuit ex oblitteratae uocis βαλσαμῶδης uerbi gijs, substituere μοτῶδης, quae quum graeca terminatione dicta sit, barbaram esse non suspiceris. Possit autem & μοτῶδης uox, pro μοσλίτην supposititia esse, Nam & hanc Dioscorides habet, & Plinius. 6. cap. 29. ex portu Mosylitico deuehi cinamomum testatur: & supra citato loco Cassiam iuxta cinamomi campos nasci tradit, unde sane tum Cassia Mosylitis, tum cinamomum Mosylon, à Dioscoride appellatur. At uero si cassia Motodes, omnino non uidetur barbara aliqua uoce fuisse appellata, malum sane ego βαλσαμῶδης pro ea legere, ac substituere hoc loco, sed in re incerta nihil statuo. Porro quod Cassia duplo pondere pro cinnamo coniiciatur, frequens sit mentio apud Galenum. Verum quod Carpesium item duplum pro eodem indiderit Quintus medicus, in septimo simplicium pharmacorum Galen. tradit, uelut nos etiam supra ostendimus.

Quaquam & huiusmodi capitis dolores necesse sit primum communibus generibus causarum dolores efficientium subiectos esse.] Communia genera causarum dolores inferentium sunt, solutio continuitatis, & intemperies, Quum enim omnes morbi ad haec duo genera, in superius tertium, compositionem uidelicet uitiolosam, referantur: ad priora sane duo genera omnes dolores referuntur. Omnis enim dolor aut ex intemperie aliqua corporis, aut ex soluta cōtinuitate eiusdem oboritur, Tertium uero morborum genus, compositio uitiosa, dolorē per se non facit: potest enim & deesse & reducere corpori pars aliqua, itēque in situ figuramque ac magnitudinem iuxta naturam aberrare, citra omnem dolorosam corporis affectionem. Porro de his causarum tum morborum, tum dolorum generibus, & de his quae haec genera produciunt, tota methodus curandi à Galeno cōscripta hinc inde agit, cuius lectionem ante hos libros necessariam esse Galen. hic ait, sicut etiam simpli. pharm. libros ante illam, uelut etiam in principio horum cōmentariorum sumus praefati.

Propterea quod in eiusmodi affectionibus uetulosi status ac frigidi humores generentur, excerni autem prohibeantur, propter continentis corporis condensationem, citra inflammationem factam.] Hoc loco Galen. sic dixit, βελανδία δὲ ἐν κελύφῃ, ὥς τῇ τὸ πρὸς αἰχμητὸς πύκνωσι, ἐν δὲ φλογμῶντος γρηγορήσει. quod nos uerbum, Excerni autē prohibeantur propter continentis corporis condensationem, citra inflammationem factam. Ambiguum autem uideri poterat, an πρὸς αἰχμητὸς uox

uox, de ambiēte nos aerē ab ipso dicta esset, an de corpore cōtinentie ipsos flatus ac frigidos humores, propterea q̄ quā ē πνεύματι, & ἀπὸ τοῦ αἵματος, aerē nos circūdan- tem ferē semper apud Galen. significet, etiā hic nihil aliud significare uideri pos- sit, quod tamen nō est, Nam necessariō σῶματις aut μορὴς uox adinelligitur, ut uī delictet corporis, aut partis, cōtinentis flatus & humores, cōdensationem faciā- citra inflammationē accipiamus. Etenim si nō ad τὸ πνεύματις τῶν κινουμένων adiectum esset, ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ αἵματος γινώσκοντα, Poterat utiq; de ambiente nos aerē intelligi, qui ob densitatem flatus & humores excerni uetaret. Verū quum inflammatio nō nisi in corpore faciā intelligi possit, necessariō σῶματις aut μορὴς uoce, in πνεύματις adin- tellecta, sententiā quā ego reddidi elicimus atq; sectamur. Vsurpauit autē & Arte midorus πνεύματις uocem, nō aeris significatione, sed cōtinentis corporis, lib. 2. cap. 16 in hoc somnio. καὶ ἡ γυνὴ οὗ γαστρὶ ἐχούσα ἐχθρὰ καὶ ἐπὶ τοῦ σώματος, καὶ ἡ ἐπὶ τοῦ σώματος λίγιστος, ἀφαιρῶν ἡ φαντασία. καὶ τὸ ἐν τῇ γαστρὶ ἐχθρὰ ἐλαιοειδὴς. πολλὰ δὲ ἐν τῇ γαστρὶ ἐχθρὰ, ἐξ ὧν τὸ πνεύματις γινώσκοντα πᾶσι ἐχθρὰ ἀφαιρῶντα. Hoc est uelut nuper in latine conscri- bendo id opus reddidi, Omnis enim piscis extra cōtineus suum, ipsam uidelicet aquam, positus moritur.

Castorij atq; papaueris succi par pōdus in testa Attica, aut si haberi nequeat, Romana torrefacito. Videtur Apollonius hic testas figulinorū Atticorum, & Romanorū, reliquis omnibus praeferre, non ob aliā causam, q̄ quod torredis in ipsis rebus maxime idonee fuerint, fortassis propterea, ut opinor, quod exacte in fornace excoctae iustā habuerint firmitatē, ut ne uel facile frangerētur, uel ex ciu- ditate aliquēd pharmacis in ipsis torrendis affricarent. De utroq; figulinorū ptestantia meminit item Plinius lib. 35. cap. 12. Atticorum Dioscor. de cerufa.

Sufficiens itaq; est etiam papaueris succi facultas, si ex eo quod eorū cōpositio diu ante praeprata, & iam inueterata sit, ipsius uires leniantur, torrefactis enim efficaciā perdit. Si uero castorio mixtus ad tempus aliquod inueterasset. Hic sanē locus in græco exemplari penitus corruptus est, Nos hanc sententiā eruiamus, aliquibus uocibus additis, aliquibus etiam mutatis, atq; græca ita resti- tuimus, ut nostrae interpretationi respondeant, hoc modo. αὐτῆς τοῦ ἐν διαί, καὶ ἡ ἐκ τῆς μεκάνης δυνάμεως, καὶ ἡ τῆς λευκοῦς τοῦ σωματιδίου ἐκ αὐτῶν, περὶ τοῦ μεκάνης. Vides planē quantum librarij culpa hic locus corruptus sit in quo primum desunt haec uerba, à nobis inserta, δυνάμεως, καὶ ἡ τῆς, deinde τὸ μεκάνιον, pro τῷ μεκάνιον scriptum est. Quid quod omnium corruptissime postea τῷ ὁμοειδῶς pro τῷ μεκάνιον legi- tur. Ita enim lectio ipsa corrupta habet. αὐτῆς τοῦ ἐν διαί καὶ ἡ ἐκ τῆς μεκάνης λευκοῦς τοῦ σωματιδίου ἐκ αὐτῶν περὶ τοῦ μεκάνιον. φανερὸν γὰρ ἂν πολλὰ οὗτοι τῷ ὁμοειδῶς, καὶ δὲ μεκάνιον τῷ ὁμοειδῶς χρονίως, &c. Apparet autem etiam ueterem Interpretem, Ni colaum Calabrum, aut quisquis is fuit, hunc locū non integrum habuisse. Nam primam huius sententiā partem satis commode reddidit. Sufficit igitur ut mī- tigeur opium ex diuurna compositione ipsorum, &c. tanquam legisset, αὐτῆς τοῦ ἐν διαί καὶ ἡ ἐκ τῆς μεκάνης λευκοῦς τοῦ σωματιδίου ἐκ αὐτῶν, quae lectio rectam sententiā refert, sed tamen alijs uerbis quā exemplar græcum uulgatū osten- dit, quae nos iuuare, non penitus reiicere ac alia substituere uoluimus. Verum posteriorem partem eīdem iuxta corruptū exemplar reddidit, sic. Si uero opio permisceatur & diu steterit, &c. penitus nullo sensu, Nam τῷ ὁμοειδῶς, opio uer- tit, quum τῷ μεκάνιον legi oporteat atq; uertī. Nisi quis opium cum opio misceri uelit, quod nō aliter nobis uetus Interpres expressit: ut qui raro aliquam senten- tiam integre reddat, & nullius utilitatis sit, nisi quod ex pessime uersis, lectionem quam sequutus est deprehendere licet, à qua aliquando græcum exemplar quod nos habemus discordat, ut sic aliquā tandem rectam sententiā eruamus. Porro

inferius paulo rursus corrupta est lectio græca, habet enim. *ἐλμ' ἰπὸ πάλιν ἢ τῆ φουδίου τὸ φασκίον αὐτὸ φαίνεται*. Sed legendum est *τὸ φασκίον ἀμυγδαλῶν φαίνεται*, hoc est, ut reddidi. Verum quum rursus in torrefaciendo efficacia ipsius pel-
fundari uideatur. Est enim αὐτὸ pro ἀμυγδαλῶν, quod fortassis oblitteratum fuit,
temere à quo plam suppositum.

Aur nuncum amararum succum, aut cassiæ ungentū, aut simplicem nardum.] Amararū nucū succus est qui ex amygdalis amaris exprimitur, uelut etiam Cel-
sus habet, quem hic ἀποδαλμα dixit, quum alias retrimētum à succo expresso
reliquū sic appellerur, ut alibi ostendi. Cassiæ autem ungentum uide nunc appellare
Archigenes, quod Cassiā induram habet, uelut suprà etiam ipse Galen. ostendit
in ungenta auricularia Cassiā, cinamomum & carpesium addi. Nisi forte etiam
peculiaris cōsectio ungenti ex Cassia, uelut ex cinamomo fuit, sed tamē eius Dio-
scorides non meminit. Nardum deinde simplicem τὸν ῥάδιον ἐπὶ ἡν reddidi, non
ut herba nardus, sed ut ungentum nardinum accipiatur, uelut sæpe iam dixi. Sim-
plicem aurem addidit, ut ostenderet nardinum oleum simpliciter sine ullis spissar-
mentis ac odoramentis præparatum, se probare.

Tepidum per strigilem infunde.] Suprà memini Celsum ἀπὸ γρίλας strigiles
uocare, & aliquando oricularios clysteres. Verum strigilis uox uidetur plane ex
ῥύσας facta esse. Nam uelut hæc ἐκ ῥύσας, Sic illa à stringendo deducta apparet,
& pro aurifusorio specillo ambæ accipiuntur. Quod itaq; Archigenes hic ῥύσας
dixit, ego strigilem cōuenti, qua uoce etiam Plinius, & Scribonius, & Marcellus
uirtur hac significatione. Nam alias tum strigilis latinis, cum ῥύσας græcis, destrin-
gendi instrumentum est, cuius usus in balneis exilit, & quod etiam εὐλγίς & à
Galenō εὐλγίς, appellatur. Artemidorus lib. 1. cap. 56. de balneis loquens. ἰδίως
δὲ τὸ ῥύσας καὶ βλάβεσι αὐτοὶ σημαντικὰ, ὅτε τὸ ἐκ ῥύσας ἑνὶ ῥύσας, καὶ μὴ προστιβῆναι τὸ
τῆ σάρκα. Et idē paulo ante εὐλγίς ἐν ῥύσας ἐν καταμέγεα ὑγείας οἷας σημαντικὰ.

In quibus deinde post fomenrum, specillum lana obuolurum intingitur & im-
ponitur.] Græcum exemplar hoc loco uitiatum est, habet enim ὅτα μετὰ τὸ πον-
εῖναι πάλιν τὸν ῥύσας ἔμην πρὸς αὐτὸν ἐν μὲν πρὶν καὶ ἐπὶ τὴν πρὶν. Verum si pro τὸν ῥύσας
substituatur μάλιν ῥύσας integra fiet lectio, & sensus quem ego reddidi.

Aut Garum Hispanum cassactum per strigilem instillaro.] Garum Hispanum
hic Archigenes appellat, quod infra Asclepiades Sociorum, itemq; Nigrum uo-
cat. Hoc enim ex omnibus laudatissimum & ingentis pretij fuit, è scombro pisce,
uelut Plinius 31. cap. 8. restatur. Quin & idem Plinius 32. cap. 7. hoc ipsum pro au-
rium medicamento prodit his uerbis. Suntq; qui præcipue cōtra omnia uiria lau-
dent, Gari excellentis sociorum cyarum, mellis dimidio amplius, &c.

Quod si ex plaga, externa pars auriculæ doleat, ad micam thuris lac affundi-
to.] Mica thuris quæ sit lib. 1. in mannae thuris explicatione diximus. Hoc uero
loco eam micā Archigenes χρίσας λιβάνα appellauit, nihil aliud indicans quàm
quod Plinius granum & micas dixit, & quod alias Dioscor. & Galenus omnesq;
medici græci mannā thuris uocant, Hoc enim est quod Dioscor. dixit, μάννη δὲ
λιβάνα θουρίδας ὅταν ἂν λιβανὶ καὶ λιβαρὶ καὶ ἰχθυόσας, hoc est, Manna thuris probatur
quæ alba est, & pura, & grumosa siue granulosa. Vnde sanè Plin. lib. 29. cap. 6. χρί-
σας λιβανὶς ὅσα, non granū, neq; micam thuris, sed mannā thuris unā dixit, ubi ait.
Viperam uiuam in sicili nouo cōburere, addito foeniculi succo ad cyathum unū,
& thuris manna una, &c. Id quod ex Marcello medico osiēditur qui idem reme-
diū sic habet. Vipera uiuā mittitur in uas sicili, & adijcitur ei succi foeniculi cy-
thus unus, & thuris granum unum.

Tertiam auricularem huiusmodi conscripsit.] Tertia hæc auricularis composi-
ticio

siffo Andromachi, est etiam apud Celsum lib. 5. à quo non ad Andromachū, sed ad Themisonem refertur his uerbis. Licet etiam compositione uti Themisonis, quæ habet castorij, opopaniacis, papaueris lachrymę ex aceto, singulorum. *. II. spumę lycij pondo. *. III. Quæ contrita passo excipiuntur donec cerati crassitu dinem habeāt, atq; ita reponuntur. Vbi usus requiritur, rursus idē medicamen tum adiectio passo teritur. Euariant ut uides pondera paululum, alias eadem res est. Verū in Celso uulgate, medicamentum adiectio specillo teritur, habetur, ubi passo pro specillo substituendum est.

Blattas detractis pennis. XII.] Blattarum genera Plinius lib. 30. cap. ultimo recenset, eaq; item auribus mederi scribit, similiterq; alijs quibusdam malis, partim capite detracto, partim pedibus & pennis: quemadmodum etiam hic Andromachus *σκληρὰς ἀνὸν ἀφαιρῶν* probat, & infra lib. 5. Archigenes eas quibus caput detractum est, ut ibidem amplius demonstrabo.

Vrina suis syluestris tantundē, fabæ Aegyptiæ uiridis internæ amaræ drachmas. III.] Vrina suis syluestris, hoc est, apri siue capri, quem hic *σάγγου* appellat Andromachus, calentissimum est pharmacum ac acerrimo odore præditum, uim habens exterioriam sortem. Velut Galenus 10. simpl. pharmacorū testatur. *ἰχθυὶν δὲ καὶ* inquit, *τὴν γὰρ τοῖς ἀνθρώποις καὶ πτηνῶν ὡς καὶ τῶν ὁσίων φαίνεται διοικητικὴν εἶναι.* Videtur itaq; puris & sordis extergendæ gratia, ab Andromacho in hoc pharmacū assumpta esse. Verum ipse Galenus huiusmodi impura medicamenta, ut ingenue & honeste mundicie studioso uiro merito abominanda, improbat: præsertim circa caput & faciem adhibenda, quo magis indigne ferendus est aliquarū urinarum, uel etiam humanarum potus, ex quo tamen pestilentia grassante in Syria, quidam conuulsisse uidebantur, Galeno eodem loco tradente, ac asseuerante item orthopnoeæ gratia, pueri urinam bibere, non esse necesse, quum alia sint multa pharmaca huic mala commoda, & quidam etiam eo potu opem non senserint. Verū tam abominanda medicamenta etiam hodie durant apud ancillas quasdā, & uulgius forte potioribus & purioribus indignum, non modo in peste, & orthopnoeā, ac anhelosis, uerum etiam in alijs tum uentris, tum intestinorum morbis, & præsertim in doloribus Coli, utpote quod uomitus irritando, & deiectiones concitando, omne uitium ualenter expurgent, uelut etiam Marcellus cap. 27. testatur. Cæterum urinam suis feræ simpliciter aurium dolores lenire Dioscorides lib. 2. ait. *καὶ δὲ τούτων σὺν σμύρνῃ* inquit *λεισθὴν καὶ σάγγου ἀπαλγίας πρὸς γὰρ.* καὶ τὸ σάγγου δὲ ἐν αὐτῇ ἔχοντα διωκόμεναι. Porro fabam ægyptiam uiridem internam amaram, hoc uidelicet quod in medio eius uiride & ænarum existit, in aurium doloribus prodesse, etiam Dioscorides confirmat his uerbis, *καὶ τῆς ἀπαλγίας δὲ πᾶσι τὸ ἐν μέσῳ χλωρὸν αὐτῶν, πικρὸν δὲ κατὰ τὴν γαῖαν.* hoc ipsum modo pulpam, modo interiora fabæ, Marcellus appellat, cap. 9. Porro in fine huius 21. compositionis in græco exemplari corrupte legitur, *καὶ κρακιδία ὀντὶδα προσπυεύω,* id est, tomentum fomento prius admoto indito. Non enim *προσπυεύω* hic legendum est, quum fomenti nullius, præterquam pharmaci cum rosaceo instillandi mentio fiat. Quare *πυφύρου* pro *προσπυεύω* legendum est sic, *καὶ κρακιδία ὀντὶδα πυφύρου,* hoc est, lanæ purpure infectæ tomentum indito. Velut supra etiam Archigenes dixit, *ἰμφορομένην πῦ πῶρον πυφύρας μαλῶ,* hoc est obturato meatu per purpuræ lanam: quanquam etiam eo loco *μαλῶν* pro *μαλῶ,* id est, aduerbium magis, pro lana legatur. Lanam autem mollem à fomento & instillamentis, auri indendam esse supra in principio huius libri Galenus dixit, Præstat tamen hanc ex purpura aut conchylio infectam esse, ut paulo post demonstrabo.

Auricularis ad desperata, uelut zollus.] Hæc cōpositio XXII. Andromachi corrupta est, legiur enim in græco, *ἰσὶν προσφάτω καλλιέρια τρία*, quod opij pondus ut longe ineptissimū & nocentissimū nemo exhibere audeat, iuxta tantulam reliquorum ammixtorū proportionem. Quare nō *ἰσὶν* hic legendum est, Nam hoc antea habet, *μικροῖν τριῶντα*, hoc est succi papaueris obol. III. cōiungendos dicens, Verum *αὖν* pro *ἰσὶν* substituendū. Vult enim uini recentis cochlearia tria addenda esse, ut eius lenitæ urinae suis feræ acrimonia aliquatulum castigaretur, & pharmaci etiam humectius redditum melius cogi possit. Sequitur autem in fine cōpositionis, Cōchylis aurem obturato, quo nihil aliud uult quàm quod in præcedenti cōpositione dixit, tomentū lanæ purpura infectæ indito. Est enim conchylum quoq; ex purpurarum gente.

Passi protropi quantum sufficit.] Passum à uino dulci differre, sicut etiam mustum ab utroq; alibi memini. Est enim passum proprie quod uitis diutius in uite à sole adustis, aut sponte defluisit, aut exprimitur, quod tamen Mustū item uocari potest, uelut Plinius 14. cap. 9. habet. Sed inter hæc genera potuū, inquit, ponere debeo & protropum, ita appellatur à quibusdam mustum sponte defluens, antequā calcetur uia. Potest & uinū appellari ratione generis, ut Dioscor. lib. 5. *ὅστις τὸ θελοπιδιδόσκει σαρυλῆς, ἢ ὅστις τὸ ἐλαμύτατον ἐστὶν αἶμα, καὶ τριῶντα γράμμασι γλαυκὸς καλὸς μῆνις κρηττός, ἢ πρὸς τρεῖς ἢ τετράμνις*. id est, uinū quod siccata uia, aut in uite assata & trita sit, passum creticū, aut protropū, aut pramiū appellatum. & Actius 9. cap. 24. de passio Scybelite. *καλιέρια αὖν 8. ὅσων, ἢ ἀντὶ τριῶν, ἢ τὴν πεπιδωκυ σαρυλῆν, καὶ τὴν αἶνα ἐκβαλόντων*. hoc est, Vinum Scybelites est quod sponte destillat, ex passis uitis ulro uinum effundentibus. Sunt enim *πεπιδωκυ σαρυλῆς*, non quæ calcatae sunt, sed eadem quas Plinius dixit in uite à sole diutius adustas. Nimirū quod ex hac patientia calcatis similes uideantur, appellatae. qua ratione idem Plinius patecon palmæ speciem dixit, quæ graecis item *πεπιδωκυ* est, uelut alibi ostendi. Neq; uero alia est *θελοπιδιδόσκει σαρυλῆς* apud Dioscoridem, quàm uinum passa, non quidem in uite, sed à uite detracta, & loco calorfico exposita. Significat enim *θελοπιδιδόσκει* exsiccor loco calorfico expositus ac uersatus, quod tum in crate, tum super ceras, commodè fieri posse ostendit Columella libro 12. cap. 16. & 39. Sic idem Dioscorides in uino myrtis, *εἰ δὲ ἀποβιδωκεν αὐτὸν ἐν ἡλίῳ*, hoc est exsiccat & exuccas reddunt in sole. Porro appellatio protropi siue musti, siue passii, seu uini dicere uelis, græcis ab eo deducta apparet, quod calcaturam & prælum sponte effluendo præuertat. *ὅστις τὸ πρὸς τρεῖς τὴν ἐκμύζωσιν*, quod ipsum ex Plinij item uerbis supra citatis clarū est, ne quis à populo appellatum existimare inducatur. Columella hoc ipsum Mustum liciuium appellauit. lib. 12. cap. 4. & 37. Græci etiam aliqui *πρίχονα* uocant, uelut Florentius, apud Constant. Cæsarem lib. 6. cap. 16. testatur.

Optime conuenit & in pello appositum.] Medicamentum hoc non auribus solum, sed & uuluis commodum esse perhibet Asclepiades, in pello subdium. Est autem pessus itemq; pessarium, medicamenti forma ad tali similitudinem reducta, quæ genitalibus foeminarum partibus inditur, unde etiam appellationem habet. Paulus lib. 3. cap. 61. lanam cōcerptā & ad digiti figuram rotundā factam, in qua pharmaca excipiantur ac contineantur, pessum appellari ait, quū tamen non semper lana excepta pharmaca indantur, sed aliquando aptis humoribus, gummicis ac resinis additis, ad talem formam cogantur. Pauli uerba hæc sunt, *ἡ δὲ ἀντὶ τὴν ἀντιστομίαν καὶ σφαιρωτὴν, διαπερὶ τὴν χύμα ἀλφειῶν, ἢ ἢ ἢ γαστρίχων τὰ φάρμακα*. Verū de usu & differentiis pessorū, idem Paul. lib. 7. c. 24. abūde tradit. Ceterū in hoc medicamēto in græco exēplari *ἰσὶν* αὖν, *δισαχ*. A falsò habetur. Nam

Nam *σκιόρων* legendū est, qui error frequēs est in græcis medicis, ut alibi ostēdi.

Cōpositio Hispanorū appellata. Gari nigri, quod Romani Sociorū appellāt. Hoc loco exēplar græcū γάρου μέλανος σκιόρων ἀρομήνιον διατόρη, habet sed falsū, Nā *σκιόρων* legi debet. Nulla est enim in Romana ac latina lingua Ocitori uox, uerum garum optimū Hispanū ac Carthagenense, Sociorum Romæ fuit appellatū, unde sanē etiam hæc cōpositio Hispanorū appellata uidetur, quod ob Gari copiam in Hispania frequēs esset, aut etiam quod Sociorū garum quod recipit, Hispanū esset Sociorū autem appellatum opinor, quod ganeones & gulæ dediti lurcones, sociatim eo uterētur, ipsumq; in maximis delicijs haberent. Plin. 9. cap. 7. de nullo loquēs: M. Apicius ad omnem luxū ingenio mīrus in sociorū garo (Nam ea quoq; res cognomē inuenit) necari eos præcellens putauit. At uero mirū uideri possit, hodie garo penitus exoleto, hoc liquoris genus præsertim ē scombri pīsce, ob præcipuā quæ inter socios caperetur uoluptatem, Sociorum appellatū esse. quando sanē Plinius alias in te stinīs pisciū, cæterisq; quæ abijcenda essent sale maceratis id fieri prodit, ut sit illa putrescentiū sanies: quæ utiq; res non uidetur adeo magni luxus esse. maxime quā Plin. eodem loco, lib. uidelicet 31. cap. 7. florē salis appellari dicat, rem odore quoq; ingrato ceu gari. & Martialis poeta ungenti odorem in gari foetorem corruptū per olfactum Papili, lib. 7. epigram. ait, his uersibus, Vngentum fuerat quod onyx modo parua gerebat, Nunc postquam olfecit Papilius ecce garum est. Verum eodem item Plinij capite, apparet hunc liquorē certo salis condimentarij genere præparatū fuisse, ut ex eo & lucūditas, & gulæ inuitamenta sint quæ sita. Et quid adeo mirum sit gari ita expetitum fuisse liquorē, quā etiam hoc nostro seculo, multa salsamentorū genera apud septentrionales maxime, et ultra citraq; Oceanū magnum habitantes in delicijs sint, quæ mediterranei homines, & superior adeo Germania penitus nō expetant, imō etiam fastidiāt. tanta uidelicet est palatorū diuersitas, Et ut reliqua omittam, Aringarum muria conditarū esu crudo superior Germania abhorret, qui tamē proximis Oceano & mediterraneis Germaniæ populis, æque diuitum ac pauperū mensis expeditur, & à Lituonibus ac Rutenis unā cum muria uoratur, ac quanto putridior est, tanto magis appetitur ac probatur. Plinij uerba hæc sunt, De sale. Cōditur etiam odoribus additis & pulmentarij uicem implet, excilians auiditatem, inuitāsque in omnibus cibis, ita ut sit peculiaris ex eo intellectus inter innumera condimenta. Ita est in mandendo quæsitus & garo. Ex his uerbis Plinij uelut dixi, apparet garū certo salis condimentarij genere præparatū fuisse. Cæterū Martialis poeta ex scombri sanguine primo, quem adhuc spirans effudit, garum Sociorum quod foecofum nominat, cōstare dixit, in Xenijs. Garum Sociorum. Exspirantis adhuc scombri de sanguine primo, Accipe foecofum munera cara garum. Quare quod Nigrū hic appellat Asclepiades garum, idem esse uidetur quod Martialis dixit foecofum: à colore uidelicet cruoris appellationibus deductis. Videtur autem Paulus Aegineta 3. capite 59. hoc ipsum garum *σκιόρων*, hoc est, primarium appellare, reliquorum ex alijs piscibus respectu. Nam ad infinitū gari genera creuisse Plinius testatur, fuisseq; quoddā colore mulsi ueteris, atque adeo dilutæ suauitatis, ut bibi potuerit. Dioscorides autem non piscium tantum, sed etiam carnū garum dixit. Democritus apud Constantinum Cæsarem locustarum quoque garum dixit, tanquam generale muriarum nomenclaturam, quæ postea ramen sit ad certum liquorem contracta, ex scombri uidelicet sanguine & certo salis condimentarij genere constantem. adiectæque certę postea distinguendi gratia uoces, ut scilicet Hispanum, Nigrum, Sociorum, foecofum, & primariū uocaretur. Constantinus certe Cæsar libri 20.

de agricultura sine *ἀμύγδαλον γάρ* ex thynno habet, sic appellatū quod unā cum branchijs ac intestinis thynni, etiam cruor saniosus ac sanguis sale conditur, ita ut ex his omnibus emanās liquor, Garum hæmatū appelletur. Quo loco etiam Liculmen barbara ut opinor uoce, appellatū garum habet, ex intestinis piscium & paruis pisciculis atherinis, mullis, mænulis, lycostomis, aut alijs quibuscumq; paruis salinis ac insolatis cōstans, ita ut sit liquamentū ex uase in cophinū perstillans, & quod restat crassius retrimentū Alex uocetur. Quancū sociorū pro liculmen legi debere suspicarer, nisi ex scombro non fieret, & Bithynū ac hæmatium ipsi præferretur. Verū antea quā à garo digrediamur locum ipsum Plinij supra citatū emendabimus lib. 31. cap. 8. Nunc è scombro pisce laudatīs. In finibus Carthaginis spartariæ & cetarijs. Ita sanè in omnibus exemplaribus quæ ego uidi legitur, uerum corruptā lectionem existimo sic restituendam. Nunc è scombro pisce laudatissimū in finibus Carthaginis & Hispaniæ cetarijs: atq; ut ita legendū putem ex eiusdem Plinij loco lib. 9. cap. 15. adducor, ubi de scombris loquens ait, Hispaniæ cetarias his replent. Neq; enim placet quod quidam Spartariam epitheton Carthaginis esse uolunt, ob sparti abundantiam, de qua idem Plinius testatur. Quod si quis autem hanc lectionem non admittat, & tamen cōiecturæ locum ampliorem concedat, ausim credere Scombrariæ pro Spartariæ legendum esse. Scombrariam enim Strabo lib. 3. ait insulam à noua Carthagine stadijs 24. sitam, quæ à scombrorū captura, ex quibus optimū garum sit, nomen acceperit.

Porro non aliud q̃ Sociorum garū esse opinor, quod Martial. lib. 7. arcanum appellauit. Sed coquus ingētem piperis cōsumet aceruū, Addet & arcano mista falerna garo. Sequitur cōpositio Charixenis ad corruptiones & foetores, quæ in græco exēplari penitus est corrupta, à nobis autē iuxta ueterē interpretem, qui tamē mancus & corruptus hic est, sic restituta, ut pro *συμφελες μελιος λευκα* legatur *μελιος δραχ. γ.* & pro *χαλασθαι λευκα* ponantur *δραχ. γ.* & postea pro *αὐτὸν μνηστειν. f. γ.* legatur. *f. γ.* quemadmodum ego conuertī. Nam quod ad pondera attinet chalcanti & aluminis melij, cuiq; statim apparet extra modum esse aucta. uini autem mensura sextarij dimidij suffecerit ad hoc pondus quod nos restitui mus. At uero quod *συμφελες μελιος*, hoc est aluminis Melij legēdum sit, ex Dioscoride & Plinio patet, qui in Melo insula hoc generari tradunt, & non in Miletō. Plinius lib. 35. cap. 15. Ad omnia quæ in cæteris generibus diximus, efficacius intelligitur ex Melo aduectum.

Aui croci & myrrhæ utriusq; drach. II. nuces amaras decorticatās. XXXVJ Exemplar græcum hic neq; pondus neq; numerum nucum amararū habet. Imò pro amaris nucibus, tenues, hoc est, *κάρνα λευκὰ* leguntur, qua uoce non amare nuces, hoc est, amygdalæ significantur, sed nuces auellanae & *παντικæ* appellatae, ut Dioscor. testatur. Sūt hæ nullius in aurum uitij usus. Amaras autem iam ante etiā sæpe in hac tractatione habuimus. Quare pro corrupta lectione, *κάρνα λευκὰ λευκὸν ὄψα λευκὰ*, & c. substituēda est integra, hæc *κάρνα πικρὰ λευκὸν ὄψα λευκὰ κάρνα λευκὰ*, & c. Hic enim numerus in ueteri interprete expressus est & sanè sufficere uidetur ad mellis & succi mensuram, quam tamen in totum non habet usus Interpres.

Probe facit ad omnē auris affectionem adeps uulpinus inueteratus, liquans & instillatus. Hoc loco Archigenes *ἀλάπτως σίαν πικρὴν ὀμβρίαν* habet, quod adipem uulpinum inueteratū uerti, quāquam *πικρὴν ὀμβρίαν* non inueteratū tantum, sed & sale conditū ac assiccatū significet, ut diligenti animaduersione opus sit græcos medicos legētib; quā significatione singulis locis usurpetur, quum non leuis differentia sit, quod ad usum medicum attinet, falsa aut insulsa, & simpliciter

pliciter affliccata aut inueterata re aliqua uti. Hoc itaque loco uidetur mihi sanè
 adeps uulpinus inueteratus simpliciter indicari, non sale seruatus & conditus.
 quomodo etià Dioscor. de anserino & gallinaceo dixit *ἀλάς ἐλὼν τετραχειδόμενον*,
 quandoquidem & *μὲν ἀλὼν* fieri *τετραχέως* possit, ut ibidem Dioscor. indicat. Et
 Plin. 28. cap. 9. de adipe suillo. Inueteratur duobus modis, aut cum sale, aut *λίπερ*
rus. Verū cum sale inueterati adipis uulpini usum, in aurū affectionibus ineptū
 puto. Sicut contra aptū suillum falsum ad malignas duricies, & maligna ulcera.
 Dioscor. capite de glandibus dixit: *οὖν εἶσι δὲ τετραχέως χοιρῶν πῶς κακοῖσιν σκλη*
ραῖς, καὶ πῶς ποικιλοῦσι εἰς ἀλῆν ἐκρέμονται. Potest tamen tum hic, tum ad aures pro
 affectionis ratione, quispiam aut falso aut simpliciter inueterato uti. Quod uero
τετραχέως & *τετραχέως*, ac alia eiusdem coniūgij uoces, ambiguum hanc significa-
 tionem habeant, aliquot locis amplius indicabo. Idem Dioscor. de Scinco, *τετρα*
χέως *ἐν κερδῶν* inquit, hoc est in nasturtio siccat ac seruatur, quāquam nī
 sal ueter etiam hic intelligere sale conditum Scincum in nasturtio seruari, quan-
 doquidem Plin. 28. cap. 8. falsos afferri dixit. Nam falsos eum uidisse, non ex *τετρα*
χειδόμενος uertisse apparet. Itaq; siue falsos, siue simpliciter in nasturtio assicca-
 tos accipias Scincos non multum aberraris, quū utrumq; recte fieri possit, & na-
 sturtij uisiofa uidelicet siccare potente, sicut sales eundem conseruant. Nolo
 tamen studiosos suspicionem meam de hoc loco cælare, Nam mihi sanè *ἐν κερδῶ*
ν legendum uidetur, pro quo facile potuit *ἐν κερδῶν* à quoptam substitui, cui
κερδῶν uox fuit ignota; quam ego alibi *μακρῶς* significatione accipere ostendī,
 hoc est pro cista siue aluēolo panario, Talis enim Scinco maxime integro saltem
 de conuenientis esse uidetur. At uero idem Dioscor. quum de cepis inquit, *ἐν*
κέρω *ἐν τῷ ἀμῶν τῷ ὀπῶν καὶ τετραχέως*, inepte quis acceperit acriorem esse crudam
 quā assatam ac sale seruata, quum cepas sale simplici asperso cōdire ac asser-
 uare non sit usitatum, Quare *τετραχέως* *ἐν κέρω* hic pro cepa affliccata simplici-
 ter accipiendum est. Sic enim inueterata asseruantur absq; salis conditura: quan-
 quam etiam acida muria, uel etiam solo aceto cepas asseruari Galenus 2. de ali-
 mentis tradat, more nobis hodie ignoto, loco ubi de foeniculo agit: eundem au-
 tem conditura ceparum modum docet etiam libro 12. cap. 10. Columella, ut de
 cepa hoc modo seruata, Dioscor. potius dixisse uideatur. At uero Galen. 9. Me-
 thodi de diatriarijs medicis loquēs, ait ipsos hominem triduo famē affliccatum,
 quarto tandem die nutrire incipere, *ἐκάνει* inquit, *προτετραχέως* *ἐν τῷ ἀνθρώπῳ*
ἐκάνει *πρίσθαι*, quo loco certe nulla alia quā simpliciter assiccandi significatio
 ne *προτετραχέως* accipi potest. Rursus quum idem Dioscor. ait *ὅ δὲ ἀμωτέρας*
λαγῶν *ὁ σῆψις δύνει τετραχειδόμενον*, necessario falsam Thynni carnem accipi-
 mus, quum non aliter asseruari soleat. Quod si quis enim solē siccatum inuete-
 rascere sinat, quemadmodū quædam piscium genera etiam hodie siccantur, ine-
 pta sanè erit Thynni caro ad hos usus, quos hic Dioscorides præscribit, supra
 hoc quod *τετραχέως* de solis siccatura priuam non dicitur, sed *ἐν ἁλὶ* *ἐκάνει*,
 atque *οκλιτωαῖ*, hanc significationem & usum habent. Quare omnino falsa
 Thynni caro, *ἀμωτέρας* & *τετραχειδόμενον* uoce accipienda est. Quod ipsum
 ex Galeni uerbis aperte colligitur libro secundo de alimentorum facultate, de cu-
 curbita ubi ait, *κατὰ αὐτῶν λόγον αἱ καὶ μακρῶς ἀλικοῦ προσενιχθῆναι, καὶ ὁπῶν*
ἐν τῷ ἀμῶν *κατὰ τῶν αὐτῶν ὅμοις σκευάζονται, ἑλικοῦ ὅν τῷ σῶματι γινώσκει χυμῶν. ὅστις*
ἐστὶν ὁ ἰσχυρὸς οὗτος σκευάζει, αἱ δὲ τετραχέως ἐν τῷ ποντικῷ ἐκάνει, ἢ καλοῦσι μῆλα.
 Hic planè uides *τετραχέως* pro falsa pisciū carne accipi, & nō solum Thynnorum, sed
 etiam aliorū pisciū & maxime ponticorum, quos *μῆλα*, id est, ouiculas, appellari
 dicit: quas ego non alias esse puto, q̃ quæ *κερδῶν* ab Aristot. & Plinio dicun-
 tur, qui

Ac caput reficcandum est.] Ita quidem Græcum exemplar habet. *καὶ κεφαλήν ξυρρατίον*. Verum ego uehementem suspicionem habeo, *ξυρρατίον* legendum esse, hoc est attondendum, ut Celsus lib. 6. ad grauem auditum ait, quanquā sanè sub *ξυρρατίον* utpote generaliori uerbo, etiam ipsa capitis rasura comprehendi queat. Nam & ipsa caput reficcat.

Similiter & per fermentum in ueru assatum fomentū adhibendum est.] Inter reliquas fomentorū species, etiam hanc per fermentum in ueru assatū Apollonius recenset. Ita em̄ habet, *ἀσπύτως δὲ πνευματικὸν καὶ εἶσιν πρὸς δβελίσκον ἐπιθεῖν*. Accipio enim hic *εἶσιν* non pro adipe & pinguedine, quæ alias significat, sed pro fermento seu farina aliqua aqua subacta aut panis massa, qua significatione tum *εἶσιν* in singulari, tum *εἶσιν* in plurali, Hefychius exponit. Inquit enim *εἶσιν λίπας, καὶ ζύμην, καὶ ἄλδην*. Et *εἶσιν* ἄλδην, *ζύμην*, & uocem *ἄρμας*, δ' αὖτις exponens ait esse, *εἶσιν* ὅτι ἡ τὰς χεῖρας ἐπιμάλλοντο ἐν τοῖς δάπνοις, βαλόντες ἢ τοῖς λυσίρ' αὐτὰ λύνοντες ἀπὸ δάπνων, hoc est, panis massam in qua manus detergebant in cōuiuijs, & discedentes inde canibus proijciebant. Intelligit autem quadras ex pane, in quibus obsonia diuidebāt, & digitos tergebant, uelut etiam Pollux testatur, qui de apomagdalijs lib. 6. ait, *καὶ ἄσπερ ὅτι τῷ ἀγρῷ μαλακῶν καὶ σαυτῶν, εἰς δὲ πνευματικῶν, τοῖς λυσίρ' αὐτὰ περὶ βαλόν*. De his etiam Virgilius sentit quī ait: Heus etiam mensas consumimus inquit Iulus. At uero *εἶσιν* de quo dicere institui, & Dioscorides, Galenus, Aetius, ac Paulus, & reliqui medici Græci sic frequenter usurpant, ut *εἶσιν* nihil aliud quàm *σαῖς* significet, quod ipsum locis aliquot adductis indicabo, ut manifestum fiat perperam facere eos qui *εἶσιν* pro *σαῖς* positū commutant, quum utraq; uox, pro fermento & farina aqua subacta accipiatur: grauius uero adhuc delinquere eos, qui *εἶσιν* pro fermento dictum, nobis latine adipem aliquando præter omnem rei rationem & usum conuertunt, à quo delictio neq; ipse Plinius se tutari potest, à se per incogitantiam admissio. Nam quod apud Diosc. lib. 2. de Scilla legit. *εἶσιν δὲ ἡ ψυχρὴ περιπλάσσεται καὶ διόδοται ἐς κλίβανον*, &c. Plinius 20. cap. 9. conijcitur in clibanum aut furnum uel adipe aut luto illita conuertit, & quod Diosc. lib. 5. de stibio dixit, *ἐπιθεῖται δὲ εἶσιν περιπλάσσιν, καὶ ἰγνερὴν εἰς ἀνδρακας, ἃ καὶ ἐν ἀνδρακασὶν δὲ εἶσιν*, Plinius lib. 33. cap. 6. sic reddidit. Quidam non fimo utuntur coquentes, sed adipe, quum non adipem hic sed fermentum uox *εἶσιν* indicet, pro qua *σαῖς* ex antiquorū codicum lectione supponere non est necesse, uelut alij Diosc. interpretes faciunt. Sic idem Dioscorides de Erysimō *ἐν δίδην εἰς εἰλίον καὶ ἐπιθεῖν εἶσιν περιπλάσσιν*, hoc est linteo illigatum & fermento oblito assatum. Neque est quod etiā hic ueterum codicum fidem imploremus, qui *σαῖς* habeant, quī *εἶσιν* lectio sit recta, & idem quod *σαῖς* significans. Sic idem Dioscorides de sic utriusque succo. *καὶ μυρμηκίαν εἰς εἶσιν ἐπιπλάσσιν* ἢ *ἐν λίνκλῳ σπινθί*, hoc est, fermento uel farina aqua subacta, aut etiam panis massa molliore, interna uidelicet medulla, oblita circumscita carne. Nam si de adipe intelligi uoluisset, adiecisset utiq; cuius animalis cum esse uellet, sed nullus est qui hanc muniendi, & ab exulceratione tutandi uim habeat, quemadmodum hanc optime fermenti & farinae tectorium præbere potest. At uero sicut in his locis atq; adhuc alijs, pro fermento *εἶσιν* recte intelligitur, Sic multis alijs pro adipe ab eodē usurpatur, quos tædiosum foret producere, quī hi suffecerint ad *εἶσιν* æquiocationē ostendendā. Verū hæc ipsa adhuc euidentius ex Paulo Aegineta apparet qui lib. 3. cap. 28. in quadā arteriaca, *ὡν ὅτι εἰσάτις ἐπιθεῖται τῇρ' αἰκνίῳ* habet, hoc est oui in fermento assati uitellicū. Nam quum diminutiua uoce *εἰσάτις* dixerit, certum est non suppositiciam esse, quum *ὅτι* τῷ *σαῖς* nulla similis forme. quod uero non adipe ouī assari uelit, utpote ad hūc usum inepto, sed fer-

fit, an aliquis liquor, quando sanè draconis sanguinè esse ipse non putat. At uero idem Diosc. qui miniu falso idem quod cinnabari putari dixit, mox in capite de argento uiuo minium etiam cinnabari abusiue appellatū fuisse testatur. Verba eius sic habent. *ὁ δὲ ἀργυρὸς ἐστὶν ἀπὸ τοῦ ἀμύμονος λευκοῦ, κατὰ χυμικὸν ἢ κατὰ τὸ πρὸς λευκὸν λευκὸν λευκόν.* Et subdit, *δίνης γὰρ αὐτὸ λευκόν ἐστὶν λευκὸν πύργου σιδῆρος ἔχοντα λευκόν, &c.* Vbi palam cinnabari pro minio dixit. Quare satis obscure Dioscorides quod uoluit docuit: ut forte non immerito à Galeno quum alibi, tum lib. i. simp. phar. notatus sit, tanquam qui linguæ græcæ non fuerit adfuetus: Videtur autè uoluisse docere, miniu à cinnabari, quam indicam Plinius dixit, rem diuersam esse, non tamen se negare, quin miniu quoq; abusiue cinnabari uocetur. Verū in eo longe obscurissimus est, quod quæ res sit cinnabari non ostendit, sed solum ex Affrica apportari, dicere contentus fuit: & magno uendī, ac exigua copia esse, ut uix pictoribus sufficiat ad lineas uariandas. Estq; amplius grauis aut profundū coloris, unde putarint quidam ipsam sanguinè draconis esse. Atqui quū hoc neget, conueniebat uel maxime ipsum quæ res esset cinnabari ostendere, quando etiā hodie sanguis draconis appellatus, non aliud esse putetur quàm uerus draconis sanguis, iuxta ipsam adeo Plinij opinionem. Ceterum quum Diosc. inter metallica de cinnabari agat, uidetur nō aliam rem quàm metallicam esse ostendere, & præsertim quū ipsi uim eandem cum hæmatite lapide tribuat, sed magis intentam. Quin & Galenus lib. 9. simpl. phar. Cinnabari inter metallica recenset, facultatem ei tribuens acrem, ita tamen ut etiā quid adstringens complectatur, sed neq; ex ipso clarum sit, quæ nam res sit cinnabari. At uero qui hodie sanguis draconis dicitur, & à plerisq; omnibus iuxta Plinij, & eorum quos Diosc. reuellit, opinionem: uerus sanguis creditur, non aliud esse uidetur quàm cinnabari inter metallica à Diosc. & Galeno relatum. Vires enim easdem habet, & in medicamentis usum adstrictorium ac cohibendi sanguinis, sic ut etiā in picturis eodem modo ut Diosc. & Plinius tradiderūt usurpatur. An uero metallica res sit, aut draconis uel alterius cuiuspiā animalis sanguis, aut cuiusdā herbe succus, neq; hodie certo constat, sed ab omnibus ignoratur quando sanè qui ex Vlyssipone Lusitanæ regni emporio amplissimo, nobis aduehūt phar. macopolæ, constanter pro uero sanguine draconis extrudunt, & nos ita recens in grumum coactum ac concretum uidimus, ut nihil aliud quàm sanguis putari possit, quibus si cum Plinio & alijs quibusdam ueteribus quos Diosc. reuellit, si dem habeamus, Dioscoridis & Galeni autoritas uilior reddetur, quod haud scio an honeste tolerari possit. Auicennæ sanè ac Serapionis aliorumq; Barbarorum ac uulgo medicorum ineptias merito à nobis explodi puto, qui hūc sanguinem draconis appellatum, succū sideritidis herbe esse tradunt, quod haud dubie etiā Diosc. Galenusq; ac Plinius tradidissent, si res ita haberet. Verum error inde ortus apparet, quod Sideritidis herbe ea uis in glutinandis uulneribus, ab illis traditur, quæ in sanguine draconis appellato cognoscitur. Neq; satis scio quantum Actio hac parte credendum sit, qui serm. 15. cap. 12. inter emplastra cruentis uulneribus cōmoda, purpuram appellatum emplastrum describit, quod sanguinè draconis recipit, & ad eius finem, sanguinem draconis in India ex herba Dracontia colligi asserit, quum neq; ipse Dioscoridis, aut Galeni, aut alicuius ueteris autoritate nitatur, qui sanè in Dracontij descriptione nō uidentur fuisse prætermisuri succū eius sanguinè draconis appellari, si res ita haberet. Videtur autē & hæc opinio ex consimili uel Dracontij ad cinnabarim enata esse, quando utrisq; acris & adstrictoria uis à græcis medicis adscribatur. Porro miniu quondam cinnabari etiam fuisse appellatū ipsa uernacula nostra lingua indicat, quæ ipsum berckcinaber, quasi montanū cinnabari uocat, ex quo sanè argentū uiuum fieri Diosc.

dixit, sicut rursus ex argento uiuo & sulphure factitium fit, cinnabari etiā uulgo appellatū, quæ ambo soli picturæ conueniunt, & in medicamenta non adsumuntur. Quod itaq; ad præsentē Galenī locum pertinet, quem ex Apollonio adscripsit, dubito uelut dixi, an cinnabari Dioscoridis & Galenī, hoc est, quod nos sanguinē draconis dicimus (neq; enim aliud quicquā cinnabaris uoce apud græcos medicos accipiēdū est) auribus instillari cōueniat, & an hic *λινναβάρης* uox recte legatur, maxime quū asteriscus adiectus indicet typographum circa lectionem hæsisse, & alias imperfecta oratio sit *λινναβάρης χυλῶν ὥστε*, deest enim aut succus, aut liquor, aut tale quiddam, ut uidelicet eius rei liquorem instillandum accipiamus. Et sanē suspicio est mihi pro *λινναβάρης* legi debere *χυλῶν μύρας*, ut mori uiridis succū instillari iubeat, quando certe Galenus 7. simpl. phar. omnes huius arboris partes uim adstringentem ac purgatoriam simul habere tradat, & radicis maxime corticem etiā habere quid amaritudinis, qua latum lumbricum occidat, ut non ob aliam causam etiā hic mori succū instillari Apollonius uelit quā uermibus & pulicibus in auribus occidendis. Verum nihil decerno, possit forte & cinnabaris, hoc est, sanguinis draconis, ut nos hodie appellamus, succus recte instillari, ob acrem uim quā ipsi Galenus uelut dixi, tribuit, siue tandem rem metallicam, siue uerum draconis sanguinē, siue sideri tidis, siue draconis tñ succum, illum ipsum esse credamus. Modo uitemus ne propter æquiuocationem ad minium delabamur uenenum, quod in medicinam non recipitur, quæ causa nobis fuit longioris commentationis.

Aut mali punici nudeo carentis dulcis & acidī succū.] Duo genera malorum punicorū tum Theophrastus, tum Plinius agnoscit, alterū *ἐπύρρον*, cui lignosus nucleus abest, ut Plin. 13. ca. 19. ait, sed candidior ei natura & blandiores sunt acini minusq; amari, distincti membranīs. Alterū nucleos habēs, cuius species Plinius recenset, dulcia, acria, mixta, acida, uinosa. Galenus uero mixtum & uinosum genus sub reliquis tribus comprehendit, & quæ Plinius acria dixit, ipse austera appellat. Has autem differētiās nucleos habentiū non solum esse, sed etiā *ἐπύρρον* id est nucleis carentiū, uel ex hoc loco apparet, in quo Apollonius *ῥιζὴ ἐπύρρον γλυκῆς ἢ ὀξείας χυλῶν* coquere iubet, uelut ego, tum hic, tum infra inter nariū exulceratarum medicamēta, ubi idem medicamentū Galenus ex Apollonio adducit, conuerit. Quare quum in utroq; genere tum dulcia tum acida sint, Plin. 13. ca. 6. quum ait, ex his dulcia quæ apyrina alio nomine appellauimus, &c. corruptus esse uideri queat, aut certe eorū quæ lib. 13. cap. 19. dixit oblitus, quando isthic apyrina non dulce, sed cui lignosus nucleus abest, uocari. Verum ea uerba indicare uidentur apyrinū propriē malū punicū dulce dictū esse, etiam si uox ipsa enucleatum significet. Porro per *ἐπύρρον* punicū non est accipiendum quod grana omnino non habeat, aut quod sit exacinatū. *πυρρῶν* enim granū & acinū præsertim blandiorem non significat, sed nucleum lignosum à Plinio dictū, quē aliqua punica habent, aliqua uero eo carent: & apyrina etiā grana habere ex Plinij uerbis patet, quando blandiores eorum acinos esse dicit. Et Gale. lib. 8. cap. 4. huius operis quod exponimus, stomachicis *ῥιζὴς ἐπύρρονος ῥιζας*, hoc est acinos mali punici nucleis carentis in alica incoquere iubet, quos X. Meth. simpliciter *ῥιζὴς ῥιζας* appellauit. Vocantur itaq; grana & acini, *ῥιζας* ac *γλυκῆς* Græcis, nucleūs uero ille lignosus Plinio dictus *πυρρῶν* appellatur, atq; ita etiā Diosc. lib. 1. accipere uidetur, quū ait, *ῥιζὴ ὀξείας ὁ πυρρῶν ἔργανός ἐστι ἄλλω ἢ ἀπὸ πικρῶν*, &c. Verū aliqui adhuc acinos exponere malunt, quod tamen nō nisi hac ratione recte fieri potest, ut uidelicet *πυρρῶν* dicamus, ipsos lignosiores acinos, nucleos Plinio dictos, neq; enim singularem aliquē nucleū apud Plinī, aut etiā Dioscoridem intelligere oportet: ubi uero hi ipsi nucleī ex malo punico fuerint per artem exclusi,

aut in blandiores acinos conuerſi (nam apyrena acinis nō carere iam ſatis oſten-
di) tunc ſanē ſam nō *ωπρῆνας*, ſed *κῆκας* & *γίγαρτα* illos ipſos acinos appellemus.
Ceterum quomodo quis *κοινὴ ἀπύρηναν* facere poſſit, per medullas uidelicet ex
trunco arboris extractionē, Conſtan. Caſar lib. 10. agriculturæ docet cap. 31. Me-
minit etiā lib. 4. cap. 6. ex Aphricani ac Democriti traditione. Meminit etiā Pal-
ladius lib. 3. cap. 29. At uero Plin. quā lib. 23. ca. 6. ait, de punice aūt loquitur: Quā
& nucleos ipſos acinorū experiri non pōgiſt, ſi ſti tuſſiq; ſtomachum iuuant, cibo
aut potiōni inſperſi, nucleos pro internis edulibus acinorū blandiorū nucleis di-
xit, & nō pro lignoſo nucleo, q; in aliquibus punice malis eſt acinorū blandiorū
loco. Et ſanē ipſa etiā Dioſc. uerba ſupra citata, non de alio nucleo quāam acinorū
interno, mihi ſentire uidentur, quorū ſententiā Plinius loco ſam citato expreſſit.

Et tomentum lanæ conchylio infectæ indito. J Habet hic Critō *ὡς ὁ τῆς ἀνδρὸς
ἀπὸ τοῦ γαλλίου*, quod idem eſt quod ſupra Andromachus compoſitione auriculari
XXI. dixit, *ὡς ἡ κοκκῖδια ἐν τῇ ἀπὸ τοῦ πορφύρεως*, hoc eſt tomentum lanæ purpura infectæ
indito. & compoſitione XXII. conchylio aurem obturato, hoc eſt, *τοῦ γαλλίου ἐν
τοῦ πορφύρεως*. quo nihil aliud uult quāam lanam conchylio imbutam ac tinctam in-
dendam eſſe. Hanc enim ut in primis cōmodam ſæpe ſam habuimus. & Marcel-
lus medicus conchyliatā lanā appellat, cap. 9. quanquā etiā ſimplici & quacunq;
lanæ, auris obturationē fieri poſſe in principio huius libri Gale. tradiderit. Quā
Plin. 31. cap. 7. inter auris remedia ſic ait. Et per ſe cōchylio infecta lana magnopere
reprodeſt. Vbi ſanē *κοκκῖδια τοῦ γαλλίου*, lanā conchylio infectā eſt interpretatur;
ut eo minus dubitandum ſit per *κοκκῖδια τοῦ γαλλίου* aut *πορφύρας* accipi tomentū
aut floccum lanæ ex purpura aut conchylio infectæ. Quo magis mirum uideri
poſſe quendam ex recentioribus ſibi permittere, ut tradat purpuras & conchy-
lia ipſa lanis ueſtita eſſe, quæ lanæ in uſum medicū ſint accipiendæ, atq; hoc ex
Dioſcor. lib. 2. uerbis de lanis uſitis confirmat, ubi ait. *τῶν δ' αὖ τῶν πρὸς τοῦ καὶ κοκκῖ-
δια καὶ ἡ λανὴ ἀπὸ τοῦ πορφύρεως*, quod interpretatur, Cremanur eodem modo
& quæ in marinis purpuriſ ueluti ſtuppæ ſunt, & exponit Dioſcoridem præter
pectoris lanas, etiā quæ in marinis purpuris ſtuppæ ſunt imagine ſunt uellera cre-
manda docere, quæ alij tomenta, alij licia, alij ſimbrias dixerint. Hæc ſunt admi-
randi illius interpretis uerba, quibus ignarū uulguſ ignorantiffimus ipſe perſua-
dere conatur, purpuras & cōchyliæ lanas habere. Et ſubdit. Quid aūt in marinis
purpuris hæc ſtuppæ ſint, nouerunt qui ad mare habitant; quotidie enim ex hoc
genere capiuntur, quæ ſuperiori ſui parte uiſioſæ ſunt, tam tenui & ſequaci uel-
lere, ut in ſilum lini modo trahi ac confici poſſit. Quod aūt bonus uir hæc omnia
ſingat & ementatur, neq; re ipſa, neq; ullius autoritate atteſtante, uel ex eo loco
apparet, quē dogmaris ſui confirmandi gratia, ex Paulo non intellecitū à ſe ad-
ducit. Pauli uerba hæc ſunt lib. 3. cap. 26. ſine. *λινὸν ἀπὸ πορφύρας βαλανθίας τοῦ πορφύ-
ρεως ἐν τῇ ἀπὸ τοῦ γαλλίου, καὶ πνίξαν αὐτὴν, ὅτι πορφύρεως, θαλαſſίας ὡς ἐν τῇ πο-
ρφύρεως ἐν τῇ ἀπὸ τοῦ γαλλίου, ὡς μαρτυρεῖ γαλλίος*. His Pauli uerbis ſuniculum ex
marina purpura, qui uipere collo circumdatus eam ſtrangulauerit, pleriq; oris et
colli affectionibus prodeſſe ſuſpenſum ex collo, aut homini adalligatum, doceri
ait, quæ ſanē Pauli ſententia non eſt. Nam uerba quæ præcedunt *ὡς ἔλεος πνίξ*, cū
his non ſunt connectenda, ſed ad præcedens medicamentū pertinent, quod Pau-
lus & ad gingiuas facere dicit. quare Pauli uerborū ſententiā hæc eſt ad uerbum
ſilum à purpura marina quod obligatū eſt collo uipera, eamq; ſtrangulauit, &
inde pro amuleto appenſum eſt, mirifice quodammodo iuuat non ſillas & colli affe-
ctiones, ut Galenus reſtatutur: Quod itaq; *λινὸν ἀπὸ πορφύρας βαλανθίας* Paulus &
Galenus dixerunt, non accipiendum eſt tanquā ipſæ purpuræ marinæ lanas ha-
beant, unde ſilum decerpēdū ſit in hunc uſum, ſed ſilū lanæ purpura marina in-

fectæ, uelut etiâ hoc loco *λεπιδία καρχηδίων* reddidi tomentum lanae conchyliis infectæ. Ipsas enim purpuras & conchyliis nullis lanis uestita esse certum est, neque ullum aliquem res habet autorem uel *ἀντίστην* testem, præter admirandum illum grammaticū, qui non uisa, non audita, nullius auctoritate tradita cōminiscitur, atq; hoc addit tandem. Neq; cuiquam absurdum uideri debere, quando & alia in mari hirsuta uillosaq; passim uideantur, quod ipsum ut in alijs quibuscūq; non penitus negauerim, ita in purpuris merum cōmentum existit. Quod autem neq; admiranda illa purpurarum lana etiam si in rerum natura esset, præcipuū hunc usum ad colli affectiones habeat, ex Plinio pater, qui idem amuletum inter strumarum remedia recenset, lib. 30. cap. 5. his uerbis. Aliqui uero circumligant eas lino, quo præligata infra caput uisera pependerit donec exanimaretur. Hic simpliciter linum dixit pro filo cuiuscunq; generis, non addendo quod ex lana purpura infecta id esse uelit, aut ex lana (si dijs placet) purpurarū natua, ut ille somnasset, quando neq; Dioscorides de alijs floccis comburendis tradat, quā lanarum marinæ purpuræ cruore tinctarum. Lanæ autē purpuræ conchyliorumq; ac muricæ cruore imbus ac tingi solitas, notius est quā ut longioribus uerbis ostendere libeat, etiam si tum lanæ, tum uestis purpuræ usus hodie sit abolitus. Plinius 9. cap. 34. ex Aristotelis ut apparet, lib. 5. de histor. animal. de eo hæc uerba tradit. Sed purpuræ florem illum tingendis uestibus expetitur in medijs habent faucibus. liquoris hic est minimi in candida uena, unde preciosus ille bibitur nigra nigræ rosæ colore sublucescens, reliquum corpus sterile. & cap. 32. quinis lanæ potat horis, rursusq; mergitur carminata, donec omnem ebibat saniem. Hæc itaq; lanas & Diosc. & Gale. & Paulus & Aetius, omnesq; medici græci ac latini tum usas, tum non usas in usu medico habent, & aliquando alia medicamenta his uelut adstringentibus & obnrandi ut prædictis excipiunt, neq; aliud per *λεπιδίας πορφύρας* & *καρχηδίας* nobis ostendunt. Sic Paulus 3. cap. 37. sine. *πύρα λαοὺς καὶ ἀναλαμβάνει τὰ πορφύρα ἢ ἰσίου ἢ ἀπὸ τῆς τῷ σαρμάχῳ*, id est, lana purpura infecta aut simplici excipiunt. Sic Galen. 7. Meth. *ἀλλὰ ἢ τῆς χιτῶνος κασιχρῆς ἢ ἀπὸ βαλοάριου λαοῖς ἔσται, ἢ μίξῃ καὶ ἰσίου, ἢ κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἀπὸ τῆς λαοῦ καὶ τῆς κασιχρῆς, ἢ κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἀπὸ τῆς λαοῦ καὶ τῆς κασιχρῆς, ἢ κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἀπὸ τῆς λαοῦ καὶ τῆς κασιχρῆς, ἢ κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἀπὸ τῆς λαοῦ καὶ τῆς κασιχρῆς*. Et paulo post *ἢ κατὰ τὴν ἐξουσίαν κασιχρῆς καὶ χιτῶνος ὡς κατὰ τὴν ἐξουσίαν, ἀναλαμβάνει πορφύρα καὶ ἰσίου*. Hic manifeste lanam tingendam medicamento, purpuram optimam esse debere docet, & addit optimam purpuram tyriam esse, hoc est, quæ cruore purpuræ ad tynum capta sit imbuta. purpuram enim & conchyliorum præcipua nobilitas apud tyrios fuit, uelut alibi indicaui. Sic etiam apud Aetium 9. cap. 35. *πύρα πορφύρας ἰσίου, & ἰσίου πορφύρας* habetur, pro nulla alia lana, quā quæ purpuræ cruore sit infecta. Dixit autem *πύρα* Aetius, quod paulo post Criso *πύρα* dixit, ubi lana conuoluta excipio uerti, quod græce habetur, *ἀναλαμβάνει πύρα ἰσίου*. Eadē enim sunt significatione, *πύρα, πύρα, πύρα, πύρα*, uelut alibi memini. Verū hæc omnia longius exquisita adducenda duxi, ut passim fieret, dicere purpuras lanas habere, idem esse quod canes scenum esse.

[Quidam absinthium pro cerufa scribunt.] Hoc quidem proclius fuerit facere græcis, ob uicinatem scripturæ utriusq; uocis, ut *ἀψίνθιον* pro *ψιμύδιον* scribarur. Nobis contra ob diuersitatem in hunc errorē prolabi non est facile, quāquam hoc sanè loco non fuerit magnum delictum altera re pro altera uui. Absinthium enim propter resuscitandi uim ac aliquantulum adstringentem, non incommode cum melle cōtulis auribus adhibeatur, atq; ego sanè malim ad hunc usum absinthium & capij semen cum melle oblinere quā cerusam. Sicut contra paulo infra ubi air. Solanū cum absinthio illinito, hoc est, *σολανον μετὰ ἀψίνθιον* illinito, hoc est, *σολανον μετὰ ψιμύδιον* legere, atque

ita etiam lego, nempe solanum cum cerussa illinito. Nam non longe post ita ex Apollonij traditione habetur, sed tamen isthic ea cōmonitio nō est adiecta, quod scilicet quidam cerusam pro absinthio scribunt. Habet autem psimmythiū, hoc est cerussa facultatē obstruendi oblinendiq; ac inducendi cicatrices, quæ res per absinthium cum solanio expleri ac perfici non possunt.

Verum in auris vulnerebus & fissuris, charulagine probe coaptata fibulas imponito. Hoc loco Archigenes dixit *ἐχόνδριον ἐπιμαλῶς ἀγκυρεῖσθαι*, quod conueriti, charulagine probe coaptata fibulas imponito. Accipio enim hic *ἐχόνδριον* pro charulagine coaptare, hoc est, *ἐν χόνδρον διαμαλῶσαι*, quo fibula cōmor de imponi vulnerebus ac fissuris possint. Ipsa enim charulago nō glutinatur neq; coalescit, uelut Hippoc. 6. Aph. 19. αἰετὶ πὺν δισκοπῶν ἐπὶ αὐτῷ χόνδρῳ, ἢ τοῦτο, ἢ γνάθος ἢ λεπτὸν ἢ κροκοδίον, ὅτε αὐτὸν εἴσῃ, ὅτε συμφέροντα. carne tamen circa incremente locus solidatur, ad quā rem fibulas imponere uel maxime conducit, quod *ἀγκυρεῖσθαι* græce dicitur, uelut alio loco ostendi. Possit tamen & *ἐχόνδριον* pro *χόνδρον ἐπὶ πύλῃ* aut *καταπύλῃ*, hoc est chondrum inspergere aut cataplasmatīs modo imponere, dictum esse. Habet enim chondrus, hoc est alica, ut alibi ostendi, uim obstruendi ac oblinendi, ut commode auribus fissis adhiberi queat. Et sanè Paulus libro tertio consulis & fractis auribus, presertim inflammatione subsequuta, alicam ex aceto coctam, hoc est, *χόνδρον σὺν ᾧσιν ἐφὶ αὐτῶν* imponere iubet. Quia *ἐχόνδριον* etiam pro *χόνδρον λιβαῖον ἐπιπύλῃ* dictum uideri queat, quando sanè *χόνδρον λιβαῖον*, micæ sunt & grana à Plinio dicta, & ea quam paulò ante dixit mannam, similiter ut ipsum thus auribus fractis commodam ad uulnera ipsarum glutinanda. Verum quando sequitur, deinde inflammationem arcenibus, & reliquo glutinatorio ductu uitior, magis placet mihi prima sententia: in his enim uerbis generaliter dictis, etiam chondrus tum alicæ, tum thuris comprehenditur. Porro *χόνδρον* uox græcis præter alicæ significationem, de qua ab unde in proximo libro dixi, & charulaginis significatum, quod ubique occurrit, in generali grumum ac granum significat, uelut iam & paulò antea etiam de thuris micis ac granis dixi. Sic Aetius 9. cap. 37. *λιβαῖον χόνδρον λιπαρῶν*, hoc est, thuris granum fabæ magnitudine dixit, & de grumo salis idem eodem libro capite 39. *ἐπὶ αὐτῷ χόνδρον ὅν τῷ σώματι κατὰ χεῖρας*, id est, salis granum in ore detinerant, & 13. cap. 46. *πυλὸν φύλλα. κ. λιβαῖον βασιλικῶν. β. ἐχόνδριον. β. ἐπὶ αὐτῷ χόνδρον. α.* id est, salis grumum unum habet. At uero *χόνδρος* *ἐπιφωρῶν* apud Galenum ac omnes medicos Græcos, os pectoris appellatur, à capitis gladij figura appellatone deducta.

Inflammationes in superficie cutis ex humorū impressione aut plaga obortas. In græco habetur *ἐπιφωρῶν ἢ πύλῃς*. Est autem *ἐπιφωρῶν* non peculiaris morbi oculorum nomen, sed omnium humorum ad quascunque corporis partes impetuosior impressio & influxus *ἐπιφωρῶν* appellatur, & propterea loci ad quos eiusmodi fluxiones impressionem faciunt, aliquando adijci solent. Sic Plinius Epiphoras uteri, & uentris, & testium ac aliorum membrorum dicere conuenit, quanquā fluxiones oculos impetentes ferè simpliciter epiphoras appellat. Paulus tamen lib. 3. ubi de oculorū epiphoris agit, non nudo modo *ἐπιφωρῶν*, sed *πύλῃς* *ἐπιφωρῶν* dixit. & infra lib. 4. Nectarium Marci *πρὸς ἐπιφωρῶν εἰσαγωγῇ* *λεπτῷ* habetur, ex quo apparet non modo pituitæ impetum ad oculos irruentem *ἐπιφωρῶν* dici, uelut quidam prodiderunt, sed omnium humorum ad quascunque partes tum internas, tum externas impressionem, cuius rei exempla frequētia sunt apud medicos autores, cū ut pauca producere libeat, aut sit necesse. Sequitur paulò post, aut glandis ungentariæ succum & resinam liquib-

tamen Copus abscēssus uertit, ut qui ἀπειράματα legit, & alias sententiā non est assequutus. Exempla plura adscribere nolo, quādo frequentis ambo sint usus in medicis græcis: cōmonuisse suffecerit, ut genuinam lectionem alterutrius uocis in singulis locis, studiōsi rerum medicarum diligenter expendant.

Aut sanè per acre pharvacum abscēssum rumpere, quale est Smilium appellatum, & quod ex alijs constat. Hæc pharvacā inter emplastra Paulus lib. 7. descripta habet. Videtur autem σμῖλον emplastrum appellatum, quod instar scalpelli seu aciculæ abscēssum rumpat.

Aut fuluū, aut nigrū aut albū, uinū esse. Inter reliquas uini differētiās Gal. hoc loco differentiā iuxta colōrē indicat. tria eius genera recensens, fuluū, album, & nigrum, quæ λεῖψον λευκόν τε καὶ μέλαν uocat, atq; tam leuiter eas differentias hic indicare satis esse duxit, quōd alijs locis abunde hanc rem tractauit. Nimirū XII. Meth. libro, & in libris de tuenda sanitate, præsertim quinto & tertio de alimentis & 3. cōmentariorum in librum Hippoc. de uicū in morbis acutis, quos locos hic indicare uisum est, de his differentijs amplius cognoscere uolentibus. Verū quod prætereundum nō puto, Omnes uinorū colores ad quatuor genera reduci possunt, λεῖψον, λεῖψον, μέλαν, ἰερὸν, hoc est album, fuluum, nigrum & rufum, quanquam & quintū addat Galenus ξανθόν, hoc est flauū, quod tamen aliquando λεῖψον idem esse ait, aliquando autem λεῖψον in ξανθόν transire, & sextum ὀχρῶν, id est pallidum, quod mediū est inter album & fuluū. Sicut λεῖψον medium est inter album & nigrū. Negs enim per λεῖψον alius color uini accipiendus est, q̃ quem latine fuluū dicimus. Is est enim de quo Gale. ait εἰ δὲ ἄλλως ἐθέλῃς ὀνομάζειν τὸ λεῖψον χρῶμα, δύναται αὖτε λέγειν περὶ λεῖψον ὀχρῶν, hoc est, si uelis aliter nominare fuluū colorem, possis utiq; igneū seu rufum pallentē dicere, quod propterea refero, quod uideā plerosq; per uinū λεῖψον, rubeū accipere, quod proprie ἰερὸν græcis appellant. Sicut etiā per μέλαν, hoc est nigrum intelligere quōsdam audio quæ sunt rufa excellenter, & quodammodo crassa, ad taurini sanguinis diluti serē similinū dinē, sicut rufa Massiliensis apparent. Verū res non ita habet. Sunt enim μέλανα uina, partim dulcia & crassa ad sapōrē modum, quemadmodū Theracū & Scybeli tes esse à Galeno traduntur, & hodie uina cretica uidentur, partim austera, uelut in Asia Perperinū & Aegæates idem esse dicit. Plin. 14. cap. 9. Colores uini quatuor, albus, fuluus, sanguineus, niger: per sanguineū ἰερὸν indicauit, in reliquis nihil dissonū græcis est. Porro præter hanc uinorū iuxta colōrē differentiā, Sunt & aliæ quatuor differentiæ, una iuxta sapōrē, altera circa substantiā siue compositionē, tertia circa odorē, quarta secundum facultatem, iuxta quā aliud uinum fortē, aliud debile, aliud mediū, atq; adhuc aliud inter mediū & utrunq; extremum medium existit. Imò & sexta differentia est, sed per accidens, ea uidelicet quæ contingit secundum ætatem, quas omnes præter tertiā & quartā: Galenus hic paucissimis indicare contentus fuit, propterea quod in alijs locis, uelut dixi, hanc rem fusissime persequatur.

Ut totus sermo eiusmodi fiat. Hic Archigenis sermo in græco exēplari corruptus est, atq; hoc modo restituendus, uelut ex præcedentibus palam est. θυμακὸς ἀραρυτὴν χειρὸς αὐτοῦ παλαιὸς ὁ ἀρῆς ἀπὸ συνειχῆς καὶ αἰσθητικῆς τῆς δόξης, ἢ ὁ συνειχῆς ἐκ τῆς δόξης τῆς αἰσθητικῆς, hoc est mirabiliter discuit & strumas, &c. uelut nos reddidimus.

Aut calcem uiuā cum strigmētis eodem modo. Strigmenta Archigenes hic γλοιὴν dixit sic, ἢ ἄσβεστον μετὰ γλοιὴν ὁμοίως. Diosc. & Gale. & alij medici græci etiā γόπον appellare solent. Sunt autem trium generū strigmenta, balneorū, palestræ, & parietum atq; stagnarum gymnasiolorum. Balneorum ex sudore, oleo, & sordibus in balneo defricis ab hominibus constant. Palestre ex hisdem rebus componuntur, accedente insuper puluere, qui partim ab olei dilutione luctaturis inspergebatur

gebatur ac affricabatur, partim à luctantibus in arena mutuo manibus ingessus, itemq; ex lucta excitatus, corporibus inharebat. Prior sanè pulvis *πῆς* & *Ἀντικῆς* uocabatur, autore Galeno: eiusq; affricus aliquando solius, ali-
quādo præmissa olei illitione, densandi ac corroborandi corporis per olei emol-
liti gratia fiebat, uelut secundo & tertio *ὁ γυμνασιάρχης* Galenus tradit. Quanquā & ob
emendandam gracilitatē, crura puluere conspergere eiusdem operis lib. 5. doce-
at, & affuso oleo confricare, sed ita ut is pulvis tenuis & pinguis sit, *ἡνίκαι λυγρὰ*
appellat, in quo uidelicet nihil asperit, neq; acris insit. Extenuat enim inquit, ma-
gis quàm incarnant, qui pumicosa asperitudine, aut nitrosa acredine participant.
Quin & refrigerandi & sudoris reprimendi causa idem pulvis adhibebatur, qui
uim habeat obducendi meatus, refrigerandiq; ac repellendi, uelut octauo simpli-
phar. Galenus testatur. At uero pulvis qui in arena tam à luctantibus mutuo in-
gerabatur, uelut prædicta cōmoditate non carebat, Sic officij ergo non insperge-
batur, sed moleste & insidiosè gallorū more euerrebat, ad usum uidelicet præ-
pediendum, & uelut Anacharsis apud Lucianū de gymnasijs loquens arbitrat, ut
facilius aliter alterū prehenderet, arena & puluere lubricitatem ceromatis &
olei eximente, quanquam alias etiā causas & cōmoditates substatē luctantibus
arenæ Solon ibidem recenseat, quod scilicet nō tam proclue sit in ea uelut in cœ-
no labi, et quod ad spersa sudorem reprimat, uentorumq; impetui obstitat, ampli-
usq; sordes eluat, & candorem inducat. Quare Plin. lib. 35. cap. 11. quū ait, Alcima-
chus Dioxippum qui pancratio Olympiā citra pulueris iactū, quod uocant aco-
niti uicit, coniti Nemea, de hac insidiosa pulueris & arenæ iniectione loquitur,
quā Dioxippū Nemea uicisse dicit: Hoc enim coniti significat, sicut contra aco-
niti pancratio Olympiā idem uicit, hoc est, citra pulueris iactum, hoc est citra pu-
gnam & molestiorem congressum. Neq; uero me latet eos qui docti uel inter pri-
mos huius seculi censentur, hūc Plinij locum temere corrumpere, dum iactum
pro iactum legunt, ad æq; suū respicientes, quod scilicet iactū non iactum signi-
ficet, & quod puluerem esse dicunt, quo post unctionē inspergebantur luctaturi,
ut corpora ceromate & sudore lubrica mutuas luctandū prehensiones admitter-
rent. Quibus uerbis & utiliter affricum puluerem, & uolenter ac hostiliter inge-
stum, inter se confundunt, imò neutrius rationem habent certam. Et de uolento
sanè ac insidioso pulueris iactu, etiam Ouidius loquitur li. 9. Metamorphoseon,
ubi Achelous cum Hercule commissus ait.

Ille cauis hausto spargit me puluere palmis

Inde uicem fuluæ iactu flauescit arenæ.

Flauescit inquit, tactu fuluæ arenæ, eius uidelicet quā ipse in illum iecerat. Porro
de utroq; genere, Plinius lib. 35. cap. 13. simul mentionem facit. Non multum in-
quit, puluere puteolano distat è Nilo harena tenuissima sui parte, non ad susti-
nenda maria fluctusq; frangendos, sed ad debellanda corpora palestræ studijs.
Inde certe Patrobio Neronis principis liberto aduehebatur. Quin & Leonaro
& Cratero ac Meleagro Alexandri magni ducibus, sabulum hoc portari cum
reliquis militaribus cōmercij reperio. Plura de hac parte non sum dicturus, non
hercules magis quàm de terræ usu in ceromatibus, quibus exercendo iuuentus no-
stra corpora, uires animorū perdidit. Hactenus Plinius. At uero tertium genus
Strigmentorū est parietum atq; statuarum in gymnasijs quę sordes sunt ex oleo
magna sui parte cōstantes, quę ex materia cui inhærent aliquid assument, uelut
ærugine ex statuis æreis. His em̄ itemq; parietibus oleum quo se oblinebāt pale-
stræ, inter ilinendū inspergebatur, quanquā etiā statuas quasdā fuisse in gym-
nasijs, itemq; uasa ærea quę oleū ipsum, quo se luctaturi oblinerēt, continerent,
ex Pauli ac Galeni uerbis apparet. At em̄ Paul. li. 7. *ἐν πῶς ἀπὸ τῆ χειρὸς ἀποστρέφον*
ἢ ἀποδύον

ἡ σκωρία, ἢ αἱ ἐκ τῶν ἰλαίων σκωριδιαί, ἔχει τὴν αἰετὴν, ἀφ' ἧς ὁρμητικῆς ἐστὶ καὶ φαρμακτικῆς μυσ-
 τήριος καὶ μαλακτικῆς. ἐπεὶ οὖν γινώσκουσιν ἀφ' ἧς, hoc est, sordes ex aeris statuis
 ac uasis, in quibus largum oleum remanet, quod & æruginis quippiam contrahit,
 discussoriae sunt & resiccantes moderate ac mollientes, quare tubercula cruda
 discutiunt. Ob hanc itaque uim uidetur etiam Archigenes hic ea strigmenta cum
 calce ad discutiendas parotidas probare. Verum Galeni lectio lib. 8. simp. phar.
 πρὸς ῥύπον corrupta uidetur. habet enim sic. ῥύπον ὁ μὲν ἐστὶ τὸν ὅν γυμνασίῳ ἀνδρῶν
 αὐτῶν, ὃν αἱ ἐκ τῶν ἰλαίων λείπεται, hoc est, sordes à statuis in gymnasijs, in quibus
 largum oleum sitū est. Legendum enim uelut Paulus habet existimo, hoc modo.
 ῥύπον ὁ μὲν ἐστὶ τὸν ὅν γυμνασίῳ ἀνδρῶν αὐτῶν ἢ σκευῶν χαλκῶν ὃν αἱ ἐκ τῶν ἰλαίων λείπεται.
 Nisi ipsos ἀνδρῶν αὐτῶν, hoc est, statuas ita facias intelligamus, ut oleū uelut dixi,
 cōtinerent. Ceterū exemplar Græcum λείπεται habet, pro quo ego λείπεται lego, ut
 sit quod Paulus ἐκ τῶν ἰλαίων dixit, hoc est, situm est, & continetur, nempe à pale-
 stræ lucra & certaminibus finitis relictiū. Vetus autē interpretis uidetur λείπεται
 legisse, uertit enim uisus, quod minime huc cōuenit, & magis adhuc mirum est
 idem fecisse Hermol. Barbarum, quum hæ sordes non lucernarum aut lychno-
 rum æreorū sint, sed statuarum ac uasorum æreorum ex oleo & ærugine ut dixi
 constantes, aut etiam ex materia parietum aliquam qualitatem indeptæ. Oleum
 uero lucernarum, neq; sordium, neq; strigmentorum appellationem assumit, sed
 oleum dicitur, cum additamento lucernarum & contractæ item æruginis, sicut
 non longe ante hunc locum Galenus, item ex Archigene medicamentum ex eo
 oleo adscripsit his uerbis. τὴν δὲ φλεγμονώδη πρήματα τῶν λευκῶν αἱμάτων καὶ αἰσθη-
 τῶν χαλκῶν λυχνῶν ἰατρικῶν κατεχίον ὀξυγόνα, hoc est, inflammata in auris puerorum
 pulsibus foramina, oleum quod in aerea lucerna ærugine contraxit, illinendo, per-
 sanabis. ἰατρικῶν enim æruginosum & quod ærugine contraxit, dixit. Porro γλοιὺς
 uox non solum strigmenta significat, uelut hoc loco Archigenes usurpat, & Pau-
 lus lib. 7. in uoce γλοιὺς exponit, & lib. 4. cap. 28. usurpat ubi ait, γλοιὺς ἐκ τῶν αἰσθη-
 τῶν ἢ κατὰ τὸν ῥύπον, &c. Sed à quibusdam etiam uiscum, hoc est, ἵψος exponitur
 magna rerum differentia, quanquam etiā uiscum ἀφ' ἧς καὶ συμπίπτειν φέρεται
 καὶ περιπίπτει Diosco. tradat, ut uel ob id proclius sit errare etiā doctis alteram
 rem pro altera accipere potentibus. Minor uero lapsus cōtingere potest in uoce
 γλοιώδης, hoc est strigmentitius, uelut ego in proximo ante hoc medicamento
 cōueri, ubi Archigenes τῶν αἰσθητῶν αἰσθητῶν καὶ περιπίπτειν γλοιώδης πρήματα,
 id est, ad strigmentitiam crassitudinē reducere iubet, nam ad uisci crassitudinem,
 quis interpretari possit, que modo dū non semelipse Celsus fecit, quod propter
 ita admonere uolui, ut diligentem æstimationem faciant græcorū studiosi, utra-
 randem significatio uocis γλοιὺς in singulis locis sit reddenda, quum apud me-
 dicos raro aut nunquam aliter quàm pro aliquo ex tribus generibus strigmen-
 to accipiantur.

Deinde ad chirurgiā perueniendum est & crudi abscessus sectionem. Quod
 crudi abscessus sectionem dixi, in Græco ἀποσπαστικόν est. Significat autem
 ἀποσπαστικόν, crudum & nondum maturum abscessum secare, quo uidelicet quàm
 celerit fluxus foras euellatur. Declarat id manifeste Paulus li. 6. cap. 24. cuius
 uerba adscribere non pigebit. ἰσχυρὰ δὲ inquit, ἐπὶ καὶ πρὸ τελευτῆς αἱ πύον μεταβα-
 λῆς φέρονται ἀμειψόμενα πρὸς ἀλλήματα, ὥστε τὸ πλεονάζον ἢ ἀπὸ τοῦ αἵματος, ἢ τοῦ αἵματος πορεύεται, ἵνα μὴ
 τὸ πλεονάζον αἶμα σιωπῇ ἀφ' ἑαυτοῦ σιωπῇ, ἢ τὸ τῶν αἰσθητῶν. Hactenus Paulus. Sed
 & continenter eodem loco idem tradit Hippocratem uicina digitis apostemata
 ante perfectam maturationem cruda secare præcipere. Verum quum lectio eius
 loci sit corrupta, etiam ipsum in gratiam studiosorum integrum adscribam,

καὶ τὰ πλείονα δὲ τῷ διακτύλῳ ἀρρώματα πρὸ ῥιπιλλῶς περιένευσας ἀμειβόμεν ἰππικῶς
της ἀρετῆς ἀνέτοι, ἀπὸς διατρικῆς ὑποδιδάσκουσιν φέλου, hoc est ob timorem peris-
rationis. Confimile porro huic uerbo est & illud medicis Græcis itidē frequen-
ter usurpatum ἀμωπικῶν uidelicet, quod non simpliciter abortum parere signifi-
cat, sed crudum partum expellere uiolenter, ob maioris periculi fugā, nimirum
quum mater sic habet ut conceptum perficere non possit, aut perfectum citra ui-
tæ periculum edere non ualeat, de qua re palam Aetius lib. 16. cap. 16. & sequenti
bus docet. Vbi inter cætera auxilia crudum partum procurantia, & capillorum
uini suffitum habet. Quanquam mihi uideatur pro ἀμωπῶς legendum esse γυναι-
κῶς, quum experimento constet muliebrum capillorum suffitum foetorem de se
præbere grauiorem. Sed & Constantinus Cæsar lib. 5. cap. 46. de agricultura, ad
hanc rem muliebrum capillorum suffitū probat, ex Africano sic prodens. ἐπι-
λάσσει δὲ ἀμωπῶς τὰ θηρία καὶ γυναικὸς στήνας θυμιάσας, καὶ τὰς ἀμωπικῶς διατρικῆς,
hoc est Abiges similiter bestias muliebris capilli suffitu, atq; inde etiam mulierū
bus difficulter & periculose parientibus, & ob id crudum partum ac abortū ex-
perientibus opitulaberis.

Laxatoria appellata omnibus nota sunt. Exempla ipsorum sunt Emplastrum
Mnafeæ, & quod ex succis constat & quod ex Psilana.] Horum emplastrorum
descriptiones sunt apud Galenū de compphar. 37 γίνεσθαι lib. 7. item Paulum lib. 7.
Estq; etiā hodie in usu myropolij descriptio una atq; altera emplastri δὲ χυλῶν,
ex succis, seminis lini uidelicet, & foeni græci atq; altheæ quos recipiunt nomī-
nata, uerum uulgo diaquilon corrupta uoce appellantur. Laxatoria autē, id est,
χαλαστικὰ uocantur, quod distentas partes laxent ac remittant.

In caput Tertium de narium affectionibus.

Primum (itaq; de Ozænis sermonem faciam.) Ozanarum quidem appella-
tio à graueolentia & foetore est, uerum non omnia narium ulcera graue olent, nec
omnia ex putrescibili influxu generantur, sed aliqua ex acribus tantum humori-
bus produciuntur, atq; hæc ob humorū acridinem ægre curabilia Galenus esse
dicit, non illa ex putrescibili humore producta & graueolentia. Corne. Cels. lib. 6
cap. 8. contra, quæ crustas plures, inquit, & odorem foedum habent, quod genus
græci ozenam appellant, sciri quidem debet uix ei malo posse succurri. in quib-
us uerbis ostendit se parum diligenter humoris noxi & ulcerationem produ-
centis rationem habuisse, & magis ad foetorem ac putrescentem humorem re-
spexisse, quem tamen non ita male curabilem, uelut acrem solum, rectissime Ga-
lenus prodidit.

Et per sternutatoria facta concussione, tectoria ulceri obducta excutito.] To-
ctoria ulceri obducta dixi, quæ græci ἱφελκίστας uocāt. Est enim ἱφελκίς quod ul-
ceri increuit tectorium siue crusta, ut Celsus uocat, qui loco supra citato, eandem
sententiā sic expressit. Sub his enim crustæ resoluantur, inquit, quæ tum per ster-
numenta elidi debent. Paul. 3. cap. 57. ἀπὸ γυνώσκει δὲ τὸ ἱφελκίς ἐκ τῆς αἵμας, ἢ πύανης, ἢ ἐκ ἱφελ-
κίστας ἱμῶν. Gal. 5. Meth. ἀντιχέου δὲ αὐτῷ μετὰ τῆς βροχῆς ἢ ὑπερμάχου ἱφελκίς.

In polypode nasturtij tenuis chemam, siue drach. dimidiā, cum ueratri albi
obolis duobus, nare attrahere iube.] Hoc medicamentū etiam supra recensuit,
sed sine certo ueratri albi pondere, dicens, aut ueratrum album cum seminis nas-
turtij chema quonidie insuffla. Nasturtij enim mensuram etiā tunc, sicut hic ex-
pressit, chemam accipiendam dicens, sed hic ueratri pondus duorum obolorum
addidit, ampliusq; chemæ mensurā siue capacitatem explicauit, χήμην ἴδιον δραχ-
μῆς, tanquam idem sit chema, quod drachmæ dimidiæ pondus, aut tanquam
chemæ mensura non plus quàm dimidiā drachmam capiat, hoc est, obolos tres,
urita

ut ita oboli tres nasturtij cum obolis duobus ueratri, nari insufflētur, aut per eandem attrahantur. Et uidentur sanē apud hoc pondus esse ad præsentem rem & usum. Verum an Chema idem sit quod drachma dimidia, & nō plus capiat, consideratione indiget. Chemam itaq; seu Chamam ostreorum generis esse Aristot. & Dioscor. testatur. pro mēsurā uero accipi apud græcos medicos frequens est, sed quantā, aded incertum est in diuersa traditione eorum, quorum de ponderibus & mensuris scripta extant, ut mihi credere libeat, penitus nullam certā mensuram, neq; pondus, per chemam, sed simpliciter aliquam capacitatem indicari, quæ chemæ testam mediocrē non excedat. Sunt enim & hæ magnitudine ac capacitāte inter se differentes. Inducor autē maxime per hunc locū ubi ex Archigenis traditione *χρημα λίσσης χύμας, ἔσται δραχμ.* s. habetur. Videtur enim uelle ostendere nasturtij tenuissime triti chemæ capacitatem accipiendā esse, de qua tamen si quis dubitet, quantum capiat, si ad manum non sit, drachmam dimidiam eius loco sumere iubet, quod sanē pondus nasturtij triti rei leuissimæ, facile chemæ capacitatem explere potest. Inducor amplius ex eo loco qui infra lib. 5. cap. 7. habetur, ubi Crito ait *ἀσπαραγγοῦ χύμας ἂν πινύται δραχμ. γ.* quo item Crito uidetur ostendere uelle spumæ argenteæ chemæ capacitatem sumendam esse. quū autem & hic dubium sit, quantum capiat, si quis chemam non habeat ad manū, addit siue drach. III. quum enim spuma argenti res metallica grauissima sit, per dimidiam drachmam eius, chemam replere non possis, quemadmodum per dimidiā drachmam farinæ nasturtij chema facile expletur, sed per III. drach. id optime facere poteris, atq; ita sextupla copiā spumæ argenti eandem capacitatem quam dimidiā drachma nasturtij triti explebit. Paulus Aegineta in his quæ de ponderibus & mensuris ad finem lib. 7. & ultimi adiecit, inquit cyathū habere chemas paruas aut mystra parua duo, nihil inter mystrum paruum & chemam paruam distinguens, & postea in mensurarū apponderatione, Mystrum paruum olei drach. V. uini scrupulos XX. olei drach. IX. habere tradit, iuxta proportionem uidelicet secundum quam tradidit uinum & mel grauitate oleum superare, uelut nos conuertimus lectione eiusdem in integrum restituta, quæ ad Aetium à nobis conuersum est adiecta. Inter spurios Galeni libros de ponderibus & mensuris habentur traditiones diuersissimæ & corruptissimæ, quarum prima *δισδραχμία σφραγίστα* inscribitur, quæ planē eadē est cum Pauli traditione, nisi quod adhuc corruptior est in Galeni quā Pauli exemplari lectio. Altera penitus obscuri auctoris est. Tertia Cleopatra ex libris eius de ornatu, quos etiam Galenus suprà lib. I. huius operis citauit. Quarta rursus incerti auctoris est, & Quinta eisdē obscuri auctoris est de mensuris & ponderibus Mulomedicorum. & Sexta Dioscoridi attribuitur posteriori Alexandrino, non Anazarbeni, qui de medica materia scripsit. Cleopatra ita quæ chemam magnam drach. III. habere, paruam II. ait. Obscurus qui sequitur, chemam magnam drachmarū III. esse tradit, paruam duarum. Dioscorides uero chemam quartam cyathi partem esse inquit, & pondere drach. III. scrupulum unum habere. Quæ omnia incertitudinē mensuræ arguunt, & quod non unum certum pondus chema cōplectatur, atq; ob id me credere uelut dixi, fateor: simpliciter aliquam capacitatem indicari, quæ chemæ mediocris testam non exuperet, cuius unum certum pondus exprimi non possit, ob rerum diuersam grauitatem: quemadmodū etiam hodie cochlearis capacitātē incerto modo uulgo usurpari uidemus, præsertim in rebus ubi nō multū refert plus an minus paulò quis sumat. Quasē nō tutum est tam obscuris auctoribus & maxime corruptis ita passim exemplaribus, per omnia fidem habere. Si enim Paulo Aeginetæ etiam rectissime prodenti, chemæ pondus in oleo drachmarum sex esse, crediderimus, &

ad eum modum etiam hic ratiocinati fuerimus, chemam sex drachmas nasturtij habere, continget, ut non *δραχ.* hoc est, drach. dimidiam putabimus legendum esse hoc Galeni loco, sed *δραχ.* id est, drach. VI. atq. ad hoc characterum similitudinem producemus, ob quam committi potuerit hic error. Sed nos in priore nostra sententia perseveramus, quam nos recte amplecti confidimus, rerum leuitate ac grauitate attestante. Insuperq. re ipsa hoc loco ac usu, quæ ambo inepta essent, si drachmæ sex nasturtij triti ad duos obolos ueratri ammiscerentur.

Scobis æris rubri unciam unam.] Scobem dixi quæ *σύνματτα* græcis sunt, hoc est, quæ lima deteritur. Sunt enim *σύνματτα* itemq. *συνίσματα* à uerbis *σύν* & *σύνει* deducta, quæ limare & lima deterere significant. Eandem significationem habent & *πρίσματα*, hoc est, serratamenta à uerbo *πρίσσει*. Theophrast. lib. 5. τὰ δὲ χαλκὰ λαιὰ σμύρνα, & φέρεται ὅτι πρὶς ὁλοῦσι τὰ πρίσματα, id est, inter serræ dentes ramenta recipiunt. Plin. 15. cap. 17. Sunt qui malunt uuas in scobe ramentis uel abietis, populi, fraxini seruare. Dioscor. etiam *πρίσματα* dixit scobem à uermibus erosam, de styrace. *δελίζοντι αὐτὸ τὸν ἱκτὶ δρῶσιν πρίσμασι, ἀπὸ τοῦ τῶν σκαλίων ἀναστρέφεται.* Aetius simili forma ac significatione *πυλκώματα* usut paut, 2. cap. 3. *πυλκώματα λωπρῶσιν ἢ πρίνιν ὅτι ἔλατο ἰψήσας ἄλαφι,* à uerbo *πυλκίζω*, quancq. omnia præsemina, & omnino per bipennem à quacuncq. materia decisa ac resecta, *πυλκώματων* uoce ueniant. Constantinus Cæsar lib. 9. cap. 11. de agricultura, *τινὲς ἱκτὶ τῶν κρετὰ γὰρ μέγιστον πρίματι ἰκκίοντες πυλκώματα μιστὰ τὸ φλοιὸν τετραπέλαια.* Eadem Hippocrates *ἰχθυήματα* appellat πρὶς ἔλατον, ubi *ἰχθυήματα* & *λατ* habet: quanquam Galen. *λεπτόματα φλοιῶν*, id est, corticum fragmēta *ἰχθυήματα* exponat. Nec alia sunt à Dioscor. *πρίσματα* dicta, de fraxino, τὰ δὲ πρίσματα τὸν ἰκτὶ πρὸς τὰ φασίον ἀναστρέφεται ὄναι. Porro in hoc pharmaco, æris rubri scobem unā cum alijs medicamentis, etiā in uas æris rubri transferri iubet, & cum radio item æris rubri agitari, quo ex ipso ære medicamentum magis efficax reddatur, ad eam nem superfluum resiccadam ac cōsumendam. Dixit autem radium *κρυπιδιον*. Non est autem aliud *κρυπιδιον* quā pistillum, quod sæpe & *δινιδιον*, cochlearis alias significatione, itemq. *πυλκιδιον* atq. *ὕπερος* à medicis græcis appellatur. Radiū autem etiam Plinius appellauit.

Scribonij Largi facit ad omnia extubetantia.] Hoc medicamentum est quidem in eo libello Scribonij Largi, qui latine circumferitur, sed ita confuse ac corrupte, ut dubitem eum libellum latine à Scribonio esse scriptū: suspicorq. Scribonium græce scripsisse, eaq. quæ in illo libello adhuc supersunt, quondā ante mille annos translata à quopiam non indocto adeo fuisse, sed qui tamen nō ad plenum græca sit assequutus. Nisi quis Asclepiadæ potius hoc crimen imputare uelit, quod latine à Scribonio scripta male intellecta uerterit in græcā, quod apud me piaculum sit credere, si modo exemplar Galeni nō est corruptum. Legitur itaq. in Scribonio sic compos. LI. Ad polypos Misy usitū, chalcitis usita, æris flos, usitū fori, æris squama, tusa cribrata. In his sanè uerbis quinq. res exprimuntur, quæ in idem Galeno recensentur, hoc modo *πίστος λεκανιδίον, χαλκίτις λεκανιδίον, χαλκίδιον λεκανιδίον, σόριον, λιπιδιον* & *χαλκιδιον*, ἀπὸ δὲ *δραχ. 9. φασίον ἰχθυσίου*. Verum in hoc discordant, quod in Galeno *χαλκιδιον λεκανιδίον* legitur, in Scribonio uero eisd. loco æris flos habetur, & *λεκανιδίον* uox ad fori, nō ad æris florem relata est. Aut igitur *χαλκιδίον* æris florē interpretatus est Scribonij interpres. Aut æris florem rite à Scribonio scriptū, Asclepiades *χαλκιδίον* male conuertit, quod tamen religio sit opinari: atq. sic alteruter deliquit quod *χαλκιδιον* pro *χαλκίδιον*, aut uicissim hoc pro illo expressit, similitudine uocum græcarum deceptus, quā res sint quidem diuersissimæ, sed quæ tamen ambæ possint in hoc medicamentū am-

misceat. χαλκὸν ἄνθος enim uim habet reprimendi exuberantia, & ut Dioscor. ait, ἰκτάκη τε ἢ μυκτῆρος ὀρεκώματα, ut uideri possit nō male à Scribonio traditus flos æris ad polypos consumendos, χαλκάνθος autem siue χαλκάνθος rursus uim habet corrodendi & crustam inducendi, in quem usum & in sequenti apud Galenum Philoxeni chirurgi pharmaco assumitur, ut etiā ipse non male ab Asclep. expressus hic uideatur, & recte ex Scribonio transcriptus. atq; ad hanc partem omnino inclinat nobis animus, pharmacū hoc ex græco Scribonio, Asclep. transcripsisse, & recte χαλκάνθος λευκανθῶνος legi. Contra male in Scribonio latine translato legi æris florem, quem interpretis eius ex χαλκάνθος intellectio pro χαλκὸν ἄνθος male reddidit. Sequitur autem in Scribonio latino, si eo medicamento per pinnam sapius nares tactæ, eiusmodi uiria attenuata cotidie emendantur, cum sint à cerebro. quæ uerba penitus nullum sensum huc pertinentem referentia, delenda censeo, uel ad superius medicamentum referenda, & quæ mox sequuntur: Paribus ponderibus sicca benefaciunt; cum superioribus connectenda, ut ita legatur: Ad polypos, Misy ustum, chalcitis usta, æris flos, ustum fori, æris squama, tusa cribrata, paribus pōderibus sicca benefaciūt. Efficietur enim sic ea senectia quam Galenus hic habet, nisi quod Asclep. certum pondus VIII. drachmarum singulorum expressit, quod in Scribonio est relictum. Porro pergit deinde Scribonius ad grauedinis remedia, sic inquit, Prodest igitur quies unius diei, & ab omni re abstinentia, perungēda nares erunt bitumine liquido, aut myrrha stacte, uel pice liquida, &c. quæ uerba Asclepiades ad præsens medicamentum retulit dicēs, διὰ τὴν προαναπνεύσιν τῆς μύτης ἡμεῖρας, τῇ δ' ἐπιστῇ τὸ φάρμακον ἀποπνεύσει μὲν ἢ προσφύσει. πρὸς τὴν δὲ δὴ ὑποχρίσκει τὸν μυκτῆρα ἐσφάλτω, ἡ πίστη ὕγρῃ, ἢ σμύρνη σακτῇ. Quare & hic apparet, uel Scribonium male translatum esse, uel Asclepiadem non intellexisse Scribonium; quod tamen absit suspicari: aut certe exemplar alterum corruptum esse, quod tamē de Scribonij quā Galeni exēplari credere malo. Nam integram Galeni lectionem puto, nisi quod προαναπνεύσιν dubia sententia legitur, pro quo substituendum puto προαναπνεύσει, ut sit quod Scribonius dixit, Prodest quies unius diei. Vetus Galeni interpres hic sicut sæpe alias omnia ea reliquit, ut inde nihil opis ferre possimus. Marcellus autem hunc locum ex Scribonio ut apparet, paulo integrius prodircap. 10.

Asclepiadæ ad ozænas quo usus est Meges.] In horum pharmacorū primo myrrhæ drach. IIII. habetur, hoc est, ut græcum exemplar habet σμύρνης δισαχ. δ. Verum uetus Interpres zingiberi pro myrrha conuertit, haud scio qua occasione, quā myrrha recte legatur. At uero quod hoc loco admonere operæ prædium uisum est, non raro, neq; in uno, sed frequentissime, ac in omnibus græcis medicis, zingiberi pro myrrha legitur, atq; hoc tam frequens fuit in exemplari Aetij manuscripto, quod ego in his quæ ex eo autore latina feci, sequutus sum, ut ex innumeris non libeat paucos locos referre, atq; ea etiā causa fuit cur non ausus fuero lectionem mutare, etiam si nō semel hoc libenter tentassem, re palam indicante, zingiberis inutilem usum esse, & myrrham necessariū accipi, quæ tamen non tantum decurtata uoce hoc modo, ζζ sed etiā integris literis ζγγιβερις prodita esset, ut ne uestigium quidē ueræ lectionis, hoc est, uocis σμύρνης offerretur. Quæ autem fuerit describētibus occasio hunc errorem propagandi in tam multa exemplaria, haud promptū sit dicere, Nisi quod Hermol. Barbarus lib. I. eorol. latorum annorauit myrrham duabus his notis, ζζ à medicis Græcis scribi sole, propterea quod ζμύρνη æque ueluti σμύρνη dicatur. De quo admonendū tantum hoc dūxi loco, quod uetus Interpres etiā hic ζζ in græco exemplari uidetur legisse, atque ita zingiberi pro myrrha transtulisse. Quare qui græca medica

menta in usum uersuri sunt, curiosissime ea expendant, ne in huiusmodi errores impingant. Porro in altero sequenti mox pharmaco, rhois rubri drachmæ ij. habentur, hoc est, *ῥοῦ ῥυθροῦ δρχ. β.* sed uetus interpretis non hic solum, sed multis etiam alijs locis, eius loco rubiā tinctorum uertit, quod semel admonere uolui, quum magnus sit error *ῥυθροῦ* quam rubiā dicimus, pro *ῥοῦ ῥυθροῦ* sumere, quē etiam Latini Rhun siue Rhoem dicimus, quum latinum nomē non habeat, ut alibi dicemus.

Plumbi usti & loti drachmas viii. uini rosati quantum sufficit.] Hōc loco in græco exemplari legitur *μολιβδίου καυμένου καὶ πεπύρις δρχ. γ.* manifestio errore, quum piperis hic nullus sit usus, & si etiam esset, necessarium fuisset adijcere ante pondus *δρχ. α.* uocem *ἀνθ.* ut utriusque plumbi uide sciet usti & piperis, drachmæ viii. accipiendæ indicarentur. Sed uelut dixi, piperis nullus est hic usus, & *πεπύρις* pro *πεπλομένη* falsò habetur, qui error ex decurtata uis usq; uocis scriptura apud græcos irrepsit. *πύρις* enim sic scribit *πύρ.* uero hoc modo *πύρ.* atq; hic error paulò infra his rursus admissus est, ubi *μολιβδίου καυμένου καὶ πεπύρις δρχ. β.* *σίμυκος καυμένου καὶ πεπύρις δρχ. γ.* habetur, *πεπύρις* uoce utrinque pro *πεπλομένη* supposita. Neque uero apud alios græcos medicos hic error deest. Sic enim apud Paulum 3. cap. 59. *καρμίας καὶ πεπύρις το β.* legitur, quum *καρμίας καυμένου καὶ πεπλομένης* legi debeat, typographo lectionem uerā nō assequuto, quæ opinor sic habuit, *καρμίας κβ.* καὶ *πύρ.* Cæterum consequenter apud Galenum, quod ego uini rosati quātum sufficit uerti, legitur *ῥοῦ, ῥοδίον το αὐτοῦ καὶ*, quod uetus interpretis uertit uini & olei rosacei quod sufficit. Verum per *ῥοδίον* uocem rosaceum oleum non esse accipiendum hoc loco, ex eo palām fit, quod sequit mox olei myrrei quod satis est. Quare ego diastolen amouendam censeo, & *ῥοῦ ῥοδίον* uel *ῥοδίον* legendum accipiendumq; uinum rosatum, quod leuiter adstringendi ac fluores siccandi uim habet, ac propterea ad ulcera narium cōmodum existit, oleo rosaceo ut superfluo relicto, quum myrteum quod satis est eius loco sequatur.

Quandoquidē uero perpetuo tolerare collyriū molestū est.] Hæc periodus in græco exemplari corrupta est, quam duabus tantū uocibus restitutis redintegrāuimus in hanc sententiam quam expressimus. Pro *χαίροντα* enim *χαίροντα* legendum est, & pro *μύλα ἢ δισπύρις* legendum *μύλα τῇ δισπύρις*: quanquam utrumque recte legatur, ut ex Galeno mox declarabo. Ceterum *πύρ. μύλα* & de speculorum formis uarijs alibi abūdē à nobis dictum est. Hic addendum hoc est, *δισπύρις* plures *μύλα* dici quæ duas cuspides siue nucleos aut capitula habeat. *πύρις* enim *μύλα*, extremum & summam cuspidem appellant. His itaque cuspidibus lana obuolutis commode pharmacum excipi potest, ac intra os illini ea parte qua natus ad palatum perforatus est. Galenus secundo de semine *μύλας αὐτῆς ῥοῦ ῥοδίον καὶ τὸ καυμένον δισπύρις διμεταχέμενα ὅτι τῶν σιγηματικῶν ὄντων, &c.* Ex hoc loco patet *τῇ δισπύρις*, instrumenta esse utroq; extremo in cuspidem abeunte, & tum singulariter, tum pluraliter, citra additionem *ὀργάνου ἢ μύλας* dici, quod aperius ex *ῥοῦ καὶ πύρις* patet, ubi ait, *ἵνα οἱ τὸ πάρος καὶ σιγητικῶν σίμας ἀποτῇ καὶ πύρις εἰς τὴν δισπύρις καυμένα.* Et paulò post. *ὅτι μὴ πάρος τῶν δισπύρις, ἢ σμίλων ἢ σιγηματικῶν, κατὰ τὸ ἔργον ὡς, ὅτι τῶν πύρις καυμένων ἔχουσι, κατὰ τὸ καυμένα, &c.* Sequitur paulò mox collyrium ipsum arefactum contritū ac cribrari & leuigari posse, atque ita insufflari: ubi quod nos cribrari uertimus *δισπύρις* in græco exemplari legitur, sed corrupte. Est enim *δισπύρις* legendū, à uerbo *δισπύρις* quod incernere ac cribrare significat. Non longè post mentionem facit corporum mollium humidorum atque *δυσκάλων*, hoc est, ut ego red-

didi, quibus ulcera agre sanescunt. Opponuntur enim *δυσήλας* eis qui *εὐήλας* appellantur, hoc est quibus facile sanescunt ulcera, utrorumque autem mentio fit à Galeno Meth. lib. 6.

Per pastillos curauit, Androniū uidelicet & pasonis, & polyidæ, & bithynū,
& per eum quem ego composui.] Horum pastillorum descriptiones sunt apud
Galenū in libris *κάρη γγίς*, & Paulum lib. 7. suis proprijs locis. Habet etiam Cel-
sus lib. 5. pastillum Andronis, itemq; polyidæ quæ etiam sphragis appellatur. Ve-
rum in Celso non polyidæ sed polybīd legitur, ita etiam lib. 6. cap. 7. Porro pastil-
lus quem se composuisse Galenus inquit, ex charra constat, supraq; citatis locis
habetur *ὁ σῆς χαρρου* inscriptis. Subdit paulò post se etiam hedychroi usum ex-
cogitasse, ex uino falerno dissoluti in ozænarum curatione. Hedychroi uerò de-
scriptionem circa Theriacam à se relatum dicitur elusi etiam factum est, tum lib. 1.
de antidotis ex Andromachæ uersibus, tum ad Pisonē ex Magni traditione. Ha-
bet autem eam & Aetius 13. cap. 89. & Paulus 7. cap. 11. uariantibus tamen pau-
lulum inter se descriptionibus. Dioscorides lib. 1. eius descriptionem reliquit in-
uens eandem eius uim ac præparationem esse, quæ Amaracini est ungenti. Ap-
paret itaque hedychroi usum non solum in Theriaca quondam fuisse, sed etiam
ungenti loco usurpatū esse, & ozænis odoris gratia illitum à Galeno. Sicut etiam
pulmonis per odorem resiccandi gratia, cuidam se idem exhibuisse refert loco-
rum affectorum 4. fine. Qua gratia etiam medicamentis ad fucum comparatis
inditum fuit.

In caput III.

A Vlinamentum ex ellychnio contortum.] Hoc loco Heraclides trium ge-
nerum linamentorum ex ordine mentionem facit. Primi ex ellychnio con-
torti, Secundi priapi pudendi forma, Tertij rasilis, Quarti autem generis infra
Asclepiades meminit torti; quanquam in exemplari vulgato *πρωτῆς* pro *πρωτῆς*
legatur. Est autem & quintum genus cōuulsum aut cōcerptum appellatum, hoc
est *πλάγος*, cuius item suprā mentionem fecimus. Atq; tot sane linamentorum ge-
nera in libello *εἰσαγωγῆς* inter Galenicis relato habentur. *πρωτῆς δὲ*, inquit, *ἀλλή-
λων τῶν πρὸς τὸν πόρον, φύσος, πλάγος, ἐλκυστικὸς, περιπλοκτός*. Verum hoc loco Galeni in
græco exemplari ter *φύσος* pro *φύσος* legitur, & *περιπλοκός* pro *περιπλοκτός*. Cæte-
rum hæc linamentorum species ad medicamenta excipienda aptæ, ut in uulnera
ac ulcera indantur, & in nares eruptioni sanguinis sistendæ, partim à formis ac fi-
guris quibus effinguntur, partim à materia ex qua formantur, nomen habent. *φύ-
σος* enim, id est, Rasilis à materia linteolorum derafa, Sicut *πλάγος* ab eadem con-
cerpta, nominatur. Quare etiam aliquando simpliciter *φύσος* à *πλάγος* τὸ *διονύμιον*
id est, rasura aut uulsura, hoc est quod linteolis derafum ac diuulsum est, pro ip-
dem linamentis dicuntur. atq; hoc est quod Plinius dixit libro 19. cap. 1. Derafactis
linetorum lanugo, è uells nauium maritimarum maxime in magno usu medic-
næ est. Sed in exemplaribus omnibus, Repertaq; falsò pro Derafactis habetur. *πρω-
τῆς* uero à figura torti dictum est, Sicut etiam ab eadem *περιπλοκός* quod ad
priapi seu mentulæ figuram formatum esset. *ἐλκυστικόν* autem non quod ad ly-
chni seu funiculi lucernarum similitudinem contorqueretur appellatum est, ut
aliqui existimauerunt, sed quod ex ellychnijs conficeretur. Cæterū certū quod-
dam genus fuisse quod ellychnio priuatim appellaretur, propterea quod *ἐκ τῆς
λύχνου*, hoc est ad funiculorum lucernarum apertissimum esset, ex Galeno apparet,
qui eiusmodi ellychnio etiam spongiæ loco uti iubet 14. Meth. his uerbis. *ἡ σπό-
γγη λυχνὸν περισκεπεί, εἰ δὲ σὺν ὑδαὶ κανὺν, ἔκαστον ἰσοῦται τῷ τῷ ἐν τῇ καλύπτει τῆς
πύλης τοῦ λυχνίου ἐλκυστικόν, μετακλινὸν δὲ ἐκ τοῦ πέντεται, ὅστις τὸ παραποῖον, εἰ δὲ ἐκόνον τῆς
πύλης*

ὑποκαίει, θαλάσσιον χρῆσθαι, διότιον γὰρ φησὶ γράσει τοῖς ἀσκήτοις. Quare ἑλκυσμῶν linamen-
 tum accipiendum est, non tam quod ad similitudinem funiculorum lucer-
 narum sit effectum, quàm quod ex materia illa constet, quæ priuatim ἑλκυσμῶν
 uulgo Galeni tempore fuit appellata, quod ex eodem Galeno 13. Meth. apparet
 ubi ait, ἑλκυσμῶν δ' ἀρκυὰς μοτὸς ἄπὸς ξηρὸς, ἢ ὅλ' αἰῶνος, καὶ μάλλον ὁ ἴκ τῶν μαλακῶν ἑλκυσ-
 μῶν, εἰς ἀπὸρ δὲ τὰ παλαιὰ. & subdit eiusmodi linamenta etiam uim quandam ha-
 bere ad superexcrecentiæ ulcerum carnem cōsumendam. Qualis autem ea mate-
 ria elychniorū fuerit, quæ ex Tarso aduehebatur, haud facile quis dixerit, quæ
 res & nomen hodie perierint. Plinius 23. capite quarto, Ellychnia claritatis præ-
 cipue ex uua ricini fieri tradit. Vocat autem uuam propterea quod Dioscorides
 lib. 4. de ricino, καρπὸν γὰρ βίτηνοις πρᾶξις ipsum habere tradit. Libro uero 28.
 cap. 11. Ellychnij papyraci meminit. & libro 25. cap. 10. Tertia, inquit, phlo-
 mis lychnitis uocatur, ab alijs thryallis, folijs ternis aut cum plurimum quaternis,
 crassis pinguibusq; ad lucernarum lumina aptis. quæ uerba ad uerbum ex Dio-
 scoride transcripsit. Libro autem 35. cap. 15. quarto sulphuris generi usum ad el-
 lychnia conficienda maxime esse dicit. Verum ellychniorum Tarsensium generi
 nusquam, quod sciam, mentionem facit, forte quod nondum Romæ in usu
 fuit. At uero suspicionem meam aperiā, Suspicor Tarsensia hæc ellychnia ex
 fungorū terrestrium genere fuisse, eorum uidelicet qui similitudinem quandam
 ad marinas spongas habent, & quibus etiam hodie ad ignis scintillam ex siltice
 ad chalybem impactio excussam, excipiendam utimur, quum cōmodissime ignis
 in his fungis seruetur. Quondam autem eosdem, & præsertim qui ex Tarso affer-
 rentur, non solum igni excipiēdo, sed & seruando in usu fuisse, ad aliorū ellych-
 niorum modum uerisimile est, quum fungorum in lucernis usum Plinius 18. ca-
 pite ultimo palam ostendat, his uerbis. Pallidi namq; ignes murmurantesq; tem-
 pestatum nunciij sentiuntur, pluuiæ etiam in lucernis fungi. & 28. cap. 11. emendat
 & raritatem superciliorum cum fungis lucernarum, & fuligine quæ est in rostris
 earum. Cæterum & hoc non leue argumentum est Ellychnia Tarsensia ex fun-
 gorum genere fuisse, quod Galenus loco supra citato, ipsorum eundem planè
 usum esse dicat, qui est spongiarum, atque etiam potiorem, præsertim si spongia
 non sit noua, ad tumores pituitosos absque dolore consistentes reprimendos, si
 posca dilutiore sint imbuta. Nam ego in spongiæ penuria, non dubitem eiusmodi
 fungo præsentē ad hanc rem uti, Nō minus enim hoc præstiterit eiusmodi ter-
 restribus, maxime non inueteratus fungus, quàm spongia noua, de qua etiam Dio-
 scorides hoc testimoniū præbet, sicut contra uetustum damnat. ὁ καινὸς δὲ inquit,
 καὶ ἀλκινός, πρᾶγματι καὶ τὸ δὴ καὶ οἰστικῶς εἶλετο, καὶ τὰ νεώτερα καλὰ εἶναι ὁ δὲ
 ἢ ὀφθαλμοῖς, ὁ δὲ πτελέει ὁ ἄλλος. Verum ut credam horum fungorum eum usum
 esse posse, qui fuit Ellychniorum Tarsensium, Imò Ellychnia Tarsensia huiusmodi
 fungos fuisse, tum funiculis lucernarum aptos, tum spongiarum maxime nō
 uarum loco usurpatos, ex Plinio inducor, qui lib. 22. cap. 23. fungos suillos iun-
 co transfixos ac assiccatos ἐ Βίθυνία uenisse asserit, qui planè hanc uim habue-
 rint, qualem Tarsensibus ellychnijs Galen. tribuit, ut sanè amplius suspicer, de
 ipsidem Plinium loqui, de quibus Galenus sentit, atque Plinij tempore eos ipsos
 ex Bithynia uenisse, Galeni uero seculo ex Tarso Ciliciæ. Sed adscribā ipsa Plē-
 nij uerba, quibus tota res notior fiet. Siccantur pendentes suilli iunco transfixi,
 quales à Bithynia ueniunt. Hi fluxionibus alui, quos rheumatismos uocant, me-
 dentur, excrecentibusq; in sede carnibus, minuunt enim eas & tempore absum-
 unt. Item lentigines & mulierum uicia in facie leuant. Lauantur etiam ut plum-
 bum, in oculorum medicamenta, sordidis ulceribus & capitis eruptionibus, ca-
 num

num moribus ex aqua illinuntur. Hactenus Plinius, & de ellychnijs quidem satis, ex quibus sanè etiam linamentum *ἐλκυννίων* appellatum conficiebatur. Porro Corn. Celsus. 7. cap. 15. Linamentum in longitudinem implicitum, *λαμνίσκος* græcis uocari ait, ut non solum ea quinque genera linamentorum esse putandum sit, quæ in libello *ἐλκυννίων* sunt relata. Nam & hoc Heraclidæ loco, cum alijs tribus generibus mentio sit linamenti longi Lycio imbucendi, quod *μακρόν κνήν διχίτ*, *λαμνίσκος* autem etiam Aetius usurpat 14. capite 7. de abscessibus sedis. *ὁὖν παρ' συμφέρον* inquit, *λαμνίσκος ποιεῖται καὶ ἐμβολήσεται τῷ τε τραχημῶτι ἀναλιλυμένῳ, ἢ ἐπὶ τῷ πρὸς τὸν θώρακα ὡς καὶ ὡς ἐπὶ τῷ θώρακα, ὅταν πρὸς τὸν θώρακα ὡς καὶ ὡς ἐπὶ τῷ θώρακα*. Usurpat item Paulus quò alibi, tum libro 6. cap. 34. *μεγάλον δὲ ὄντ' τὸ ἀποκείματ' καὶ πλάσσει διακρίσται* & *διακρίσται τινα λαμνίσκος δι' αὐτῶν ἐργαζομένη*. Sed & idem *σφηνίσκος*, hoc est cuneolum, pro linamento usurpat, eiusdem lib. capite 4. *καὶ εἰς αὐτὸν τὸν ὅσον, σφηνίσκος ἐκ ῥάβδου ἐκτεταγμένης τῶν τριτύμων*. & cap. 91. *διὰ σφηνίσκου ἐκ τῶν ὅσον ἐκτεταγμένης ὅταν πρὸς τὸν θώρακα*. Quod autem non sit aliud *σφηνίσκος*, quàm linamentum ad cunei parui similitudinem intortum, ex eiusdem lib. cap. 7. apparet, ubi ait *γυμνωθέντ' ἢ τὸ ὅσον, σφηνίσκος ἢ μετὰ πλάσι χυλίσκου ἀπὸ ἀλλήλων*.

Brachia item & manuum iuncturas, foemoraq; & inguina atq; genua cōstringere in his qui mœsto ac deiecto sunt animo. In græco hic habetur *ὅτι καὶ σωματελμῶν*, quod reddidi, in his qui mœsto ac deiecto animo sunt. Sunt enim *σωματελμῶν* animo cōtracti & *συγκυρῶν*, hoc est, confusi, & qui spem abiecerunt.

Finis tertij libri commentariorum medicorum.

IANI CORNARIi MEDICI PHYSICI

COMMENTARIORVM MEDICORVM, IN DECem libros Galeni de Compositione medicamentorum secundum locos conscriptorum, Liber IIII

In caput primum. De affectionibus quæ in oculis fiunt.



VO D enim cum compressione, aut tensione, aut obturatione, aut corrosione, aut quibusdā pulsationibus dolent, nobis aperte indicatur. Oculorum dolores cum his affectionibus, & ex his fieri, Galen. aperte indicari nobis ait: quam esse etiam dicat, qui hæc discrimina neq; ab ægris neque à medicis cognosci posse scribant, præsertim si fluxus ex partibus intra cranium, aut etiam extra, & ex arterijs ac uenis in oculos feratur: cuius signum sit quod ægri neque

dilationem, neque obturationem, neque aliud quoddam symptoma se sentire dicant, de nulla re queruli quàm de doloris uexatione, atque hoc non solum in oculorum dolore, sed etiam aliarū corporis partium contingere. Nam quum aliqua externa causa dolorem excitauit, in hac ipsa non adeo difficilis sit cognitio neque doloris, neque affectionis. At uero internum affectum doloris causam cognoscere operosum est, & exercitatum artificem requirit. Quare quum Galenus paucissimis transcurrat has dolorum causas, ut qui uelut ipse meminit, libro 12. Methodi de doloribus & eorum causis egerit, ex 13. Methodi amplius ad oculorum affectus cognoscendos conferentia ostenderit: Visum est no

his è re studio forum fore, etiam hic de doloribus summam quandam adscribere. Omnis itaque Dolor aut ob alterationem aliquam uehementem & acuatim ingruentem fit, aut ob continuitatis diuisionem. Continuitatem diuidunt Ruptio, Contusio, ac Corrosio. Hæc uero aut ex Distentione, aut grauitate, aut mordaci qualitate producuntur. Si itaque externum nihil sit, quod aut distendat, aut grauet, aut corrodat. Distensio sanc ex interno humore multo, aut ex flatu concluso, aut ex multa siccitate oritur. Grauitas à dura aliqua magna aut graui mole corpori extra illapsa contingit, aut etiam ab interno aliquo magno aut graui tumore, Mordax qualitas ex humoribus acerbis ac mordacibus prouenit. Alteratio autem per uehementem contingit calfactionem ac perfrigerationē, siue spirituum, siue humorum, siue partium solidarum. Quare in omni dolore considerandum an multus humor, aut status exitum non habens, aut immodica siccitas, aut grauis rei illapsus, aut gravis tumor, aut mordax humor adsit, aut caliditas aut frigiditas occupauerit. Atque hæc est summa omnium affectionum dolores producentium, quam per longum Galenus 12. Methodi exequitur. Oculorum uero dolores præsertim in inflammatione, Aut ex acrim humorū influxu mordaci, aut ob distentionem tunicarum repletarum uel crassis humoribus, uel flatuosis spiritibus, generantur, uelut idem XIII. Methodi refert.

De pharmacis mordacitatis expertibus ac lenibus. J Mordacitatis expertia sunt quæ græci *ἀσφρα* uocāt, Celsus Lenia dixit. Sunt autē eiusmodi pharmaca non solum lenia per se & acrimoniæ exortia, Verum partes etiam quibus adhibentur leniunt, & à mordacitate liberant, qua gemina significatione etiam *ἐσφρα* & *ἐσφραγισαν* dicuntur, uelut alibi memini. Recenset autem pro leni oculorum medicamento pompholygem, uel imprimis tenuibus & acerbis fluxionibus leniendis sistendisq; ac resiccandis cōmodam. quas uires item spodio & amylo esse dicit. Cæterum quatenus Pompholyx à spodo seu spodio in neutro genere differat, Dioscorides libro 5. & Galenus 9. simpl. pharm. docent, Vnius enim generis Dioscorides esse ait, specie tantum differre. Galenus autem neq; spodio neq; antispodio, quod eandē uim habet, se usum esse dicit, propterea quod semper pompholyge abundarit. Ocularij medici hodie uulgo Tutiam uocant, quanquam alij Cadmiam hac appellatione accipiant, de qua alio loco retuli. sed in pharmacopolijs Nihil appellatur, unde et dictum uulgatum, Nihil oculis commodissimū esse, quo ambigue tum pompholygem oculis utilem, tum oculos non multis medicamentis contingendos esse innunt. Estq; Nihil album appellatum uera pompholyx. Sicut gryseum aut nigrum dictum, uerum spodium metallicum à Dioscoride & Galeno descriptum. Nam quod alijs hodie Spodium officinæ uocant, cum metallicum nihil commune habet, uulgoq; ebur usum esse creditur, Auicenna radi cum cannarum exustarū cinerem spodium esse dicit. Quare qui metallicum græcorum medicorum spodium in usum uertere uelint, recte pompholyge, quod nihil nigrum uulgo uocatur, utentur. Contra qui Spodio Arabum medicorum uti uolunt, aliquando cinerem eum officinarum, siue usti eboris, siue radicū cannarum exustarum, aut cuiuscunq; tandem rei ustæ hæ reliquiæ sunt, (ossis autē esse palam apparet,) assument, aliquando contra metallicū illud in usum adhibebunt. Nam sicut illum cinerem, aut ossium ustarum reliquias, græci medici ignorant, Ita Arabes de utroque quidem trahunt, Verum ita inter se confundunt, ut spodio iuxta ipsorum præscriptū uisuros, diligenter expēdere oporteat, utra res ad subiectum accommodatio existat.

Ericæq; fructus, &c. J Ericam fruticosam esse arbusculam myricæ similem, sed multo minorem Dioscorides tradit. Eius fructum inter adstringentia oculorum pharmaca

pharmaca Galenus hoc loco recenset. Dixi autem fructum καρπὸν græcè dictum: quanquam sciam quosdam malle semen uocare. Verum quā καρπὸς proprie fructum significet, malim ita interpretari, quamuis aliquando, & fortassis etiam hic, nihil referat, semen an fructum eandem rem appellemus uelut etiam alibi commemorari. Quatenus autem differant καρπὸς & σπέρμα explicauit Aristoteles primo de generatione animalium his uerbis. σπέρμα δὲ καὶ καρπὸς διαφέρει τῷ ὕστερον καὶ πρότερον. καρπὸς μὲν γὰρ τὸ πρῶτον ἔσται, σπέρμα δὲ τὸ ἐκ τούτου ἔσται. Quibus uerbis indicat, Semen à fructu secundum prius ac posterius differre: fructus enim ex alio quidem est, Semen autem ex hoc ipso aliud est. Velut exempli gratia, Pomum quidem fructus ex arbore est, Semen autem pomi ex eo ipso est, & quidem posterius fructu, hoc est, ipso pomō. Verum hanc differentiam clarius explicat Galenus libro secundo de alimentis, cuius uerba græcè adscribam. νῦν δὲ ἐπεὶ τῶν καρπῶν ἀσφραγίς, διαρίσεις πρότερον αὐτῶν τῆ σπέρματος, καὶ μετὰ οὗτοι πολλοὶς ὁλοφύσσειται ἐν ὅλῳ, ἢ καρπῶν αὐτῶν, ἢ σπέρμα. τὰ μὲν οὖν καὶ ἡμεῖς λελεγκμέναι σπέρματα βρεχύντι καρπῶν ἀσφάρις. τῶν δὲ νῦν ἀσφραγίστων οὐκ ὀλίγον ἀφ᾽ εἰς, καρπὸς μὲν γὰρ δὲ συνκῆς τῆ συνκῆς, ἢ δὲ τῶν αὐτῶν λελεγκμένων σπέρμα συνκῆς. ἑσπερὶ καὶ τῆς βραχέως ὁλῆς οὐκ εἰς ἀμπίλον καρπὸς μόνον δὲ, τὸ δὲ γινώσκον ἀμπίλον σπέρμα. ἵστανται οὖν αὐτὰ δὲ ἀπὸ τοῦ καὶ μετὰ τῆς ὁ μὲν καρπὸς, ἀπὸ τοῦ καὶ μὴ δὲ, τὸ δὲ σπέρμα τῶν δὲ τῶν αὐτῶν τῶν μίσις αὐτῶν κῆρυς. Cæterum uetus Interpres ubique serè Tamariscum interpretatus est pro erica, quum tamen Tamariscus myricam proprie significet, corrupta uoce ex uera latīna Tamaricis, qua & Plin. & Columella usi sunt. At uero Tamaricem Plinius contra Dioscoridem & Galenum nullum fructum ferre dicit lib. 16. cap. 26. his uerbis. Fructum arborum solæ nullum ferunt, hoc est, ne semen quidem, tamarix scopis tantum nascens, populus, alnus, ulmus, &c. quod itaq; Dioscorides dixit καρπὸν ὡσπερ ἐν δένδρῳ φέρουσα βρυόβιος κατὰ τὸν ὁσπερ, id ipsum Plinius, tum semen, tum fructum esse, aut dici posse non putauit. Porro calices fieri ex trunco myricæ arboris solitos, qui splenicis essent in usu commodi Dioscorides prodit. Sed ea gratia hodie uina ex tamariscis uirgultis cōcinnantur in superiori Germania cisthenana, quæ splenicis utiliter bibuntur, Tamariscina uulgo appellata. quod ut nouissim inuētum adscribere uoluī, quum faciitij huius uini Dioscorides inter tot genera non meminerit, & Democritus apud Constantinum Cæsarem lib. 19. cap. 7. ad eandem rem uinum prunis myricæ superfusum, & sic potatum magis probet.

Siue cū erosione comiformis tunica, & prolapsu uuliformis appellata. De oculorum tunicis & humoribus, earundemq; utilitate Galenus 10. de utilitate partium abunde tractat: quanquam exemplari ita corrupto, ut uix certam sententiam eruere possis. Nos huc nomina tantum adscribemus, ut tum huius, tum aliorum locorū, in quibus ipsorum nomenclatura contingit, facilius intellectum capiamus. Sunt itaq; oculorū tunice quas χροσίδας uocant septem: quanquam ex toto quatuor tantū sint, sed ita ut tribus ex his in duas partes, anteriore uidelicet & interiorē diuisis, septem fiant. Prima itaq; interior est ἀμφιβλεστροειδής, hoc est, Retiformis appellata, quam tamen Galen. neq; colore, neq; substantia, tunicam esse ait, sed partem cerebri putari uidentibus posse. Huius itaq; pars anterior ἀραχοειδής, id est, Araneiformis appellatur. Secūda interior χροσίδας uocatur, hoc est Secundiformis, cuius anterior pars φρυγοειδής, id est, Vniformis dicitur. Tertia κωκκοειδής, id est, Corniformis anteriore sui parte nominatur: posteriore uero σκληρός, id est, dura uocatur. Quarta aut, siue diuisionis partū superiorū respiciendo. Septima tunica, ὀπισθοφωκὴς χιτὼν appellat, hoc est, tunica agnata, propterea quod, ut infra de lippitudine Galen. ait, alijs quæ oculum ipsum cōstituunt tuni-

sim fuisse appareat, quum ex alijs locis, tum ex 13. methodi, ubi nobilis cuiusdam
ocularij qui arterias temporu exciderit, mentionem facit. Porro de hodierna me-
dicorum etiam in publicis gymnasijs secta, dubito an alia quam Empirica voca-
ri mereatur, quum maxima pars eorum neq; ex sectoria corporum arte, neq; ex
rationali speculatione, neq; ex ulla methodi cognitione, neq; aded ex medicoru
scriptoru lectione: nisi hi sint Arabes aut Barbari, atq; aded etiam ipsi Empirici,
sed ex solis experimentis, atq; his non per se, sed per priores, eosq; obscuros indi-
ligenter atq; incostanter factis, ad medicandu progrediantur, ut ne dicā titulos do-
ctriņæ & doctoris (eo enim nihil speciosius, neq; ad imposturā faciendam aprius
hæc ætas in studijs habet) uendi aliquādo rudibus serē omnīū literarum, æque
ut rei medicæ, ac meris Thesialijs afinis, uelut Galenus eiusmodi uocare solet.

Aliqui quidem specilli concavo superficiem deradentes.] Specilli cōcauum
 ἢ καυὸν καὶ σφῆλαις dixi, quam partem auersum specillum Celsus & Scribonius
 dicunt, non solum ad fundendum aliquid ex eo, sed ad deradēdum etiā aptam.
 Sicut contra aduersum specillum πυρῆα μῆλιν vocāt, hoc est cuspidem, uelut su-
 pra ostendi. Videntur tamen græci medici inter se confundere καυὸν καὶ πυρῆ-
 α. Suprà enim lib. 3. de narium polypo, arida pharmaca nō semel per specilli ex-
 pectum ac nucleum, hoc est, ἵνα πυρῆος μῆλιν, admouenda ac indenda esse narī-
 bus dictum est, quod ipsum fieri commodè non possit, si per pyrena cuspidē acu-
 tam accipiamus, uelut suprā in διαπυρῆος appellatis accipi indicauī. Quare illis
 locis πυρῆα pro extremo quidem dicitur, sed non acuto & in cuspidem abeunte,
 uerum cauo & ad fundendum aliquid ex eo apto, hoc est pro ipso καυὸν, quo-
 modo etiā 13. Methodi Galenus usurpauit, ἐπὶ μὲν τῇ χεῖρι ἢ ἰλκῳ inquit, ἵνα
 μῆλιν πυρῆος ὡς πιδόντας ἢ πυρῆα π. φαρμάκων. Hoc ipsum est enim quod Celsus
 lib. 5. cap. 28. de Theriomate dixit. Quicquid autē inspergitur, auerso specillo in-
 fundi debet, ut paulo post Galenus, καὶ τὴν ἀσπερῆσιν νεύοντα ὡς πυρῆα φαρμάκων
 χύοντες ἐφ' ὧν ἢ ἰλκῳ ἀποκαταστήσιν τοῦ π. ἀσπερῆσιν πυρῆος. Sic etiā 5 simp-
 lipharm. γυνώσκει γὰρ ἀκριβῶς τὰ τοιαῦτα φαρμάκα ἵνα τὸν ἢ μῆλιν πυρῆος ἀποκαταστήσιν
 τοῦ σπερμῶος ἢ ἰλκῳ. His itaq; locis πυρῆα non pro cuspidē, sed pro caua
 specilli parte ex qua aliquid fundi potest, & pro rotunda, non acuta accipitur,
 quum in ulceribus uolutari debeat, Atq; hanc significationem uariantem subin-
 dicare uidetur Galenus 9. ἀνταμιγγικῶν. Vbi post διαπυρῆος specillorum siue in-
 strumentorum descriptionem ait, ὅτι μὲν πυρῆος ἢ πυρῆα καὶ ἀσπερῆσιν
 καὶ τὸν ἰλκῳ π. φαρμάκων, ὅτι ἢ πυρῆα καὶ ἀσπερῆσιν ἵλκῳ, καὶ ὅτι καὶ ἰλκῳ, &c. Etenim
 πυρῆα καὶ ἀσπερῆσιν dixisse uidetur ad differentiam acuti, aut concavi, id est, ὅτι
 καυὸν καὶ πυρῆα, quanquā suspicer καυὸν καὶ πυρῆα pro καυὸν καὶ πυρῆα debere legi. Quod si etiā
 sic habeat, tamen non longe post, hanc πυρῆα significationis uarietatem decla-
 rat, his uerbis. Αἰσθάνεται δὲ ὅτι τὸ ἀσπερῆσιν πυρῆα ἵνα π. φαρμάκων, ἢ ἰλκῳ
 καὶ τὸν ἰλκῳ π. φαρμάκων, ὅτι καὶ πυρῆα καὶ ἀσπερῆσιν ἵλκῳ, καὶ ὅτι καὶ ἰλκῳ, &c. Quare planè manifestū sit πυ-
 ρῆα extremū specilli, siue acutum, siue cauum, siue rotundum sit, significare. Nos
 autem quodecūq; ex illis pro rei propositæ apuudine intelligere oportere. Por-
 rò Galenus paulo post marinorum quorundam animalium coria, eūdem usum
 præstare ait, quem specilla concava siue auersa. Intelligit autem Herinaceorum
 cutem, itemq; squatarum, ἡ δὲ ἰλκῳ appellatam, uelut alibi explicauī. Celsus ad
 hunc usum, etiā folium ficulneum probat, atq; asperatum specillum, & inter-
 dum scalpellum laudat, quod sanè Βλεφαροσφύρον Paulus dixit.

In caput

In caput II de lippitudine siue ophthalmia.

Porro collyria Monohemera appellata, quædā priuatim seculēta dicta, multam acaciam in se habent. *μνοήματα* collyria dicta sunt quod una die efficaciam suam declararent, seculenta autem, hoc est *τροπιδία* ab acacia quā recipiūt, sunt appellata. Eorum descriptiones uariæ infra recensentur à Galeno, item Celso lib. 6. & Paulo lib. 7. cap. 15.

In caput III de ulceribus oculorum.

Ulcera oculorū eandem secundum genus curationem requirūt quam alia ulcera. Omnia ulcera eandem secundum genus curationem desiderāt, Nimirum ut siccentur & expurgentur. Verum hæc ratio immutatur pro partium in quibus ulcus est natura, quā alia magis, alia minus hæc genera requirant. Quare hic lenissima esse oportere ait pharmaca, quæ oculorum ulceribus adhibentur, quorum tamen uim iuxta affectionis uehementiam augere semper cōuenit. Sic uero etiam alia partes suam indicationē habent, & ut Galenus ait siccissima medicamenta in humidis maxime glandis ulceribus requiruntur, propterea quod siccior eius partis natura existat, quæ omnia uidere est apud Galenum lib. 3. 4. ac 5. methodi assatim tradita & declarata.

Quidam etiam polygoni succum ammiscuerunt. Polygonum frigida esse facultatis in principio tertij ordinis, itemq; adstringendi uim aliquā habere, Galenus 8. simpl. phar. ait. unde sanē ad ulcera inflammata, & fluore imperita, cōmōdum pharmacū fuerit eius succus, uelut etiam hic tradidit. Latini sanguinariam ac sanguinalem appellant, quod sanguinis reiectionem, & fluorem undecunque feratur sistat. Verū græcis *πλυγών* appellatio ex geniculorū multitudine esse uidetur, & quod ut Dioscor. ait *γόνια σωκῆ ἔχει ἰσχυμένα ἀλλήλοις ἀπὲρ σελήνης γόνι*, aut à multitudine seminis, ut Plin. ait. hoc est, *ἐν πολλῷ ἔχει γόνι*, quod item Dioscor. de eo præsertim masculo testatur. Sed Scribon. cap. 4. 7. uel herbam, inquit, quæ quia multa est, & ubique nascitur, polygonon appellatur, non δὲ τῶν ἡνερῶν, neq; δὲ τῶν γόνιων ἀνέματος, sed ἀπὲρ πᾶν γόνιον πάντα τοῦ πόνου, appellationem deriuans: quod haud scio an non sit ab interprete eius libri effectum & adiectū. Habet tamen sic etiam Marcellus cap. 10. sed uerbenæ latine appellatione præscripta, quam ego expungendam existimo, & pro uerbenam herbam, Vel herbam quæ quia, &c. scribendum: quanquam idem multis herbis polygoni appellationem tradat, ueluti millefolio & rubiæ cap. 1. & amplius cap. 9. dicat, herbam quam Græci polygonum, nos aliquot uocabulis, sed præcipue sanguinalem dicimus: ut forte & uerbena polygonos sit appellata. Quin & cap. 17. herbæ inquit, polygoni quæ ut opinor Tiniaria uocatur, sed eum locū ex Serapionio sumpsit, apud quem falsò *πλύγ* pro *πλύγων* habetur.

Quapropter etiam aspritudines exurpat nō paruas modo, sed magnas: quæ sycoses græci à granorū sycus similitudine appellant. Aspritudines palpebræ internæ si paruæ sunt *πραχμα* uocantur, si uero aulescant, ut uelut incisuris quasdam habeant, *συνέες* dicuntur, quod ferè *βυρραίδιαι*, hoc est, sycus granulorum similitudinem referāt. Quum uero eiusmodi aspritudines inueteratæ iam in callum abeunt, *τέλειαι* uitium appellatur. Nos antiquos callos conuertimus. Sicut *σπέρμα* quæ mox sequuntur, oculorū ungues reddidimus, Celsum in hoc imitati, qui lib. 7. hoc malū sic describit, Unguis inquit, quod *σπέρμα* græci uocant, est membranula neruosis oriens ab angulo, quæ nonnunquam ad pupilam quoq; peruenit eiq; officit. Paulus libro 3. cap. 22. ferè eadem uerba habet τὸ σπέρμα inquit, *μερόδες ἐστὶ τῷ ὀφθαλμῷ τὸ ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἐκπορεύον, ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ μὲν ἀπὲρ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ, ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ*. Idem tamen Paulus

Paulus eodem loco non *αἰγύρια* unguem, id est, *ἔρυα* græcis appellari tradit, sed *ἔρυα*, hoc est unguem uocari, ubi corniformi tunica in superficie suppurata, pus ipsum figurâ ungui simile apparet. Est autem & *αἰγύρια* circa ungues digitorum, tum in manibus, tum in pedibus, uisū, in quo caro exulcerata ab ungue recedit. Sunt præterea *αἰγύρια* etiam nasi partes, quas Alas conuerti libro primo de difficultate spirandi, ex Galeno nuper à me cum alijs quibusdā eius argumenti libellis edito. Nam idem lib. ii. de utilitate partium *αἰγύρια* τὰ κατὰ πρὸς τὴν σὺν τῇ *ἐνὶ τῇ* nominari scribit. Est autem & *ὀφθαλμία* non tantum palpebrarū oculorum aspritudine, sed & podicis ulcus, ex nimia attritione generatū, quod & marisca, quæ alias species ficus est, appellatur. Iuuenalis poeta quū dixit, Cedunt tumidæ medico ridente mariscæ, ad obscenam & libidinofam earū partiū attritionem respexit. Sicut Martialis ad attritionem ex equitatione, in apophoreis. Ephippium. Stragula uellinī uenator fume ueredi. Nam solet à nudo surgere ficus equo. Quare uel his locis redarguuntur quī Mariscas hæmorrhoidas interpretantur. Neq; enim uerisimile est tam crudelem medicum fore, ut risurus sit in hæmorrhoidibus amputandis, quæ locales sunt uenarum in sede dilatationes, quandoq; in callum transeuntes, nō ex pathica libidine inducē, uelut mariscæ, quæ proinde medico ridente pertūduntur, quum sint alias etiam ulcus *ἐνὶ τῇ*, id est, carnosum. Vocantur præterea *ὄνυα* & *συνέλις ὄνυα* atq; *ὀφθαλμία* *ἐν τῇ*, in capite & mento, itemq; reliquo corpore tubercula, ulceroſa, rotunda, subdura, rubicunda, cum dolore, ut Aetius 8. cap. 14. ex Orbasio & Critone tradit, & infra Galenus huius operis quod exponimus libro quinto.

In caput IIII. De ocularium pharmacorum uisibus.

IN hoc genere esse existimandum est tum gummi, tum tragacantham. Gummi & tragacanthæ aqua maceratarum eundem usum esse posse, quī est liquoris albi ouorū, ac lactis muliebris, ac fœni græci decocti, Galenus docet, ad collyria nimirum cogēda, atq; etiam ad serosos humores ex oleis eluendos. priorem utilitatem etiam Celsus indicauit, his uerbis. Gūmi quum quasdam alias facultates habeat, hoc maxime præstat, ut ubi collyria facta inaruerūt, glutinata sint neque frientur. Cæterū quum multa sint gummi genera ex diuersis arboribus provenientia, quando solum *κόμμι* reperitur scriptum, de eo quod uulgo etiam hodie gummi simpliciter, & aliquando Arabicum dici solet, intelligendum est. Enascitur autem ex Acacia arbore Aegypti, ut Dioscor. lib. i. ait. καὶ κόμμι δὲ inquit, καὶ τὸ ἀκόνδιον ἢ ἡρακλέα. Vnde etiam Marcellus cap. 14. gummi acanthinum uocauit, atq; hoc est quod Plinius 13. cap. 11. ait. Gummi optimum esse ex Aegyptiā spina conuenit, uermiculatum, colore glauco, purum sine cortice, dentibus adhærens. Primas duas differentias, uermiculati uidelicet & coloris, non tamen glauci, sed albi, etiam Aetius expressit 9. cap. 37. ubi *κόμμιος σπάλκτος* & *λευκὸν* mentionem facit. Scribonius inter ocularia pharmaca gummi Alexandrinū probauit, infra uero in Hæmatitino collyrio gummi Thebaicū laudatur, quæ omnia nihil aliud sunt quàm ipsum Arabicum gummi.

Ex pharmacorum ad scabras in palpebris affectiones conuenientium numero, sunt Sales ammoniaci, & lapis Asiæ tum ipse, tum flos ipsius, &c. De sale ammoniaco & reliquis medicamentis ocularibus hoc loco à Galeno adductis, si quis amplius desyderat cognosse, habet Dioscoridem itemq; Galenum in simpl. pharm. libris, in quibus ea requirere potest, Nos quum difficiliore tantū locos exponere instituerimus, eos modo prosequemur, quemadmodū etiam hæcenus fecimus. Quare hoc loco de lapide Asio, eiusq; flore, etiam hoc commune faciemus studiosos, quod non ita apud illos autores, neq; apud alios quosuis expo-

fitum est. *Assus* itaq; lapis appellationem ab *Asia* in qua nascitur habere uidetur. *Galen.* autem. 9. *simpl. pharm.* *Assium* lapidem uocat. & ab *Assio* oppido in quo nascitur uocari dicit, & plane eundem describit, quem *Dioscorides* *Assium* uocat, eiq; florem eundem tribuit, ut nulla suspicio relinquatur, alium esse lapidem *Assium* *Galen.* alium *Assium* *Dioscoridis*, sed eundem & *Assium* & *Assium* uocari, altera appellatione ab *Assio* oppido, altera à tota regione *Asia*, in qua et ipsum oppidum est, deducta. Caterum *Plinius* *Assium* lapidem lib. 36. cap. 17. describens, eundem penitus indicat qui à *Dioscor.* & *Galeno* describitur. Verum in principio eius loci, In *Assio* inquit, *Troadis* *Sarcophagus* lapis scissili uena scindit, corpora defunctorum condita in eo absumi constat intra 40. diem, exceptis dentibus. Et libro 2. cap. 96. At circa *Assion* *Troadis* lapis nascitur, quo consumuntur omnia corpora, *Sarcophagus* uocatur. quibus uerbis indicare uidetur, *Sarcophagum* alium lapidē esse quā quem postea *Assium* dicit. *Sarcophagū* enim lib. 21. inter miracula recenset, sed lib. 36. palam inter *sarcophagum* in *Assio* nascentem, & *Assium* distinguit, quum de utroq; seorsim tradat. Ego autem *Sarcophagū* lapidem eundem esse quem *Assium* constanter contra *Plinium* sentio, quem deceptum ex eo puto, quod apud alios græcos autores, unde sua transcripsit, de *Assio* lapide in *Assio* nascente legit, & rursus apud alios de *Assio* simpliciter, quæ occasio fuit ei *Assium* alium ab *Assio* lapide putandi ac prodendi. Est autem hoc uel maximum argumentum, quod neq; *Dioscor.* neq; *Galen.* neq; *Aetius*, neq; *Paulus*, *sarcophagi* seorsim mentionem fecerūt, quem haud dubie seorsim explicassent, si alium ab *Assio* putassent, atq; *Galenus* sanè *Assium* ob id maluisse appellare uidetur, ut non alium esse putandi cuiquam occasionem daret, quā *Sarcophagum*, qui uidelicet in *Assio* nascitur. Quod autem corpora defunctorū *Assus* lapis absumat, *Dioscorides* itē dixit, *ὅτι σαρξί, inquit, σαρκοφάγος γίνονται*, hoc est, loculi defunctorum carnes absumentes ex eo fiunt, quanquam is locus mire sit ab interpretibus corruptus. *Galen.* uero id ipsum de eo testificatum reliquit, solum ea tradens quæ ex ipso ad rem medicam conuectit. Est itaq; idem lapis *Assus* & *Assius*, ac *Sarcophagus* appellatus. Cuius rei testimoniū ex *Cello* lib. 4. cap. 24. abunde suppetit, ubi ait, Lapis etiam qui carnē exedit quem *σαρκοφάγος* græci uocant, excisus sic ut pedes capiat, demissos eos quum dolent, & recentosq; si leuare consuevit, ex quo in *Asia* lapidi *Assio* gratia est. His uerbis *Celsus* palā ostendit *Sarcophagum* *Assium* lapidē esse, Nam eandem uim *Dioscorides* *Assio* adscribit, *κατασπινάζονται δὲ καὶ πόδια καὶ χεῖρες αὐτῶν, οἱ δὲ ἐν ποταμῶν καὶ ποταμῶν ὅτι θύνη ἀφαιρούνται*. Quin ipse etiam *Plinius* hoc auxilium de *Assio* lapide prodidit. *Assus* inquit podagras lenit, pedibus in uase ex eo cauato inditis, Sed tamen *sarcophagū* aliū esse putauit, deceptus ex eo quod etiā *Assium* aliū ab *Assio* esse putaret, quū uelut dixi, iam de *Assio*, tam de *Assio* apud græcos medicos reperiret.

In cap. v. de aridis medicamentis oculis conducentibus.

Ex crescentem item iuxta nasi angulum carnem encanthida appellatā, &c.) *ἐγκανθίδα* incrementum supra iustum modū carunculae naturalis, circum angulum oculi angulum esse, *Paulus* lib. 3. ait. Idem *μίλας* quæ mox sequentia palpebrarū defluuia exposuimus, *μαδάρσιον* appellat. Idem enim esse *μαδάρσιον* ac *μίλας* dicit, & exponit *ἐπιπύσιον τὸ βλεφάρου πρυμνὸν τὸ ἐν πύθῳ* esse. Ad hæc itaque uitia, alia atque alia ex aridis collirijs commoda esse dicit, & inter ea quæ propterea quod lachrymas proliciant, & fluxiones repellant, *ἐπιδακρυτικά* & *ἐπιπρυτικά* appellantur. *ἐπιδακρυτικά* enim delachrymatia, & cientia ipsas lachrymas dixit, quanquam uice uersa etiam pro suppressantibus, & intercipientibus *ἐπιδακρυτικά* dici possint, Sicut *ἐπιφλεγματισμοὶ* etiam dicuntur, qui piteui

tam detrahunt, atq; ita fluorem eius sistunt ac intercipiunt. Habent enim aliqua uerba ex ἔξ composita, tales contrarias serē sibi ipsi significaciones, uelut etiam ἐκλαμβάνω pro recipio & recupero usurpatur. Paulus 3. de uteri strangulatu, καὶ οὕτως ἐκλαμβάνουσιν τὸ τε νεῖον καὶ τὸ διδύμω. Et rursus pro extraho & euello apud eundem lib. 4. cap. 46. εἰ ἂν ἡ γυνὴ οὕτως ὀδύνηται πρὸς σκέλην, ὥστε τὸν τοῦτο ἔλκεος τοῦ χιτῶνος, & τὸν ἐκλαχῆσαι, &c. Hippocrates quum alibi, tum. 2. prædictionum ἐκ λήψεως οὕτως dixit, Galenus ὀδύνην exponit. Galen. infra in Monohemero Scripgi ophthalmici, κατὰ τὸ ἐκλαχῆσαι dixit, post prolectas lachrymas. Scribonius uero aut eius interpretes, ad delachrymationem, dixisse uidetur pro μίχρῃ ἔκλαχῆσαι, cap. 37. Deinde inquit, hoc medicamento suffricatur curiose ad delachrymationem, Sic etiam usurpat Marcellus cap. 8. ex quo etiam Scribonij lectio corrupta eo loco, restitui in integrum potest. Plinius 34. cap. 11. de ærugine. Vis eius collyrijs oculorum aptissima, & delachrymationibus mordendo proficiens, sed abluī necessarium pennis calidis, donec rodere desinat.

Aur aliquo fuluo & odorato, uelut est Tmolites, Ariusiusq; & Lesbium. J. De horum uinorum facultatibus Galenus 12. Methodi abunde docet, & nos etiam supra mentionē fecimus, Meminit & Plinius 14. cap. 7. sed Ariusium pro Ariusium legitur quemadmodum, &c. apud Virgilē cloga. 5. Arusia legitur, & à ple-risq; omnibus exponitur, in uersu. Vina nouū fundam calathis Arusia Nectar.

Aeris usti unciam unam quod est drach. viii. piperis albi tantundem, folij malabathri tantundem, sibi hemiolium, quod est drach. xii. J. Vnciam drachmas viii. pendere frequens est apud Galenum quum in his, tum in alijs medicamentarijs libris, quanquam quinto καὶ ἥμισυ, plurimos septem & dimidiæ drachmæ, aliquos septem tantum, aliquos octo drachmarum statuissē unciam dicat, quæ dissensio denarij Romani respectu facta putanda est, quum Denarij septem unciam Romanam constituant iuxta Celsum ac Scribonium, Quare qui septem drach. in uncia esse dixerunt, denarios Romanos intellexisse putandū est, quum drachma pro denario aliquando ab ipso etiam Galeno usurpetur, ut alibi ostendā. Qui uero unciam septem drachmarum & dimidiæ dixerunt, itemq; qui octo, ad expensum pondus mihi respexisse uidentur, iuxta quod discordare alteros ab alteris, dimidiā plus minus drachma, non est mirum, quum fieri poterit, ut alteri minus ponderosos denarios, itemq; drachmas expēderint. In cōmuni autē omnes qui de ponderibus apud græcos tradiderunt, uncia drach. viii. faciunt. Sicut Celsus & Scribonius, itemq; Plinius, eandem septem denariorum statuūt. Celsi uerba sunt lib. 5. cap. 17. Sed & antea sciri uolo, in uncia pondus denariorum septem esse. Scribonij autē præfatio sic habet. Erit aut nota denarij unius pro græca drachma. æque enim in libra denarij octoginta quatuor apud nos sunt, quot drachmæ apud Græcos incurrunt. Quāquam Marcellus medicus antiquus nuper à nobis editus, eam ipsam epistolam Cornelio Cello adscribat, Sicut & aliam ab eodem Cello ad Pullium Natalem scriptam, in qua idem traditur his uerbis. Græci medici pondera medicamentorum ad drachmas redigunt, quæ quia ad denarium nostrum cōueniunt, octoginta enim & quatuor in libram incurrunt, pro nota græcæ drachmæ quæ est figura. z. notam denarij latinam, quam nostri posui, id est, hanc. * . & ad eius pondus græcas drachmas rediges. His itaque locis drachmam argenteam accipere oportet, non Atticam siue medicam, quarum octio unciam efficiunt, uelut alibi uberius ostendi. Plinius porro quāquam lib. 21. cap. ult. Atticam drachmam & medicam, cum argentea ac denario confundat, tamen lib. 33. cap. 9. palam declarat. Denarios septem in uncia esse, his uerbis: Miscuit denatio triumuir Antonius ferrū, Miscuit ari fallax moneta, Alij è pōdere subtrahūt,

quum sit iustum octogintaquatuor ē libris signari. Si itaq; ex libra argenti denarij LXXXIII. sunt signati, uncia omnino denariorū septem fuit, quum duodecim unciaē libram cōstituant. Cōueniēq; huic rationi hodiernus argenteus nummus, qui ad aurei unius Rhenani ualorē percutitur, & uncialis existit, & septem denarios aequiuales habet, Saxoniae principum monetē, Schreckenbergos dictos. Duodecim enim Vnciales argentei nūmi, eorū denariorū LXXXIII. ualent. Et nos sane iam saepe expendimus denarios ueteres iuste signatos, planeq; idē pondus in Denario & Schreckenbergo, siue Angelfco appellato grosso inuenimus; atq; inde adeo aestimare licet etiā Denarij ualorē, itemq; assis, quorū decem denarius ualebat. Quo autē res in hunc diem à nemine ex tot qui de ponderibus nuper scripserunt ad plenum intellecta clarior fiat, explicabo & Martialis poetæ locum huc pertinentē, in quo indicatur aperte, sed tamen uerbis satis obscuris, etiā auretum nummū septem denariorū fuisse, & nō octo, ut ferē omnes tradunt. Pondere autem etiā drachmalem, non ut ab iisdem proditur didrachmalem perpetuo. Locus Martialis sic habet lib. 10.

Natales mihi Martiae calendae,
Lux formosior omnibus calendis,
Qua mittunt mihi munus & puellae.
Quinquagesima liba, septimamq;
Vestris addimus hanc focis acerram.
His uos si tamen expedit roganti
Annos addite ter precor nouenos.
Vt nondum nimia piger senectas
Sed uitae tribus aureis peractis
Lucos Elysiæ petam puellae.
Post hæc tempora nec diem rogabo.

Dicit poeta se quinquagesima liba, septimamq; acerrā addere focis, quo innuit, se iam septimū supra quinquagesimū annum agere, & precatur deinceps sibi ad hanc transactā ætatem addi annos ter nouenos, quorū omnīū annorum summa excurrit ad annos LXXXIII. quos ubi impleuerit, post hæc tēpora nec diem amplius se rogaturū dicit, utpote qui satis diu uiixerit, & pigrā ac decrepitā senectam nō expetat. Esse enim hoc tēpus uitae tribus aureis peractis, hoc est implese se se tum tot annos, quot sestertios nummos tres aurei ualent. Iam quum dixerit se optare uitam nō ultra LXXXIII. annum, palam est LXXXIII. sestertios, tres aureos ualuisse. Si igitur supputaueris, in aureo uno denarios VII. reperiēs, & in denario sestertios III. atq; ita continget ut in tribus aureis sestertios LXXXIII. inuenias, quot annos poeta uiuere optat. Porro ex his locis intelligis, unciam argenti habuisse ualorem drachmæ auri, siue drachmalis aurei, quem etiā Plinius Denarium ex auro dixit, lib. 33. cap. 3. Cæterū quod hemiolium stibij, drach. XII. faciat, palā est, Nam XII. drachmæ ad VIII. collatæ, eas in totū, & insuper ipsarū dimidiū repræsentāt, quæ uocis Hemiolij significatio in rebus omnibus existit. Hemiola enim proportio est quæ totū & dimidiū eius ad qd collatio sit cōtinet. At uero quod Stibij dixi & græcis σίβη est, hodie uulgo antimonij appellatur.

In caput VI. De aridis pharmacis ad oculos ab Asclepiade conscriptis.

EX libris Philoxeni aridū achariston.] *ἀχρεστον* uidetur appellari hoc medicamentū, quod digna gratia ipsi referri nō queat. Habet & Celsus collitū Theodoti Acharistū appellatū, sed non est idem cum isto. Sicut neq; quod Marcellus refert cap. 8. ab Antigono inuētum, itidem Achariston Theodoti appellatum. Est autem & antidotus *ἀχρεστον* appellata, cuius descriptionem recenset

reliqui corporis ulceribus expleri indigenibus, commodæ existant.

Tomentorum purpuræ Laconicæ drach. viii.] Tomena purpuræ Laconicæ, hoc est *λεονίδας πορφύρας λακωνικῆς*, non esse alia quam quæ à lana purpuræ laconicæ cruore imbuta sint detracta, supra abunde ostendi, contra quorundam opinionem qui ipsas purpuras lanas habere affirmarunt. Cæterum hic Laconicam purpuram præ alijs probat, quemadmodum supra Tyrias laudauit. Opimæ autem purpuræ ubi in totum sint, Plinius 35. cap. 6. ostendit, quum de purpurillo inquit. Quare Putcolanum potius laudatur quam Tyrium aut Geulicis, uel Laconicum, unde præciosisimæ purpuræ. Idem lib. 6. cap. 36. tradit.

Pharmaca cum Calliblepharon exornandis palpebris accommodatum.] Calliblephara pharmaca dicuntur à pulchritudine & decore quem palpebris addunt, siue collyria siue smegmata alias ea ipsa appellare uelis. Cæterum in eo quod Serapianum appellat. folij drach. ii. hoc est *φύλλων φασγ. B.* habentur. *φύλλων* autem simpliciter hic dictum est, quod supra in suo arido pharmaco Galenus *μαλαβάρην φύλλων* appellauit, Hunc enim morem ueteribus fuisse uideo, ut simpliciter *φύλλων* nominarint, quum etiam reuera folium sit paludibus Indicis innatans, ut Dioscorides ait, *ιδίον γὰρ ἐστὶν ἄλλος φύλλων ὅτι τοῖς ἐνδὲς τοῖς ἰσχυροῖς, φύλλων ὅν ἐστὶν ἰσχυρὸν τῷ ὄφθαλμῳ, &c.* At uero in hoc diligenter animaduersione habere oportet, ne *φύλλων* de malabathri uel Indico folio, ut hodie etiam dicunt, dictum, pro phyllo accipiamus herba, quæ apud eundem lib. 3. describitur, aut uice uersa. Sequitur mox in alio Calliblepharo, palmularum ossicula assanda siue cremāda esse in figulino, quod remedium etiam Plinius tradit 23. cap. 4. fine. Nuclei palmarum inquit, cremati in fictili nouo, cinere loto spodiij uicem efficiunt, miscenturq; collyrijs & calliblephara faciunt addito nardo. habet & Dioscorides lib. 1. de palma.

In cap. vii. Liquidæ oculares compositiones.

Aliud Phedri Rhinion, id est Limula.] Rhinion appellatum uidetur hoc medicamentum, itemq; alia eius generis diminutiva uoce, hoc est limula, *φίμα* enim significat, quod ad limæ similitudinem deterat oculorum cicatrices & callos, atq; hoc propter alcyonium, & lapidis Asij florem, ac æruginem quæ uim habet uelut Dioscorides ait *ἐξ οὗ τῶν τῶν ὅτι ἐσθλα μὲν ὠλάει, καὶ λευκίζει, & δ' ἀπὸ τῶν ἄλλων.* Habet autem & Celsus unam atq; alteram descriptionem collyriorum quæ Rhinia uocat, sed ab hac diuersas, quanquam non in aliud usum paratas. Habet & Paulus lib. 7. quod Rhinarion uocat eadē ratione & usu compositum. Refertur & *ἰνὴ φέρμα* inscripsum, eundem scopum & compositionis & appellationis habens.

Aegyptia ad callos & albugines, aufert etiam pelliculas confestim.] Albugines & cicatrices distinguit ita Paulus libro tertio, ut has in superficie consistere dicat, & non solum *ὠλάει*, sed & *ἐν φιλίᾳ* appellari. Illas uero *ἀνυλόμενα* dictas, altius progressas cicatrices esse. Cæterum in prima compositione Aegyptia, Nitri nigri, hoc est *μέλας*, sesquidrachma habetur, tamen si rosas concolor & album nitrum Dioscorides præferat. Verum in secunda compositione Aegyptia in græco exemplari, *νίτρον μέλαν B.* corrupte legitur. Est enim legendum *νίτρον μέλας φασγ. B.* uelut nos reddidimus. Sequitur compositio ex acenis uisum, faciens & ad glaucedinem, in qua fellis perdictis syluestris partem unam, in alio exemplari, succi herbe perdictij legitur, atq; de hac lectionis diuersitate recte conuincit uel Antonius Musa cui pharmacum inscribitur, uel ipse Galenus, quum ualde diuersæ res sint succus herbe perdictij, & fel perdictis syluestris, & ad præsentem usum fel longe accommodatius ac efficacius sit. (uelut etiam alia fellis genera, quorum supra ad suffusos Galenus mentionem fecit,) quum perdictij succus. Apud græcos autem facilis fuit occasio substituendi, *πρὸς δὲ τὴν βρογχίτιν*

modi f: illis genera præter cōmunem cum omnibus alijs acrem ac resiccioriam uim, uidentur etiā aliquid à naturæ proprietate habere ad eiusmodi uitia sananda, quemadmodū etiam sanguis uestertilionū, qui ibidem mox additur. De quo tamen quid in totū sentiendū sit, agit Galenus lib. 10. simp. phar. Porro medicamentis ad *πριχασιν* comparatis cōtraria sunt quæ defluos pilos glutinant, quæ mox subiungit, inter quæ pix & lithocolla habentur. Est aut lithocolla non eadē quæ & *συλοκωλα* & *παντοκωλα*, & simpliciter *λιθα*, hoc est, glutinū appellatur, sed glutinis, cū marmore aut lapide panio mixtura, uelut Dioscorides lib. 5. tradit, ubi & hunc usum eius refert.

Ad paruos instar ordeī oblongos, circa pilos palpebrarum abscessus, crithas & posthias Græci appellant.] *κεδαι* græcis à similitudine ad ordeī figurā dictas esse, palam est. Sicut easdem *πιδιαι* appellarūt, nomine, ut equidem puto, à similitudine ad *πιδιον*, id est, præputium pudendi uinilis deducto. Paulus abscessum paruū oblongū esse, crithen scribit, iuxta palpebræ summitatē, quam ipse *πρσόν* appellat. *κεδαι* inquit, *εστιν ἀρεταμεινον κρεττον του τ βλεφαρον πρσόν επιμακτα*. Sic uero etiam Archigenes infra eam palpebræ partem *πρσόν* dicit, quam alam siue marginem palpebræ dicere possis. Galen. certe in glossis Hippoc. *πρσόν* appellari dicit *πρωτον περιπλευσινωδον*, id est, quicquid est dilatatum. Sequitur paulo post pharmacum ad *χαλάρια*, hoc est, instar grandinis in palpebris tubercula. Paulus *χαλάριον* inquit, *εστιν ἐργον ὅμοιον συνέσει κρεττον του βλεφαρον*, quibus uerbis concretionem lenti humoris in palpebra chala zion esse dicit. *ἀσπρωγας* Galeno inscriptæ autor *χαλάρια* inquit, *εστιν ὁμοιων τινε γυαλιου του βλεφαρον επιμακτα πρσόνι γραμμεται. κρεττον του χαλάρου*. Hoc est, Grandinatio sunt rotundæ quædam intra palpebrā emittentia, ad grandinis similitudinē circūscriptæ. Sequitur mox aliud ad Aegilopas. Describit autem Paulus Aegilopa abscessum esse inter magnū oculi angulū ac nasum, qui trumpatur & si negligētius tractetur, in fistulam abeat, usq; ad os ipsum progredientem. Prius quā uero abscessus is in ulcus erumpat Anchiropa uocari. Porro Illecebræ succus, cuius in pharmaco mentionem facit, est ex andrachne agria, id est, syluestri portulaca, quæ sic, illecebra uidelicet, latine appellatur, uelut etiam Plinius testatur. Est autē eadem quæ Aizoön tum minus, tum agreste, itemq; semperuiuum, & Telephium appellatur, uelut in glossis Hippocratis Galenus testatur.

Illitio Anthera eadem hora iuuans.] Græcū exemplar habet *ανθηρα ανθηρα*, adiecto asterisco indicante dubiam lectionem, & potest certe uideri *ανθηρα* legendum esse ut illitionem antheram, hoc est floridam accipiamus. potest item *ανθηρα* legi, significatione quod hæc illitio eadem hora uel die opituletur (Nam non infrequens est & hoc græcis medicis, ut horā pro die dicant) atq; sic *ανθηρα* idem sit, quod alias *ανθημερον*, & suprà *μανημερον* dixit, & quod paulo inferius *παρημερον* & *ανθηρα* dicit. Ceterū in ipsam illitionem cinnabari additur, illud uidelicet quod à Libya afferri Dioscorides dicit, de quo alibi tractaui, cui amplius uim eandem hæmantæ lapidi idē tribuit ad ocularia medicamēta, sed intensiorē, cuius respectu fortassis Anthera illitio uocari possit, quū ipse Plin. 35. c. 6. inter floridos colores ipsum cinnabari recenseat. Ego utrāq; uocem reddidi, tamen non multū retulerit, quo modo uoces medicamentū, modo de re, & usu constet, quæ ambo alias sunt manifeste expressa. Porro Antheras uocari cōpositiones non tantū stomatīcas, sed etiam alijs partibus cōuenientes, & nō à floribus rosarū, uerum à floridis coloribus, qui in eas cōpositiones recipiuntur, & non solum siccas quæ pulueris specie inspergi possint, sed etiam melle exceptas ac permixtas, ex multis locis declarari potest, cōtra q̄ uulgò persuasum est, & quidā prodere nō dubitauerūt.

Et sanè hæc illitio quã hoc loco Galenus præscribit, Anthera appellata, nõ ulceribus oris destinata est, sed oculorum fluxionibus: deinde flores rosarũ non recipit, ut inde *ἀνθηρὰ* uocata uideri possit, sed cinnabari, quod ipsum inter floridos colores à Plinio uelut dixi, recensetur. Postremo nõ sicca inspergitur, sed trita à modico melle excepta illinitur, quod tamẽ etiam in Antheris ori destinatis fieri posse Celsus lib. 6. cap. 11. testatur, & Aetius 8. cap. 46. Sanat enim, inquit Aetius, in totũ ulcerationes ipsas tum sicce adhibet, tum illitæ cum melle. Idem Aetius eodẽ loco non ita longe post floridam cõpositionem habet, qua ad putrefacta, & abscessus gingiuarũ sicca uti iubet, ad crustas uero cum melle: & in ipsam cõpositionem flores rosarũ addi quidem posse ait, sed non recipit, sicut etiam Galenus eandẽ referens infra lib. 6. cap. 1. ut *ἀνθηρὰ παρὰ τῆς ἀνθης ἢ ῥόδου* appellata uideri nequeat, quũ rosarũ flores recipi & relinqui pro arbitrio usuri possint. & Paulus quidẽ lib. 7. cap. 13. phar. macũ *ἀνθηρὸν*, hoc est floridũ, habet penè idem quod Aetius, sed additis omnino rosarũ floribus. Verũ Galenus lib. 5. compos. phar. κατὰ γῆρας, inter arida ab Andromachò prodita recenset duas Antheras cõpositiones, alterã qua se uti dicit, alteram Magni medici, sed in neutram rosarũ flores ammiscentur. Quare palàm est hæc medicamenta nõ à floribus rosarũ Anthera, id est florida esse appellata, sed ut ego iudico, à florido colore quẽ habent, maxime ex sandaracha, quã omnes omnium antherarũ descriptiones admixtam habet. Et quanquam Plinius Sandarachã inter floridos colores non recenseat, tamen in his nihil aliud uidet *ἀνθηρὸν γῆμα* efficere, quàm ipsa sandaracha. Sicut in hac anthera Galeni illitione ad oculos, eundem colorem nihil aliud facit quàm cinnabari, cuius colorem etiã in Sandaracha Dioscor. probat. atq; ut hæc tota res clarior adhuc fiat, locum ex 5. libro Galeni κατὰ γῆρας adscribere non pigebit, ex qua omnino manifestum sit eiusmodi cõpositiones nõ aliunde quàm à colore florido, antheras appellari, quũ nõ solũ *ἀνθηρὰ*, sed etiam *ἀνθίζουσα*, hoc est, floridum colorem referentes appellentur, & hoc maxime ex sandaracha. Galeni uerba sic habent. *ἀνθίζουσα καὶ μεγάλου πλεῖς σπινθόνας, νομὸς, ἀνθρακας, ἡφρύγια, ὠπτε πινυέσσουσιν, ποῖα καὶ πλεῖς τῆς ὅτι τῷ σώματι νομὸς. συνθῆρας ῥιζὴς δισαχ. 8. χαλκὸν δισαχ. 5. σάνδαρον 8. δισαχ. 7. σιδῆρον ῥιζὴς ἑκατὼ δισαχ. 6. χαλκὸν δισαχ. 10. μίσους δισαχ. 6. οὐρεας δισαχ. 6. ἀμφακίου ἑκατὼ δισαχ. 6. γῆμα ῥόδου 6. μετὰ μέλιτι.* Huc accedit quod Hesychius *ἀνθηρὰ* uocem τῶν σπινθάρων, exponit. At uero cinnabari abusiue minium fuisse dictum, & à quibusdam creditũ, ex Plinio ac Dioscor. supra ostendi. Quare quod Celsus lib. 4. cap. 15. ad cancerem intestinorum minij glebam probat, & lib. 6. in liquido Euelpidis collyrio minium combustum habet, de cinnabari dictum uideri possit, quam uidelicet abusiue etiam ipse Celsus minium dixerit. Sed malo ego Minium Sinopicum intelligere, cuius mentionem in Smilio collyrio paulo ante facit. Nam hoc in medicamẽta recipitur etiam Dioscor. ac Plin. testibus, atque à Celso eo loco ad sordida ulcera expurganda proditur, ob resiccandi uim in ipso præcellentem. Veruntamen quum Minium hispanum uenenum in medicamenta non recipi, & Dioscorides & Plinius dixerint, Contrã uero Strabo libro tertio inadat ex Tudertania hispaniæ euehi minium sinopica terra non deterius, possit uideri alicut Celsus in hac opinionum diuersitate, ipsum Minium hispanum significare, & in horum numero esse, quos Dioscorides & Plinius in hoc errore uersari dixerunt, ut minium hispanum pro cinnabari accipiant, aut etiam pro minio sinopico appellato. Sed præstat in eiusmodi dubijs rebus ad optima mẽtem inclinare, & suspectis cautissime uti: atque hac parte Dioscoridis & Plinij autoritas præualere Strabonis opinionem debet, qui fortassis neque hoc ad rei medicæ usum respiciendo dixit, sed ad publicam in usum pictoriæ æstimationem.

Sequuntur

Sequitur mox lychniū & phloginiū specioſæ medicamentorum inuſitatum ap-
pellationes, à lucerna, & flamma deductæ, & phosphorus à luce ferenda. Sicut à
colore Pſittacus, euehrum, & phæon, & à rebus quas recipit, diſamyrnum Glau-
cidanum, nimirum glaucio & myrrha ipſum ingrediētibus appellatur. Habet &
Scribonius diaglaucij descriptionem non multū ab hac diſſonantē. Omnia enim
preter myrrham & hæmatiten habet, quæ fortaliſs exciderunt, ſed pondera ſunt
iſtic ualde minuta. Paulus penitus eandem descriptionem habet, quam hic Aſcle-
piades, ſed gūmi drach. XVI. addidit, & uino, non aqua excipere iubet. Legitur
autem *διαδομυρον το γλαυδικον* in Paulo, tanquam à Claudio autore ſit nomina-
tum. Ego autē *γλαυδικον* à glaucio nominatū puto, & Pauli lectionē corrumpe-
re.

Rosarum uirgidium reſectis extremitatibus drach. XLVII.] Extremitates ro-
ſarum dixi, quas *ροσος* Aſclepiades appellauit, *ροσας χαλκας* inquit, *χαλκας* ἢ *λα-
βας* drach. *υγ.* Appellantur enim *ροσαι* græcis, omnium rerum ſummitates, proprie
uero auris infernæ partes pulpæ latinis dictæ. Quin & hepatis ſumma *ροσαι* Ga-
leno & alijs appellatur. In roſis autem hic *ροσας* dixit, quos *ονυχας*, id eſt, ungues,
Dioſcorides appellat. Sunt autem cæcidæ foliorum partes, quibus detractis ro-
ſæ *ονυχιστοι* & *βενονχιστοι* dicuntur, hoc eſt exungues, & reſectis unguibus
uelut infra in collyrio ex roſis horeo conuerti.

Aqua excipito ac uiſtor cum lacte muliebri, Temperatura mediā eſt.] Tem-
peraturam huius pharmaci mediā eſſe dicit, inter eam uidelicet quæ craſſa eſt,
& rursus eā quæ aquoſa penitus eſt & diluta, ita ut *μεσην παχους καυδαιος* acci-
piamus, quarum temperaturarū in ſequentibus aliquot pharmacis mentionem
facit Scribonius quum ait, Aquato hoc medicamento uti oportebit, dicit plane
id quod poſtea *η λευκος υδαρς*, in Sergij ophthalmici Monohemero uocat, Sic
etiam Marcellus appellare ſolet.

Nectariū Marci facit ad incipientem lippitudinem, facit ad illationem fluxus
tenuis, ad chemoleis, tumores, pellicularum eminētias.] Chemoſin, inquit Pau-
lus appellant quū ex inflammatione forti utraq; palpebra diſtorquetur, ut ocu-
los uix oculere poſſint, & album oculi ſublimius nigro ſit & rubrum, ac multam
nigri partem occupat. Eadem deſcriptio & apud *απυργος* Galeno inſcriptæ au-
torem habetur, Sed addit is, Chemoſin proprie dicit quum album ab utraq; ſtidis
parte inflammatur, iuxta ſim uero cauatur, ſimili figura ad chemam, cōcharum
uidelicet generis appellatū. Porro ſequitur non longe poſt Neapolitæ collyrium
in quo fere deſcribitur quæ affectio ſit Chemoſis. Inquit enim: facit ad maximas
epiphoras, maxime in his qui aegre rigantur, & ſubalbicant circa inflammatio-
nes, ut ſimile quiddam chemofi appareat. Ad hunc itaq; oculorū affectū Necta-
rium Marci conferre dicit, ſicut etiam ad pellicularū eminentias, hoc eſt, *υμινος
εμπυρεσις*, quas infra in Artemonio collyrio *υμινος βροχας*, hoc eſt, membranarū
extruſionem dixit. Dicuntur autem & *φλυκταίνουσιν* *εμπυρεσις*, hoc eſt, pu-
ſtularum ſeu papularum eruptiones, uelut in Philadelphio conuerti.

Scylactum pharmacum accommodatum eadem die curans.] Quanquam non
multum referat unde horū collyriorū appellatio ducta ſit, tamē nō inuſilis curio-
ſitatis eſſe uidetur, & hoc ipſum indagare. Videtur itaq; mihi hoc pharmacum
Scylactum dictum eſſe, quod eius experimētum in catulo ſit factum, uelut idem
infra de Phœnicæ appellato collyrio teſtatur. Cæterum quod accommodatum
uerſi hic & in omnibus alijs locis *αποπεινυγμενος* in græco eſt, quæ uox ſignifi-
cat ſcilicet experimento cognitum & accommodatum, dicitur & *επιπεινυγμενος*
à Paulo, eis quæ opponitur *αποπεινυγμενος* & *αποπεινυγμενος*, id eſt, inſelicitè ex-
pertum, & ſuccellu fruſtra expectato, à uerbis *επιπεινυγμενος* & *αποπεινυγμενος*.

& recentis & dulcissimi *. P. III. Primum itaq; ὁ ἰατρὸς in græco legitur pro
 τοῦ ἰατρῶν, ut recte latinus Scribonius habet, nisi quis legendum putare malit,
 ὁ ἰατρὸς, eo enim nomīne etiam supra Heronis ophthalmici collyrium Asclepi-
 ades produxit. ἀποκατατε autē uisiones in latino Scribonio dictæ sunt. ὡλὲς de
 ipse ἀκαταμάτας, cicatrices solutas uertit, & πνεῦμα, uastum tumorem, quem
 quia à loco interdum uidetur propellere oculum proptofin uocant, reddidit, &
 addidit, cum oui albo quod est tenue, quod in græco ad finem adiectum est, ἡ
 σι ἀλ. Quod uero in græco συγχύσεις ὅπου πικρὰ ἀματ. & ἡ γυγὼς ὅπου, haud
 scio an non corrupte legitur, Nō enim uideo cur ὅπου sit adiectum, quum hyemē
 & alijs temporibus itidem contingere possit. hoc latine dictum est: Sed præcipue
 facit cum quasi sanguine suffusi sunt oculi. Quod uero addidit, & ob id nullū ni-
 si leuissimum collyrium patiuntur, hoc in græco generalius habetur. γήμων ὁ
 κρὶ πρὶς τὰς ὡλὰς διαδίδου, καὶ μάστιγι ὡς τὰς θυαυδῶν τὰς ἰσθμῶν, & additur, ἡ
 ὅπου δέκρουρ λιγύρ ἐκκαίεται, quod ipsum in latino Scribonio mox in principio di-
 ctum est, facit ad epiphoras quæ cum tenui & acri lachryma consistunt. Quare
 hunc turbatum ordinem malo imputare interpreti latino Scribonij, quàm credē
 re Asclepiadem ex latino Scribonio in græcum transferēdo hanc confusionem
 fecisse: quod tamen omnino certū esset, si iuxta uulgatam opinionē Scribonij
 ipse latine scripsisset: quod mihi nō uidetur uerissimile, quū nec latina eius seculi
 dictio sit, & multi loci non ætatis iniuria, sed interpretis uitio corrupte legantur.

Collyrium Nili diarodon ex rosis. Recenset Asclepiades aliquot ex ordine
 collyria ex rosis διὰ ῥόδων uel διὰ ῥόδων appellata, ac primum Nili iuxta Andree
 medici traditionem, deinde alia ex ordine, inter quæ quintum etiam Celsus pro-
 ducit, sed sine spodio, & ponderibus omnibus imminutis. Cæterū hæc omnia col-
 lyria & medicamenta à principio 6. capituli, usq; ad 7. initium Galeni ad uerbū ex
 Asclepiade ipso apposuit. de quo admonēdum duxi, ut ne quis putet Galenum
 hos collyriorū autores citare, tanquam eosdem uiderit ac nouerit, quod nō est:
 uixit enim sub Antoninis, Neq; uero Flori collyriū, quo in Drusi matre usus est,
 sic citatur ab Asclepiade, ut qui id temporis uixerit, Florumq; & Antonij Drusi
 matrem nouerit, Nō enim id seculum attingit, sed sub Vespasianis & Domitiano
 floruit, uelut alio loco ostendit: quanquā non matrem, sed uxorem legendū existi-
 mem, hoc est pro ματρί quod in exemplaribus uulgatis habetur, γυναικί. Iuxta
 Suetonium enim itemq; Plinij Antonia Drusi uxor fuit, Livia uero mater, quæ
 & uxor postea Augusti, qui Vitricus Drusi fuit nisi per Drusum accipere uelis
 Germanicū ab eisdem appellatū, qui sanè fuit filius Drusi fratris Tiberij Cæsa-
 ris, ex matre Antonia iuniore. Tamen aūt Historia hæc nihil ad pharmaci usum
 aut efficaciam cōferat, attamen quū ob auctoritatem conciliandā ipsi pharmaco,
 hæc adiecta sit, non supine prætereundā esse uisum est. Ceterū in ipso pharmaco
 in Græco exēplari, deest ὁ δόξας ἰσθμῶν lectio, quæ paris mēsuræ cū uino esse debet,
 ut ex sequētibus patet, & Aetio lib. 7. qui palam habet. Quanquā in eodē etiam
 malorū Mandragoræ drach. XII. habeantur, quū Galen. duas tantū habeat: quæ
 diuersitas facile admitti potuit, per 4. numeri denarij notæ, ad 8. binarij notam uel
 istic additionem, uel hic deductionē. Habet præterea Aetius hyoscyami seminis
 drach. V. tantū, quorū loco hic duo oxybapha, aut ut aliq; drach. XXIII. legunt.
 Habet porro inter hæc collyria, unū διὰ ῥόδων ἀντιγυγῶν inscriptū, quasi Anende-
 thus propriū auctoris nomen esset. Verū ego ἀντιγυγῶν legendū puto, accipien-
 dumq; tale esse collyriū, quod cōstanter efficaciam suā ostendat, atq; ob id neq; re-
 prehendi, neq; accusari mereatur, & propterea sanè diarodon inculpabile uertit.

Zodii pharmacū faciens ad lippitudines antiquas, myocephalos, staphyloma
 ca, &c.]

lo latino Scribonij vulgato, sed quarta tantum ponderum omnium hinc ab Asclepiade expressorum parte, præterquã myrrhæ dimidia; & nardi ac opij ponderibus palam corruptis; additur autem & gummi pondere pro reliquorũ proportionẽ; quod hic penitus deest. Cæterũ dicit hoc collyrĩum Scribonius à quibusdã Athenippum, ab alijs diasmyrnũ, ab alijs *νάρδι* vocari. Quare mihi uidentur alie quot descriptiones Collyrĩorum Athenipporum & Asclepiorũ appellatorum à Scribonio fuisse traditæ, quarũ hic Asclepiades in fine huius Collyrĩi mentionem facit, quã ait in libro de Athenippis Asclepijs opij drach. viii. habentur. Etsi sanè Cornel. Celsus lib. 6. Asclepion Collyrĩi descriptum habet, sed penitus ab hoc diuersum: At uero Scribonij uerba sic habent. Componitur autem ex his; Pompholygis lotæ * P. viii. æris usui. * P. viii. croci. * P. an. myrrhæ * P. an. nardi * P. sex semis & uictoriatũ, lapidis hæmatitæ * P. ii. & uictoriatũ, pipæris albi grana decem, opij * P. i. aut uictoriatũ, commis. * P. x. teritur uino Chio. Quod itaq; nardi et opij pondera corrupta esse dixi palam est. Nardi enim denarij sex semis & uictoriatũ pondo, legiatur: primũ nimio pondere reliquorum comparatione, quũ Asclepiades drach. v. tantũ habeat, ad quadruplum reliquorum pondus, deinde semis & uictoriatũ male legiũ, tanquã diuersa sint pondera; quũ uictoriatũ ipse denarius dimidiũ sit. quare semis aut uictoriatũ legendum est, ut uidelicet indicet idem esse pondus denarij semis, & uictoriatũ, quod ego sanè certissimũ esse puto, cum ex alijs; tum uel hoc unico Marcelli testimonio; ca. 9. ubi castorei obolos duos, id est duas partes uictoriatũ accipere iubet, quãtũ quam & in ponderibus operi suo ab ipso præfixis a parte tradat, uictoriatũ denarius dimidia pars est drachmæ. Neq; enim probabile est uictoriatũ duorũ obolorũ esse, iuxta quorundam opinionẽ, ut hic intelligendum sit, nardi denarios sex & dimidiũ ac obolos duos, hoc est, scrupulũ siue tertĩũ denarij partẽ accipientẽ dos esse. Ad quid enim attinebat tam exacte appendere nardi pondus; maxime quũ tam magnũ sex denariorũ pondus præcedat. Quare pro sex semis & uictoriatũ, omnino legendum existimo, * P. i. semis aut uictoriatũ, exprimentur enim sic drach. una & dimidia, quæ quarta pars est sex drachmarũ ab Asclepiade expressarum, quæ proportio ad reliqua item quarta parte accepta respondebit. Verum hæc res tota ex Marcello medico clara fiet, qui Scribonij descriptionẽ integram habet, cap. 8. hoc modo. Componitur autẽ ex his rebus. Pompholygis lotæ * P. viii. æris usui * P. viii. croci * P. an. myrrhæ * P. an. nardi spicæ * P. ii. & pondus uictoriatũ, lapidis hæmatitæ * P. ii. semis, pipæris albi gran. x. opij * P. i. & pondus unius uictoriatũ, gummis * P. x. teruntur hæc in uino Chio, &c. Quod si uero etiam uictoriatum pro obolis duobus, hoc est scrupulo, & tertĩũ denarij partẽ accipiamus, ita ut aut particula nã identitatem, sed diuersitatẽ significet, erit tamen etiam sic lectio recta, si pro sex denarijs, unũ cum additione semis aut uictoriatũ legamus, sed obolo uno pondus minuetur, si pro denario dimidio obolorum trũ, uictoriatũ duorum obolorum capiantur. Opij porro pondus etiam comũ prelegitur, * P. i. aut uictoriatũ; sed si pro aut, legatur &, efficietur idẽ quartã pars ponderis opij ab Asclepiade expressi, hoc est, sesquidrachma, quæ quartã pars est drachmarum sex, aut denariorum sex, si eiusdem ponderis denarius & drachma statuantur.

Diasmyrnũ odorũ Syneronis, &c. Facit ad Rhezadas, hoc est angulos artrosos. Opposita plane uisita oculorũ sunt *lyxargis* & *faide*. Nam sicut illa incrementum est supra iustum modum carunculae naturalis; circa magnũ oculi angulum, Sic *faide* eiusdem carunculae imminutio est & decrementũ. Sequitur paulo post Hieracis Collyrĩum ad aspersiones, & mox, Apollonij phoenix Collyrĩum Hieracium

Hieracium ad aspretudines, per hoc catulo egregie medicatus est. Sic enim intel-
ligo quod in græco corruptū, hoc modo restituendū est. ἀπολλωνίς σκυλάκιον ὡς
συνεῖς ἱερῶν δὲ τῶν ἐν ἱερῶν καὶ ὡς πρᾶγμα πρᾶγμα, ὡς γὰρ ἱερῶν φέρει.
Vult enim indicare hoc collyriū esse quidem Hieraciū, ab Hierace uidelicet com-
positum, uerū ab Apollonio in usum assumptū esse, ad efficaciam ipsius probandā,
atq; id in cane, cui quū opem tulerit argumentū esse & hominibus similiter affe-
ctis profuturū. Phoenicis autē appellatio ipsi item ab Hierace autore imposita ui-
detur. Fuerunt itaq; uariæ compositiones Hieraci inscriptæ. Plin. lib. 34. cap. 1. re-
censet unā his uerbis. Hieraciū uocatur Collyriū quod ita maxime cōstat. Tem-
peratur autē idem ammoniaci uncij quatuor, æruginis Cypriæ duabus, atramen-
ti futorij quod chalcandium uocant, totidem, misyos uero una, eroci sex. Hæc o-
mnia trita aceto Thasio colliguntur in pilulas excellentis remedij contra glauco-
matum initia & suffusionē, contra caligines & scabrias & albugines ac genarū
uitia. Porro ut & de hoc semel admoneā, Collyria simpliciter prolata dicuntur,
quæ in oblongam formam coacta effinguntur, quod Plinius hoc loco colligun-
tur in pilulas dixit. & non solū ocularia pharmaca in eiusmodi formā collecta ac
coacta Collyria uocantur, sed & glandulæ quæ ano, & pessi qui uulua subdun-
tur, & quæ naribus induntur, ἱερῶν alias appellata, collyria subinde medicis uo-
cantur, atq; hoc ut dixi propter oblongam effingendi formā. At uero ocularia ali-
qua medicamenta nō coacta ad eiusmodi formā, sed tum liquida tum arida, item
Collyria nominantur, sed cum appositione liquiditatis aut ariditatis. Græcis enim
ἱερῶν καὶ ἱερῶν atq; ὡς ἱερῶν καὶ ὡς ἱερῶν appellantur. Habet autem & Celsus lib. 6. Hiera-
cis Collyrium ad aspretudines, quod habet myrrhæ, P. * I. ammoniaci thymia-
matis P. * II. æruginis rasæ P. * III. cum aqua pluuiali.

Collyrium Harmation, id est, currus inscriptum.] Hoc collyriū habet & Scri-
bonius, Harmation autem appellatum esse, ipse, & Marcellus qui itidem cap. 8.
prodit, ait, quia ex quatuor rebus, ut quadriga equis constat, & celeres effectus
habet. Recensent autē ipsi quatuor res quas & hic Asclepiades, sed hic lapis Hæ-
marites adiectus amplius est, & pondera omniū duplicata. Quanquam in exem-
plari scripto, ex quo inuulgauimus nuper Marcellum, hopia dici hoc collyrium
scriptū erat; quē errorem librarij puto, non adeo indocti, qui appellationē Har-
ma non intelligens græcā esse, sed latinā putans, Arma uidelicet, maluit græcam
appellationē Collyrii amplecti, atq; Arma latina in Hopla græca conuertit.

Hermophili Collyriū Thalasserum.] Hoc Collyriū Thalasserū, hoc est, mari-
num, fortassis appellatū est, quod nauticis & in mari uersantibus hominibus ma-
gis cōmodum existat. Legitur autē in exemplari græco ἐν τῇ μολύβδινῃ φαρμᾷ, quæ
res occasione dedit ueteri interpreti, opij drach. IIII. uertendi, quū hic non opij,
papaueris uidelicet succus, accipiendum sit, sed succus medicus qui secundus à
Cyrenalco est, cuius in sequenti Collyrio usus habet. Quare succi medici drach.
III. conuertit, legendum est enim ἐν τῇ pro ἐν τῇ. Possint tamen etiā docti hic falli,
quū in precedentibus Collyrijs sæpissime opium adscriptū fuit, opinaturi & hic
ammiscendum esse. Verum quū forte sit Collyriū hoc, & in suffusionibus ad cor-
pora duriora & nautica accommodum, medicus succus addendus est, qui hanc
uim Diosc. & Gal. testibus habet. Dixi autē de eo etiā alio loco. Sequitur non lon-
ge post Eustacton Collyrium appellatum, quod Scribonius Stracton, Paulus Sta-
cticon, appellat. Variant tamen etiam parum descriptiones, maxime uero quod
ad pondera attinet.

Collyrium fuluū Panchreston.] Supra à principio capituli septimi, liquidum
Collyrium Panchreston Erasistrati recensuit. Legitur tamen in Græco exemplari

πύργον, quasi totū aureum, sed falso, quū *πύργον* & *ισθίε* & hoc loco legendū sit, ab omnimoda utilitate ita appellatū. Nam & Aetius sermonis sexti cap. 98. & Paulus lib. 3. cap. 11. & rursus lib. 7. cap. 14. Panchreston Erasistrati habent *λύ* quidam Collyrij formā, quæ eadem est cum ea quā supra Asclepiades tradidit, quanquā non referat quibus nominibus appellentur, modo de re & usu constet. Sequitur & infra Panchrestum Athenippion appellatum, sed de Athenippis uel Athenippijs appellatis supra memini.

Tryphonis orbiculare sphaëricon dictū.) Hoc equidem Collyrijū sphaëriconā figura efformatōis dictū existimo, Celsus sphaëricon habet, sed est alia cōpositio. Sequitur deinde Isochryson quasi auro cōpar appellatū, quanquā *ισχύον* in græco exemplari legatur, tanquā hæc uox autotē referat. Sequitur & Cinnabariū Cinnabari quā recipit dictū, quod Stolo Britannico opthalmico celebri inferibitur, ad corrosos angulos et lippitudines ad malū habitū perducias ita enim relligo quod dixit *πρὸς μαλακίας ἐφ' ὅσα μῶν*, siue *ἐφ' ὅσων* ut exemplar habet. Ad intelligendum est em̄ *μαλακίας*, utrū tandem legas, & significātur affectiones quibus oculi ad malum habitū peruenerūt, quales sanè à longis lippitudinibus proueniūt. Deinceps est Melinū atarachū à perturbationibus amolendis dictū ut puto. Postea sequit̄ proteus, in quo pondus cadmiæ corrupte legitur *μαλ.* Est enim legendum *μαλ.* uelut conuerti, uel certe. *μ.* uelut sequentiū.

In Caput VIII. de remedijs ab Archigene conscriptis.

Quemadmodum totū 6. ac 7. caput ex Asclepiade adscripsit Gal. sic in hoc octa uo ab Archigene prodita ad oculos affectos auxilia recēset. Refertur aut̄ primo diēta in qua corrupta est lectio in græco exēplari, *ὡς πάλιν ψυχρὸν τὸ πρῶτον, ἀπὸ τοῦ δι' ὕδατος μὲν πρῶτον ἔσται, &c.* Legendum est aut̄ restituta à nobis in integrū lectione, sic *ὡς πάλιν ψυχρὸν τὸ πρῶτον, ὅτι τὸ δι' ὕδατος μὲν πρῶτον ἔσται, ὁ δὲ πρῶτον πρὸς τὸν ὀφθαλμὸν ὡς ἔσται*, hoc est ut uertimus. Et facies aliidue primū multa frigida, deinde etiā acē to ammixto proluat. Porro non longe post hunc locū inter pharmaca quæ sistentas sandara cha faciat, medicamentū fort̄ extersoria atq; adeo uisoria ui pręditur qua gratia in præcedētī capite, in cinnabariū Stoli ad corrosos oculorū angulos fuit admixtū. Hunc aut̄ errorē & plerosq; consimiles, nemini impurari cōuenit q̄ operis castigatori, qui *περὶ ὀφθαλμῶν* pro *ἐν ὀφθαλμοῖς*, ob similitudinē quandā substituit. Porro etiā aut̄ Andrachnem græcis dictā, oculorū & alijs inflammationib. imponi, Diosc. & experientia testatur, ob frigidā uidelicet & repulsiōnā facultatē.

Aur mali punici succus cum flore farinae polentæ, aut ipsum malum in uino maris experte.) Hæc inter auxilia oculis fortis imponenda ab Archigene nūmerantur, satis nota, sed tamē de uino maris experte, *ἐβελωρε* Græcis dicto, pauca apponemus. Vina itaque *ἐβελωρε* uocabantur, quibus marina aqua non esset ammixta. Sicut contra *βελωρε* & *πυλινωρε* dicebatur, quibus marina esset addita. Quot modis uero hoc ipsum fieret, Diosc. li. 5. & Plinius itemq; Columella docent. Corne. Celsus lib. 3. in regij morbi cura, hæc uina græca salia appellare uideri possint, integraq; uocare maris expertia, simul aut̄ uilitatē ipsorū docere, his uerbis. Oportet aut̄ uinum bibere græcū salum, ut resolutio uentris maneat, tū altero triduo ualidiores cibos & carnis quoq; aliquod esse, intra aquā manere, deinde ad superius genus uictus reuerit̄, cū eo ut magis satietur, omisso græco uino, bibere integrum austerū, atq; ita per hæc uariare, ut interdum acres quoq; cibos interponat, interdum ad salum uinū redeat. Hæc uenus Celsus. Verū non est idē salum uinū quod mari mixtū, sed diuersum, & quomodo fiat utrumque Colu. 2. cap. 11. docet, item Const. Cæsar lib. 8. cap. 23. Quanquā uinū quoq; mari

mari mixtū habere uim ducendi aliu, etiā Dioſc. teſtat. Quare Gale. XII. Meth. ubi uina quæ ſtomachū roborant, ac digeſtionē alimenti in corpus ſuaū, recenſet, uina probat maris expertia omnes ἀπαραχύντας talia appellās, λαμβανόντων δὲ inquit ἀπαραχύντας, οὐ τὰ δ' ὀνομαζομένης εἰς τὴν μίμικτον τῶν θαλάσσης, μεγίστην βλάβην ἡγεμενός ἐφ' ὧν μίμικτον φησιν αὐτῶν, εἰ μὲν οὖν ἐπὶ πάσαις τῶν διηγεῖσθαι οἷσιν, ὅτι ἐν ὧν ἐλόντων δὲ, μεγάλαι ἐν βλάβαις, ἐν ἡσίοις, καθ' ἑαυτῶν δ' ὅν χιόν τῶ ἀριστοῦ. Meminit ἀπαραχύντων οἶνον etiam Dioſc. lib. 5. ſed à nullo adhuc interpretū intellecto loco, quū ἀπαραχύντας cum hiſ qui ſapam admixtā habent confundant. Videtur autē mare propterea fuiſſe ui- no mixtū, tum ut gratius ſapore fieret quod Plin. 14. cap. 7. ait, Nunc gratia ante omnia Clazomenſio eſt, poſtquā parcius mari condunt; tum ut celerem uetusta- tem acciperet, quod idem Plinius de thalaffite appellato 14. cap. 8. teſtatur. thalaſ- ſiten autē inquit uocant, ualis muſti deiectis in mare, quo genere præcox ſit uetu- ſtas. Et propterea ſanè hoc uinū etiam Βυζιον fuiſſe appellatū, quod uidelicet eſſet ad uetustatem accelerandam coactū, atq; hoc eſt quod Plin. lib. 13. cap. 1. dicit, Fi- ciniū non poteſt uideri quod hizonappellauimus, quū ſit in eo ſola pro arte feſtinatio, &c. Quanquā idem Plinius priore loco originem marinæ aquæ uino miſcendæ, à ſeruū furto ſic meſuram explentis ortam dicat.

Cafeus item mollis ac nuper saluus.] Cafeū mollem repulsoria ui præditū esse & meatus obducere ipsum per se, Galenus quū in simp. phar. libris, tum infra lib. 5. cap. 1. de hypopijs tradit . Salutus uero recens etiā discussoriā & modicē adstrin-
gentē uim acquirit. Quare in oculorū fluxionibus ac inflammationib. cōmode ad-
hibendus hoc loco proditur. Nam & Diosc. hoc de eo testatur. ἐφαλε δὲ inquit,
καταπλάσσειν οφθαλμῶν φλεγμονὰς ὅτι πικρὰ καὶ ψαλλῖν, ἀπορροήεντες ἰδιόμοιροι, καὶ
παρὰ τὰς αἰσθητικὰς μετέωρον, λακτοειδέας, λυτὰ καὶ κλειρά, καὶ γαστρικά, ὃ καὶ καταπρόος
μελέων σπληνός. Ita enim legendum est, ut recenti falso contrariæ uires attribuantur
ei qui præcedit insulso. Sed & Plin. eadem li. 28. cap. 9. tradit, sed lectione item cor-
rupta, quā sic restituendam censeo. Stomacho utiles qui non sunt falsi, id est, re-
centes. Veteres alui sistant, corpusq; minuunt, stomacho inutiliores. In totum
falsi minuunt corpus, alunt molles, cafeus recens cū melle sugillata emendar, ue-
tus alui sistit, &c. Porro quando in casei mentionē incidimus, obiter locū apud
Galenū lib. 3. de alimentis expendemus, ubi de caseo scil legitur. λεγαίμεθα δὲ διὰ τὴν
ἀπαρτή των παλαιῶν διδιδυμῶν ἢ γάλα βιβλόν τένομα, hoc est, optimus est etiā qui Ro-
mæ apud diuites in precio est Bathys nomine. Ego itaq; nō βιβλόν legendum pu-
to, sed βιβυσσιος, atq; hoc ex Plinio inductus qui lib. 11. cap. 4. ait Dalmatice Do-
cleatem mittunt, Ceutronicæ uatusicū, &c. Videtur et̄ Vatusicus Plinio dictus
esse, quē Galen. optimū esse dixit, & βιβυσσιον Romana uidelicet uoce appellari.

Aut crudam ordeacea uel triticea farina pasto coctam.] Quod crudam farina dixi αἰσιν λύσιν Archigenes appellauit, quæ uox quid proprie significet alibi à nobis relatu est. Ad hæmalopas & hypophagmata, hoc est cruentatos oculos et fugilatos.] Hæmalops cruenti aspectus suffusione non solum in oculis, sed quacunque corporis parte significat, quales maxime à plaga aciculis succedunt. Quin & homines hæmalopes, id est, cruentati aspectus uocantur. Diosc. etiã in adipe cruentas reliquias αἰμαλώπας appellat. τριβί inquit, κατ' ἐλίζην ὅτι οὐκ ὠχρὸν ἔχει αὐτὸν ὡς αἰμαλὸν ἐκκεῖνται. Galenus in glossis Hippocraticis, αἰμαλωπία uocari ait, ἀπὸ τῆς τριβίος ὁδὸς αἰμολωπία. Describuntur autem paulò ante ab eo αἰμαλωπία, οἱ πεπολῆς τ' ὀφθαλμοὶ. λέγουσι οὖν οὗτοι ὅτι πυρρὸς σωματικὸς οὖρος ἐν ὀφθαλμοῖς λέγουσι, ὅτι τὸ αἶμα ἐν ὀφθαλμοῖς. Archigenes porro hoc loco ὁποφάγμα γὰρ ad αἰμαλώπας adiecit. Dixit enim τῶν αἰμαλώπων ἢ ὁποφάγματι, hoc est ad cruenti aspectus suffusiones & fugillationes, quemadmodum etiam ipse cōsequenter describit. Paulus aut lib. 3. hypophagma rupturam esse dicit uenarum tunice

M 3 agnata

agnata, ex plaga maxime oborta. Ad huiusmodi itaq; affectus sanguis columbinus ab Archigene prodit instillandus, praesertim is qui ex teneris pennis est expressus, habet enim *αἷμα μολιστὸν τὸ ἐκ τῆς ἀπελιδῶν πτερῶν ἐκπαιζόμενον*, quanquam pro *πτερῶν* uetus interpretes legerit *πρὸς ὀφθαλμῶν*, tanquam columbarum tenerarum sanguis ab ipso maxime probetur; quod quidem uerum est, sed non alius quam qui ex pennis teneris euulsis exprimitur, ut *πτερῶν* rectius omnino legatur. Ad eandem terram Aethiopicam cum nistro & myrrha, paribus portionibus probat. Verum quales fuerit terra Aethiopica dubium utique existit, quoniam ut plerumque alia hodie penitus exoleuerit, & neque Dioscorides neque Galenus neque Plinius Aethiopicam terram mentionem faciant. Opinor tamen eandem esse quam Ampelitis & pharmacitis ab his autoribus appellatur, & non aliam esse puto quam supra li. 3. idem Archigenes ad aures contusas, terram nigram uocauit, & quam se aliquos tanquam smegmate conficere dixit, atque hoc maxime propter discoloriam resicatoriamque ac perfrigerandam uim, quam in ampelide terra praedicantur, & in his affectionibus utrinque requiruntur, Amplius autem inducor ad hanc opinionem per colorem, qui ab ipsa autoribus niger in ampelide terra proditur. Et potuit sane etiam ab ipsa Aethiopia haec terra aduehi, ut inde habeat patriam appellationem, quanquam Dioscorides eam in Seleucia Syriae nasci tradat.

Ad eos qui crassas, callosas ac rubras, glabrasque ac pilis nudatas genas habent pilos graecis dictos. Pulosin Paulus lib. 3. hoc modo describit. *πυλῶσις παχύτερ ὅτι τῆς βλεφάρων πυλώσεως, ὅτι ὀφθαλμοῦ, οὗ συμβαίνει πυλώσεως καὶ τῆς περιχρῶν ἐπιπύσεως*. Quare ut explicaremus qui *πύλοι* essent ac dicerentur, tam multis uerbis eos depinximus, quoniam latinis non sit una aliqua uox quae pilos exprimat, tot malorum accessionibus hunc affectum constituentibus. Neque enim simpliciter defluua pilorum palpebrarum dicere licuit, quum hoc uirtutem *μυλφωσι* paulo inferius appelleret. Est itaque tum in Milphosi, quae & Madarosis dicitur, tum in pilosi, defluuium palpebrarum; sed in pilosi amplius palpebrae crassae callosae ac rubrae fiunt. Galenus tamen 14. Metho. simpliciter eos qui perdididerunt ciliorum pilos, pilos nominare uidetur. καὶ τὸς ἀπὸ μολιστῶν ἢ inquit, τὸς ἐκ τῆς βλεφάρων πύσεως, οὗ ἀναμειβόμενοι πύλοι.

Papias Laodiceensis Autolyco medicus multa in his tentabat, euellebat primum ipsos pilos, deinde locum diligenter cum dropace irritabat, &c. Quisquis fuerit hic Papias medicus; itemque Autolycus ab eo curatus, recenset sane Archigenes eius conatus in trichiasi extirpanda, primum pilos euellendo, mox cum dropace locum irritando, deinde chamæleonem album uirtutem cum ranarum sanguine permixtum illinendo. Ita enim legitur in graeco exemplari. *ὁρῶντες πύλους τῶν ὀφθαλμῶν, χαμαὶ ἐλόντες τε λυθὼν λέοντι πεφραγμένῳ ἀμαρτὴν βαρυνέμεν χαλκῶν, ὃ ἀπὸ τῆς λευκάου γίνονται, λευκὰ χέμεν*. Plinius idem auxilium 31. ca. 7. tradit, sed pro chamæleone albo, lachrymam uitis habet. Ranæ inquit, quas dryophytas & calamitas uocant, sanguis earum cum lachryma uitis, si euulso pilo palpebris illinatur. Et paulo post ranam ipsam describit, idem auxilium rursus repetens. Est parua rana in harundinetis & herbis maxime uiuens, muta ac sine uoce, uiridis, si forte hauriatur, uentres bouum distendens. huius corporis humorē penicillis dera sum, claritatem oculis inunctis narrant afferre, ipsasque carnes doloribus oculorum superponunt. Ranas etiam coniectas in fictili nouo iuncis configunt quidam, succum earum qui ita effluxerit admiscunt lachrymae, quae ex alba uite emanat, atque ista palpebras emendant. inutilibus pilis exemptis, acu instillantes hunc succum inque stigia euulforum. Haecenus Plinius. Cuius uerba propterea adscripsi, quod & ranarum notio manifestior ex ipsis sit, & quod utroque loco lachrymam uitis albae cum sanguine ranarum permiscendam tradit. Hoc uero loco Chamæleo albus

tus ammiscendus, haud scio an recte legatur, quū neq; Diosc. neq; Galen. neq; Plinius, hoc de chamæleone herba tradit. De chamæleone certe animali Diosc. tradit quod sanguis eius æque ut uiridiū ranarū pilos palpebrarū denudet, ut suspicio sit mihi locū corruptū esse, & pro *χρυσαιλόντι τε λόντι λείω περιτραχίλιν*, legendum esse, *δρακόντι τε χρυσαιλόντι τε περιτραχίλιν*, &c. Aut ut Plin. habet, *βρυονίας τε δισκόντι λόντι λείω περιτραχίλιν*, &c. Nam uitis albæ lachrymā eam uim habere certum est, inde enim ipsa bryonia etiā psilothrū ipsi Dioscoridi ac Galeno appellat. Nihil tamen decerno, possit fortassis & chamæleo albus recte cū sanguine ranarū confundi ac illini. Nam Paulus lib. 3. ex hoc tamen ut opinor loco, idem remedium prodidit ac transcripsit, ubi cinerē uisti uidelicet chamæleonis illinendum cum sanguine ranarū ait, *πύριον δὲ* inquit, *τὸν τὸν ὀδὸν ἀμαρτὴν βαρύνει* *χρυσαιλόντι, ἢ μετὰ τῆς φρενὸς χρυσαιλόντι λόντι*. Ego saltem suspicionem meā pharimaco ufuris indicare uolui. Cæterum quod locum cum dropace diligenter irritabat uerti, *δρακονίζων* in græco legitur. Est enim *δρακονίζων* dropacem adhibere, & per eum locum irritare ac præparare, ad sanguinis ranarum successuram illirionem. Est autem *δρακονίζων* medicamenti formā, quæ aliquando ad emplastri, aliquid quando ad malagmatis similitudinem præparatur, imò & calidā illinitur: uelut etiā hoc loco necessarium est: alias ex materia eadem constans, quæ & a copa, & emplastra. Quare cataplasmatibus uice in diuturnis affectionibus adhibet, tum ante sinapismos, ad corporis præparationem, tum post sinapismos, ad reliquiarum affectionis extirpationem, quanquā simplicis. dropax nihil aliud sit quāmpicatio appellata, constans ex pice sicca paucissimo oleo liquata, uelut Aetius 3. cap. 190. & Paulus lib. 7. cap. 19. prodit. Quin & depilatoria psilothra, quorū usus ad omnes corporis partes depilandas, effeminato poetæ Martialis seculo erat, dropacēs appellantur. Martialis 10. libro in Carmen ionē. Leuis dropace tu quotidianō, Hirsutis ego cruribus genisque. Sunt tamen qui forcipem intelligere per dropacem malunt. Apud Lucianū in Demonacte, falsum ac mordax Demonactis dictum legitur in huiusmodi facto. Proconsul erat qui luxui licentius deditus, ungento & picatione per omne corpus delibutus esse solebat, hoc uitium cynicus quidam in ipso publice ex suggesto reprehendebat, tanquam parū uirile & obscœnum. Quare proconsul indignatus, Cynicum ducti iubebat supplicium de eo sumpturus: Verum quum fortuito interuenisset Demonax, eius precibus cynicam libertatem afferentibus liberatus est, sed tamen proconsule ita cum Demonacte pacifcente. In præsens inquit, hoc in tuam gratiā impune feret, si uero rursus tale quid designauerit, quam poenam illi statuendam ducis? Ad hūc Demonax, tunc sanē inquit, *δρακονίζου*, id est, dropace illini iubebis. Hoc enim dicto proconsulem pupugit, ei non minus quā Cynicus ipse mollicem exprobrans, quum Cynico in poenam statueret, quo ille in luxu uteretur, Sed hunc locum nuper quidam doctus citauit, & *δρακονίζου*, forcipe uelli, uertendo, tum dictū, tum sententiæ arguiam penitus euerit. Sicut alius quidam ex Galeno. *υποχύτας*, hoc est, perfrigeratos, à uirulenta bestia afflatos, & *γλυκύν*, hoc est, polysum, polentam, & *περίχοντι*, id est, falfamenta, pilos, id est, *πρίγες* conuertit. De quibus obiter admonéo, ut studiosi in uicinis maxime uocibus diligentē animaduersionem habeant, ne alteram pro altera agnoscant, ac cōuertant. Hircū uide licet pro hortulano, iuxta uulgare prouerbiū. Sequitur paulo post, Ricini à cane foemina adempti sanguine ad eandē rem uiuendū esse, sed in græco exēplari, *λέγει τὸν ἀπὸ τοῦ κυνὸς ἀπὸ τοῦ κυνὸς ἀπὸ τοῦ κυνὸς* legi, pro *ἀπὸ τοῦ κυνὸς ἀπὸ τοῦ κυνὸς*, &c. Putauit enim is qui exscripsit locū auctoris nomen esse, Critonis uidelicet, quod si credas, in sequenti uerbis sanguis canis foemine pro auxilio adhibendus indicabitur, qđ omnino est falsum. Nam caninus sanguis hanc uim nō habet, sed ricini præsertim à foemina

IANI CORNARIi MEDICI PHYSICI

COMMENTARIORVM MEDICORVM IN DE/
cem libros Galeni de cōpositione medicamentorū secun/
dum locos conscriptorū, Liber Quintus.

In Caput Primū de Sugillatione sub oculis, hypopion gr̃ci dicūt.



V O D hypopion sub oculis fiat, ipsum nomē indicat: Idē em̃
est uelut si quis hypophthalmiū dicat, quod ipsum sub ocu/
lis sonat. Est autē ex genere effusionū, ecchymomatū appella/
tarum. Suffusiones quas proximo libro in oculis ex plaga
aut ictu factas, hæmalopas & hyposphagmata Archigenes
appellauit, si in facie cōtingant, ὑπόπια à loco scilicet in quo
fiunt, uocantur, latini sugillationes & sugillata dicunt. atq;
ita hæmalops & hyposphagma atque hypopion, ad unum
genus effusionis sanguinis, ἰχθυόματα & ἰχθυώσεων gr̃ci appellant, referuntur,
quod nihil aliud est quàm χυμῶν ἰχθυος, hoc est, humorum effusio sub contu/
sum locum, uelut hoc loco Galenus & reliqui Gr̃ci omnes describunt. Con/
tingit autem ut plurimum cum contusione & ruptione, aliquando etiam iuxta
apertionem osculorum uasorum ἀνοστέων appellatam, itemq; per perfusatio/
nem, uelut tum hic, tum quarto Methodi Galenus testatur. Fit autem ipsa per/
fusio, quam ὑπερσυστροφία uocant, ex tunica quidem rarefacta, sanguine uero at/
tenuato, itemq; aliquando, osculorum uasorum paruorū apertione, quæ quum
necessario per refrigerantia ac adstringētia curetur, atq; hæc tamen ipsa minime
apta sanguini effuso in locū contusum discutiendo existant, sicut mixti generis
medicamenta, ex adstringente uidelicet & discussoria facultate, in principio re/
quirantur, donec in suam naturā uenulæ redierint, ne scilicet non tantū qui effu/
sus est sanguis discutiat, sed ex cōtusa uena amplior etiā adtrahatur. Porro cō/
fundi solent apud Gr̃cos autores, atq; id errore ac ignorantia librariorum, ἰχθο/
ματίων atq; ἰχθυώσεων uoces, cū his quæ ἰχθυώματα & ἰχθυώσεις appellantur,
& sanè hoc loco Galeni, ἰχθυώματων falso pro ἰχθυώσεων legitur, quū tamen
ita inter se differāt, ut ἰχθυώσεων contrariū planè significet τὰ ἰχθυώματα. Illa enim
sanguinis & humorum effusionem ex uasis, uelut dixi, significat. Hæc uero infu/
sionem eorundem, qua uidelicet uenulæ pleniores redduntur, corpusq; colora/
tus euadit, atq; sic accipit lib. 3. Epidemion apud Hippoc. sectionis quartæ finie.
Vbi ἀπὸ τοῦ δυνάμει οὐδὲν μέγιστον ἐκπύου, καὶ χυμῶν ἀναλίσσειν ἐν τῇ, καὶ ἰχθυώσεως ἰα/
bet. Galenus enim lib. 3. de spirandi difficultate, hunc locum non aliter exponit,
ἀσπασχέειν inquit, ἀσπασχέειν σημαίνει τὴν ἐκτετακταμένην καὶ καταφυγμένην διασπασθῆναι. κατὰ
τοῦτον οὖν τὸν λόγον, καὶ τὸ δυνάμει ὅτι ἀπὸ δυνάμει σπασθῆναι σημαίνει, οὐδὲν μέγιστον
ἐκπύου, & χυμῶν ἀναλίσσειν σημαίνει καὶ ἰχθυώσεως, ὅς ἐστι τὸ δυνάμει ἐκπύου, τὴν ἐκπύου
σημαίνειν διασπασθῆναι, hoc est, uelut nos in nuper uulgata illorum librorum uer/
sione diximus, cōtinens respiratio uentilare simul et excalescere perfrigerata po/
terit. Iuxta hanc igitur rationē, etiam in secundo morborū popularium consultiuit
diligentiam adhibendam esse, ut exandescencia inducatur, & coloris reparandi
& sanguinis in uasa subter cutem colligendi gratia. Cæterum ad effusum sangui/
nem ex uasis sub locum contusum discutendum, inter reliqua auxilia uel in pri/
mis Collyrium Nilī ex rosis laudatur, quo cum reliquis non proficiente. Colly/
rium ex sandyce cōmode adhiberi dicē, cuius item & Aetius & Paulus in hoc
loco tractando mentionem fecerunt. Est autem sandyx non res naturalis per se,
sed factitia, cerusa uisa in eam transeunte, pharvacum alias tenuium partium &
resiccandū

refricandi ui præditum, non tamen calfactorium. Ita enim Galenus nono simpliciū phar. libro de eo tradit, ubi de cerussa agit, quanquam locus penitus sit corruptus, qui tamen ex Diosc. & uereri interprete sic restituendus est. *Υψηλόν, καὶ τὸ πρὸς τὸ φάρμακον μακρὸν τὴν προσηλυτὴν τῆς μελιβόλης διαφέρει. ἔστι γὰρ ἴσος φάρμακον καὶ τὸ ἀπλοῦς φάρμακον, ὅμοιος ὅτι φάρμακον, ὅτι ἀπλοῦς φάρμακον, &c.* & paulo post, *καὶ τὸ φάρμακον καὶ τὸ ἀπλοῦς φάρμακον, ὅμοιος ὅτι φάρμακον, ὅτι ἀπλοῦς φάρμακον, &c.* & paulo post, *καὶ τὸ φάρμακον καὶ τὸ ἀπλοῦς φάρμακον, ὅμοιος ὅτι φάρμακον, ὅτι ἀπλοῦς φάρμακον, &c.* Diosc. uero lib. 5. de cerussa, si utere uelis inquit, cerussam, ipsam tritam in nouam ollam coniecto, & prunis impostā ferulā agitato, donec colore sandarachæ similis fiat, & ablata utere, quæ sic preparata est, sandyx ab aliquibus appellatur. Plinius autem lib. 35. cap. 4. sandycem ex sandarachâ factitiam, & rubricâ æqua parte ammixta fieri tradit, quod non dissonum est à Dioscoridis traditione, nisi in rubricæ tantum additione. siquidem sandarachâ etiam ex cerussa sit, colore in flammeum permutato; quanquam Plinius uerba sic accipi possunt, ut uertatur, Hæc si torreatur, de cerussa intelligatur. Plinius uerba hæc sunt. Sandarachâ quomodo fieret diximus, sit adulterina & ex cerussa nō in formace cocta, colorem esse debet flammeum, pretium in libras asses quinā. Hæc si torreatur, æqua parte rubricâ admixta, sandycem facit, quanquā animaduertio Virgilium existimasse herbam id esse illo uersu.

Sponse sua sandyx pascens uestiet agnes.

Precium in libras dimidium eius quod sandarachæ. Nec sunt alij colores maioris ponderis. Inter factitios est & syricum, quo minis sublimi diximus. Fit autē ex sinopide & sandyce mixtis. Hactenus Plinius. Quod itaq; ait se dixisse quomodo fieret sandarachâ, hoc ipsum lib. 34. ca. ultimi fine fecit, ubi de cerussa ait, Et coquitur in patinis misceturq; rudiculis donec rufescat, & simile sandarachæ fiat, & non longe post. Postea cerussa ipsa si coquatur rufescit, sandarachæ quæque propemodum natura dicta est. His enim uerbis & locis, & non alijs indicauit, sandaracham factitiā ex usta cerussa fieri, quanquam satis obscuris, & ut suspicor corruptis. Nisi & uerba lib. 35. cap. 6. paulo ante supra citatum locum ab eodem relata, de sandarachâ ex cerussa factitiā intelligenda esse putandum sit, quæ sic habent. Loquitur autem de cerussa in hæc uerba. Nunc omnis ex plumbo & aceto fit ut diximus. Visa casu reperta incendio Piræi cerussa in orcis cremata. His enim uerbis ferè idē quod Virtruius libro septimo architecturæ ait, indicat. Cerussa uero inquit, quum in formace coquitur mutato colore ad ignem incendij sandarachâ fit, id autem incendio facto ex casu didicerunt homines, & ea meliorem usum præstat, quā quæ de metallis per se nata foditur. Quare iuxta Plinium & Virtruium ex cerussa usta sandarachâ fit, & ex eadem tosta, iuxta eundem Plinium, cum æqua rubricæ parte, sandyx iuxta Dioscoridem uero & Galenum, sandyx mox ex usta cerussa redditur. Porro quod Plinius Virgilium, sandycem herbam existimasse, se animaduertere dicit, haud satis diligenter Virgilij uerba expendit. Neque enim de herba Virgilius dixit, sed de coloris genere, de quo ipse adeo Plinius docet, uelut omnino ex præcedentibus uersibus palam est. Eam enim seculi felicitatem ominatur poeta, ut tincturâ lana non desideret, sed sua sponte dum in pratis oues pascuntur, non ex sandyce, quæ nulla est, sed quacunque herba, & murice, & croceo luto, & sandyce, uellera tincta acquirant. Ita enim ait.

Nec uarios discet mentiri lana colores,
Ipse sed in pratis arces iam suæ rubenti
Murice, iam croceo mutabit uellera luto,
Sponte sua sandyx pascens uestiet agnos.

Cæterum quod idem Plinius Syricum ex sandyce & sinopide fieri ait, neque Dioscorides, neque Galenus habet. Paulus tamen libro septimo & Aëtius lib. 2. sandycem ac syricum pro eodem dixit, *σάνδυσ* inquit, ἢ σινωπὸς λεγόμεναι μὲν εἰσι καὶ σφραγισθεὶς διαμένει, δύμην δὲρμει, quæ tamen uerba ex Galeni uerbis supra à me citatis prout affollet extraxit.

Summe facit ad recentia & liuida sugillata, spongia muria tincta, &c.) Muriam quæ Græcis *ἄλμη* est, eundem usum præstare, quem aqua maris, Dioscorides ac Galenus, iteq; Plinius indicauere. Maris aut aqua discutere liuida tota Dioscorides testatur, *σφραγὶς* inquit καὶ πωλιδύματα πνεύματι, in quem sanè usum hoc loco muria ab Archigene præscribitur. Est autem nihil aliud muria quàm aqua falsa, uelut etià ipsam mare falsum existit, sed hoc ex natura, illa arte paratur, prout usus exposulat plus aut minus falsam esse. Quare differt etià à falsugine uel falsilagine salinarum, quæ etià ipsa natura falsa est, magis etià quàm marina, & ad hoc etià liquida, quum muria etià dura fieri possit, certa quadam ratione prodita à Columella lib. 12. cap. 6. quanquam non duram sed maturam legendum esse credere malim, nisi tam sæpe & Columella, & Cornelius Celsus, & Scribonius, & Marcellus sic appellarent; ut uidelicet duram & maturam pro eadem accipiamus, cui cruda opponatur. Sic autem facere docet Columella. Quum salem per aliquot dies uidebis in aqua liquefcere, ex eo intelleges nondū esse muriam maturā. Itaq; subinde aliu salem tam diu ingeres, donec in sporta permaneat integer, nec minuatur: quod quum animaduuerteris, scias habere muriam maturitatem suam. & paulo post. Est aliud murie mature experimentum. Nam ubi dulcem caseum demiseris in eam, si pessum ibit, scies esse adhuc crudam, si innatabit, maturam. Hunc autem murie mature parandæ modum etià Galen. lib. 4. simplicium pharmacorum prædixit, sed eam tamen cui ouum innatat *σικραδὺν ἄλμην*, hoc est temperatam & maturam ad falgama condienda appellat: eam uero quæ iniectura salem amplius colliquefcere non permittit, uehementer falsam, hoc est, *σικρὴν ἄλμην* uocat: quum Columella hoc utrunq; experimentum maturæ murie esse dicat, nisi quod dulcem caseum oui loco demittendum tradit. καὶ οὕτως inquit, καὶ αὐτὸς χρησάμενος δαλματῶν ἱερίων, ἔλας ὕδατι ποτὶς σφραγισθῆναι, καὶ γύναια πῶς βαρύνειν ἀπὸ τῆς πύξης τοῦ ὕδατος τοῦ γλυκῆος. ἔλλατ' καὶ μέτρον ἴσθι τὸ πικρύνειν τὸ τῆν ἄλμην δύκεσθαι ὑπὲρ τὴν σικραδίαν, εἰ φαίνεται κατ' αὐτὴν ὑπὸ πλῖον ὕδρ, ὅς ἐστι γὰρ λιπαρὸς ὁρμῆς καὶ μέγιστον οὐκ ἐστὶν ἄλμης ὀνυχορμῆς, μέλλων ὕδατι ὥσπερ καὶ γλυκῆα εἶναι. δεινὸς δ' ἄλμινος γυνί τω ποτὶς τῇ ἐμβληθῆναι, ὅς μακρὴν ἐγχαρὸν ὑπὸν κείνη τὴν ἐπιμβάδα ὁρμῆς, καὶ τὸν τοῦ σικραδίου τὸ ὕδρ, ἀπὸ τῶν ὕδατων ἐνυδρῶσται βαρύνειν. Dura porro appellatio ex eo indita uidetur, quod aqua in ipsum salem uim suam exercere amplius non potest, quod liquida utique aqua & non indurata faceret salemq; colliquaret: Plinius sanè duram non appellat; sed certam mensuram salis exprimit in aquam mergendi, quod dura aut moderata reddatur, trigesimali primi capite sexto in hæc uerba. Verum & hæc cura præuidit, inuenta ratione qua sibi quis quæ aquam maris faceret. Illud in ea ratione mirum est, si plus quàm sextarius salis cum quatuor aquæ sextarijs mergatur, uincta aquam, salemq; non liquari. Cætero sextarius salis cum quatuor aquæ sextarijs, salissimi maris uim & naturam implet. Moderatissimum autem putant, supradictam aquæ mensuram octonis cyathis salis temperari. Vsum autem Murie duræ præscribit Celsus libro quarto capite nono. Edenda inquit, sunt falgamenta, uel oleæ ex muria dura. & eiusdem libri capite 15. Themison muria dura quàm asperrima sic utendum moria prædidit. & pluribus alijs locis. Scribonius cap. 195. uulgatæ editionis ad

coriandrum dātū. Adiuuari aut debent qui biberūt, ex uino mero atq; plurimo, uel aqua marina, uel muria dura pota. Constantinus Cæsar lib. 20. de agriculturâ cap. ultimo, eam ipsam murtam non duram, sed *σακίαν*, id est, stillaritiā & illi quidam siue percolatam appellant. *ἐλας* inquit *σακίης διδύμασσι δίνει ὅτι οὐδὲ ἀπὲρ ἰμβλῶδιν πίπτει. ἰὰρ ἡ βυδίζουσα, ὅπου ἔχει ἄλας τὸ σῆμα.* At uero quam Galenus *ἐλας* *δανὺς ἐλαγέρην* dixit, eandem Archigenes citante Galeno supra lib. 2. cap. 7. *ἐκράτον* appellauit. Quare tres in uniuersum murtarum species existunt. *ἐκράτον* uidelicet quam Hippoc. 1. *χωμακίαν, γλυκύαν* appellasse uidetur, *ἰκράτον* & *ἐκράτον*, hoc est cruda, matura siue temperata, & dura siue metaca, uelut supra lib. 2. cap. 7. reddidimus, quem locum eū Actius transcripsit serm. 4. cap. 67. Verum interpretis Italus aquam tepidam pro *ἐκράτον* conuertit, *ἐκράτον* uoce ab *ἐλας* seu iuncta, sed hoc minus mirum, quàm quod eodem capite sicic pro pipere, & scordium pro allio haud scio q̃ Italice conuertit, *σῆμα* nimirū pro *πικρὺν*, & *σῆμα* *δαν*, uocem pro *σμερίδιν* contra omnē rationē & terū expensionē reddendo, ut mihi Germano eius auctoris interpreti non parum gloriosum sit, quod me fortuitum collegam non est aspernatus.

33. Aut fabam fresam cōmanducatam imposito cū melle. Inter reliqua auxilia ad sugillatos facientia, Archigenes etiā fabæ fresæ aliquoties meminit. Quando uero alia sufficienter ab ipso Galeno declarantur, de faba fresca hoc adijciendum esse uisum fuit, eandem esse fresam & fractam à Plinio dictā, quam Græci *φρυγὴ* simpliciter uocant, *ἐκ τῷ ὑψιδίαν*, quod uidelicet in minutas partes sit fracta, ut sit *φρυγὴ* in faba, quod *χρύθον* & *πρωτὸν* in frumentis, uelut alibi dixi. Quæ uero molita est & in farinam redacta, lomentum fabaceum dicitur, & græcis *λευκόν* *ἐλάγρον*, itemq; *ἐλάγρον* *φρυγίον*, quod hoc loco Galenus etiā cum melle subactum, sugillasis commodè imponi tradit, sicut Archigenes fabam fractam, cōmanducatam prius imponi iussit, propter saluæ uires, inde accessuras. At uero & *φρυγὴ* uocem pro lomento & farina fabarum, non infrequens est reperire, sicut paulo infra, ubi cerusæ & spumæ argenti æquales partes teretæ cum melle subet, & ammixta faba fresca, hoc est, *φρυγὴ* ad cerati formam reducere. Non possit enim *φρυγὴ* commodè ammisceri in cerati formam, nisi in farinam redactus. Quin & *φρυγὴ* non de faba solum dicitur, sed & de alijs leguminibus, itemq; radicibus, eodem modo fractis. Paulus libro 3. cap. 24. *φρυγὴ καὶ σφισάνης φρυγὴ ἀνὰ f. a. s.* habet, hoc est iridis & pisanæ fractæ seu fresæ utriusque sesquialterarium. Hippoc. *πρὸς χωμακίαν φρίνας καὶ ὑψιδίαν πικροσφρίας καὶ ἰεροφρυγίαν* habet, id est ordeum tostum ac fresum, Galenus 1. de alimentis, Cicer fractum non ualde in cibo familiare esse dicit, sed magis farinam ipsius lacte coctam, quum non possit eodem modo, quo fabæ & pisa frangi, ut ex ipso *φρυγὴ* fiat. Appellatur autem edulium ex cicere, & reliquis leguminibus fractis *ἰκράτον*, sicut ex farina eorundem pulmentarium *λευκόν*, uelut in libro *πρὸς ὕλην καὶ καταχυμῶν* ipse Galenus declarat. *ἰκράτον οὐ ἰσχυρὸν*, inquit, *τὸ ἐκ τῆς φρυγὴς καὶ σφισάνης καὶ ὑψιδίαν σπιδίαν*, *λευκόν* *ἢ τὸ ἐκ τῆς ἐλαγέρην ἐλάγρον ἢ ἰκράτον ἢ ἰσχυρὸν*, προσεμεικταμένον τῷ λίπτι. Quare *λευκόν* *ἰκράτον* apud Græcos medicos nihil aliud est quàm faba fresca elixata, & *λευκόν* *λευκόν* nihil aliud est quàm fabæ lomentum elixatum. Sic Paulus libro tertio cap. 30. ad clauos & callos *πρὸς καὶ ἢ λευκόν* *λευκὸν* *μὲν ἄρα ἢ ἰσχυρὸν*, hoc est facit & fabæ lomentum cum aceto coctum. Idem *ὑψιδίαν* *λευκόν*, id est, erui farinam siue lomentum habet libro tertio cap. 25. & Hippocrates *πρωτὸν* *λευκόν* in spuris ad primum *πρὸς χωμακίαν* adiectis. *πρωτὸν* inquit *λευκόν* *ἰμβλῶν* *δὲ χεῖρα ὑψιδίαν* *ἢ ἢ μὲν λευκὴ γρίστα*. Neq; referre libet quid his locis interpretes uenerint.

Vnde

Vnde passim est neq; pisum, neq; putamen ouis, *λίανον* appellari, uelut aliqui traxiderunt, sed aliquando quidem & simpliciter dictam, pro oui luteo ac uitello ac cipi, cum additione uero, eius rei quæ adijcitur farinā elixatam. *λευδοπύλα* ita quæ græcis appellantur, non qui pisa aut oua uendunt, sed qui eiusmodi pulmentaria, farinas uidelicet leguminum elixatas, et pinguedine aliqua cōditas uenum proponūt. Apud alios tamen scriptores *λίανον* etiam oui testam siue putamen significat. Sic apud Artemidorum lib. 1. somnio 85. *ἰδίῃ περὶ δ' ἄλλος πρὸς τὸ λευδοπύλας ἰσθῆναι ἐφ' ὅσον, καὶ τὸν μὲν λίανον ἀρρενέειν, τὸ δ' αὖν προαρρενέειν*, hoc est, uisus est sibi seruus quidam ouum ab hera accipere coctum, & putamen quidem abijcere, ouo uero uti. Nisi fortassis *τὸ μὲν λίανον*, pro *τὸ μὲν λευδον*, quod isthic habetur, est legēdum. Paulus porro lib. 4. cap. 11. a chirurgia hypochimatū, lanam albo oui & rosaceo imbutam imponendā tradit, his uerbis. *καὶ ἀνδρόντο· ἰσθῆναι λευδὸν αὖ σὺν ροδίῳ διότιν ἀνδραιοῖν*. Verum lectio est corrupta, & pro *λευδον* *βον* legi debet *λινον*. Non enim lutei, sed cādidi ouorum eo loci usus expetitur. Quanquam aliās nō dissimilis & uitelli sit facultas, ut qui iidem medicamentis inflammationem arcentibus misceatur.

Aut cuminum linteolo illigatum in feruenti aqua tinctum pro fomento adhibe. Hoc auxilium in græco exemplari paululum corruptum, sic legendum est. *ἢ κύμινον ῥολιὸν ἐν δ' ἄλλος αἰς ζεῖον ἰσθῆναι πινεῖν*. Estraūt & paulo ante hūc locū lectio ipsa corrupta, *ἵππια δὲ πελιδνῶν ἢ μέλαν ἢ ἄσθι μηχανῶν* &c. Vbi legendū est, *ἵππια δὲ πελιδνῶν ἢ μέλαν ἢ ἄσθι μηχανῶν* &c. Sicut nos uertimus, qualia liuis aut iam nigrescētis & inueteratis sunt adhibenda. Sed & paulo post quod dicitur, Aut sceniculū tritum impone, in græco *μαλάκιστον λαῖον ἀνδρόντο· ἰσθῆναι* pro *μαλάκιστον* &c. habetur. Esse autem *μαλάκιστον* legendum tum ex subscriptis Apolloniæ phar macis, in quibus idem habetur, apparet, tum ex Galenō constat, qui lib. 7. simpl. pharm. suffusis auxiliari testatur. Sequitur nō longe post, Aut cicer eruinum eodem modo. Galenus duo ciceris genera facit, alterum *αἰός*, id est aries siue arietinum appellatum, alterum *ἐρυνάιον*, id est eruinum dictum, quod hoc loco ab Archigene ad sugillata commodum, ob uim discussoriā & exterforiam proditur. Plinius 18. cap. 11. ex Theophrasto, ut apparet, differentias ciceris magnitudine, figura, colore & sapore diffinxit, & arietinum appellatum esse, quod arietino capiti simile sit prodit, dulcissimū uero id quod eruo simillimū, quod postremum mirum est si in illo recte legitur, quum Galenus & Paulus caliditatem & amaritudinem eruiño ciceri tribuant, ob quas qualitates facultatem & splenem, & hepatis, & renes expurgādi habet, ut hoc genus etiam ea gratia iſtericis in cibo exhibere iubeat, infra lib. 9. cap. 1. Archigenes, in aqua maceratū, à sumpto primum ipsius cremore. *ἐρυνάιον* autem *ἐρυνάιον* ibidem appellat, uelut etiam Galenus 6. simpl. pharm. ne quis uocem corruptam ex *ἐρυνάιον* putet.

Ceterum ad uetustiores sugillationes smilacis fructus cum uqa nigra tritus facit. Smilacē tum asperam, tum leuem, Gal. lib. 7. simpl. phar. in litera *μ* refert, *μέλαν* appellans, ad differentiam utputo, *σμίλακον* arboris quæ & taxus uocatur. Idem facit eum in hoc, sicut in cæteris instar similit̃ imitatus Paulus. Dioscorides tamen atq; alij *σμίλακον*, adiecto ad caput uocis *σ* uocāt, eiusq; fructum hic ob calidā & acrem uim, ad sugillata Archigenes probat. Porro paulo post uox *ἐρυνάιον* falso legitur, pro *σπαραγάνῃ* aut *συμβριχνῇ*, hoc est ut reddidit, comparative.

Quæ Crito ad sugillata recentia medicamenta scripsit. In his Critonis auxilijs ad sugillata descriptis, primum cicutam tritam ex aqua impone, habetur. Verum cum cicuta, hoc est *κρόνον* excellēter frigida ac repulsoria ui prædita sit du

bito an hic recte legatur, quum scopus sit in sugillatis, ut sanguis collectus in loco contuso discussatur, & ut ipse Galenus in principio huius tractationis dixit, ut primum parum quid ex adstringentibus ad discussoria addatur. Hanc hæsitacionem auxit mihi uetus interpret, qui *λύματα* pro *λύματα* legit & pro *μὲν ἰσθμῶς*, legit *μὲν μάλιστα*. Et sane cuminum etiam supra Archigenes inter sua auxilia recensuit, ut cumino etiam ipse uti malim, nisi planè in principio inflammationum ac influxionum repellendarum gratia, cicutam adhibendam à Critone etiam accipiamus, qua gratia etiam Heras infra cicutam in medicamentum compositum ammisit. Inter eadem auxilia conuenit, bryoniæ radicem tritam cum melle imponito, aut rosaceo cerato exceptâ adhibeto: sed in græco exemplari lectio est corrupta. *Βρυονίας ῥίζαν τριψάσας μετὰ μέλιτος ἀποτίθῃ, ἢ τριχομύδων καρπῶν ἀναλαβὰς ἐπιτίθῃ*. Puto itaq; pro *ἢ τριχομύδων καρπῶν* &c. legendum esse, *ἢ ῥοδίων καρπῶν ἀποτίθῃ*. Meminit aut & infra cerati rosacei, ut hic non sit inepti putandum.

Animaduertere aut oportet diligenter ne cutis exulceret. Crito tum in hoc, tum in sequenti medicamēto hanc cautionē adhibere iubet, *ὥστε μὴ ἐλκεσθῇ ὁ χῶρς*. id est ut dixi, ne cutis exulceretur, quanquā in sequenti simpliciter, *ὥστε μὴ ἐλκεσθῇ* habetur, quod ego ne locus ulceretur, reddidi. Veri autē in priore loco cutem *τῶν χῶρων*, nō quod *χῶρς* proprie cutem significet, aut hanc solam, sed quod commodius usum fuit dicere cutem, quam corpus, aut carnem, quæ item *χῶρς* uoce indicatur, uelut Galen. lib. 1. commentariorū in Hippocratis librum de fracturis tradit, his uerbis. *χῶρτα καλοῦσιν οἱ ἰατροί, τὸ ὅτι τὸ σῶμα τῶν ἄνθρωπων σαρκοδὲ, ὅτι ἡ μὲν λυγρὴ ῥήξις, τὸ σῶμα ὡς αἰ μὲν δὲ σῶμα, ἰσχυρὸς δὲ αἰ ὁ μὲν δὲ ὡς ἀπὸ ἀνθρώπου, τὸ δὲ τῶν ὀστέων ῥήξις, οὐκ ἐννομεῖται χῶρτα, καὶ οὐκ ὡς αἰ τὸ σῶμα, ἀλλ' ὡς οὐκ ἐννομεῖται. Atq; ita etiam Homerum accepisse ait, quum inquit:*

Ὡς αἰ μὴ ἐλκεσθῇ τῇ χῶρτι καλὴν ἰδέσθαι.

Nelaceres tenerum plorans miserabile corpus.

Thuris integræ nō sectæ tantundem. In hoc medicamento thus *ἑπταγών* probat Aristarchus, quod ego integrū non sectum dixi. Est enim iuxta Dioscoridē thus opumū quod masculum appellat, & naturaliter rotundū est, non sectū. Nam sectum de industria rotundū sit, nimirū cum quadrangulari figura sectū ac in figuram linum coniectū, tādū obuoluatur, donec rotundū fiat, atq; hoc *ῥῆμα* appellat, illo deterius, ut cōtrariæ appellationis. Dicunt hæc genera etiam *τρυφὴ* & *ἀνθηδών*.

Glandis Aegyptiæ tantundem. *Βάλανος ἄγυπτίου* hic non aliam dicere uidetur Crito, quam eam quam mox sequenti pharmaco *βάλανος μυροβάλανος* appellat, & quam glandem unguentaria Latini, itemq; myrobalanum Plinius uocant. Aegyptia autem dicitur patriæ appellatione. Dioscoride enim autore in Aethiopia & Aegypto & Arabia, & in Penæ Iudææ urbe nascitur. Eius uero usus cōmodus existit sugillatis, ob uim extensoriæ & incisorîæ, ob quas etiam ad uaros & lentiginēs, cicatricesq; nigras efficax estur & Diosc. & Galen. produnt. Porro cum hæc glans unguentaria *μυροβάλανος* dicta in Aegypto, uelut dixi, nascatur, & in eadem proueniat quoque palma, quæ fructum *φαικαςβάλανος* uocatum, hoc est palmarum glandem producit, error utique committi potest, ut *μυροβάλανος* pro *φαικαςβάλανος*, aut uicissim hæc pro illa accipiantur, à quo neque Plinius immunem esse supra lib. 1. ostendi, nisi librario impurare quis malit delictum, qui pro phœnicobalano, myrobalanū libro uigesimali tertio, capite quinto, substituerit. Quamquam idem Plinius lib. 12. cap. 22. ubi ait: Myrobalano in ungentis similem propter xonumq; usum habet palma in Aegypto, quæ uocatur adippos, uiridis; colore mali coronæ, nullo intus ligno &c. uideatur planè phœnicobalanum cum myrobalano cōfundere, quum tamen res sint diuersissimæ, & palmarum succus in ungentibus

ta commodus nequaquā exprimat. Quare quod Diosc. lib. 1. de palmæ fructu dixit, *ἡ μύροβαλανος τῆ ἀρετῆς μύροβαλάνου*, Plinius in ungentis similem proximumque usum habere ait. cum Diosc. id non uelit, sed *ἡ μύροβαλανος* de aliquali figuræ similitudine dicat, nō de usu in re medica ac ungentis, imō planè alias uires palmulis, quæ & dactyli hodie appellantur, & Diosc. & Galen. adscribunt, quæ myrobalano siue ungentariæ glandi. Durat autē utrunque pharmacum in hodiernum diem, & phœnicobalani quidē altero sui genere rari sunt, illo uidelicet quod Plinius nullo intrus ligno esse dicit. Meminit huius generis ex ossis item Aetius u. cap. 30. *ὁ κελύκος δὲ* inquit *φαίνεται κερυνώτης ὁ μὲν ἔχειν ὀστέον, ἄτε φέρεται ἡνέστερον δὲ, ὅτε ἀντιχρίσται τῇ νιχέριος*. quibus uerbis indicat non omnes hoc genus palmas ex natura osse carere, sed arte sic parari. *κερυνώτης* autē dixit Caryotam Varroni & alijs itemque Plinio appellatam. Plinius autem lib. 8. cap. 4. ubi per longum de generibus palmarum agit; Sicciore inquit in hoc genere Nicolai, sed amplitudinis præcipuæ, quare mihi cubitorū longitudinem faciunt &c. Eorundem uero & Paulus, cum alibi, tum lib. 7. in epithemate ex uinaceis meminit, *φαίνονται μυροβαλάνος δ' ἴσως* in ipsum cōiungere iubens, appellationem autem eam à Nicolao Damasceno periparetico philosopho, ipsiis impositam, & primū quidem à Cæsare Augusto, cui *ἰς* carissimus fuit, autor est Plutarchus in quæstionib. conuualibus. Atque hæc de palmulis obscuriora hic adijcere usum fuit, de quibus tamen etiam alio loco egi. Porro sicut cassia fistula & spodiū, itemque sandaracha, aliæ res sunt apud Arabes medicos, aliæ apud græcos, uelut alijs locis à me est demonstratum. Sic myrobalanorum genera hodierna, ex Arabū scriptis in usum medicum producta, alia sunt quæ myrobalani græcorum. Et sanè myrobalani Arabum uideri possunt ipsas inspicienti, esse ex palmarum genere, ut tum Diosc. lib. 1. ubi similitudinē aliquam palmæ ad Arabicam myrobalanū esse dicit, tum Plinius lib. 13. cap. 5. ubi ait: palma quæ fert myrobalanū &c. uideri possint Myrobalanum pro genere palmæ agnouisse, & pro hoc adeo genere, quod nobis Arabes medici in officinas protulerunt. Verum Plinij locus corruptus est, uelut supra lib. 2. ostendi. Myrobalanum uero Arabicam à Dioscoride dictam, non esse aliam quæ *βάλανον μυροβαλάνου* ab eodē lib. 4. descriptam, uel hinc clarum esse arbitror, quod nunquam speciatim myrobalanum describit, sicut neque Galenus, neque Aetius, neque Paulus, minime relicturi, si diuersa ab illa ipsa esset. Quare certum esse penitus mihi persuasi, myrobalanū græcorum medicorum nihil aliud esse quàm *βάλανον μυροβαλάνου* ab iisdem medicis dictam. Sed & Aetius 10. cap. 1. cum ait, *ἡ δὲ τῆ μυροβαλάνου βάλανος, ἢ μυροβαλάνου καλοῦνται, ἐνίκατοι γίνονται, ὁ μὲν τὸ ἐφελκυστικὸν πλεον*, planè indicat myrobalanos & myrepseas balanos eandem rem esse. Quin & Celsus lib. 6. cap. 3. medicamentū Tryphonis recensens, in quo myrobalani magna habentur, de nulla alia re dicit, quæ de retrimētis ab expressa myrobalano reliquis. Hoc enim retrimētum Tryphon *μέγμα*, sicut Diosc. *τετάρτα* appellauit. Velut alibi in his cōmentarijs abunde ostendi. Quo loco etiam alium ex Cello, & unū ex Galeno produxi locum, ex quibus apparet eandem rem balanon myrepseicā & myrobalanon esse. Sicut quoque lib. 11. meth. ubi ait, *μυροβαλάνου τέταρτα, καὶ ἵππος τῶν φίλων ἐνίκατοι γίνονται, καὶ κίλινδροι καὶ ἀσπιδιοῦνται, ἐπιρροαῖα μὲν ἀπὸ τοῦ ἀρχοῦ τῶν μυροβαλάνων καὶ τῶν τετάρτων &c.* nihil aliud quæ balanon myrepseicā se accepisse ostēdit, quam sanè Arabes medici Ben appellatione describūt, rem ab eorundem myrobalano penitus diuersam. At uero quæ hodie nux muscata seu moschata uocatur, non alterius generis quàm myrobalanorum græcorum censendam puto: & fortassis ea est quæ chrysobalanos infra lib. 8. appellatur. Neque enim credere sustineo ueterib. ignotā fuisse, in tanta hodie frequentia, nā quæ ab Arabibus medi-

cis ei adscribuntur uires, magna ex parte Diosc. βαλάνω μυρεψικὸν tribuit. Verum est hæc in suo genere magis aromatica, & stomacho comoda, tum corroborans, ac concoctionē iuuans, quod Diosc. de balano myrepfica negasse uidetur. καὶ οὐ μὴν οὐδὲ διηγεῖται inquit. Ad olei certe ex ea expressionem reliquis generibus etiam accommodatior uidetur. Succum aut ex balano myrepfica expressum, olei uicem in ungentis preciosis præbuisse. Diosc. lib. 4. testatur, & cum in alijs, tū in amaracino ac cinamomino ungento lib. 1. meminit, eundē uelut Plinius quoq; facit oleum balaninū sæpe appellans. Nolo tamen hac parte in hac rerum obscuritate, quicquā adseuerantius astruere. Hoc solū constanter credo Aegyptiā glanzdem hic à Critone nō aliam esse dictā quā ungentariā paulo post ab eodem appellatam, quāquā Plinius 13. cap. 4. sine, cū de palmis ait, cū cotoneis & cera & croco sugillata emendat, planē indicet palmarū etiam usum ad sugillata cōuenire. Verum ego locum corruptū puto. Verba enim quæ Diosc. habet, Pliniū siue ex ipso Diosc. siue ex alio græco autore, unde etiā Diosc. sua accepit, transscriptū se apparet, quæ sanē hac parte cum Diosc. non cōueniunt. Diosc. enim habet, ἐκ δὲ ἑρπυλίου ὡφελὲς διηγεῖται ἰσχυρὰ ἀποσπῆκον, τομαχικόν, στυγοντορῆκον, ὅτι τὰ πρὸς τὰς κεφαλὰς, καὶ τὰ πρὸς τὰς ὀφθαλμοὺς λήπτει μετὰ τὸν διανίον καὶ λαρῶν οἰνωθίνων. Quæ Plin. reddidit, sanguinem quoq; excreantibus utilis in cibo maxime, Illinunt caryotæ stomacho, uesicæ, uentri, intestinis, cum cotoneis & cera & croco sugillata emendat. Plin. itaq; duo diuersa auxilia fecit, ex uno à Diosc. prodito, quod sic apud Pliniū legi debebat. Imponunt caryotæ stomacho, uesicæ, uentri, intestinis, cum cotoneis & cera to cenanthino. quāquā neq; sic Diosc. sententiā integre fuerit expressa, sed exempli tantū gratia id produco. Neq; mirū uideri debet etiā hanc culpam ipsius Pliniū esse, cum nō hic solum, sed & in alijs locis λαρῶν uocē male reddat. Sic lib. 22. cap. 17. de helxines succo dixit: imponit & podagris cum caprino seuo ceræq; cypria, quod Diosc. habet, ἐφελὲς καὶ τὰ χυμὸν καὶ τὸν ποδὸν καὶ τὸν σὺν λαρῶν τὸν λαρῶν ἀναλῶν, ἢ τὸν γάλακτος. & lib. 12. cap. 15. opobalsamū cerā cypria uitia dixit, quæ penitus nulla est, nam cyprus ceræ laudē nō habet. Verum sic reddidit λαρῶν τὸν λαρῶν τὸν Diosc. dictā. Et lib. 17. cap. 7. de absinthio, Peculiariter ilibus imponit cum cypria cera, aut cum fico. Vbi Diosc. habet, καὶ τὰ πρὸς τὰς κεφαλὰς καὶ τὰς ὀφθαλμοὺς λαρῶν τὸν λαρῶν. & lib. 25. ca. 8 de buphthalmo. Hæc cum cera scirthomata discutit: hoc est σὺν λαρῶν τὸν σκλήρην σκλήρην. id est, cū cerato, & nō simplici.

Ego uero nucem per ætatē oleosam factā expertus sum. Hoc me (ter ceradicamentum Gal. se experimēto cognouisse dicit ad sugillata comodum, quāquam & Plin. eius mentionē faciat, lib. 23. cap. 8. Et quæ per ueteres sunt nuces inquit gangrænis & carbunculis medentur, item sugillatis. Aetius 8. cap. 2 idem auxilium ex Galen. transcripsit, sed καθάρων ἐλασμάτων hic Galeno dictū, ipse τρυγίδων appellauit, hoc est nucē rancidam uelut ego in eo opere nuper à me cōuerso reddidit. Est enim τρυγίδων uerbum, rancescere & rancidum fieri significans, à uoce τρυγίς id est rancidū, quam Paulus & Aetius sæpe penumero de nuce usurpant, de ductum. Paulus lib. 7 τὰ λάρνα τρυγίς ὅτι παλαιότερα ἐν τρυγίδι ἔχουσιν τὸ πρὸς τὴν ἀσθένειαν, quibus uerbis planē indicatur facultas exterior, ob quam rancidæ ob uetustatem nuces ad sugillata sunt efficaces. Fit aut & oleum ipsum τρυγίς, id est rancidū, quod quomodo curetur, Constantinus Cæsar lib. 9. cap. 22 docet. Pomō Gal. lib. 7 simp. phar. inter reliqua quæ de nuce arbore eiusq; partibus habet, de fructu eius qui in cibi usum uenit tradit, quod oleosus sit & tenuiū partū, ut ob id etiā facile in bilem transeat, præsertim repositus & inueteratus. Verum lectio corrupta est. Legitur enim ἐκλυθῆναι, quod interpret recitior facile exprimitur uertit, nulla sententiæ expensione facta. Nihil enim tale Gal. docere uult, cū pau-

lo post dicat; oleū ex ipsa in ueterata nuce exprimi posse, & quid adeo attinebat de exprimendi facilitate, re cōfessa scilicet, uel hoc uel altero loco mentionē faceret. Legendū est itaq; *ἐκχολᾶται*, hoc est in bilem mutatur, in cibo accepta uidelicet. Nam sic aperte Paulus lib. 7 habet, *τὸ ἰδιώδιον αὐτῶν ἐλαττωδὲς ἔσται, ἐπεὶ οὖν ἐκχολᾶται*. Sed neq; eius interpretēs aliter q̃ *ἐκχολᾶται* legit & uertit. Verū in hoc minus mirū id est, nempe homine & medicinae & literarū græcarū ex æquo ignaro, ita ut ne titulos quidē & argumenta operi præmissa intellexerit. Quod autē *ἐκχολᾶται* legendū sit, & experimento cōstare cuiq; potest. Et Diosc. palam testatur, *καρπὸς βασιλικὸς ἰδιώδιον ἐκχολᾶται*, hoc est nucēs regias comestas bilē facere, dicēs. Vbi patet autē idem uerbū Gal. lib. 3 de alimentis; de melle loquens, *ἐπεὶ οὖν ἐκχολᾶται ἢ τὰ βότρυς σάμας*.

Eiusdē Heræ ad egilopas. Videtur hoc loco Gal. post habitā mentionē phar-
maci ab Hera ad sugillata cōscripti, eiusdē medicamētā ad egilopas prodita sub
fecisse, de quibus consequenter cap. 2 ueluti distincti agit: possit tamen & titulus
de egilope his Heræ uerbis præponi, reliquis æque apte successuris. Habet autē
inter cā pharmaea, aut myrti recentissimas baccās cataplasmatīs modo adhibe,
sed in græco exēplari *ἢ σμύρνης* in præposita *καρπὸς μύρτι* habetur, *σμύρνης* uo-
ce pro *μυρτίνης* supposita, quo dū ex Dioscoride liquet, qui de myrti fructu, *ἢ
καρπὸς ἐκχολᾶται ἢ τὰ βότρυς σάμας*, inquit. In cap. 11 de egilope.

Inter reliqua auxellia ad egilopas ab Archigene prodita, etiā egilopis herbae
succus probatur, cum melle illinendus, ob uim uidelicet discussoria quam ha-
bet. Est autē egilops herba à Theophrasto, Diosc. Galenoq; ac Plinio descripta,
nulla alia q̃ quæ & hodie auena dicitur, sed tamen magis ea quæ sua sponte pro-
uenit, atq; hordeo in eam degeneratē sit, atq; ob id frumenti uisū à Plin. dicta est
lib. 18 cap. 17 ubi etiam non aliter hordeū à festuca quæ uocatur egilops enecari
dicit, q̃ triticū ab æra, id est solio, et cicer ac equū, ab herba quæ inde orobache ap-
pellatur atq; hoc est quod Virg. Maro dixit, Infelix lolū, & steriles dominan-
tur auenæ. Steriles enim auenas, egilopā appellauit. Porro quæ à Diosc. lib. 2
itemq; 4 (quāq; eo loco suppositiū caput de bromo putem), describitur brom-
us, item auena est, sed satiuā & nō sponte proueniens; neq; ex hordeo degene-
rante producta, quāq; & hanc Theoph. egilopā appellare uideatur. Quare in-
ter bromon & egilopā hæc differentia est, quod bromos auenā frumenticiā, sa-
tiuā, purā, & quam hodie albā appellamus, significat; egilops autē auenā ex
hordeo degeneratē proueniēte, & inter frumentū sua sponte, utpote eius uisū;
atq; etiā alias enascēte, & quam hodie auenā syluestre ac erraticā uocamus.
Huic enī auenæ descriptio egilopis apud Diosc. penitus eouenit. Plinius ta-
men iam Theoph. iam Dioscoridē secutus, egilopā utrāque auenæ speciē dixit.

Quæ Asclepiades ad egilopas cōscripsit. In priore ex his duob. pharmacis
Asclepiades ad finem; mastichen uerō improbamus, cōuerti. Puto enim legendū
esse *τὸν δὲ μαστίχην ὁρμητικὴν*. Videtur nūque uelle indicare, in eptā esse eius mi-
sturam in hoc medicamentū. Verū exemplar habet, *τὸν δὲ μαστίχην ὁρμητικὴν*, tāq;
accipiendū sit, mastichē euestigio inijciendā esse; ut eum succis coquatur; quæ le-
ctio mihi non placet, tum quod asterisco adiectio à typographo mihi sit suspecta,
tum quod mastichen in cocturā addere non cōuenit, sed probe terēdo lento igne
dissoluere, alias enim spissatur, & omnino ægre liquefcit. Est autē hic mos familia-
ris scriptoribus pharmacorū, ut præscriptio medicamētō, ipsi ad finem iudicium
suū apponāt, de his quæ ritē aut secus in ipsum indantur.

Arum Galenus tuberculū siue tumorem paruū describit & durū in facie,
additq; eius originem & causā, distēditq; simul pharmacorū facultates,
ad ipsum curandū efficaces. Verum cum sint & alia genera tumorū, qui faciem

occupare solent, mox eos omnes à uaris distinguit, primū ficosos tumores, mox lichenosos menti tumores, deinde menti eruptiones, postremo furunculos describens, singulorum causis, ac medicamentis facultatibus adiectis, quos omnes nos in singula capita distinximus, quantum, quin tum, sextum, septimum, quamquam Galenus coniunctim quasi sub uno uarorū titulo de omnibus agat, & post communitatem ac diuersitatem singulorū ostensam, etiam consequenter specialia ad singulos auxilia mixtim tradat, quæ tamen singulis conueniant probe distinguens. At uero uaros latinis dictos, græci *ῥαῖες* uocant, itemq; *ἐλκας*, ut Aretius habet. *ῥαῖες* sanè quod instar *ῥαῖς* id est simi faciem conspurcent, ac maculis foedent, uelut etiam qui *ῥαῖδες* uocantur. *ἐλκας* uero quod nō sint pruriginosæ, & ob id ad scalpituram sui non stimulent. De ficosis autē tumoribus supra meminimus. Eruptiones uero in cōmuni græci *ῥαῖες* latini pustulas ac papulas uocant, furunculos *ἀλῦνες*. Verum lichenosi tumores quos ex mixto humore, serosis uidelicet ac tenuibus succis cum crassis permixtis generari prodit, ac facile in psoram ac lepram transire, quales sint considerabimus. Lichenes itaq; nouum morbum putari, Tiberij Claudijs Cæsaris principatu Romam inuasisse, tradit Plinius lib. 26. cap. 1 qui græco quidem nomine lichen, latine uero cum à mento fere otitetur, loculari primum lasciuiā, mox & usurpato uocabulo, mētagra sit appellatus, occupans in multis totos utiqui uultus, oculis tantum immixtus, descendēs uero in colla pectusq; ac manus, fœdo cutis fursure. Quibus uerbis eundem fere etiā Crito paulo post citāte Gal. depinxit. Quod itaq; mētagra hic morbus Rhomæ uocatus sit, etiam Galenus infra testatur in excoꝛiatorio Pamphili medici, sed in græco exemplari *μυρτιγῆρας* pro *μυρτιγῆρας* falso legitur, estq; ipsa uox uiciosæ compositionis, ex græca ac latina parte constans, contra grammaticorum præcepta; unde etiam Plinius mox usurpato uocabulo dixit, rāquā quod neque ipse probet. Ex mento enim & *ἐμπόλαι* uerbo, cōpositio facta est, ad similitudinem uocum *μυρτιγῆρας* & *μυρτιγῆρας*, quæ recte utraq; parte græca componuntur. Quod uero nouus hic morbus sub Claudijs Cæsaris principatu coeperit, Galenus non meminit, neque omnino uerum est, quum plerique autotes ex quibus hoc loco Galenus phar-maca citat, ante Claudiū uixerint, & impetiginis nomen longe ante ea tempora latinis notum fuerit, quod de nullo alio morbo accipi debet quàm de lichenibus à græcis appellatis, quos ipse etiam Plinius aliquoties impetiginem cōuertit. Quare de uolentia & repentina eius mali impressione Plinij uerba intelligenda sunt, quando tum magis quàm ullo alio antea seculo lichenes inualuerint. Sicut etiā nostra ætate ab anno Christi quingentesimo supra millesimum, per iuges fere triginta annos per omnem Europam feruissime grassati sunt. Neque enim alterius generis censendus est, qui uulgo hodie Gallicus & Neapolitanus morbus, & ab alijs Hispana scabies nominatur, quāquam hæc ipsa affectio multarum specierum existat, & non recens aut noua huius sæculi, iuxta quorundam traditionem. Videntur autem *μυρτιγῆρας* appellati, non quod linctura saluæ humanæ curētur, ut quidam opinati sunt, cum tamen res se non ita nisi in admodum leuibus habeat, & hoc non ex lincturæ, sed pituitæ utcumq; adhibitæ facultate, uelut Galenus tertio, *πῶς γίνεται δυνάμει* testatur, *ἡ γὰρ ἐκ πάλυρα, τὰν δὲ ἐκ τῆς σάπης καὶ ἀλγίνης* &c. *ἐκ τῆς σάπης ἀλγίνης* &c. sed quod lambendo proserpant, uelut etiam licheni in petris solet.

Ex Critone ad uaros. Inter hæc Critonis ad uaros medicamenta, in primo statim habetur, Mellis Attici cyathum unum, siue drachmas duodecim, hoc modo *μῦρτιγῆρας* & *ῥαῖες* & *ἐλκας* &c. uidetur itaque exponere, cyathi pondus drachmarū duodecim esse, quod de oleo quidem uerum est, sed mellis pondus oleum exuperat dimidia parte, sicut uinū quoque excedit quarta ampliusq; decima

decima parte: uinum uero exuperat oleum nona parte, iuxta Pauli traditionem, quam nuper à nobis latinam factam ad Aetij finem adiecimus. Verum & hoc loco non in commodum fuerit adscribere, quo singularum mensurarum pondera exacte cognoscantur, iuxta tres præcipuos liquores, olei, uini, ac mellis: atq; id eo etiam proclivius faciemus quod lectio Pauli corrupta, à nemine adhuc est intellecta, quum tamen aliqui suas de ponderibus mensurarum rerum liquidarum traditiones, ipsius Pauli suffragio confirmare sint annisi.

Habet itaque Ceramium siue Amphora Italica.

Olei	Vini	Mellis.
Libras LXXII	Libras LXXX	Libras CVIII
Chus siue Congius habet.		
Libras IX	Libras X	Lib. XIII & dimidia.
Sextarius habet.		
Vncias XVIII	Vncias XX	Vncias XXVII
Cotula siue hemina habet.		
Vncias IX	Vncias X	Vnc. XIII & dimidia.
Magnum mystrium habet.		
Vncias III	Vncias II. scrup. VIII	Vnc. III & dimidia.
Acetabulum habet.		
Drach. XVIII	Vncias II. scrup. XII	Vnc. III. scrup. IX
Cyathus habet.		
Drach. XII	seſquunc. scrup. IIII	Vncias II. drach. II
Paruum mystrium habet.		
Drach. VI	scrupulos XX	drachmas IX

Palam itaq; ostendit Paulus cyathū drach. XII pendere, quo euenit ut sextarius uncias XVIII pendat, cyathis nimirum XII in sextario cōtētis, sed de olei liquore hæc Paulus tradit, quem mel dimidia ponderis parte uelut dixi, exuperat, ut cyathus mellis drachmas duodeuiginti pendat, non duodecim uelut hic Gale- nus ait, aut certe Crito quem ipse citat, ponderis ipsius mellis ratione, cum pon- dere olei leuissimi liquoris confusa: Sequitur mox in sequenti pharmaco, spumæ argenti chemam siue drachmas treis, tanquam chema drachmas treis capiat: ue- rum hoc ipsum quomodo sit accipiendum supra indicauī. Additur autem ad fi- nem huius pharmaci. Hoc pharmacum etiam à rugis liberam & mūdā faciem cōseruat, hoc est *τετανόν και καδαρύνει* *αφ' ου λυθ' ην τ' οφθουται*, *τετανόν* enim exten- tum & erugatum significat, unde & *τετανόν* uerbum est, id est erugo. Dioscori- des de radice uitis albe *χρῆται ῥύνην και τετανόν*. Et *τετανόν* *μακα* ac *τετανόβλα*, phar- maca erugaroria: Est autem & *τετανόν* conuulsionis species, qua nervi ac mus- culi totius corporis distenduntur, & quasi obrigent. Vnde tetanici qui hoc mo- do affecti sunt, Plinio dicuntur libro uigesimo, capite uigesimo secundo, ubi de si- napi ait. Vritur ad alopecias cum rubrica, pſoras, lepras, phthiriasēs, tetanicos, opſithotonicos &c. sed pro tetanicos, legitur corrupte & falso lithanicos, quos quidam lapide laborantes exponunt, quorum Plinium hoc loco nullam mentio- nem facere, uel hoc maxime indicio est, quod opſithotonicos adiecit, qui cum li- thanicis nihil commune habent, sed cum tetanicis, quorum media est affectio in- ter opſithotonicos & emprosthotonicos appellatos: quanquam & ex hoc quod lithanicorū appellatio nusquam alibi est apud Plinium, satis declaratur: itemq; per medicamenti ad calculosos ineptitudinem.

Ad uaros callosos saponis gallici drach. IIII. Gallici saponem in hoc medica- mento Crito probat: est enim sapo gallicū inuentum, uelut Plin. lib. 18. cap. 12. ait. Gallorum hoc inuentū rutiladis capillis, sit ex ſuo & cinere, optimus fagino &

carpinino, (legitur tamē uulgo & falso carpino, quanq̃ sine qui caprino legat̃, nō ad cinerem, sed ad seuum sententiā detorquētes.) duobus modis spissus, & liquidus, uterq; apud Germanos maiore in usu uiris q̃ fœminis. Quibus uerbis duo saponis genera, liquidū & spissum, Germanis in usu fuisse ostendit, quæ etiā hodie restat, uet̃ liquidū magis circa septentrionales populos in usu est. Spissus uero maxime sentietus apud plerosq; oēs primas habet, q̃ oleo oliuæ addito parat̃, calce inq̃ ac sale, aliquādo etiā odorib; quibuscūq; præter cōmunē præparat̃i modū.

Ad ficosas menti popularū eruptiones.] In his Critonis pharmacia in græco exemplari semper *κατάρκασσι* legitur, hoc est cataplasmatiss uice impone. Verū cū pharmaca ipsa arida sint, ut apparet, minime ut cataplasma adhiberi possunt. Quare pro *κατάρκασσι* legēdū est *κατάρκασσις*, id est insperge, quod & Crito ipse satis indicat cum ait, & cū specilli humectū extremo admove, quo uidelicet pharmacum ipsum adhaereat.

Critonis ad lichenas in mento.) Describit Crito lichenas uelut Plin. quemadmodum supra indicaui. Verum quod conuertitur, nam & pruriginē inducit, & affectum partium circumtensionem, ita graeco habetur, *Θυσισμας ἀποφύγει περίσπινον* ἢ *πυρρὸν*. Sed pro *περίσπινον* legendum puto *περίσπινος*, id est circumtensionē. Nam sic etiam Aetius legit lib. 8 cap. 16. Possit autem & *περίσπινον* legi, nisi addidisset *ἢ πυρρὸν*, & uerba quae sequuntur *ἐν λινθίωνι καὶ ἐν ὤνι*, id est periculū nō modicū, idē plane quod *περίσπινος*: uox indicaretur. Significat enim *περίσπινος* eadem & incōmoditatem ac afflictionē, hoc est *λινθίων*. Vnde etiam *ἐπερίσπινος* Gal. lib. 1. ἢ *ῥῆσι* uocari dicit quae nō sunt magna, et nulla grauiore incōmoditate uexantur, hoc est uelut ipse Galen. ponit, quae neque fordes, neque inflammationē simul habent, & neque uitio forū humorum influxū, neque distemperatā circa cauitatē carnem, quod propterea adscribendū putauī, quod uidēam locū hunc, sicut pleraque omnia, mire ab interprete peruersum. Sequitur nō longe post. Ita ut ab inueteratis recentes dissiparemus, quod graece est, *ἐν λινθίωνι καὶ ἐν τῇ λινθίονιδι* πικρὸς ὤνι, sed ex uo persequo *ὤνι* uox, in graeco exemplari est addita. Sunt autem *πικρὸς ὤνι* recens pūdicia, *πικρὸς ὤνι* καὶ *κατὰ λινθίον*.

Pastillilichenici.] Recēset varias medicamentorū formas ex ordine, ad liche-
nas facientes, & primū paſillos, deinde ungenta ſive illitiones, poſtea emplaſtra
uaria, quorū uſum etiam ungentis commodiorē eſſe dicit. Poſtremū etiam exo-
riatoriā pharmaca, & ad corū uſum quadā preparatiō prius corpus ac partes, ut
quid illorū adhibitiōe ledātur. In illitionibus itaq; aliquoties myrrha amineam
mentio fit, hoc eſt *σμύρις αμινιακή*, ſed falſo, debet enim *μυρίακη* pro *αμινιακή*
legi, qui error nō his ſolū locis, ſed in multis alijs, nec in Galeno tantū, ſed & Ae-
rio, & Paulo, atq; alijs græcis medicis inoleuit. *Μυρίακη* autem à loco ubi naſcitur
appellata eſt myrrha, uelut Galenus lib. 1. de antidotis teſtatur, eadēm eſſe troglo-
dyticam ac Minnae prodens, hiſ uerbis. *ἀνθράκι δὲ τῶν ὑποστάντων ἐξ οὗ τοῦτος ὁ φάρμακον
διττός τῷ πρῶτῳ, καθότι τὰ λεγόμενα σμύρις, γίνεαι ἀπὸ τῆς ἐνεργείας μυριάκης καὶ τῆς
ἐπεκτεταμένης ἀφ' οὗτοῦ τοῦ λυσιδίου.* Quo magis mirum eſt Dioſcoridem trade-
re, troglodyticam myrrham primas tenere, Minnaem uero reprobam eſſe, &
αμινιακή δὲ καλὴ γένος inquit, *καὶ διευθετά*, quāquam & eo loco *αμινιακή* pro *μυρίακή*
falſo legatur. Plinius certe lib. 12. cap. 16. troglodyticam primam facit inter *myr-
rhæ* genera, cithyream uero & Minnaem ſecundā, quibus generibus adhuc alia
quatuor deinceps annumerat. Sed & idem Plin. huſ Minnaem, à Minnæorum
pago dictum tradit, eiſdem libri cap. 14. ut certū ſit Minnaem & non Amineam
myrrham appellari, quum in iſſdem proveniant locis thuſ & myrrha, eodē ſcilicet.
Porro habetur in iſſde illitionibus etiam amureca cōdenſata, hoc eſt *σμισημακίνη*
ἀμύρη, quæ non alia eſt q̃ quæ per cocturam inſufflata eſt. Vſurpant enim medi-

ci grad

et graecis uerba συσπριφιδις, κηδε αὐτῶν φιδις, in his quæ liquidiora sunt, & coctiura
deficiunt ac coagmentant. Sic paulo inferius ἑλῖ, inquit, κηδε ἔταν μίλαν θρηνη κηδε
συνσπριφιδις, ἄκωρ &c. hoc est postq̃ nigrum factū fuerit & condensatū, & rursus
non longe infra, ἑλῖ, ἀπὸ τῶν, τικουίνου καὶ, κηδε ἔταν συσπριφιδις, ἐπὶ αἵματι ἑσθῶν. Ac
tius 9. cap. 9. ἑλῖ, κηδε ἔταν ἀνσπριφιδις, ἔρας ἀπὸ τῶν, μὴ coacta fuerint reponito. At uer
o amica ipsa hoc modo cocta etiam efficacior redditur, uelut & Plin. & Diosc.
de ipsa testantur, & Galenus eam multo magis crassarum partium atq; aridam si
ri ait. ut secundū ordinis calfacientium & resiccatium quodāmodo intense sit cen
senda, qua gratia etiam hoc loco assumitur. Porro ἀπὸ συσπριφιδις sunt etiam συ
σπριφιδις, quas φῦμας καὶ σπληνελας Gal. in glossis Hipp. exponit. Diosc. lib. 4. de stri
mento palæstræ. τὰς καὶ αὐτὸ κηδε αὐτῶν συσπριφιδις ἀπὸ τῶν μίλαν, ἀφῶν. id est articu
lorum tubercula ac durities iuuat.

Exemplum Lichenis Philotæ.) Hoc emplastrum etiam Aetius 2. cap. 16. habet, sed uariante aliquo modo lectioe, pro sulphure enim uiuo, hoc est *δύο ἀνύδρη*, Aetius *ἰς* habet, id est æruginis. & pro *ἰσὺς αὐτῆς φαρμάκου* Aetius *ἰσὺς αὐτῆς ἐπιμεθῆ* habet, quod & nos hic reddidimus, donec pharmacum redditum fuerit æruginosum. Deinde aristolochiæ rotundæ & lōgæ pondus *ἀνὰ δραχμὰ* id est utriusq; drach. 1 habet Gal. Aetius uero aristolochiæ simpliciter unciam unam habet. Postremum in liquecibilib. Gal. hic *ἰσὺς δραχμῶν τετρακισθίους δραχμῶν* habet. Sed Aetius *ἰσὺς δραχμῶν τετρακισθίους δραχμῶν* legit, decuplo maiore refinæ pondere, nisi fortassis & hoc loco *σ* ducentarij numeri nota excidit, & pro *τετρακισθίους δραχμῶν*, legendum sit *σφαιλικισθίους δραχμῶν*, id est ducētas uiginti, ut duplum pondus sit apud uirgū, auctorē te- rebinthinē ad cerā. Ceterū quod ad finē addit. Hoc pharmacū duplicē aspectū uē- dētib. exhibet in græco dicit *δυσκρίσιμον ἔστι*, & unde cōtinuat alio loco indicauit.

De excoriatorijs Lichenib[us].] In hoc primo excoriatório medicamēto græcum exemplar ualde est corruptū. Verum ex Aetio qui idē tradit, adiūtī, omnia in integru restituimus: uelut ex trāslatione nostra collaturis eam, cū græco exemplari palām apparebit. Nam singula adscribere maioris tēdij q̃ utilitatis esset. Quæ uero alicuius momenti sunt non præteribo. Velut est quod καυθαριδιον κελιδιον θιακας legi[ti] pro τῶν κελιδιων θιακας, nisi diminutiua uoce κελιδιον dictū accipia[m]us. Nā uentres cantharidū accipiendos esse palā est ex eo quod Aetius hoc loco καυθαριδιον χαλεις περιωρ in πασιωρ habet: sed adhuc clarius ex sequenti Apji Phasi excoriatório reddit, in quo Aetius palā καυθαριδιον τῶν κελιδιος habet, & lectio in Gal. exēplari rursus corrupta est, nā καυθαριδιον τῶν κελιδιος legi[ti]. At uero cantharidū uentres solos accipiēdos esse, reiectis uidelicet pedibus & alīs, tanquam hic incommodis, utrinq[ue], recte legitur. quanquā recte Galenus lib. ii. simp. phar. se in pharmaca ad scabros ungues, & ad pforas ac lepras destinata, totas cantharidas iniicere fateatur; & hoc felici in his malis successu: imò nō in eiusmodi tantū error suas & uisiones cōpositiones integras cātharidas se iniicere dicat, sed etiā in medicamēta urinā cientia, in que ali j corpus tantū, ali j pedes ac alas solū cōiicere solent, utriq[ue] ex Hipp. sentētia ad suam opinionē induc[t]i. Sunt autē Hipp. uerba hec lib. 4. de dicta acut. πωμα ὑψηλοποσωνα, καυθαριδιας προσεθελων των λεφαλην ιασησ, υπο ποσων, in περιε, περιεας εν ηρωσι λευθους ὑδατος τις σωματια. His itaq[ue] uerbis confisum quendā medicū, corpora cātharidū hydropico cuidā bibēda dedisse Gal. ait, sed nihilominus agrū mortuū esse. Cum uero idē medicus à quodā alio medico admonitus esset, Hippocratē iubere his uerbis, nō corpora seu uentres, sed alas, caput ac pedes, in potu præbandas esse, rursus alteri hydropico ille audaculus medicus has partes bibendas dedit, egrūq[ue] similiter interfecit: ut non tuū sit a uentres, aut has partes in potu exhibere; nisi medicamēto alicui urinā cienti ima

mixtas

mixtas. Sic enim Collinū equitē Romanū medicus ex Aegypto uocatus intere-
mit, ut Plin. 29. cap. 4. tradit. Sunt tamen qui etiā hodie quoddā alatorū uermium
genus, nigricātis cum uisore coloris, ex scarabeorū ut equidē puto genit, nō mi-
nus certe q̄ ipsae cantharides ueneno sum, tum hydropicis, tū quibuscūq; in omni
febrili specie propinēt. Appellationē aut uulgo à uerno tēpore, quo maxime ap-
paret, habet, uernalis uermi colorū. Ceterū mixtura siue totarum cantharidū ut
Galen. se usum esse testatur, siue uentriū solorū, uelut hic in Pamphili excoriatō-
rio habetur, minoris periculi est, imò certae salutis in his morbis, quemadmodum
Gal. tum hoc loco, tū in simp. phar. lib. palam asserit. Videntur aut partes illae pro-
pterea fuisse à quibuscūq; à corpore aulsae, quod priuatim cōtra accepta canthari-
dū corpora auxilio sint, uelut Gal. eodē loco, & Diosc. itemq; Aetius 3. cap. 49
testatur. Quin & Plin. cū alibi, tum lib. 11. ca. 35. ubi ait. Venenū hoc remedia secū
habet, alae medētūr, quibus dēpitis lethale est. Quādo enim hoc praestāt, suspicio
nē exhibēt de se ne simul cū corpore admixtae illius uenenū perimāt, aut certe mi-
nus efficax & inualidū reddant. Quare eas partes etiā alibi Hipp. abijcit, uelut in
lib. πρὸ γυναικείας φύσεως, ubi sic ait. ὅτι ἡ διστομάτις, μελαινία, ἢ ῥέδι, ἢ ἀμα κηταιφραγνῆ, ἢ ἡ
μοί, πρὶν τοῦ λυσιτελεῖν τοῦ σώματος ἀποκρίσασθαι αὐτὰ πρὸς αὐτὸν, καὶ πρὸς τὴν σπλῆνα, καὶ τὴν ἐσφαλῆρα.

Cōpositio Menecratis quae propter excoriatōriū appellatur. Hoc emplastrū
ἐστὶ τὸ ἐκδοῦν, hoc est propter excoriatōriū appellatū est, propterea qd corpora
praeparet ad successuras excoriatōriū impositiones, tum squamas auferendo,
tū partes artenuādo ac solidas reddendo, quo illa uim suā efficacius exerceāt, &
partes ipsae munitae eandē patientius sustinere queāt. Iubet aut cocturā liquefobi-
lium in eo fieri ad splendidū ignem donec nō inquinent, hoc est μέγχι ἀμυλῶντα,
hoc est donec pharmacū aliquo modo spissetur, ut neq; manibus contactum hae-
reat, neq; uasa amplius inquinet, quibus effusum excipitur, neq; in frigida aquā
instillatū diffuset, & paulo minus sit q̄ aridū ac siccum, atq; hanc ἀμυλῶντα σκεῦ-
σιν significationē esse, Gal. ipse declarat lib. 2. ad Glaucōnem, ubi de suo empla-
stro quod cōpage quidē liquidū est, facultate aut siccum, ait. ἀμυλῶν ἐστὶν ὅταν γὰρ
ἐκ τῶν ὀστέων αὐτῶν ἡ δὲ δυνάμις ἀμυλῶντα, ὅταν μὴ πᾶν τοῦ σώματος ἢ μὲν ἀμυλῶντα
ἔστω. hoc est, expertus sum efficacius id esse in huiusmodi affectionibus, cum neq;
ualde durū fuerit, neq; exacte cōpagem non inquinantē habuerit: & primo ἡ
ἡδύτης. ἢ ἀμυλῶντα ὅταν αὐτῶν μὴ ἔστω μὲν ἡ δυνάμις ἢ μεταλειπῶν ὅταν αὐτῶν μὴ
ἔστω ἢ ἀμυλῶντα ἢ ὅταν αὐτῶν μὴ ἔστω, ut penitus nō inquinet, aut etiā paulo du-
tius euadat. Et ad hāc compagē etiam hodie coquuntur emplastra citrinū, fuscū
ac gryseum uulgo appellata: atq; ita coquere iubet Paulus emplastra uulneraria
& cruentis uulneribus destinata, quae ipse τραυματικὰ & φάρμακα appellat. Neq;
uero solū emplastrorū coctura ἀμυλῶντα fieri cōsueuit, sed etiā arteriacarū cōpor-
tionū, praesertim quae terebinthinā, tragacanthāq; & gumī, itemq; mel recipiūt.
Sic infra lib. 7. in Aromaticis Michridatis iquit. ἔστι μέλι, ζακύνθου, ὁποῦν ἄλλων ἡρώ-
δου καὶ ἰνδὸς καὶ ἀμυλῶντα φασφίλλου ὅς ὁ δὲ φασφίλλου. Et Aetius 8. cap. 21. φάρμα-
κον ἢ τὸ τραυματικὸν μὴ ἔστι μὲν μέγχι ἐκ τῶν ὀστέων λείων, ἢ ἔστι μὲν μὴ μολύνει φασφίλλου
ἢ ὅταν αὐτῶν.

In cap. VIII de dentū affectionibus.

Communis serē omnium physicorū doctrina est, ossa omnia sensus expe-
tia esse, atq; ob id dolorē non percipere, quemadmodū etiā cerebrū, ac me-
dullam, omnēq; in corpore adipē sensu carere. Quare pro ossiū ratione, etiā den-
tes dolorē non sentire cōsequens est, aut si dolorē omnino percipēt, id neri ad
radicē dentis substrati gratia euenire, ut soli dentes inter omnia ossa dolore affi-
ciantur, uelut Aetius 8. cap. 19. aperte testat. At uero Gal. hoc loco ex suo illustri
experimētō asserit etiā dentes dolore affici, aliquādo citra gingiuarū, citraq; πρὶν
ui cū

[illegible]

ἡλός, ὅτι τὸ ἐπ' αὐτὴν ἀποκαταστήσει· καὶ οὕτως ἐκ τούτου καλεῖται διερμύς, ἵνα καταστήσεται διὰ τοῦτο διὰ τὴν αὐτὴν.
ἀποκαταστήσει μετὰ τὴν αὐτὴν σφραγίσαντες μεταρτίαις, &c. Hacienus Galen.ex quo abunde ostenditur duplum uas esse *διπλασμα*, altero uidelicet in alterum locato, quod etiam ab eodem. 4. lib. 6. γ. ιαυῷ abunde declaratur. Reliqui græcorum medicorum inter pretes diploma etiam latinis conuertunt, quemadmodum sanè etiam ego tum in Galeno, tum in Aetio aliquoties feci, aliquando tamen conduplicatum uasculum reddidi, Sed in Aetio. 8. cap. 20. & 4. 4. conduplicato linteolo, pro conduplicato uasculo typographus expressit, de quo admonere obiter uoluī, ut locum si dioli emendent, neque nobis errorem adscribant, quum sit linteolum tum simplex, tum duplicatum, ad calcaciendum in ipso oleum penitus ineptum. Plinius duplicia uasa *διπλασματα* dixit, 13. cap. 2. de unguentis. Sol inquit, inimicus his quamobrem in umbra coquuntur duplicibus uasis. sed locus per aliquem semidoctum temere, sicut plerique alij corruptus est, qui plumbeis pro duplicibus à se non intellectis supposuit: quum plumbea uasa ad ungenta coquenda sint inepta, & ungentarios duplicibus ad ungentorū preparationem uasis uti, ex Galeni loco lib. huius operis septimi supra citato, didicerimus.

Bodè modo utere pentaphylli siue quinqsfolij, quæ ab aliquibus Eupatorium dicitur, radice.) pentaphylli radicis decoctum dentium dolores sedare in ore dententum etiam Dioscor. tradidit. Verum etiam herbam Eupatorium item dici, nemo alius, quod sciam, tradit, præter Archigenem hoc loco. Dioscorides folia quidem Eupatorii herbæ in quinqs aut plures fissuras diuisa esse tradit, ad similitudinem pentaphylli aut magis cānabis, unde fortassis quondam utraq; est pentaphyllon appellata. At uero Eupatorii herbæ radicis neq; Galenus, neq; Paulus, neq; Plin., neq; Dioscorides mentionem fecerūt, hic tamen continenter tum de Eupatorio, tum de pentaphyllo libro. 4. scripsit, ut non feralia radix quàm ipsius ueri pentaphylli accipienda. Sequitur non longe post medicamentum, Aut haliacabi corticis, & redæ aceto feruēfaciæ decoctio large incoctio colluio. Sed in græco exemplari corrupta est lectio hoc modo. ἡ ἐλκευμένη φλοιὸν, ἢ σιελίης ῥίζαν ποσειδωνίου ῥίζαν, σιελίου ῥίζαν ἀπὸ πολλῶν ἐκφυλισμένην. quam ego sic puto restituendam, uelut etiam conuerti. ἡ ἐλκευμένη φλοιὸν, καὶ σιελίης ῥίζαν ποσειδωνίου ῥίζαν, σιελίου ῥίζαν ἀπὸ πολλῶν ἐκφυλισμένην. Paulò ante etiam corrupte legitur, καὶ αἱ τῶν ξύλων τῶν ὕψους βιβάων. pro quo ego legi ac conuerti, καὶ αἱ ξύλων ἑξ ὧν βιβάων. Non longe post legitur, καὶ κουφίτης τῶν πέτρων, pro quo lego ac reddidi, κουφίτης τῶν πέτρων. Sequitur deinceps medicamentum. Aut sycamini, id est, mori arboris lac in uinum infunde, &c., quod in græco habetur, ἡ συκαμίνου τῶν τῶν μερῶν γάλα αἱ εἰναι ἐγγίαις, &c. Vocat autē γάλα, id est, lac, succum qui ex radice arboris mori circumfossa & incisa colligitur, uelut Dioscor. lib. 1. testatur. ὁ πρὶν τοῦ εἰναι ἐγγίαις, καὶ τῶν πετρῶν τῶν ὑψους βιβάων, καὶ τῶν πέτρων. De eodem etiam Plin. 16. cap. 38. ait. Mirum hic in moro medicis succum quærentibus ferè hora diei, secunda, lapide incussus manat, altius fractus siccus uidetur. Sed hæc uerba Plinij, Dioscorides non de moro arbore sed de sycomoroto habet, quæ omnino alia est, & in Aegypto nascitur, uelut alibi ostendi. At uero sycomoroti arboris succum hic non debere accipi ex eo declaratur, quod συκαμίνου, τῶν τῶν μερῶν, ipse Galenus exponit, atq; id propterea quod & mori, & sycomoroti arbor & fructus συκαμίνου appelletur. Cæterum Celsi lib. 3. cap. 18. mori lachrymam ignorasse uidetur, cuius uerba studiosis expendenda adscribam. Alij uel amomum, uel sycamini lachrymā fronti inducunt. Hoc nomē apud medicos reperio, sed quū Græci mori συκαμίνου appellāt mori nulla lachryma est, sic uero significatur lachryma arboris in Aegypto nascēus, quā ibi συκαμίνου appellant.

Apollonijsuestigiò dolores sedat.] In hoc medicameuro Myrti ramulos longitudinis duorum palmorum duos Apollonius habet, hoc est, *μυρτίνης κλωνία δύο πάλαια δύν*. Est enim *πάλαια* mensura quatuor digitorum, quæ palmus parvus latinis appellatur. Nā magnus palmus *πενταμύ* græcis est, habetq; digitos. XII. seu pollices nouem, hoc est, paruos palmos tres. Vocatur autem palmus magnus etiam *δωδεκά* atq; *δωδράς* græcis, ut Plinius. 35. cap. 14. testatur, ubi didoron lateris genus longū sesquipede esse ait. Habet enim sesquipedes omnino palmos magnos duos, qui & dodrantes dici possunt: ut sit dodrans in pede pollicū nouem, siue digitorum XII. quemadmodū uncia nouem sunt dodrans libræ, hoc est tres partes eius in quaternas diuisæ. Sunt enim æque XII. pollices in pede Romano, sicut in libra XII. uncia. Plinius 7. cap. 2. Super hos extrema in parte montium Spithamæ Pygmæi narrantur, ternas spithamas longitudine, hoc est, ternos dodrantes non excedentes. Est itaq; Spithame, & Dodrans, & palmus magnus, & Spanfa uulgo à manus expansione dicta, eadem mensura. Vsurpantur aurem etiam reliquæ libræ partes de pedis partibus, & primum omnium uncia ipsa pro pollice uno reperitur, Sextās pro duobus, Quadrantes pro tribus, Triens pro quatuor, Quincunx pro quinque, Sexunx pro sex, Septunx pro septem, Bes pro octo, dodrans pro nouem, Dextans pro decem, Deunx pro undecim pollicibus, hoc est, pede integro cui deest unus pollex. Atq; ita accipiendi sunt loci aliquot apud latinos aut opores, Litiū, Pliniū, Vistruuiū, Gellium & reliquos. Plin. 21. cap. 18. de iunci generibus. Amplitudine iuxta maritimas alpes tanta, ut inciso uentre impleant penè unciarum latitudinem, hoc est, pollicum. Et 33. cap. 8. de corticula siue lapide Lydio. Sunt autē modici quaternas uncias longitudinis, binasq; latitudinis non excedentes, hoc est, longitudinis pollicum quatuor, latitudinis duorum. & 7. cap. 16. procerissimum hominem ætas nostra diuo Claudio principe Gabbarā nomine, ex Arabia aduectum, 1 X. pedum & totidem unciarū uidit. At uero sicut apud latinos palmi uox iam pro quatuor digitorum mensura, iam pro XII. digitorum dicitur, Sic apud græcos, tum *πάλαια*, tum *πενταμύ* uoces, iam pro palmo paruo, iam pro magno reperiuntur: ut diligenti animaduersione opus sit, utrius mensuræ significatione singulis locis hæ uoces dicantur. Dioscor. de Chamedry, *ἡ μίστης πενταμύ*, hoc est, ut Hermolaus exponit, frutex quatuor digitorū altitudine. *πενταμύ* enim pro palmo paruo accepit. Qui accipiendus item apud Plinium est lib. 20. cap. 22. de serpillo. Satiuum non serpit, sed ad palmi altitudinem increscit, hoc est, altitudinem quatuor digitorum. Idem Dioscor. de Bechio. *ἡ δὲ δὲ πενταμύ* *ἡ δὲ*, hoc est, ut ego accipiendum existimo, caulem altitudine. III. digitorū, hoc est, palmi parui quod uel ex sequentibus palmū sit, ubi ait, cito abijcere bechium & florem & caulem, ut quidam putantur herbam & caule & flore carere: Nam hoc sanè etiam Plinius prodidit: quod ipsum omnino fieri nō posset, si *πενταμύ* *καὶ δὲ* altitudinis XII. digitorum, hoc est, palmi magni acciperetur, Neq; enim tanta altitudo tam cito euanescat. Atque hi quidem loci suffecerint ad indicandum saltem spithamen græcis etiam pro palmo paruo accipi. Nam pro magno frequētius est quàm ut paucis locis productis ostendere libeat, & ex Plinij uerbis supra citatis palmū est. Et ex loco de tripolio lib. 26. cap. 7. aperte declaratur, ubi *καὶ δὲ πενταμύ* à Dioscoride dictum, caule palmo alto tripolium esse scripsit. deest tamen in exemplaribus uulgaris uox caule, ex incuria elapsa. De palæste deinceps uideamus quæ occasione dedit nobis hæc prodendi. quum *πάλαια κλωνία δύο μυρτίνης* hoc loco Apollonius accipere iubeat. Videt itaq; *πάλαια* hic pro altitudine quatuor digitorū, hoc est, pro palmo paruo dixisse, ne

liqurum rerum ponderis ac copiae respectu, thuris uidelicet obolorum trium, & alij nucleorum quinque. possunt enim facile ex tanullis ramulis folia decerpi ad illorum copiam æquandam, & nimia esset copia foliorum myrti ex ramis longitudinis sesquipedis: tantum enim duo. palmi magni siue dodrantes duo efficiunt ut supra ostendit decerptorum. Atque hæc significatio *παραστή* pro altitudine. IIII. digitorum frequentissima est. Sic Aetius 13. cap. 33. de basilio. *ἄρ' ὃ ζώνη μεγέθους δὲ παραστήν τριών*, id est, magnitudine palmorum trium, Plinius enim 8. cap. 21. duodecim non amplius digitorum magnitudine tradit. Verum idem Aetius eiusdem libri cap. 21. de uipera. *μεγέθους δὲ ἰνκῆς, ἢ 1/2 μεγέθους παραστήν τριών*, hoc est, magnitudine cubitali, longissima uero tres palmos æquat: quo sane loco *παραστή* non pro palmo paruo accipi potest, quum res ex ipsis tres tantum pedis quartas constituant, nedum cubitum excedant, qui sesquipedis est. Atque idem itaque certe est per *παραστήν* palmus magnus, qui res acceptus, sesquicubitum efficit: atque sic accipiendum etiam uidetur quod idem eiusdem libri cap. 23. hæmorrhoidum & hæmorrhoidem, *μεγέθους παραστήν τριών* dixit, hoc est, palmorum trium, magnorum scilicet. Quare perspicuum est palæsten aliquando pro paruo palmo, aliquando pro magno grecis dici. Porro dodrantes uoce tres quidem quartæ partes libræ, & assis, itemque pedis significantur, Verum non horum solum ponderum ac mensurarum, sed cuiusque rei mensurabilis, itemque mensuræ: sicut etiam cubiti, orgyæ, iugeri, itemque sextarii: tres quartæ partes dodrans appellantur. quomodo accipiendum est quod Liuius lib. VIII. ab Urbe condita ait. Latium Capuæ agro mulctati, Latinus ager priuernati addito agro, & salernus qui populi Campani fuerat, usque ad Vulturum flumen plebi Romanæ diuiditur, bina in Latio iugera, ita ut dodrantem ex priuernati complerent data. Terna in salerno quadrantibus etiam pro longinquitate adiectis. Hactenus Liuius. Dodrantem itaque hoc loco dixit res quartas partes iugeri, sicut quadrantem unam quartam partem. Ad eundem sane modum etiam reliquæ libræ partes usurpantur, uelut apud Scribon. cap. 126. legitur, bes sextarii, hoc est, duæ tertie partes, id est, cyathi octo, & uini quadrans apud Cels. 3. cap. 15. non pro quadrante libræ, sed irem sextarii, hoc est, pro cyathis tribus: quamque & pro libræ quadrante accipi posset, si libræ eiusque partes mensurales accipiamus, & hoc utique modo quadrantes, quincunces, deuncesque ac besse, apud poetam Martialem accipere quis posset, nisi ipse exponeret satis manifeste, neque de mensuralibus, neque de ponderalibus uncias se dicere, sed de cyathi partibus, quum æque duo decim cyathi in sextarium, sicut XII. unciae in libram incurrant. Martialis lib. XI. Quincunces, & sex cyathos bessellemque bibamus, Caius ut fiat, Iulius, & Proculus. Cæterum quādo in pedis mentionem incidimus, obiter explicabimus & Gellij locum lib. 3. cap. 10. ubi ait: Herodotus homo fabulator in primo historiarum inuentum esse sub terra scripsit Orestis corpus cubita longitudinis habere septem, quæ faciunt pedes. XII. & quadrantem. Facit enim Gellius cubitum non sesquipedis, hoc est, digitorum XXIII. aut pollicum XVIII. sed sesquipedis & quadrantis, hoc est, pollicum XXI. aut pedis unius itemque unius palmi magni siue dodrantis.

Aur Araneorum oua ungento Nardino diluta inde.) Plinius lib. 11. cap. 24. Aranei inquit conueniunt clunibus, pariunt uermiculos ouis similes: & mox: pariunt autem oua ea in telas expansa, quia saliant, arguta emittunt. De his itaque ouis uidetur hic mentionem facere. Archigenes ad magnos dentium dolores commoedis, quod ob naturalem quandam *ἀντιπιδίαν* euenire uerisimile est. Sequitur paulo post. Porro ubi ueluti inflammatione correpti fuerint, nitrum rubrum & ossium persiorum nucleum unita resina excipe, &c. Dixi autem nucleum ossium persiorum quod Archigenes ait: *πρὸς τὴν ἰσχυρὰν τὴν σπινθῆρα*. Ex eodem uero etiam inferius paulo

auxiliū ad gingiuas et uentatas habet, ubi in græco exemplari habetur *συμφύσσει*
δὲ μέλαινα χυτὴ, ἢ πρῶτον τὸ μαχαιρίων μίση δύνει. συμύσσει μίση *δὲ* *χυτὴ* Sed legendum est, *πρῶ-*
τον τὸ μαχαιρίων *τὸ* *χυτὴ* *μίση* *δύνει*, uelut ego cōuertī. Aut nucleorū ossium siue ma-
 chærarum persiorum partes duas, &c. Appellauit autem ossa ea postremo loco
μαχαιρίων, à similitudine ad machæram, quod uidelicet sint ad gladij formā mucto
 nata. Opinor autē non ex persicorum malorū fructu nucleum Archigenē hic in-
 dicare, sed ex persio appellato pomio, de quo alibi memini quale esset, & cuius ar-
 boris folia idem Archigenes ad capitis dolorem cōmoda prodidit cum myrrha
 & semine uiscicis, ut Galen. lib. 2. huius operis retulit, ubi etiam ipse Galen. diuer-
 sum esse pomū persium à persico dixit: quanquā uelut tum etiam indicauī, pleriq;
 eandem esse arboreē putāt perseam ac persicam appellatā: in quorum numero &
 Nicander, & eius interpretes habendi uidentur. Quod si quis tamen etiam persico-
 rum ossium nucleū in hunc usum assumere uelit, habet eius rei faciendæ largam
 copiam, succellum autē experimento discet. Ex græcis uero & latinis medicis nul-
 lum aliū scio qui huius auxiliij ad dentes meminisset, ut non sit quod de eo affir-
 mare inexpertus ipse possim. Persicorū quidem nucleos ex aceto & oleo capitis
 doloribus illini debere Plin. 23. cap. 7. tradidit, & Dioscor. ac Paulus eosdē contra
 cerusam acceptā exhibent, quanquā Nicander perseæ nuces contra cerusam pro-
 bet, ut uel ex hoc perseæ & persicam eandē putasse cognoscatur, uel certe pro *πρῶ-*
τον δὲ apud Dioscor. & Paulum legendū est itidem uelut apud Nicandrā *πρῶ-*
τον δὲ, quemadmodū etiam hoc loco eadem habentur, quod tamen in tanta ex-
 emplariū concordia assueuere non ausim, & hoc quū non minor ad contrariam
 partem suspicio existat, nimirum quod etiā hic, uelut apud Dioscor. & Paulum,
πρῶτον δὲ *δύνει* *τὸ* *χυτὴ* legendū esse uideri queat, & persicorū nuclej accipiendi uul-
 go notī, non persiorum ex Aegypto fructus nobis peregrini. maxime quum *πρῶ-*
τον δὲ uox quæ hoc loco bis in exemplari græco legitur, tum pro *πρῶτον*, tum pro
πρῶτον. uoce supposititia esse possit.

Aut blattæ pistinariæ a uulso capite adipē cum rosaceo calefactū, & in aurem
 instilla, & in cauernam inde. Hic locus in græco exēplari longe corruptissimus
 est, & tamen non aliam esse sententiā quā eam quā reddidi constantissime sen-
 tio, ex Aetio maxime itemq; Plinio ad eam ipsam apprehendendam persuasus,
 ex quibus etiam restituendā lectionē puto, hoc modo. *ἢ σιλάφης τὸ λευκὸν δισόσσης*
τὸ σπρ σὺν ῥοδίῳ διερματῆς ἄσσει τὸ πρῶτον, *ἢ* *στὸ λευκὸν ῥοδίον*. Legitur autem cor-
 rupte hoc modo. *ἢ σιλάφης δισόσσης τὰ πρῶτα σὺν ῥοδίῳ διερματῆς*, &c. ex quibus uerbis
 ego nullā sententiā eruere possum, Lectionē itaq; uelut dixi mutatā restituendam
 eius loco censeo. Plin. enim lib. 29. cap. ult. idem remedium non ad erosos dentes,
 uelut hoc loco Archigenes, sed ad aures tradit his uerbis. Est & quædā pinguitu-
 do blattæ si caput euellatur, hanc tritā unā cum rosaceo auribus mīre prodesse di-
 cunt, &c. Apud Aetium autē, 8. cap. 33. itidem recēsetur corrupte hoc medicamen-
 tum, sed tamē paulō integrius hoc modo, *σιλάφης τὸ κατὰ κεφαλὴν τὸ δισόσσης τὸ σπρ σὺν*
ῥοδίῳ τῆς ῥοδίας ῥοδίας *ἢ* *στὸ πρῶτον*, hoc est, ut ego cōuertī. Idē præstat blattæ domesticæ ca-
 pite detractio adeps cū rosaceo liquefactus ac auri instillatus. Itaq; tum in Aetio,
 tum in Galeno, *σιλάφης δισόσσης* legitur, obscura & diu nobis pensitata uocis *δισό-*
σσης significatione, donec in eam sententiā peruenerimus, ut *δισόσσης* uocē corrup-
 tam & pro *κατὰ κεφαλὴν δισόσσης* supposititiā esse putemus, atq; id uitiū ex decurata
 hat uocū scriptura contigisse. Nimirū *λευκὸν* uoce per solam. *κ*. literā expressa
 & *δισόσσης* uoce adiecta, quæ postea per ignorantij exscribentij simul coaluerit,
 & in *δισόσσης* transferit, quæ uox quum nihil significare uideretur, mox. *κ*. literam
 in. *β*. mutata est, & *δισόσσης* uox tanquam aliquid significans successit, ab aliquo
 uidelicet

uidelicet locum emendare uolente substituta: quanquā eius significatio nihil huc pertinens habeat. *βλάτα* enim pedo significat, quod nihil ad blattam facit. Quare omnino corruptā eo quo dixi modo sectionem suspicatus sum, & iam constanter credo, maxime quum Plinius loco supra citato bis dicat, primum, blattæ si caput euellatur, & paulo post, has capite detractio attritas, lepras sanasse, &c. Erat quidē suspicio *καταβλάτα* pro *βλάτα* legendum esse, sed nec eius uocis significatio blattæ cōuenire uidetur. Si enim *σάλας καταβλάτα*, blattæ irascētis uel ad iram irritatae, uertamus, haud scio an recte accipiamus eam quæ sit uarijs modis agitata & irritata. Quin & tertia suspicio erat, *σάλας κατὰ βλάτα* uel *κατὰ βλάτα* uidelicet legēdum esse, ut esset ea quā Plin. eodē loco dixit exacuta clune. *κατὰ* enim acutum significat, sed his utrisq; suspicionibus relictis, illam primam apprehendendam censeo, ut *βλάτα* *σας* uox pro *καταβλάτα* sit supposititia, eo quo dixi modo, errore propagato. Hæc enim omnium uerissimilima mihi apparet quam etiam reitūrus sum donec certius cognouerō quæ *σάλας βλάτα* grecis medicis dicantur. Nam & Paulus lib. 7. in *ἐν τριβέλλοις, ἐν τριβέλλοις, σάλας βλάτα* habet, ut *βλάτα* quasi *βλάτα* & *σας* *πρίμα* dicē uideri quæst. *βλάτα* enim Hefychius *πρίμα* *βλάτα* exponit. Porro idem Plinius eodem loco tria blattarum genera recenset, Molles, Mylæcos, hoc est, pistrinarias, & tertium genus tetri odoris, & in primorū duorum usu, capitis detractū *meminit*, tertio pedes etiā ac pennas detractū, ut quod sit alatum. Verum lib. 11. cap. 28. tenebrarum alumna blattis uita, inquit, lucemq; fugiunt, in balneis maxime humido uapore prognatae, Dioscor. lib. 2. blattæ pistrinariae interanea oleo trita aut cocta ad auris dolores sedandos instillanda probat, fortassis per interanea, hoc est, *τὸ σπέρμα*, nihil aliud indicās quā quod Archigenes hoc loco, & Aetius uelut citauit, *σας* appellant, & quod Plinius pinguitudinem quandam dixit. At uero Marcellus medicus cap. 9. non caput, sed pellem blattæ seu gliri detractādam, eiusq; intestina melle decoquenda dicit, & blattam eandem cum glire facere uidetur, cuius rei fidem apud autorem relinquo. Apud Plinium certe loco supra citato, de glire eadem uerba leguntur. blattæ autē tum non simul meminit, sed postea, uelut antea citauit. Cæterum quæ uulgo medicorum Arabica aut certē barbara uoce, blattæ Byzantiae appellantur, nihil cum his blattarum generibus commune habet, Sunt enim Blattæ Byzantiae testæ cuiusdam generis conchyliorum non dissimilis purpuris, Sed quod in India solum reperitur Dioscor. lib. 2. teste, & aromaticum odorē habet, propterea quod nardo in paludibus isthic nascente ea conchyliā pascitur: appellatur autem ea testā *ὄνυξ* Dioscoridi. Galenus tamen eam inter ostraca ac testas purpurarum ac muricum generatim comprehendit, eorundem enim uim habet, & præterea suffita ab utro stragulatas scēminas, & comiciali apprehensos morbo excitat, quod tamen etiam de purpurarum testis Galen. xi. simp. pharm. tradit. Meminit eius onychis Plinius quoq; 22. cap. 2. quum ait. Inuenio apud quosdam ostracium, quod aliqui onychem uocant, hoc suffitum uuluae pœnis mire resistere. At uero ab hac blattæ barbara appellatione, blatteus color pro purpureo dictus est à flauio Vopisco in Aureliano, ubi inquit. Vestem holosericam neq; ipse in uestiario suo habuit, neq; alteri utendam dedit, & quum ab eo uxor sua peteret, ut unico pallio blatteo serico uteretur, Ille respondit, absit ut auro fila pensentur, Libra enim auri tunc libra serici fuit. Plinius blatteum colorem onychinum dixit lib. 15. cap. 15. de piris. Alij à colore testacea appellant, sicut onychina purpura. Quemadmodum enim purpureus color à purpura, sic onychinus ab onyche, eodem significato dicitur. Sic quoq; Columella lib. 12. cap. 10. prima onychina, purpurea appellauit.

De fomentis. Inter hæc fomētā aliquoties lectio græca est corrupta, de qua

admonendū dixi, uelut quod dixi, aut ricini cauliculū eodē modo, aut staphidem agrestem stilo cuiuspiam acuto infixam eodem modo: in græco exemplari habetur. *ἢ καὶ δὲ λευκὸν ἀρκίον ἢ στεινὸν ἀρκίον ὅς ἐστι τὸ ἀντὶ τῆς ἰσχυρίας*. Legendum est autem uelut manifeste apparet *leuius*, hoc est ricini, quum *leuius* id est, gallic nullus cauliculus extet, & Aetius 8, cap. 33. *leuius* expresse habeat, & sequens medicamentum alijs uerbis, sed eadem planē sententia tradat, *ἢ στεινὸν ἀρκίον ἢ γαλλικὸν καὶ ἰσχυρίαν*, hoc est, aut staphidem syluestrem stilo seu scalpello adaptatam uel infixam. Sequuntur mox pharmaca quibus dens tolli possit, siquidem his formentis adhibitis dolor non quiescat. Non esse autem ad dentes extrahēdos festinandū, omnes medici ex æquo præcipiunt, quum etiam exesus & corrosus, scalpro ea qua catus est parte detritus, reliqua sui parte solida, & usum & speciem dentis exhibere possint: hoc est, quod Erasistratus scripsit plumbeum *ὁδονταχρηστικόν*, id est, forcipem extrahendis dentibus aptum, apud Delphos in Apollinis templo suspensum fuisse, in significationem, quod non oporteat nisi penitus exesos ac laxatos eximere, utpote quibus tollendis plumbeus forceps sufficiat. Habemur autē hoc loco non ferrea instrumenta quibus dens exigatur, sed pharmaca quæ ita laxum faciant, ut digitis extrahi queat. Inter ea est plumbago trita cerato excepta, hoc est, *μολύβδαλα*, sed Aetius pro ea *σαρδὰ ἀρκύων* haud scio an non rectius habet.

Ad dentes denigratos. Testam callainam assatā ac tritam dentibus affricato. Testam Callainā, quam hic Apollonius *ὀστρεὴν καλλαινίαν* appellat, non aliā esse puto quam uasorum Callainorum, de quibus libro. I. huius operis, inter ea quæ pilos attenuant, Galenus mentionem fecit. Ita enim legi debere, me suspicari tum indicaui, & non *τὴν μύλανα*, uelut exemplar uulgatum habet. Quemadmodum autem eo loco ad attenuandos pilos, ita hic ad dentifricū probatur. An uero Callaina uasa ex Callai lapide facta fuerint, indeq; appellationem traxerint, ut libenter crediderim, ita non potest alicuius autoritate confirmari, quando hodie ignota ita lize ac Romæ sint, quò tamen tempore Galeni fuisse aduecta ex Alexandria, ex Galeni loco iam citato apparet, & Alexandrionica uocata, patria ut palam est appellatione. Porro si neq; hic Callainā testam uasorum Callainorū accipiendam, neq; supra Callaina uasa legenda esse conuincamur, supra quidem *τὴν καλλαινίαν* pro *τὴν καλλαινίαν*, uelut ibidē diximus, legemus: Hoc uero loco Callainā testam ostreorum Callaici Oceani accipiemus, quando sanè tum ostreorum, tum sicidium uasorum testa, *ὀστρεὴν* græcis appellatur, & Callaici ostrei testa nō ineptum dentifricum exhibeat, quemadmodum etiam supra post Callaina uasa, purpurarum ac muricum, & aliorum ostreorum testæ ustæ, attenuandis pilis itidē ut illa aptæ produntur: quanquam si horum ostreorū testæ accipiendæ sunt, *καλλαινίαν* potius quam *καλλαινίαν* legendum erit, qui lapsus facile potuit contingere ob similitudinem characterum. Martialis. Accipe Callaicis quicquid fodit Astur in anis. & rursus, Callaicum mandas si quid ad Oceanum. Sequitur mox aliud medicamentum. Sal fossile melle subactum in testula torreto, hoc est, *ἀλάς ἐρυκτὸν μίλιον φρυγίας ἰσχυρίας ἢ ὀστρεὴν*, ut Aetius legit. Sed in Galeni exemplari *ὀστρεὴν καλλαινίαν* pro *ἢ ὀστρεὴν* habetur, hoc est, in sarmentis, quod improbo, quum salis cum melle ustura non commode in sarmentis fieri possit: quanq; etiam in libro *ὀστρεὴν* Galeni idem remedium similiter *ὀστρεὴν καλλαινίαν* torrendum prodatur. Quare fortassis sic accipiendum est ut in testa quidem assatura fiat, uerum sarmentis subditis & accensis. Sequitur statim aliud, pulegij partem. i. salis tantundem, melle subacta, & c. hoc est, *πῶς τε φρυγίας μίλιον* uelut rursus Aetius legit, sed exemplar Galeni *ὀστρεὴν* pro *μίλιον* habet, hoc est, aquam pro melle, quam item ineptam, sicut mel apuissimum puto. Sequitur paulò post aliud. Alabastritis usti drach, γιι. hoc est

est ἀλαβαστρίτον κακωμένον δραχ.η. Sed exemplar græcum ἀλαβαστρὸν habet. Vide tur autem Alabastriten lapidē uustum in dentificiū hoc approbare. quod etiam Plinius 37. cap. 10. de eo testatur. Alabastrites inquit, nascitur in alabaastro Aegypti, & in Syriæ Damasco, candore interstincto uarijs coloribus, quæ cremata cū fossili sale ac trita, grauitates oris & dentiū extenuare dicitur. Eundem autē lapidē ad uasa ungentaria cauari, quum optime ea incorrupta seruet, lib. 36. cap. 8. prodit. Vnde sanē alabastra appellata uidentur, quantū quod ansas non habeat, quasi ὠστὸς λαβῆς, alij dicta malint. Quin & onychem lapidē, alabastriten uocari ibidē meminit Plin. & Galen. 9. simpl. phar. eundē uero onychem alio loco gemmam esse candorē habentem, unguis humani similitudine, ex Sudine Plin. refert. Quare onychinus color pirorū apud Pliniū, & prunorū apud Columel. de quo paulo ante mentionē feci, uideri possit ab hoc onyche lapide dīcius esse, sed ego non aliū quā purpureū accipio, ex ipsius adeo Plinij interpretatione. At uero sicut Alabastrū uas ex alabaastro siue alabastrite lapide appellatum est, Sic onyx & lapis, & uas ungentarium ex ipso paratum dicitur. Martialis libro 7.

Vngentum fuerat quod onyx modo parua gerebat,

Nunc postquam olfecit Papilus ecce garū est. Quantū & onyx hoc loco pro cochylis testa, de qua paulo ante dixi, accipio possit, maxime quū poeta genus mutarit. Sed Propert. poeta quī dicit. Et crocino nares murrheus ungar onyx. onychē nō pro uase ex onyche lapide, sed simpliciter uasis significatione dixit, et murrheus uoce adiecta, eius materiā indicauit, ex myrrha, ex qua etiam pocula fuisse Martial. indicat lib. 4. in Ponticum. Nos bibimus uitro, tu myrrha Pontice. quare? Prodat perspicuus ne duo uina calix.

Martialis porro lib. 11. idē pro uase ungentario, sed masculino genere dixit. uelut etiā Horat. Nardi paruus onyx. Profertur Cosmī nunc mihi siccus onyx. Siccum hic pro euacuato dixit, & Cosmī medici siue myropolæ nomen adiecit, cuius etiā libro 1. meminit. Pastillos Cosmī luxuriosa uoras. Et lib. 5. in Gelliam. Quod quacūq; uenis, Cosmum migrare putas,

Et fluere excusso cinnama fusa uitro. Porro onyx murrheus Propertij, & pocula ex myrrha Martialis, nō alia fuerunt quā quæ Murrhina à Plinio lib. 37. cap. 2. dicitur ex myrrha uidelicet siue myrrha humore sub terra calore densato, Sicut crystallum contraria huic causa, gelu uehementiore cōcretum facit. fuerūt autem minime perspicua, ut Martialis palam dicit, Sed & Plin. trāslucere quicquam aut pallere uitū est, inquit. quod adijcere uolui, ne quis ex myrrha lachryma arboris in Arabia constituisse putet, ex qua Murrhinā uinū antiquissimū conditū, idē Plin. lib. 14. dicit. Nam de eo suspicio esse, ex eo quod Martial. in apophoretis ait, possit: ubi eadem calido uino ex ipsis bibendo accommodatiora esse inquit, & maxime falerno ardenti, quod ego igne admoto incensum accipio, Sic enim Plinius 14. cap. 6. de falerno faustiano ait, solum uinorum hoc flāma accenditur, quemadmodum hodie apud septentrionales populos uino uulgo Romanēia uocata incendi, atq; ita calida bibi solent.

Myrrhina.

Si calidū potas, ardenti myrrha falerno Cōuenit, & melior sit sapor inde mero. Cōmanducationes ad molarū dolores.] Primū pharmacū inter ea quæ com manducanda p̄scribit, in græco exēplari penitus est corruptū hoc modo. ἡβερῶνος δραχ.β. δόρυγος δραχ.β. πιπρίδος λευκῆς δραχ.α. παχιδίος φηγορίας, ἢ τ' ἀλλας λιθιότῆτας β.β. τ' παχιδίος κῶπης φλοπίνος, τὸ δ' σμύρνον μίλντι δαλύτης ἐπίβληαι τῇ παχιδίῃ καὶ τῇ σμύρνον, καὶ μίλντι τοῖς καλαρμαῖσι δέ. Primū itaq; παχιδίος φηγορίας habetur pro γρηγορίας, aut certe λευκῆς, Quibus oppositæ sunt παχίς ex uite syluestri, hoc est labrusca, & μιλάνθ. Vult itaq; γρηγορίας, hoc est genuinā, & nō syluestre uas p̄fā accipienda m

e. Te, aut certe etiam de genuina *λευκή*, id est albam, non nigram. & sanè de alba idem hoc auxilium etiam Dioscorides prodit lib. 5. *ὅς τε ἐκφυλισματισμὸς* inquit, *καὶ ἰσχυρὸν καὶ σὺν πιπίρῳ μαλακτικὸν ἐστίν*. Hoc est ad detrahendā & interceptiendam pituitā per se & cum pipere cōmanducata cōmoda est. Quam non minus recte *περὶ δὲ ἐχρίας* pro *φρυγίας* legi queat, Nam & de hac Dioscor. testat, quod *ἐκ μαλακτικῆς φλίγματος ἐξ ἀλάτου, καὶ ὀνυχαρίας ὀφθαλμῶ, &c.* & quum addat *ἢ ῥιζὰ λυσιπεποτιστῆρος*, uideri potest utramq; *περὶ δὲ ἐχρίας* & *ἐχρίαν* & *ἡμερῶν*, æque commodam prodere. Deinde quod legitur, *τὸ ὃ σμύρναν μέλιτι διαλύσας ἐπιθεῖν τῷ περὶ δὲ καὶ τῷ σμύρῳ*, in totum supposititium est, quum necq; smyrnium, necq; myrtham antea in medicamento recensuerit, ut de ammiscendi modo nunc dicere debuerit, nisi fortassis hæc ipsa ex prima nomenclatura deperierunt. Quare his expunctis, ea quorum in medicamento relatu pondus est substituenda sunt, ut lectio in totum hoc quo convertimus modo habeat. *κέρχυνος δραχ. β. ἐργάνου δραχ. β. πιπίρως λευκῆς δραχ. α. περὶ δὲ λυσιπῆς ἢ ῥιζῆς λυσιπεποτιστῆρος* [i. e. τῷ περὶ δὲ καὶ τῷ σμύρῳ πίνουσι, τὸ δὲ ἐργάνου, καὶ κέρχυνος, καὶ πιπίρος, λὰ α ἢ ἐπιθεῖν, καὶ μέλις ποῖς μαλακτικῶν δὲ. Quāquam omnino suspicio est mihi, quædā in prima enumeratione deesse, quæ hic uidelicet repetat.

Molare emplastrū bonum quod in multis miraculo fuit.] In hoc medicamento quod ad formam emplastri redactum molaribus imponendum tradit, Succū carpasi drach. i. habetur, hoc est *ὁπὺ καρπῆσσιν δραχ. α.* Qualis autem carpasi succus sit, & quod cum carpesio nihil cōmune habeat, alibi ex Galeno in his cōmentarijs ostendī, ut non sit necesse hoc loco de eo amplius quicquam commentari.

Ferreā itaq; limulam quo celerius opus succederet feci.] Et hoc loco exemplar græcum corruptum est, sed ex Aetio lectionem in integrum restituitimus hoc modo. *ποτὶ δὲ αὐτὸ ἐξ ἑκατέρου ἀνομαλῶ φαίνονται τῶ ὀδόντων κατὰ τινὰ μέγεθος ῥιζοῦνται, ἢ ὅτι δὲ ἑκατέρω ἔχουσιν τὸ πύρεθρον, ἑκατέρω καὶ τῶ ῥιζοῦντος δύνανται, καὶ δὲ πρὸ δύνανται πύρεθρον, &c.* quemadmodum ego conuertī. Paulo inferius etiam *αὐδισίπυφίς* habetur, pro *ἰσχυρῶν*, sed si eiusmodi omnia annotare uelim in immensum hoc opus excreseat. & poterint de talibus locis citra meam commonefactionem edoceri, qui nostram uersionem ad græcum exemplar contulerint.

Ab Archigene scripta quæ mobiles dentes corroborant.] Inter hæc Archigenis pharmaca in primo, pompholygis, aluminis scissi, amyli, &c. conuertī, sed in græco exemplari *πυμφόλγης, χίνου, ἀμύλου* habetur. Satis autem manifestū est pro *χίνου* debere legi *χίνης*: quamquam etiam uetus Interpres, post multa hic relicta, hunc tandem locum reddens, lentiscum uerterit pro alumine scisso, ut non nouus unius exemplaris error sit *χίνου* pro *χίνης* legi. Porro lentisci foliorū decoctum collutum sistit quidem dentes, sed quum hoc medicamētum aridum sit & inspersile, necq; folia, necq; fructum, necq; cortices, neque radices commode admittit, & si quid ex his lentisci partibus hic indendum erat, necesse fuerat de hoc commonere, easq; exprimere, quod quum factum non sit, certum est non *χίνου*, sed *χίνης* legendum esse; de qua certum est quod mobiles dentes firmet, & in puluerem redacta amplius aptissime reliquis rebus affricandis ammisceri potest. Ceterum in sequenti paulo post pharmaco ualde dubio an *Μίσυος* uox recte legatur, quum sit *μίσου* pharmacum quidem adstringens, sed tamen crustam inurens. Suspicio *μαδνους* aut *σμβένους* uocem pro ea legendum esse, sed tamen mutare non sum ausus.

Cæterū in dentū stupore portulacā manducant.] In dentū stupore dixit, quod græcè est *ἡ ἀμασθία*. Est enim *ἀμασθία* νέκρω καὶ ἰσθμὸς ἢ ἀπόσματος γίγνεται μῆγος. Hoc est Hæmodia est stupor à uisione ac auditione productus, quum uideli

cet ea à quibus animus ac corpus pariter abhorrent, uidemus aut audimus, uelut ei quò ictus, aut ruinas aut præcipitia subito contuemur, limarumq; ac serrarum attritus audimus, Vnde etià aliqui stridorè dentium *δενουσίαν* reddiderunt, uelut Marcellus quoq; cap. 12. facit. atq; hoc ipsum uelle uidetur Hippocr. *πῶς γυναικας, quò αἰε. λυπηματὰ γυναικας ἢ ὅτι τὸ ὀμμάτων, ἢ ὅτι τὸ ὀκλῶς, οἷα τὰ σώματα, μὴ ὅτι ἡ φρεσὶς πῶς ἐαυτῶν ἐδόντας ἀμείβεσθαι, πῶς αὖτε κριθὸν πῶς ὀκλῶς, σκέλια πῶς ὀκλῶς.* hoc est, Molestiæ animi aut per oculos, aut per auditum fiunt, uelut etià corporum, Mola quidem dentium ad seipsam attrita, dentes stupefcunt, Ambulanti uero circa cauū locum, crura tremunt. Quamq; & hebetationē dentium, à frigidis austerisq; ac acidis fructibus obortā, item *δενουσίαν* nomine comprehendant. Et alij τὸ *δενουσίαν*, aut ut Hippocr. dicit, *δενουσίαν* simpliciter *ὅτι ἐδόντας ἐδῶκασι* exponāt, quò certe ut grauis, sic breuis dolor & offensa sit dentium *δενουσία*, & quæ nō diutius permanere soleat.

De doloribus gingiuarum. Inter hæc medicamenta habetur. Proprie autē conuenit galla tenuissime trita acetabuli mensura, cum myrrha magnitudine fabæ. Sed in græco exēplari *κυάθον τὸ μέγιστον*, hoc est cyathi magnitudine, falso pro *κύαμος* τὸ μέγιστον legitur. Nam cyathi mēsurā dicitur, non autē magnitudo. Sicut contra cyami, id est fabæ magnitudo dicitur, rarissime autē pro mensura *κύαμος* usurpatur. De ea igitur *κύαμος* uocis significatione aliquos locos hic indicabo. Cyamus igitur iam simpliciter, iam cum appositione Aegyptij, aut Græci pro magnitudine accipitur fabæ simpliciter, uel cuius patria est adscripta. Verū pro mensura, nō quidē certa, sed simpliciter rei alicuius mensurabilis capaci, cyamū Aetius usurpauit 13. cap. 115. ubi de picræ exhibitione ait. *ἡ δόσις καὶ σίτω μελιχρότερον κύαμοις ἢ ὅτι ἐπὶ φάρμακον ὁ δότος διερεῖς κύαμος.* hoc est, Datur cochlearij mēsurā cū aquæ mulsæ cyamis IIII. Ab acceptione item aquæ calidæ cyamos IIII. absorbeant. & cap. 122. eiusdē libri, *ἄλφις καλίσου καὶ κισσῶς ἀνὰ κύαμον. α. χολὴ λευκὴ κύαμον. α.* Id est, Aceti optimi & cedriæ singulorum cyamū unum, succi brassicæ cyamum unū. His locis & cōsequenter pluribus in Aetio cyamus legitur palam pro mensurā, quum liquores magnitudine nō indicemus, neq; metāmur. Est itaq; cyamus poculi genus, quod & Ciborium ac Cibotium appellatur. Sic enim Helychius ait, *κύαμος καὶ τὸ ἀγρόστιον κισσῶν λευκῶν καὶ κισσῶν.* Legitur tamen corrupte in Helychio *λευκῶν καὶ καλίσου.* Hoc est, Cyamus significat etià Aegyptiū Ciborium appellatū, itēq; Cibotū. Sic enim Dioscor. lib. 2. de faba Aegyptiaca testatur, & Strabo 37. *ἰσὺς ἀγρόστιον ἢ κύαμος ἀγρόστιος, ὃ τὸ λευκὸν γαστ.* Quare & cyamus & cibotū, tum pro faba Aegyptiā dicitur, tum pro poculi capacitate siue mensurā, qualis ex fabarū Aegyptiarū folijs parabatur, quæ adeò magna esse idem Strabo testatur, ut poculorū & catinorū usum præbeant, aptam insuper ad id habentia cōcauitatem, ut Alexandriæ officinæ his plenæ sint, & ut uasis utantur. Imò non solum pro poculo ex folijs Aegyptiæ fabæ factio, siue Colocaliæ, ut Plinius libro 21. capite 15. de Aegyptijs loquens ait, Adeoq; Nilī sui dotibus gaudent, ut implexis Colocaliæ folijs in uariam speciem uasorum, potare gratissimum habeant. Verum etiā pro alio, ex alia materia ad eiusdem similitudinem factio, eadem uoces usurpantur. & pro faba quidem *λευκῶν* & *λευκῶν* Dioscor. dixit. & Galenus ad Pamphilianum de Theriaca, *διδόται ἢ ὅτι τῶν ὅτι γλυκίος ἢ μελιχρότερον, πῶς ἐπὶ φάρμακον δότα ἀνὰ τὸ πικρὸν, κύαμος ἀγρόστιος τὸ μέγιστον, ὅστις ὁ γαστ. οἷος κισσῶν ἢ λευκῶν καλίσου.* Hoc est, datur his ex passio, aut a qua mulsā, in quibus dictamni aut ruta incocta sunt, fabæ egyptiæ magnitudine, quā quidā uerna cula lingua Cibotū & Cibotū appellant. Legitur tamē *κύαμος* pro *λευκῶν* in uulgata editione. Pro poculo uero Strabo uelut dixi usurpauit, & Athenæus cōfirmat, & Helychius amplius testatur, ubi ait: *λευκῶν ἀγρόστιον ὄνομα ὅτι ποτῆριον.*

Quo modo sanè etiam Actiū in prædictis locis cyamū accepisse credo, & propterea priore loco de meo parenthesis uice adieci, in eius operis cōuersione. Est id poculi genus, & Aegypcio uocabulo ciborū appellatur. Quancū pro *lucius* possit aliquis *κυνδύς* uocem substituere, tanquā ueram pro supposititia, si hanc cyami significationem ignoret. At uero & Galenus cyamum pro poculo dixisse uideri potest lib. 10. simp. phar. de stercore lupino ubi αἰνῶντες δὲ αἱ γὰρ γαστρίων τῶν λυγίων, ἀλλὰ οὗτοι οὐκ ἔστιν ὁ μάλιστα κύανος, ἐμβλεῖν αὐτῶν τὸ κέντρον ποῦναι αὐτοῦ φῆναι τῶν περὶ. Sed Interpretes pro maxima faba *μύσσην κύανον* accipere maluerūt, non quidem male, sed quod tamen uideri possit, quum de ollula mētionem faciat, eam ad cyamum poculum comparasse, rectius utiq; meo iudicio quā ad fabam legumētum quantumuis magnum: quanquā ipsa Galeni uerba sic iaceāt, ut cyami quantitas non ad ollulam, sed ad stercorem ollulae indendum referri possit.

Ceterū in epulide, hoc est supercrescente ex inflammatione carne. I Vnicum hoc auxilium Galenus in epulide prodidit, hoc est ὅτι τῶν ἐπουλίδων, quas ego supercrescentē ex inflammatione carnem dixi ex Paulo, qui ἐπουλὶς δὲ οὗτος inquit, οὗτος φλεγμονὴ ἐπιπάρουσα κατὰ τὴν ἐσώτην τῶν γύμφων ἰδίᾳ. κατὰ τὴν περὶ τὴν ὀδὸν. Differt autem à parulide, quæ iuxta eundem φλεγμονὴ ἐστὶ πρὸς τὴν μίση τῶν ὀδόνων, ἢ τῶν πρὸς τοὺς ὀδόνους ἐκπύουσι, hoc est, Parulis est inflammatio circa partem aliquam gingivarum, quæ non soluta suppuratur.

Ad erosionem & dolorem dentiū. Quinquefolij radices in uino coctas à cœna colluendas præbe, coquito autē ad tertias. I Huius medicamenti lectio in græco corrupta est, quam nos iuxta cōuersionis nostræ rationem restituendam censuimus, ut hoc modo legatur, *πρὸς ἑκάστην ἡμέραν οὖν εἰς ἑλκὸς διόλου διεκλιβήσῃ μετὰ τὸ δειπνῆναι, ἑκάστη δὲ αἱ τὸ τρίτον μίση*.

Smegma quo utor, gingiuas contrahit. I In hoc smegmate in græco codice sic legit, *γίνωκτι ἐκ τῆς ἀλάνης βοτάνης λευκαυλίδος οὖν πρὸς τοὺς ὀδόνους τὴν περὶ τὴν*, hoc est ut ego reddidi, lentisci & perdicij herbæ ustæ cū lanis, aut per se solū, utriusq; quartam libræ partem: putō enim per *γίνωκτι* uocem lentiscū indicari, cuius omnes partes aequalibus uiribus proditæ sunt, & in præsentem usum cōmodis: quanquam & *γίνωκτι* recte legitur, ac iuncus rotundus odoratus accipi possit, itidē adstringendi uī prædictus, & propterea gingiuas contrahendis apus, quod indico ut si quis pharmacum paraturus sit, utrum libeat per me consiciat, quum & lentiscus & iuncus odoratus in hac pharmaca commodent, & in sequentibus prodantur recipienda. Deest autem in græco contextu particula *οὖν*, quam ego reponendam censeo ante uocem *τρίτον*, ut per eam indicetur, utriusque lentisci uidelicet, & perdicij quarta pars iniicienda esse. *τρίτον* enim hoc loco pro quarta libræ parte dictum existimo, hoc est pro quadrante. Nam & antea in hoc pharmaco libræ meminī, itemq; unciarum, ut hic per *τρίτον* quarta libræ pars, hoc est uncia: tres significari mihi uideantur. Neque enim uera produnt, qui *τρίτον* græcis, priuatim dictū quartarium esse uolunt, hoc est quartam sextarij partem, siue dimidiā heminā. Quum & sextarij *τρίτον*, & heminæ *τρίτον*, & cyathi *τρίτον*, in his Galeni libris habeamus, & hoc loco *λίγιστος τρίτον* necessarium accipiamus, quando nullius alterius ponderis, aut mensuræ, in præcedentibus mentio fiat, de quibus *τρίτον* accipi queat. Sed & in libello de ponderibus græcis inter Galenicos relato, Dioscorides Alexandrinus ut ego sentio, horū *τρίτον* appellationis rationē planè nō aliā indicat, q̃ *τρίτον*, hoc est tertiarj partē, & *ἑκτόν*, id est, sextarū: atq; ita *τρίτον*, *τρίτον* & *ἑκτόν*, de omniū mensurarum tertia, quarta & sexta parte dicuntur. Verum quum corruptissimus sit ille ipse Dioscoridis locus, uisum est mihi eum emendatum ac restitutum à nobis adscribere.

bere, ut ex eo etiam suprà nobis tradita ex Paulo de eadem re, clariora reddantur, quæ ipsa etiam in principio libellorū eorum de ponderibus apud Galenum habentur, sed Pauli nomine suppresso, & longe corruptiora quàm sunt in Pauli exemplari ad finem ab ipso sane Paulo adiecta, Nam in præfatione totius operis, ad finem de his se dicturum compromittit.

Διοσκοριδίου, ποδὶ μέτρων ὕψους.

ποδὶ αἰνου.

τὸ κεράμιον ἄγχι λ. π.

ἢ ὄρναι ἔχον λ. μ.

ὁ χῶς τεταίσι τὸ πῶγμα ἔχον λ. ι.

τὸ ἀμυγδαλίον ἔχον λ. ι.

ὁ ξίσκος ἔχον λίτραν μίαν, Γ. α.

ἡμίνα ἢ κοτύλη, Γ. ι.

τὸ τίταρον Γ. α.

τὸ ὀβύδαρον ὅτι ἐστὶν τίταρον κοτύλης, ἄγχι Γ. β.

λευκὸς ὅτι ἐστὶν ἑστὸν κοτύλης ἄγχι Γ. α.

ὁ δὲ χῶς ἐστὶν λευκὸν

τίταρον, ἄγχι ὄρναι, γ.

ὁ αὐτὸς δὲ σαρμός ἐστι καὶ ὁ διατῶ καὶ ἔξουσ,

φασὶ δὲ τοῦ ὀμβρίου ὁ διατῶ πλεονάζειν ἐκ τοῦ σαρμῶς, ἄγχι δὲ ὀλκῶς

ψ. κ. τὸν χῶν.

ποδὶ ἐλαίου.

τὸ κεράμιον ἔχον λ. σβ.

ἢ ὄρναι ἔχον λ. λ.

τὸ πῶγμα ἔχον λ. β.

τὸ ἀμυγδαλίον ἔχον λ. σβ.

ὁ ξίσκος ἔχον λ. α.

ἡμίνα τεταίσι ἢ κοτύλη

Γ. β.

τὸ τίταρον ἔχον Γ. α.

τὸ ὀβύδαρον ὅτι ἐστὶν ἑστὸν κοτύλης, ἄγχι Γ. α.

Γ. β. ὄρναι, β.

ὁ δὲ λευκὸς ὅτι ἐστὶν ἑστὸν κοτύλης, ἄγχι Γ. α.

ἢ χῶς λευκὸς

τίταρον, ἄγχι ὄρναι, γ.

ποδὶ μίλιτῶ.

τὸ κεράμιον ἔχον λ. ς.

ἢ ὄρναι ἔχον λ. σδ.

τὸ πῶγμα ἔχον λ. γ.

τὸ ἀμυγδαλίον ἔχον λ. σ. Γ. β.

ὁ ξίσκος ἔχον Γ. α.

ἢ ἡμίνα ἔχον Γ. γ.

τὸ τίταρον ἔχον Γ. α. ὄρναι, σ.

τὸ ὀβύδαρον ἔχον Γ. γ.

ὁ λευκὸς δὲ ἔχον

Γ. β. ὄρναι, β.

ἢ ὁ χῶς ὅτι ἐστὶν λευκὸς τίταρον, ἄγχι ὄρναι, σ. ε.

Hæc sanè lectio quantum ad mellis mensurarū pondus attinet nobis aliquandū uisā est esse uera, & pro genuina omnino restituenda, Nam si cum mensurarum pōderibus suprà latine ex Paulo nobis redditis cōtuleris, uidebis planè eandem rem ab utrisq; tradit. Nimirū quod uinum nona parte oleū exuperat, Mellis uero pondus dimidia parte oleum excedat. Vinum uero quarta ampliusq; decima parte à melle superatur, hoc est fermè tertia parte: quanquam ipse Dioscorides non nominatim & expresse sicut Paulus de hac præponderationis diuersitate tradat, & in uulgaro exemplari mellis pondus semper totum uini eiusq; dimidium legatur, quum nō totum uini, sed olei pondus, insuperq; eius dimidium Mel pēdat, uelut Paulus apertis uerbis tradidit. Sunt autem uerba Dioscoridis in uulgaro exemplari Galeni hæc.

τὸ κεράμιον ἔχον λ. ς.

ἢ ὄρναι ἔχον λίτρας β.

τὸ πῶγμα ἔχον λ. α.

τὸ ἀμυγδαλίον ἔχον λίτρας β.

ὁ δὲ ξίσκος ἔχον λ. σβ.

ἢ ἡμίνα ἔχον λ. α. Γ. γ.

τὸ τίταρον ἔχον Γ. β.

τὸ ὀβύδαρον ἔχον Γ. γ. ὄρναι, β.

ὁ λευκὸς δὲ ἔχον Γ. β.

ἢ ὁ χῶς ὅτι ἐστὶν λευκὸν τίταρον, ἄγχι ὄρναι, λ.

Verū hanc planè falsam esse lectionē, & priorē cū Paulo cōsentientem, omnino uerā iudicārē, indeq; inoleuisse putārē, quod in Cerathio prima mēsurā, ἔχον λίτρας ς. falso habetur, pro λίτρας β. ad quā proportionē necessariō is qui præluit operis castigationi, etiam reliquarum mēsurarum pondera auxit, & fortassis in hoc Fannium exprimere uoluit, qui quum Sextarium mellis duarum librarum & dimidia faciat, reliquæ utiq; mēsuræ ad eandem proportionem idipsum pondus habebunt. Ipsum certe Dioscoridem sic tradidisse non putarem, quū nō aliter q̃ Paulus habet, & nos etiam cōuersum suprà prodidimus, legendū uideatur: nisi nuper ad eō in Marcellum antiquum latinum medicum incidissem, qui penitus cum Dioscoride, itemq; Fannio consensit, in mellis mēsurarum apponderatione, Cuius uerba eo libētius adscribam, quod autor ignotus hæcenus, & temporū iniuria multis locis corruptus, nuper ad eō nobis purgatissime restitutus, ex officina

officina Frobeniana, est inuulgatus, & sanè quasi à morte ad uitā excitatus: dein de quod quum ipse latine scripserit, ponderum tamen & mēsurarum rationem, græcè pariter ac latine censuit operi suo præfigendam esse, uelut etiā in præfatione sui operis contestatur. Verba ex ipso opere sic habent:

τὸ κεραιμαρ ἔχα.		
ἐλαίου.	αἶνου.	μέλιτος.
λ. αβ.	λ. π.	λ. ρκ.
	τὸ κῆρυμαρ ἔχα.	
λ. θ.	λ. ι.	λ. ιη.
	ὁ φίσκος ἔχα.	
Γα. ια.	λ. α. Γα. β.	λ. βδ.
	ἡ κωτύλη ἔχα.	
Γα. β.	Γα. ι.	λ. α. Γα. γ.
	ὁ κύαδος ἔχα.	
Γα. ας.	Γα. ας. γρ. δ.	Γα. βς.

Sed & Pauli locum græcū adscribam à nobis restitutum, quanquā in Pauli exemplari Venetijs uulgato, omnino integrior est quàm in Galeni exemplari quod indidem prodijt, habetur. hoc itaq; modo legendus est. *Εἰ δὲ βούλων καὶ τῶ παύων τῶ ὕψους ἀδύναμις μέτρον, πᾶσι πᾶσι μὲν γὰρ αἱ τῶν ὕψων ἐσθλὴν αἶσαν ἢ τῶν ῥοπῶν ὁμοιοῦται, ὡς αὐτὸ πᾶσι δόγματι· ἑλαίου τε καὶ αἶνου καὶ μέλιτος· λείψανον. τὸ μὲν ἐν μέλι τῶ αἶσι βαρύτερον ἐστὶ τὰ πᾶσι μέρα, καὶ προσίτι διυκνέται, ἐπὶ δὲ τὸ ἄλλο συνίγγυσι φίσκος. ἔχῃ γὰρ τὸ αὐτὸ τῶ αἶνου, τὸ μέλιτος· πασι, ἄλλο γὰρ τῶ αἶνου παύων, καὶ προσίτι τὸ πρῶτον αὐτῶ. τὸ δὲ ἑλαίου τὸ μέλι τῶ αἶσι μίρα βαρύτερον ἐστὶν. ἔχῃ γὰρ τὸ ἄλλο τῶ ἑλαίου, καὶ προσίτι τὸ ἄλλο αὐτῶ. τὸ δὲ αἶνος τῶ ἑλαίου ἐννάτω μέρα· ὑπερῆχῃ ἄλλο γὰρ αὐτὸ ἔχῃ καὶ τὸ β. αὐτῶ. πῶς βαρύνει δὲ πᾶσι, καὶ ὡς ἐν δόγματι, τῶν κατὰ μέρος μέτρων τῶν παύων· πᾶσι πᾶσι, ἄλλο κατὰ μέρος ὡς ἐν τῶ παύων πᾶσι τῶν· ὑπερῆχῃ αὐτοῖς κατὰ τὸ πᾶσι, τὸ, τὸ ἑλαίου, καὶ ὁ αἶνος, καὶ τὸ μέλι κατὰ γορῶνα κατὰ.*

τὸ ἰταλικὸν κεραιμαρ ἔχα.		
ἐλαίου.	αἶνου.	μέλιτος.
λίτρας. ιβ.	λίτρας. π.	λίτρας. ρκ.
	ὁ χῶς ἔχα.	
λίτρας. θ.	λίτρας. ι.	λίτρας. ιγ.
	ὁ φίσκος ἔχα.	
Γα. ιθ.	Γα. κ.	Γα. κζ.
	ἡ κωτύλη ἔχῃ.	
Γα. θ.	Γα. ι.	Γα. ιγ.
	τὸ μέγα μύτρον ἔχα.	
Γα. γ.	Γα. γ. γράμματα. θ.	Γα. δς.
	τὸ ὀφύλακον ἔχα.	
φραχ. ιθ.	Γα. β. γράμματα. ιβ.	Γα. γ. γράμματα. β.
	ὁ κύαδος ἔχα.	
φραχ. ιβ.	Γα. ας. γράμματα. δ.	Γα. β. φραχ. β.
	τὸ μικρὸν μύτρον ἔχα.	
φραχ. ε.	γράμματα. κ.	φραχ. θ.

Ex his itaq; studiosi mensurarū singularū pondera exacte expensa habent, quæ grauatus fuisset adscribere, nisi uiderem plerōsq; ex professio hanc partem transientes adeo oscitanter supineq; rem explicare, ut locos etiā cōtra seipsos, tanquam pro se facientes adducant. Porro Fannij uersus de Sextarij pondere iuxta liquores hos diuerso, hi sunt.

Illud præterea tecum cohibere memento,
Finitum pondus uarios seruare liquores.
Nam libræ, ut memorant, bessem sextarius addet,
Seu puros pendas latices, seu dona Lyzi.
Addunt semissem libræ liuentis oliui
Seslibramq; ferunt mellis superesse bilibri.

Ad motos dentes stabilendos. Atramentū sutorium cum oleo terito, & cum lana dentium radicibus admoüeto. Hoc medicamētum in græco exemplari sic habetur, χαλκανθου σπρίψας μετ' ἑλαιας, πρὸς ἑστῆς τ' ἡμῶν ἱερῶδίου. pro ἱερῶδίου itaq; ἱερῶ le gendum puto, & accipiendum, cum lana admoüendum esse pharvacum, & for tassiss diminutiua uoce ἱερῶδίου pro ἱερῶδίδιον est. Velut infra lib. 10. cap. 2. in uer su Democratis σκίπτουσι τὸ κώλον καφ' ὀφθαλμοῖς ἱερῶδίου, id est, Totū teges crūs mollis bus uellētibz. Nisi quis ἱερῶδίου pro fulcro & sustentaculo dīcium accipere uer lit, ut uidelicet specilli uel graphij extremo, uelut sustentaculo, medicamētum sit adhibendū. Sequitur paulo post. Itē cerui cornua in uīno cocta. Sed in græco exemplari deest uox ἑλαιας, quam ego restituendam puto, quanquam & ἀγρῶς, id est capræ cornua legi possint, ut quæ ἡσίδem uiribus prædicat sint, ut Galen. 11. simp. pharm. prodit. Harum itaq; uocum altera restituenda est, ne infinitas erro rem pariat. Sequitur fomentū dentiū corrodorū & dolentiū, in quo τῆρας πνεὺς ὀφεί μελλωτὶ δίδωται legitur, sed pro πνεὺς substituendū est πνεῦμα, hoc est foue seu fomenta.

De dentifriciorū cōpositione quibus utor. Dentifricia ἰδίων στρογγύλων λέγουν tur græcis. Verum hoc loco corrupte ἰδίων στρογγύλων leguntur. Fiunt autem ad di uersos usus uaria. Nam & frigefactis dentibus, & moris, & dolentibus, & ἡσίδem poliendis, & gingiuis laxis, & ad parulidas, & putrefactiones, omniacq; oris uitia seorsim destinata parantur, uelut ex ordine ad singulas has affectiones & uitia Galenus describit. Sunt autē diuerfa dentifricia à dentiscalpijs, quæ ἰδίων στρογγύλων qæ græcis appellantur. Dentifricia enim in tenuissimum puluillum redacta affri cabantur, Dentiscalpia uero ex harundinibus maxime, in oblongam formam si gurabantur, eximendis his quæ dentibus à morsu ciborum inhaerent apta. Fie bant etiam ex uiridi lentisci ligno, atq; hoc est quod Dioscor. de lentisco ait. τὰ δὲ φυλλώδη χλωρὰ ἀντὶ καλαμίδων πρὸς στρογγύλων πῶς ὁ δὲ τὸ σμήμα πάντως. Quamquam ipsa uerba indicent ligna lentisci uiridia dentibus affricanda esse, sed certè nō alio modo quàm scabendo ac scalpendo, quo uidelicet inhaerentia extergantur ac exi mantur. Nam eum Lentisci usum Martialis poeta lib. 6. palam indicat, ubi ait, Foditq; tonlis ora laxa lentiscis. Et in apophoretis. Dentiscalpium. Lentiscum melius, sed si tibi frondea cuspis.

Defuerit, dentes penna leuare potest.

Quum enim penna itidem dentes leuare ab impactis & inhaerētibz possit, scal pendo uidelicet, affricari enim cōmode non potest, certū est neq; lentisci lignum alio usu fuisse quàm scalpendis dentibus, & non confricandis, uelut ex Dioscor. intelligi possit, & partim ab eius interpretibus est intellectū. Sed & idem poeta in eodem opere dentifricij lemma seorsim habet. Dentifricium.

Quid mecum est tibi r me penna sumat. Emptōs non soleo polire dentes.

Timocratis dentifricium. Hoc dentifricium ad gingiuas madore laxatas, pu trescentesq; facere ait, hoc est οὐλα πινυδιώντα μυδιώντα. Non enim legendum est μυδιών, uelut exemplar falsò expressum habet. Idem inter cætera etiam ad paru lidas conferre dixit. Verum in græco exemplari πρὸς ὀφθαλμοῖς pro πρὸς ὀφθαλμοῖς falsò le gitur. Ad oris enim uitia omnia mox cōmodum esse subiungit, ut nō ad aurium abcessus πρὸς ὀφθαλμοῖς appellatos, sed ad gingiuatum inflammationes πρὸς ὀφθαλμοῖς

dictas, legēdum esse uel hinc manifestum fiat. Quid uero sint Parulides suprà ex Paulo ostendi, & Cor. Celsus lib. 6. cap. 13. docet, Solent inquit, etiam interdū iuxta dentes in gingiuis tubercula quædam oboriri dolentia, *παρυλίδες* Græci appellant, Verum hoc ipso etiam Celsi loco, in quibusdā exemplaribus *παρυσίδες* legitur, in alijs *παρυσιδες* à quopiam non indoctio pro *παρυσίδες* substitutum est, ex eo quod Celsus iuxta dentes oriri dixit, sed utrumq; falsū, quum de paroytidibus hic non sit locus, & apud græcos medicos nulla affectio *παρυσιδες* appelletur, At uero *παρυσίδες* omnes agnoscunt. Cæterū pharvacum ipsum corruptis in eo rerum mensuris, ut suspicor traditur, neq; facile est integram lectionem restituere ob exemplariū inopiam, & quod Vetus interpret hæc omnia reliquit, ut neq; inde coniecturæ saltem sit locus: Habet autem nostrum exemplar hoc modo. *λαβὼν ἓλ πέρυλιδες βοτάνης μέδιον ἰταλικόν, ὃν ἄλλω μετῷ, ἁλὸν λαβὼν καὶ λιπῶν* f. a. *μέλι τ' ἑξάγλιν. a. κ' ὡς ἄν ᾖ ῥησίδα μέλιαν ψαφασωτίσαν.* hoc est Accipito herbæ perdicidis modium Italicum, alijs Minam habent, salis albi tenuis sextarium unum, mellis Hexagium. Primum itaq; herbæ perdicidis modij Italicī mensura nimia uidetur ad proportionem salis sextarij unius, quare quod adiectum est pondus Minæ in alio exēplari haberi, uidetur castigare modij excessum: quanquā neq; hoc ipsum Minæ pondus probem, utpote minus quam proportionē sextarij unius salis conueniat. Est autem Mina iuxta Paulum Aeginetam unciarum. xvi. Attica uidelicet & Aegyptia, Romana uero unciarum. xx. Sicut Sextarius quoq; Italicus unciarum. xx. mēsuraliū, Atticus uero. xvi. iuxta Galenum lib. 1. & 5. *ἡ γένε.* Quanquam Aetius xli. cap. 35. Sextarium Italicum unciarū xxiii. facere uideatur, hoc est librarum duarum. Sic enim habet *ἅλως κρινῶν περιουγμένην* f. a. *ἰταλικόν. τουτίσι τ' α. λ.* hoc est. Salis communis torrefacti sesquiseptarium Italicū, hoc est uncias xxxvi. quāquam suspicio nobis fuit eum locum uertentibus, f. β legendum esse, quod si tamen etiam legatur, Sextarius Italicus xviii. unciarū erit, & sic eiusdē mēsuræ cū Attico, quod Galen. locis paulō ante citatis apertis uerbis redarguit. Libro primo enim *κατὰ γένε* sic ait. *πρὸ γὰρ τοῦ ρωμαίου ὁ εἶς ἔχει μίον λίτραν καὶ ἡμίσην καὶ ἑκατὸν, ὡς ἔστιν τοῦ πάλαι ὀγγίας κ. α. ὡς ὅτι τὸ πάλαι τοῖς ἑσπερίαις μετρησιν, ὡν τ' ἐκ τριῶν ἑξαδὸν ῥωμαῖοι τοῖς ἑσπερίαις, ἵναι δ' ἑξ ὀκτώων ἑκαδὸν αἰσθάνονται τ' ῥωμαίων εἶς ἑκαδὸν αἰσθάνονται μετρητὰς ἑχὺ ὀγγίας.* Porro Modius Italicus iuxta Aetium est librarum xl. Sic enim 13. cap. 57. ait. *ὁ δὲ μὲν πρὸς τὸν κρινῶν ὁ λαβὼν ἡμῶν μολίου ἰταλικῷ, τουτίσι λίτρας κ.* Et paulō post *προσπαχῆς ἑπερῶ ἡμῶν μολίου ἰταλικῷ, τουτίσι λίτρας κ. λίτρας.* Sed Paulus octo Chœnicas Italicum ac Aegyptiū modium habere tradit, Chœnicem uero duos sextarios, quo eueniet Modium sextariorū xvi. esse, qui omnino libras xxvi. uncias viii. efficiant, si sextarius xx. unciarum uelut dixi statuatur, atq; hanc finē mensuram modij, in herba perdicio leui ualde, & parua copia magnam capacitatem explente, & quæ adhuc paucior ab ustura reddatur, nō nimiam esse putarim, eamq; omnino conijcere malim quā Minæ pondus, si ego medicamento usus sim. At uero quod sequitur, Mellis hexagium unum accipiendū esse, adhuc longē magis sollicitos nos de mellis iusta mensura facit, quum nulla proportio sit mellis hexagij, ad modium herbæ & sextarium salis: siquidem Hexagium pro pondere aurei unius aut sesquidrachmæ accipiat, uelut pleriq; omnes tradūt. Quare hoc loco suspicor nō *ἑξάγλιν. a.* legendū esse, sed uel *ἑξάλιν. a.* ut sit eadē mentura mellis ac salis, uel *ἑξάχλιν. a.* hoc est Hexangeum unum, Ita ut *ἑξάχλιν* pro mensura sex uasculorum paruorum capaci accipiat, *ἑχὺ* autem *μικρὰ* in frequenti usu sunt tum Aetio, tum Paulo, quæ ego uascula parua fuisse existimo in uulgaro usu officinarum, in quibus mel, oleum, ac reliquos liquores dimetiebantur

bantur. Sic enim Aetius 12. cap. 44. de oleo gleucino habet, *ἐποβαλόμενος ἐν ῥοῇ μὲν κρεῖν. τοτὶς γὰρ οὐκ ὁμοίαις*. Caperent itaq; sex uascula parua fere heminam, & unum uasculum paulo plus quam fescūciam, iuxta Aetij indicationem, qui tamen uidetur heminam 12. unciarū mensurā sibi statuere, si modo integra est lectio exemplaris, quod ego in eo uertendo sum sequutus. Non largam autē copiam mellis accipiendam esse, uel ex eo apparet, quod additur, cōtundenda hāc esse ita ut in massā tenuiorem & friabiliōrē redigantur, non spissā & coactiorem. Nolui tamen mutare lectiōnē uulgatā, de hēsitatione mea admonere contentus. Addam autē adhuc aliam cōiecturā, possibile est lectiōnē rectā sic habere, *μὲν λιβὲς ἰσχυρίων, ἀνέκοντα ὡς γρηθὶ μάλα ψαφιστάσαν*, id est mellis tantūdem uel aequalem mensurā, cōtundito ut massa friabilior reddatur. *ἰσχυρίων* autem pro æquilibrio usurpat Constant. Cēsar lib. 2. de agricult. cap. 30. ubi docet quomodo exigere oporteat panis pondus iuxta pondus ipsius frumenti, hoc est, ut ipse ait, *ὡς γὰρ τὸ ἀέριον τῷ ἔρπον ποιᾷται*. Potuit autē facile cōmitti ut præpositio *ἀνέ* ex cōpositione transierit in *ε*. unitatis notā. Sequitur mox pharmacū hoc super prunas positum, immissa per foramen rudicula, agitandum esse, sed lectiōne rursus corrupta. *ὅτι ἡ λανάδιον ῥάβδιον διὰ ἀνθρακῶς ἀπὸ γρηθὶ*. Legi autem debet sententia ita postulante. *ὅτι ἡ λανάδιον ῥάβδιον ἐστὶν ἀνθρακῶς ἀπὸ γρηθὶ*.

Dentifriciū Damocrati inscriptū.] Recenset hoc loco Galen. duo dentifricia ex Damocrate medicō & poeta uersibus Iambicis senarijs conscripta. Meminit eiusdē etiā Plinius ut medicū, & qui ipsius Plinij tempore uixerit lib. 24. cap. 7. Scio inquit, Democratem medicū in ualitudine Confidit M. Seruili cōsularis filiae, omnem curationē austerā recusantis, diu efficaciter usum lacte caprarum, quas lentisco pascebat. Damocratē itaq; Plinius Democratē appellat, & alio loco Seruili prænōmē ei tribuit, eiusdēq; uersū sententiā reddit, quos integros Galen. infra lib. 10. recitat, uelut ibidē declarauit. Verū uersus aliqui hic in primo dentifricio corrupti sunt, quos quemadmodū emendādos putem hic subscribā. Secundus uersus sic legendus est. *ἀνθρῶς τὴν τρεῖς ὁδόντας ἡσπινός*. Septimus sic. *λίπρας τὴν πατρὸν, ἀλλ' ἄλλος λίπραν μίαν*. Octauus sic. *λίπρας ἡλεφάν πατρὸς ἡλεφάν*. Nonus sic. *λίπρας τὸ ἡμὸς ἀλλ' ἄλλος ῥήγας δύο*. Vndecimus. *χέδρου τὴν πατρὸς ῥήγας λίπραν μίαν*. Duodecimus. *ῥέου λίπρας τὸ πρῶτον, ἢ πλῆον βεχρὺ*. Decimusquartus. *ἢ ῥήγας φύλον μαλαβέδρου πῶς δύο*. Reliquorū lectio ut cūq; tolerabilis est, & ex nostra uersione cuiq; patere ac constare potest.

Aliud Aurelij.] In hoc dentifricio aluminis pondus deest, & satis dubium est quantum eius coniici oporteat, Videtur tamen dodrantis, hoc est nouem unciarum pondus, ad reliquorum proportionem non male consenire, quod sanē restitutum puto, sed tamen citra præiudiciū, ut eo usus aliquis uel plus uel minus addat. Lego itaq; *ἀπ' πάντες ἀλλ' ἂν*. hoc est ex hoc dodrantem accipito.

Cōpositio pharmaci dentes præseruātis.] In hac cōpositione *περδίκις βοτάνης* τὴν τριβόλαις, &c. in græco exēplari legitur, haud scio an nō. corrupte. Si enim accipiamus eum de perdicio in Tiberiade uel circa nascēte loqui, nō succurrit autoritas alicuius, qui de hoc idem testimoniū præbeat. Est autē Tiberias oppidum Iudææ ad lacum Genesari, calidis aquis salubre, ut Plin. 5. cap. 15. prodicit, quancūq; si etiā de hoc oppido accipiamus dictā perdicij herbam, nō τὴν τριβόλαις, sed τὴν ἰβηρίαν, omnino esset legendū. Quare uideri possit nō τὴν τριβόλαις, sed τὴν ἰβηρίαν legendum esse, & intelligendum de ea quæ in Iberia, hoc est Hispania proueniat. Sed neq; perdicij Hispani uel in Iberia nascētis quispiā mentionē facit. Cæterū quando perdicij in his dētifricijs iam sæpe mētio facta est, uidebimus semel quæ nam herba ea sit ex autorū traditione, ut uel hinc loci huius integritatē assequamur.

Perdicium itaq; & muralium à Celso appellari. Plin. 21. cap. 30. dicit, quam Græci alij partheniū, alij leucanthemum, alij amaracum uocant. Ita enim legendum est, & non alij leucanthem, alij tamnacum, ut uulgata exemplaria habent. Id quod ex Dioscor. lib. 3. apparet, qui habet *ῥιζώματα αἰ ἢ ἀμαράκων, αἰ ἢ λευκάνθημων*. Verum Plinius etiam hoc loco duas herbas in unam cōfudit. Muraliū enim & perdicū à Celso dicta, est quidem partheniū à Græcis appellatum, sed nō hoc de quo Dioscorides hæc uerba scripsit. Verum quod Helxinen idem describit, itemq; Partheniū appellari dicit. Partheniū itaq; quod in loco citato Dioscorides descripsit, plantē ex genere chamæmeli est, & fortassis ea ipsa species quam hodie uulgo maritima uocant. Helxine uero est ab eodem lib. 4. descripta, itemq; parthenium ac perdicium appellata; uelut etiam ab ipso Plinio 22. cap. 17. Helxinē inquit, alij qui perdicū uocant, quoniam perdices ea præcipue uescuntur, alij sideritiū, non nulli parthenium. Similiter à Paulo & Galeno proditur. atq; hæc est quam Celsus 2. cap. 33. muraliū & perdicū appellauit. Sed utraq; Plinius temere inter se priorē loco, uelut dixi cōfudit. Cæterum hæc ipsa perdicium, à Plinio etiam incoquilis, & hodie parietaria, siue ut Marcellus habet parietalis, itemq; uolubilis appellatur. Estq; utriusq; appellationis uestigium apud Dioscor. in adscriptiōis, ut ego iudico uocibus, sed corrupta est lectio *βουλονπυλαπύρας*, pro *βουλόβλητων πύρας*, uelut palam apparet. Parietaria autem eadem ratione, qua à Celso Muralis dicitur, Neq; est hæc uoce accipienda illa quam paritaria à duplici floris colore, uulgo appellant. At uero primū illud partheniū non esse puto, eam quæ in his dentifricis perdicū, à Galeno & alijs, quos hic citauit eorū autoribus, appellata est. Nam primum partheniū à Dioscor. descriptum, inter tot appellationes à Dioscoride relatas, perdicū non appellatur. Secundum uero, ipsa uidelicet Helxine, humectæ ac subrigidæ naturæ, facultatis est extensoriæ ac leniter adstringentis, ut non inepta quidē ad defricandos dentes uideri queat, maxime uita cum sale & melle. Nisi obstaret hoc loco *ῥιζώματα* uox declarandi gratia adiecta. Verus Interpres in primo dentifricio, ubi duæ herbæ sideritis & perdicis à Galeno uendæ prodūtur, pro sideritide paritaria uertit, & pro perdicide siue perdicio, (Vtramq; enim uocem Galen. habet) mercurialem reddidit, falsus ut apparet, ex eo quod perdicij uocē pro parthenio semper accipi putauit, qua opinione etiam Plin. ut dixi, delusus fuit; quū perdicū non nisi Helxines species tam ostensa appelletur, parthenij autē appellatio pluribus herbis æqualiter accommodatur, uelut chamæmeli cuiuspiā speciei, & ipsi etiam helxinæ appellatæ, uelut ostendi, & leuozostidi siue Mercuriali, quemadmodū Dioscor. & Plin. tradunt. Quare neq; ex ipso quicquā iuari possumus, non celaturi si ex ipso profecissemus. Suspicio quidem esse queat, pro *ῥιζώματι βουλόβλητων ῥιζώματος*, legendū esse *ῥιζώματι βουλόβλητος*, uel *ῥιζώματος βουλόβλητος*, aut etiam *ῥιζώματος*, accipiendumq; ibidem herbam quæ & Lepidium & Cardamine appellatur. Cuius radices Galen. infra lib. 10. ad ischiadem auxiliares, ex Damocrate prodit, uelut eo loco uberius à nobis ostendetur. Sed & hic obstat meritō nobis debent uel imprimis hæc duo, Nimiū uim eius, nimis acrom ad hanc rem esse, & perdicij appellationē ei non tribui ab alijs, neq; cōuenire. Quare iuxta meam adeo sententiam, libenter tamen potiori celluram, recte ut opinor, ad perdicū superius, helxinen uidelicet trāsibimus, eoq; ut extensoria uel prædita, & hanc uberius adhuc ex uisura adipiscente utemur, & pro *ῥιζώματος*, legentes *ῥιζώματος*. Hispanā prælatā reliquis intelligemus; quanquam non certō constet, helxinen Iberiæ ut opimam, præ reliquis terris laudem terre. Et recta lectio fortassis sic habere debet, *ῥιζώματος βουλόβλητος ἢ τῆς ῥιζώματος βουλόβλητος*, ut uide licet declararet perdicū eandem esse quam etiam perdicidē antea dixit. Ipsam cerie

certè Helxinen, urceolarem uelut dixi appellatam; etiam Scribonius & Marcellus inter dentifricia, cum sale urendam recēsent, quo argumento potissimū hanc lectionem probamus. Sequuntur mox huius pharmaci cōmoditates, inter quas in græco exemplari legitur, ὅτι παρουσίας ἀμαχθήσονται, ὅτι ἐπιπροσέτις, ὅτι ἐξελκυσθήσονται. Verum ego uel pro παρουσίας legendū existimo τὰ ἔλα, ut sit sensus, Neq; gingiua: cruentabuntur, neq; superflua carne redundabunt, neque fluxione infestabuntur. uel pro ἀμαχθήσονται, legendum est ἀναχθισσονται. & ante ἐπιπροσέτις uerbum, τὰ ὅλα interponendum, ut sit sensus, Neq; parulides producentur, neq; gingiua: superflua carne redundabunt, neq; fluxione infestabuntur. Annectit mox Galenus. τινὲς δὲ πρίχους λέγουσιν, &c. sed rursus corrupta est lectio. Nam πρίχους legendum est pro πρίχους. Nulli enim pili hunc usum præbere possunt, ut quis πρίχας pro πρίχους legendum esse suspicetur. πρίχους autem, id est, salsamenta uista, itemq; Cybia dentium doloribus cōmoda esse, etiam Plinius lib. 32. cap. 7. tradit, Salsamentorum inquit, etiam sicili uase cōbustorū cinis, addita farina marmoris, inter remedia est. Et cybia uetera eluta in nō uo uase, deinde trita profunt doloribus. Salsamenta itaq; Plinius πρίχους dixit. quæ maxime constabant ex Thynnorum carne, cuius generis etiam cybia sunt. Ita enim uocari concisam pelamidem Plinius testatur. Pelamidis autem appellatio thynni est nondum annuum uitæ spacium egressi, Sicut idem Cordyla uocatur à recenti partu, eodem Plinio libro 33. cap. 11. teste. Dixit autem cybia uetera Plinius, quæ alias solet inueterata uocare, hoc est τὰ τεταρχυμένα, uelut etiam alio loco indicaui.

Finis quinti libri commentariorum.

IANI CORNARII MEDICI PHYSICI

COMMENTARIORVM MEDICORVM, IN DECem libros Galeni de Compositione medicamentorum secundum locos conscriptorum, Liber VI

In caput I. de affectionibus in ore, & de pharmacis ad eas cōmodis.



ETVS profecto sermo est, quem pleriq; artifices in ore habent, Quod nō idem sit, neq; simile, à uiua uoce discere, & ex libro legere.] Est quidem uerissimū quod sibi in principio huius sexti libri de pharmacis locatibus Galenus præfandū duxit prouerbiū, de uiuæ uocis efficacia, sed si id ipsum Galenus sequutus nihil literis mandasset, dii boni q̃ nihil uiuæ uocis nobis medica studia sequentibus hodie audire cōtingeret, sed penitus in muto & surdo auditorio, cæcæq; & mortua caligine utilissimi omnis generis studiorū uersaremur, ut me certe citius affectam esse & poeniteat, & pudeat. Quare uiuæ uocis significatio nō est nisi de ea quæ uera & sana dogmata resonans, nō auribus tantum se nostris, sed per oculos magis pectoribus insinuat, accipienda: tantum adest ut uiuæ putandæ sint uoces quorūdam hodie in publicis scholis mortua dogmata, & meram ignorantiam suam docentium, Et contra mortua scriptura non est nisi quæ falsam & commenticiam doctrinam cum inanī insuper uerborum pompa ostentat, à qua quum doctus Galeni scripta alienissima sint, ita ut hic unus saluberrimam artem

medicam à prauis opinionibus afferuerit, eamq; ad ueram, & ante eius tempora penitus corruptam, & uix uni eius primo auctori Hippocrati non ignotū metho- dum deduxerit: tantum abest, ut mortua scriptura censenda sit, ut ego si nō hanc uocem audiuissē, certe nihil aliud habeam quod uiuum in nostris studiis appel- lare audeam. Itaq; non tantum non uulgaris utilitas ex optimorum auctōrū prae- clarissimis scriptis, industrijs hominibus & prudētī lectione ea uersantibus con- tingit, sed uiua penitus uox sunt mihi omnia ubiq; excellētissima Galeni scripta, maxime tanto splendore & perspicuitatis luce fulgentia, ut nemo nisi hebenissi- mo ingenio praeditus, de eorum obscuritate cōqueri possit: aded ut neq; horum commentariorum nostrorum ullus aliquis usus futurus erat, nisi temporum in- iuria tot clarissimi loci essent obscurati, & ex longo situ pleraq; omnia eius scri- pta cariem sensissent, interim pessimorū librorum pelago, & rerum & uerborum spūrcitia, incertitudine ac errore exundante, nobis offuso, ex quo tandem per di- uini numinis benignitatem, & nostram contentiosam industriam liberati, omnib; uerae ueteris medicinae graecae studiosis manū porrigimus, eos libenter à cer- tissimo naufragio seruaturi, modo uiuam Galeni uocē tum in illius lingua pro- ditis, tum in his atq; alijs eiusdē scriptis à nobis cōuersis, & deinceps uertendis, audire non negligant. In eorum enim gratiam, qui optimarū rerum studio se fau- gare non cessant, se ad hanc scribenda progressum testatur, aliās citra scriptū con- tētus futurus, quotidiano sermone suos familiares amicos ac sodales hoc modo instituere. Legitur autē corrupte in graeco exēplari, *βουλόμενος ἢ ἢ τῆς ἀμας*, &c. pro quo ego legi ac reddidi, *ἀλλ' ἔτι καὶ βουλόμενος τῆς ἀμας*, &c. Sed & titulus huic tractationi praefigendus in graeco exēplari deest, quē hoc modo resti- tuendum putamus. *πρὸς τὴν τῶ σίματος πύλιν, καὶ τῆς τῶ πύλης φάρμακον*. De oris enim affectionibus & praesertim inflammationibus hoc capite tractat.

[Quale est quod per auramentum sutorium constat.] hoc stomaticum phar- macum non tantum inlocūdī usus, sed etiam nociuum esse ait, si oris affectionib; illiūm, siue ad gulam, siue ad asperae arteriae extremum, quod *ἀσπρυγ* graeci medici uocant, praeterlabatur. Haec enim ipsa ut statim occurrentia laedit, por- stea uero etiam ex gula uentrem, & ex asperae arteriae extremo, ipsam arteriam asperam, & pulmonem. Sed in graeco exemplari corrupte legitur, *ἀλλ' ἔτι καὶ τῆς ἀμας*, &c. *πρὸς τὴν τῶ σίματος πύλιν, καὶ τῆς τῶ πύλης φάρμακον*. Itaq; pro *ἀμας* legendum est *ἀδίας ἀπὸ τῆς*. Sic enim legit uetus interpres, quanquam etiā altera lectio tolerari possit. Porro *ἀσπρυγ* uox summū asperae arteriae graecis medicis uelut dixi significat, hoc est *τῆς ἀσπρυγ τῆς τραχείας ἀρτηρίας*. Id ipsum autem aliquando etiam *τῆς φάρυγγος* dicunt in masculino genere. Nam *τῶ φάρυγγος* in muliebri genere, ipse Galenus quum alibi, tum secundo de semine, *τῶ τῶ σίματος ἀσπρυγ* uocari dicit, hoc est omnem internam oris am- pliitudinem, Nos latini fauces appellamus. Quemadmodum igitur *ἀσπρυγ* prin- cipium est asperae arteriae, sic *τῆς φάρυγγος* pro eodem usurpatur, & aliquādo etiam pro ipsius gulae principio siue summa parte accipitur ueluti alibi ostendi.

[Ego quidem igitur à ratione inducius inueni, quemadmodum neruorum sau- ciatorum curationem, ita etiam hoc pharmacum quod omnibus praestat.] Solet quidem Galenus ex omni occasione se suaq; inuenta iactare, sed citra ostentatio- nis & uanitatē suspicionem, quum & rite & uere se iactet, non popularis aurae emerendae studio, sed excitandorum magis studiosorum gratia, ut similia co- nentur: atq; ad hunc sanē modum nos in declamatione, quod optimus medicus sit & philosophus, ad Hippocratis amulationem exhortatur, promittens nobis non

non solum similes nos illi euasuros, sed etiam præstantiores, his quidem uerbis, *Ἐπισκοπῆσαι ἡμῶν δὲ πρὸς τὸν ἀσπὲρ ἐπακράτους ἀλθὲς ἰσχυρὴ ἐλευσται, καὶ τὸ πικρὸν μὲν, οὐδὲν κελύξαι καὶ πικρὰ πλοῖους, ἀλλὰ καὶ βελτίους αὐτῷ φρεῖναι, μανθάνοντας μὲν ὅσα καλῶς ἐκείνῳ γέγραπται, καὶ λάττοντα δὲ αὐτοῦ ἐφελκυσσόντας.* Ad eundem itaq; modum etiam hic de inuenta à se neruorum curatione gloriatur, & de stomatico ex nucibus à se primū excogitata obiter in professione & reditu primo ex Alexandria in patriam. Porro de neruorum cura à se inuenta sexto methodi pertractat, & tertio, τῶν κατὰ γῆρας. De peregrinationibus autem uarijs cum aliarum rerum, tum simplicium quorundam cognoscendorum gratia assumptis ab ipso 9. simp. pharm. libro mentionem facit, & in libro de prænoscendo, & in pluribus alijs per occasionem libris. Cæterum in principio huius stomatici ex nucibus medicamenti habetur: Vtebatur autem collutione aquæ mulsæ, hoc est *σφαλιύσματι*, sed in græco codice *σφαχίσματι* expressum est.

Satis enim scio etiam ipse non solum multos pauperes esse medicos, sed & qui ab ipsis curantur, quibus satis est ubi ægrotent, alicam cum aqua mulsā accipere & mundū panem habere, aut aliquam farinam utilem ad cataplasma. Hoc loco mundum panem habere, non accipiendum est cibi loco eos mundū panem expetere, sed ad cataplasmatum usum, quare subdit, aut aliquam farinam utilem ad cataplasma, ubi uidelicet mundū panē non habeāt. Alludit autem ad ineptam Theffaliorum curationem, qui tribus auxilijs instructi, omnium acutorum morborum sanationem pollicebantur, sorbitione uidelicet ex alica, olei calidi perfusione & panis cum melle cataplasmate, uelut Galenus 13. methodi tradit his uerbis. *κατὰ πολλοῖσιν μὲν ἀρταμέλει, προκατακυνῶν δὲ ἐλαίου διερμῶν, καὶ τριφυλῆς χυμοῦ σφαμῶματι. πᾶσι γὰρ ἀρκῶν τὴν γῆρας χέουσι ἀπὸ τοῦ τοῖς τῶν ἀμεδόλοις διοσκολέως, εἰς τῶν τῶν ἀρκῶν ἰατρῶν.*

Origanum in sapa, quam alij siræon, nostri omnes hepsēma uocant, feruescit. Sapam, siræon, itemq; hepsēma appellari etiam Plinius testatur decimi quarti capite nono, quo loco etiam musto ad tertiam mensuræ partem decocto sapam fieri tradit. Sicut eodem ad dimidiā redacto Defrutum uocari, quæ quidem Plinij uerba sic accipienda uidentur, ut tertia pars tantum musti restare debeat, duabus per cocturam insumptis, uelut etiam libro 23. capite secundo habet. Columella tamen libro duodecimo, capite decimono, de tota mensura tertiā tantum insumere quosdā dicit, decoctione nimirum musti facta ad consumptionem tertiæ partis, sed adscribam eius uerba. Quidam partem quartam eius musti quod in uasa plumbea coniecerunt, nonnulli tertiam decoquunt. Nec dubium quin ad dimidiū si quis coxerit meliorem sapam facturus sit, eoq; uisibus utiliore, adeo quidem ut etiam uice defruti, sapa mustum quod est ex ueteribus uineis condire possit. Sapam porro Carœnum Marcellus medicus appellat, uoce ut apparet, suo seculo latina facta, uel non longe antea, quādo eam neq; Cato, neq; Varro, neq; Columella, neq; Plinius usurpet. Palladius tamē lib. 1. cap. 18. itidem Carœni meminit, sed à sapa & defruto distinguit: Carœnum esse tradens, quum tertia perdita, duæ partes remanserint. Sapam uero ubi ad tertiā redacta descenderit. Defrutum uero à deferuendo dictum, ubi ad spissitudinem fortiter desumpauerit efficit tradit. Hippocrates *ψυχρὸν* appellat defrutum, & Galenus per sirēon exponit, ut iam apud Græcos *ψυμα* ac *ψυτῶν*, quā apud Latīnos sapa ac defrutum inter se confundantur. Est autem apud Constantinum Cæsarem de agricult. frequens *ψυτ* uox, quā & sapam & defrutū accipere licet, quando sane Columella lib. 12. cap. 21. palam dicat: Mustū q̄ dulcissimi saporis decoquitur ad tertiā, & decoctum sicut supra dixi, defrutum uocatur. At uero

συκαμινε appellantur uera Mora, utrisq; appellationibus à plantis deductis, quæ
μορια arbor itē *συκαμινε* uocetur. Idē planē 2. de aliment. dicit, sed quū locus sit
 corruptus eum emendatū ac rescriptū subscribam, & *βάρυν καρπὸν ἐναυμαζοντι οἱ*
πρὸ ἡμῶν ἀνθρώποι βάρυναι, καὶ ἀπὸ μόρας τῆ καὶ συκαμινε τῆ φλωρίας & *συκαμινε*, Sic
 sanē legendū est, sed in uulgato græco exemplari, uerba & τῆ φλωρίας καὶ συκαμινε
 defunt, ut ex præcedentibus nullus sensus erui possit. Vult autē Galen. Batina à
 bato dici, sicut Mora à Morea, & eadē sycamina à sycaminea. Sed & Diosc. lib.
 4. de rubo agens, *βάρυν* uocem recenset, uerū in exemplaribus uulgatis *βαλάνια*
 legitur, pro *βάρυν* uoce rubi fructū, hoc est rubi mora significāte. De his Plinius
 lib. 15. cap. 24. ait, Mora nascuntur & in rubis multū differēte callo, sed in exem
 plaribus uulgatis, Romæ nascuntur, leui sed tamen à nemine animaduerso erro
 re legitur. Non enim Romæ, sed ubiq; terrarū Mora in rubis etiā nascūtur. Qui
 dūs poeta 4. Metamorph. Cornū & in duris hæretia Mora rubetis. Sūt autē
 mora rubi quæ uulgo nostrati brombehr & kratzbehr ab ipsius rubi aculeis di
 cūtur. Cæterum Morus arbor satis nota est, Ego tamen nō memini me pulchrio
 rem q̃ in collegio Buslidiano Louanij est uidisse. eius fructus ab eo quod in sto
 matica pharmaca cōmodus est, apud nostros nomen inuenit, Maulbehr appella
 tus. At uerō Sycomora nō sunt eadē cum sycaminis siue moris appellatis: quan
 quam Dioscor. quosdā etiā ipsam sycomorū sycaminū appellare prodit. Syco
 morū enim Galen. loco paulō ante citato, plantam unā cum fructū se in Alexan
 dria uidisse dicit, fructum quidē cōsimilem sicut paruzæ albæ, eumq; in medio mo
 rorum ac sicū locari posse ait, unde etiā nomē sit adeptus, à similitudine uide
 licet quam ad utrūq; fructū habet. Amplius autem ridiculos esse ait eos qui syco
 mora dicta putent, quod fatuis ficubus, hoc est *πρὸς μορῶν σῦβης* similes existant,
 per quæ uerba palam est ab eo Dioscoridē notari qui ait *καλὸν τὸ εἶναι καὶ ἰσὺ αὐτῶν*
καρπὸς συνόμορον, ὅτι τὸ ἄκρον φλοῖον. Videtur enim sentire Dioscorides ob
 debilem saporem sycomorū quasi fatuū sicut esse dictum. Sed & aliud mirū de
 hac arbore eodem loco Galenus prodit. Nempe generationē eius diuersam esse
 à reliquis arborū fructibus. Neq; enim ex uirgulis ac germinibus, sed ex ipsis ra
 mis magnis ac stipite siue trunco enascitur. Sed in græco exēplari corrupte legi
 tur *καρπὸν* pro *πρῶτον*. Locū itaq; integrū subscribam. *ἡ γὰρ αὐτὴ ὁμοῦ*
γενεῖα πρὸς δὴ πρὸς τοὺς ἄλλους καρπὸς τῶν δένδρων, ὅτι γὰρ ἐκ τῆς ἀκροῦς καὶ βλαστῆος
καρπὸν εἶναι αὐτῶν τῶν καλῶν καὶ τῶν πρῶτον ἐκφύονται. Meminit huius arboris itemq;
 fructus eius, etiā Plin. sed nō sycomorū appellat, uerum sicut Aegyptiā lib. 13.
 cap. 7. Arbor inquit, moro similis folio, magnitudine, adspectu. Pomū fert non
 ramis, sed caudice ipso, idq; ipsum est sicut prædictis, &c. & paulō post. Huic si
 milis quadatenus quæ uocatur Cypria sicut in Creta, Nam & illa in caudice fert
 pomum & ramis, quum in crassitudinem adoleuerē. Porro in sequenti ex musto
 pharmaco meminit inijciendarum extremitatum mollis rubi, aut rubi canini, &
 corni. Rubus itaque qui sit iam ostendi, Verum Rubus caninus, *κυνίσβατον* di
 ctus, is est qui nostris hyfen, & hagenpotten fructum fert appellatum, ipseq; ru
 bus hagdorn, quasi fruticosa spina uocatur, ei enī penitus cōuenit & Dio
 scor. & Galeni descriptio. Cornus autem arbor item nota est Germanis, Nam
 & apud Heluetios & Alsatas nascitur, & alijs etiā ad Herciniam syluam locis,
 & fructus eius ab illis instar oliuæ muria conditur, quod etiā Dioscorides sic
 ri tradidit & Columella. Huic sanē familiæ meæ nomen debeo: quāquam is qui
 mihi primo hoc nomen ex Germanico latinū fecit, Laurētius Vrsalius multarū
 rerū studio ac cognitione eruditissimus uir, patriæ cōsul, ac charis. mihi postea
 socer, ipsum cynosbatum iam à me ostēsum corni appellatione uenire putauit,
 & cynosbatum

& cynosbatum sylvestrem esse cornū adseueravit, ex Dioscor. inductus, qui cornū ferre fructū *ἀς ἰλαίας ἰππικῆς χλωρὸν τὸ πρῶτον, πεπαισμένον δὲ φαδόν* scribit, quā omnia Cynosbato à me offenso cōuenire putauit, quū tamen Cynosbato, aperitissimis uerbis esse à Dioscor. declaratur, quē ille cornū sylvestrem putauit, cui ipsi familia mea apud Getmanos cognominis existit. Diosc. uerba hæc sunt, *καρπὸν ἡ φέρει ἀπὸ μίαν πυρῆν ἰλαίας ἰουῶτα, ὅν τῃ πεπαισμένῃ κίττον τοῖς δὲ ὅπως ἰουῶσι*. Quibus uerbis indicat Cynosbatū ferre fructū oblongū, oliuæ nudeo similem, quum maturefcit rubentē, interna sui parte lanugine obsitū, &c. qui plantæ is est quē Vrsalius socet meus cornū sylvestrē existimaui, & qui à quibusdā etiam hoc die cornus esse putatur, quū tamē cornus fructum ferat ad oliuæ fructus similitudinem oblongū, et interna sui parte nō lanuginosum, neq; multa grana habentē, sed unū tantū nucleū uelut oliua, cuius nucleī magnitudine cynosbati fructus à Diosc. describit. At uero cynosbati fructus Galeno cynosbata, eodē modo quo rubi fructus batina, & mori fructus Mora, & corni corna appellatur. Sed & Vergilius quū dixit, Lapidosaq; corna, his qui uera corna ignorant, de cynosbati dixisse idipsum uideri queat, lapidosa plantē multaq; ut dixi grana habentibus, sed omnino de uero cornu dictū hoc ab ipso est, quod unū quem dixi nucleum, sed tamen ossiculum potius ac propterea lapidosum à Vergilio dictum, habet.

At uero & ex Cornis, ac Brabylis, & prunis apud nos appellatis præparatur apud nos stomatica pharmaca. Institui quidē in his cōmentarijs omnes difficiliores locos librorū Galeni de cōpositione pharmacorū localium enarrare, neq; quicq; est mihi hactenus præteritus, qui alicuius momēti sit, & in ipsius libris inueniri nō possit. Verū hic de Brabylis locus diu nos suspēso animo tenuit, addubitantes quid de eo proferremus, ut palā fieret qui fructus Brabyla ab ipso appellantur, quū nūq; aliis, quod sciam, eorū meminerit, & neq; apud Græcos, neq; Latinos scriptores Brabylorū uox temere reperiatur, præterquam libro 2. de alimentis, ubi Brabyla inter sylvestriū plantarū fructus recenset, sed similiter ut hic obscuro loco, quū neq; inde clarum fiat qui fructus Brabyla appellantur. Adscribam itaq; eius uerba ut his expensis aliqua saltē cognitio nobis contingat. *Λοιπὸν τῶν καστανῶν, ὅτι καὶ μόνον τὸ ἀγρίον καρπὸν ἀφ' ἑδωλοῦ τροφῶν διδόναι τῇ σάρτι τινάσσουσα γὰρ ἐστὶν ἀπὸ βάτινα, καὶ λιμοσβάτα, καὶ βράδυλα, καὶ μεμύκλα, καὶ σίφιφα, καὶ δίοσφυρα, καὶ ἀλκάνεαβα, ὅτι τερμίνθου καὶ ὁ τὸ ἀγρίον καρπὸς, ὅτε τ' αἶμα πωλεῖται βροτῶν μὴ τι τροφικὸν ἔχον, καὶ χυμὸν δὲ πίνει δὴ. καὶ τινὰ γὰρ αὐτὴ καὶ λευκοσμάχα, καὶ ἀπὸ τῶν σπυρίωντα βρώματα, καὶ τὸ τῶν ὄχλινων, ἀλλὰ τοῖς ὄρεσι διατηροῦνται, &c.* His sanē uerbis Brabyla inter sylvestres fructus, corna, mora rubi, cynosbata, & memecyla recenset, quos omnes pauci nutrimenti & maligni succi esse ait. quosdam etiam ex ipsis stomacho nociuos & infucundos, & suum potius quā hominum cibos, atq; ex his ferarum magis quā domesticatum. Sed nihil præter suspitionis aliā quā leuem saltem ansulam nobis exhibet, quæ talis est, ut opinemur Brabyla ab ipso dici spinæ illius fructū quem Germani uulgo schledorn appellamus, ita ut Brabyla fructus sint qui nobis schleendicuntur. Possit autem merito aliquis ueteres scriptores indiligentiæ coarguere, si huius spinæ eiusq; fructus non meminissent, qui ubiq; gentium frequentissimus occurrit. Verū meminerunt, & quidem diligenter, Dioscorides, Galenus, Paulus, ac Plinius, estq; ea (nisi penitus fallor) quæ ab his omnibus poterion & Neuras appellatur. Sed Galenus quidem & Paulus de fructu penitus silent, Dioscorides autem fructum ferreacrem & inutilem dicit, eumq; nullo nomine insignit. Plin. uero semen pro fructu cōuertit, idēq; nullius usus esse, sed tamen gustu acuto & odorato præditū esse, testatus est, palā ostendens se non scire quæ res sit poterion quā describit, ut etiam pleriq;

pluribus omnibus, & maxime Dioscoridis interpretibus ansant dederit putandi, herbam ab ipso, non spinam & sentem describit. Ex græco autem autore aliquo & fortassis ipso Dioscoride, uel certe inde unde etiam Dioscor. sua transcripsit, hæc nobis eouertit, in quibus reddendis quam felix fuerit, ut cuius patere possit, utriusque Dioscor. uidelicet & Plinij uerba adscribam, & primum quidem Dioscor. quimhi poterion non aliam rem quam spinam brabylla ferentem, schledorn nobis dictam, describere uidetur. *πότηριον, ἰσχυρὸν δὲ τρυφώδεις καλῶσι, δένδρον δὲ μέγας κλάνας ἔχον μακρὰς, καλακύνες, ἱμαρτίδις, λιπρύνες, ἐμφερὲς πρᾶγμα, ἀνὰ μακρὰ, πρὸς ἡμέραν. ἄλλος δὲ ὁ βλάμης πρὶν αὐτῶν. λιπρὺν χροῖον ἰσχυρὸν, καὶ ἰσχυρὸν ἀκρῶς, αὐτὸν μακρὰ, λείαν. κερταὶν δὲ σφυμὼν, ἀρχαῖον φέρεται ὡς ἰαχόδωσι καὶ γυαλίφει χαλῶσι, φέρεται δὲ ὅπως πώγων δένδρον ὡς ἰσχυρὸν, ἰσχυρὰ, τρυφώδεις, δένδρον πρὸς τῇ γῇ ἀκρῶς ὡς αὐτὸν διακρῶν καμψύμηνον, κοπύσαι δὲ καὶ ὡς πλάγιον τρυφῶν ἀκρῶς καὶ τρυφώματα καλῶσι, καὶ τὸ ἀγρίωμα δὲ αὐτῇ πινύμηνον, τὰς πρὸς τρυφὰς ἀκρῶς αὐτῶν ἀκρῶς.* Hæc Plinius sic reddi dit. 7. cap. 12. Poterion aut ut alij uocant, phrynion, uel neurada, large fruticat, spinis retorta, lanugine spissa, folijs paruis, rotundis, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus, flore longo, herbacei coloris, seminis nulli usus, sed gustu acuto & odorato. Inuenitur in aquosis collibus, Radices habet duas aut tres binum cu hitorum, in altitudine neruofas, candidas, firmas, Circūfoditur autūno, & præct so frutice dat succum gummi similem. Radix mira uulnerebus sanandis traditur, præcipueq; neruis uel præctis illita. Decoctum quoq; eius cum melle potū dissoluitiones neruorū, & infirmitates, & incisuras iuuat. Hæcenus Plinius. Quod igitur ipse quid esset Poterion ignorauit, non difficile est iudicare græca Dioscori dis uerba, cum ipsius uerbis conferenti. Sed & hoc non paruum indicium præbet, quod eiusdem libri cap. 8, de Brabylla tanquam herba tradit, quod spissandi uim habet cotonei mali modo, nec amplius de ea tradunt autores. Hæc sunt Plinij uerba, quæ si ipse sic prodidit, quod tamen malim non suspicari, extrema rerū ignorantia se laborasse, & propterea neque Græcos, ex quibus sua descripsit, intellexisse, palam facit. Neq; enim de herba Brabylla ab ullo aliquo traditur, sed de Brabyllis fructu, uelut dixi poterij, cuius Galenus his quos ostendi locis mentionem facit. Quare omnino in Plinio lectio hoc modo restituenda est, Brabylla spissandi uim habent, cotonei mali modo. Nihil enim dubito quin in græco autore legerit Plinius. *Ἀβύλλα δὲ ὡς αὐτὸν εὐφραστὴν ἔχει τῶν κυανέων μέλιων τρέπον.* Videtur itaq; per uerbum *ἔχει* deceptus, quod singulare plurali uocē *Ἀβύλλα* Attice comore additū non obseruauit, quod stupendū est in tanto uiro, maxime quum uel ex similitudine admoneri debuisset, quæ Brabylla ad cotoneum malum conferuntur, inepta certe si quis herbam ad malum cōparet, aptissima uero si herbam ad herbam, fructum ad fructum, brabylla uidelicet ad malum cotoneum. Nam reuera in Brabyllis à me indicatis eiusmodi aliqua adstringētis facultatis similitudo ad cotoneum malum continetur. At uero quod addidit Plinius, Nec amplius de ea traditū autōres, legendum est, Nec amplius de ipsi tradunt autōres. Sed & idem nos queri possimus, & ab initio sumus conquesti, quod apud nullum utriusque linguæ scriptorem, de brabyllorum uoce quequam reperiamus, nisi hoc Galeni loco, & illo altero ex secundo de alimentis adducto, & tertio hoc Plinij loco, ab ipso autore non intellecto. Meminit tamen Theocritus Idyllio septimo brabyllorum hoc uersu. *ταῖς δ' ἰσχυρῶν, δεπνὰν βραβύλλαις κρεβέσσοντις ἐκπρῶν.* hoc est. Depressi ad terram brabyllorum pondere rami. Verum Scholiastes communia pruna brabylla esse dicit, siue Damasena. Sic enim ait. *βραβύλλα τὰ πινύνη κρεβέσση, ἵσχυον δαμασενά.* Meminit & Idyllio 11. *ἀπὸν ἔχει χαλῶν,* ὅσων μάλα βραβύλλαις ἀδῶν. Sed scholiastes eo loco & præcedentibus & sequentibus

sequentibus diligenter dedaratis, nō exponit quanto malum dulcius sit brabylis. Verū quum palam dicat poeta, Ver hyeme iucundius esse, & malum brabylis, nihil aliud indicare uidetur, quā fructum poterij ut dixi. Neq; enī malum est dulcius Damascēns, quā priore loco per brabylorū uocem Scholiastes accepit. At uero alia arbor est *βράβυλος* Constantino Cæsari appellata, Nimirū persica quæ ex osse persici est enata, uelut tradit lib. 10. de agricultura ex Florentino his uerbis *ἡ βράβυλος τῆς ποσειδωνίας τοῦ καὶ γαλακτοῦ, ἀπὸ τῆς τοῦ περσικοῦ ὀστέως ἐστὶν ἐκείνη, ἢ ἐκ τοῦ δακτύλου τοῦ καὶ ἢ ἐκ τοῦ βελγιδίου. βράβυλος δὲ λεγέται καὶ ἄλλα, τὸ ἐκ τοῦ περσικοῦ καὶ τοῦ βελγιδίου ἀπὸ τῆς ποσειδωνίας.* Verum tantū abest ut dubitemus Brabyla alios fructus esse quā poterij spinæ, quos schleen Geriniani uocamus, ut si stomaticum pharmacum preparaturus essem, aliorū potiorū inopia, eo fructu uti nō dubitarem. Neq; auertar aut ex eo quod Galenus & Paulus de poterij fructu siluerunt, aut ex eo quod Dioscorides inutilem dixit, quū ad præsentem rem stomatici uide licet medicamenti cōsectionem, commodissimus hic tradatur, & ne esse quidem alius possit quā is quem indicauit. Cuius opinionis nostræ fidē nobis amplius faciunt corna & pruna syluestria, tanquā non multum dissimiles uiribus et usu fructus, uelut etiam reuera sunt, ad brabyla adiecti, ex quorū omniū succis præparari stomaticapharmaca in Asia, uelut ex mororum succo, Galenus hoc loco tradidit. Cæterum quod pruna hic Galenus uocari apud Asianos dixit, non de prunis satius accipiendum est, sed de syluestribus. Nam q̃a solum *πρῦμα* Asiani appellabant, Romanā uē apparet uocē. Satius enim *κακίμυλα* communi græcorum appellatione dicuntur. Sicut syluestria etiam *ἀγροκακίμυλα*. Sic enim Galenus 2. de alimentis ait, *ἡ τῆς ἀγροκακίμυλων καρπὸς ἢ πρῦμα τῆς ἡμῶν καλὴς.* Idem 7. simpl. phar. *πρῦμα*, syluestrem prunū arborem, in Asia appellari tradit. Singula porro quæ dixi iniicere licet aliquādo & musto austerarum uuarum, quā Aminæas uocant. Vuas austeras Aminæas uocari Galenus hic palam dicit, ex iisdem mustum ad stomaticum pharmacum probans. sic enim ait, *κακίμυλα δὲ ποτὶ τῶν γλυκύων σφόδρὰν ἀσθενῶν ἢ ἐννομήσων ἀμυνάει.* Ex iisdem Aëtius etiam mustum ad oleū gleucinum parandum probat, *ἀμυνάει τὴν σφοδρότητα* exponēs. Sunt enim omnino austera & acida itemq; acerbæ uua, frigidiores, & adstringendi ut prædixi, aliæ plus, aliæ minus, sicut contra dulces calidæ sunt & aluum subducunt. Verū in medio utriusq; generis existunt quæ à græcis *αἰνῶδες*, hoc est uinosæ appellantur, quæ uidelicet nullam uehementem qualitatem exhibēt. Aminæa porro uina Galen. 5. de sinitatis tutela, in Italia nasci tradit circa Neapolim & Thuscorum terram, ut nō sit Aminæa appellatio patria censenda, maxime quum Plinius Aminæam Syriacam dici tradat 14. cap. 3. Est & nigra, inquit Aminæa, cui Syriacę nomen imponunt, Sed & idem sequēti capite ex Catone maius & minusculum Aminæum uitium genus recenset, & Aminæam Varro ni Scātiānam uocatam prodit. Scribonius cap. 249. Ad imperigines, inquit, uua Aminæa quæ sic dicitur, bene facit. Est autem ruberrima & in uepribus nascitur. Quare Aminæa omnino pro austera ubiq; ponitur, sed obscura nominis ratione, quā tamē aut à loco, aut ab inuentore putamus deductam primum, & postea ad omnia austera translatam. Nam & Neapolitani & Siculi Aminæi, id est austeri, Galen. 12. Meth. meminit. Vide de eadem Constant. Cæsarem de agricultura lib. 5. cap. 17. & lib. 8. cap. 21.

Maxime uero aptus est Rhus siue masculino, siue muliebri genere ipsum uerbis appellare. Duo genera Rhois Galen. hoc loco facit. Alterū quod obsonijs inspergitur & stomacho cōmodum est, quod *ῥωὶς ὀψία*, & *ῥωδῆρις*, & *μεγαλὴ ῥωὶς*, aliās Græci medici appellare solent, nos obsonariū, & rubrū, & culinariū, his uertendis

uertendis diximus. Alterum à tinctoribus coriorum expetitur, & propterea *Βυρ-
σαριον* appellatur, quem Coriariū alias uertimus: atq; hæc Rhois genera sic
distributa, non accipienda sunt, tanquam diuersæ plantæ essent. Est enim una
planta quæ Rhus byrsodepica uocatur, qua tinctorum ad coria spissanda utun-
tur. Semen uero aut potius fructus, eiusq; succus, præcipue in usum medicū ue-
niunt, quanquam aliquando uterq; Rhus, hoc est & planta, & fructus, uelut etiā
hoc loco, in medicamēta assumantur. atq; hæc differentia, & appellationis ratio,
aperite à Diosc. & Galeno produntur, sed Paulus ex hoc in compendium omnia
reduxit, cuius uerba adscribam. *ῥοῖς τοῦ Βυρσοδεπικῆς λευκὸς τῆς γὰρ οὗ ὁ λευκὸς μὲν
ἀπὸ τοῦ ὁ χυλὸς αἷς ῥοῖαν ἀποκαλεῖται, ἐκ τούτου ἐστὶ τὸ συνήκες μὲν ἢ ῥοῖαν τῆς
αἷας, συνήκες δὲ τὸ ὁλόκληρον.* Verum Plin. 24. cap. 21. duas diuersas plantas fecit, pri-
mūq; Rhun fruticem Coriariū subrutilum descripsit, moxq; de Rhoē erythro
id est rubro frutice eiusq; semine tanquam diuerso à priore tradit, quum tamen
uelut dixi, & ex Pauli uerbis palam apparēt, alterius Rhois plantæ, alter Rhus
fructus sit, & illa tinctoribus, hic medicis familiarior existat. At uero Syriacus
Rhus idē propterea dictus uidetur, quod in Syria multus proueniret, uelut item
ex Plinio lib. 15. cap. 6. apparet, ubi recte Rhoi Syriacæ plantæ pellibus cōmodæ
semen quod Rhus item uocatur, medicamentis commodum adscripsit. Semen
autem quàm fructum, *λεπτόν* græcis dictū uocare maluit. Quare toto cœlo errāt
qui Rhun uel Rhoem (Nā latinū nomen nō habet, inquit Plinius) apud Celsum
mannam significare putant, non thuris, de qua alio loco à me dictum est, sed que
hodie manna appellatur Arabica uoce, pharmacū aluolenter soluendæ, itidem
ut cassia fistula hodierna, aptum: quum nihil aliud sit Rhus Syriacus, quàm ery-
thros, siue ruber, & apud Celsum 6. cap. 11. non ros, sed rhus quē Syriacū uocant
legi oporteat, sicut etiā apud Columellam 9. cap. 13. nō rorem futuriū, sed rhoem
Syriacum legendum est, quū Syriaci appellatio latinis sit æque ut græcis familia-
ris & recepta. Neq; enim futuriū à futurorum siue Coriariorū usu, ipsum dixisse
noua appellatione efficta, credere par est, uelut quidam somniant, Neq; etiam
rorem marinum eodem loco paulo post legendum est, uelut recens edita exem-
plaria habent. Nam & lib. XII. cap. 41. idem Columella in conditura ex cydo-
neis, rhois Syriaci contriti & cribrati heminam habet, de quo adeo in eiusmodi
pharmacā ac condituras addendo, Galenus hoc loco itemq; in sequētibus agit.
Habetur tamen etiam apud Marcellum medicum rhus marinus, siue rhus orien-
talis, cap. 27. dysentericis tritus propinandus ex uino, ut etiā apud Columellam
rhoem marinum legi possit, sed nō rorem. Libet uero mihi credere eundem rhun
siue rhoem, à diuersis locis in quibus prouenit, tam uarias appellationes fortiri,
quando etiam Eupatoricam & Ponticam rhun (est enim generis cōmunis) Da-
mocrates prober, uelut infra libro septimo ostendi. His enim omnibus locis nul-
la alia gratia proficitur adhibendus, quàm in usum adstringendi, quàm adeo uim
solus hic de quo agimus, rhus habet, ut neq; ros marinus latinis appellatus, &
græcis *λιβανώτης*, neq; manna hodierni temporis, accipi his locis possint, quum
sint penitus inepta, & contrarijs planē uiribus Rhoi prædita. Est autē huius rho-
is succus etiam hodie officinis notus, sed Arabica uoce, ut alia multa, sumach ap-
pellatur. Galenus certe paulo post hunc locum inter parabilia adstringentia re-
censet Culinarium & Coriarium rhoem, & succum qui ex Syria affertur, qui
sanē succus non alius est quàm à rhoē Syriaco collectus, Eundem etiam capite
sequenti, mox post rhoem Coriarium subiungit. Quare hac parte diligenti anim
aduersione opus est, ne æquiuoco succi Syriaci decipiamur. Nam qui alias suc-
cus Syriacus, hoc est, *ῥοῖς συριακός*, Diosc. Galen. & Plinio nominatur, omnino

alia res à rhois Syriaci succo existit. Est enim ex Lasericis generibus, in quibus principatū habet, qui Cyrenis nascens Cyrenaeus dicitur, ita ut ab eo secundus sit Medicus, & deinceps Syriacus uocatus, utpote illo debiliores & grauiorē odorem habentes, uelut Diosc. lib. 3. testatur, ut fortassis non male Asa foetida hodie appellata, hi succi esse putentur, omnes ex silphio, quod latini laserpitium dicunt, in praedictis locis collecti. Hos autem succos etiam in stomatica medicamenta ad discutiendas induratas inflammationes, Galenus paulò post Rhoei succi mentionem, commodos dicit. Sed quod admonendum hoc loco duxi, succus medicus in ueteri translatione aliquoties indicus legitur, non interpretis, sed typographi uisio, lectionem ueram non assequuti, quæ occasio esse possit, aliud accipiendi per indicum succum quàm qui medicus appellatur, atque id non sine graui errore & delictio, quum non indicus succus aliquis Græcis uocetur, neque indicus lapis siue color accipiendus indicetur, sed falsa & supposititia uox sit, indicus succi pro medico, quod tamen doctos aliquos non animaduertisse, magis notum est quam ut pluribus indicare ac improbare libear. Est autem locus unus omnium celeberrimus in quo indicus succus pro medico legitur, in ueteri interprete huius operis lib. 4. ca. 1. de pharmacis acribus oculorum, quem indicare uolui ut de errore studiosos cautos reddam. In græco enim exemplari aperte legitur ἰνδίκος ἢ ἰνδικαῖος ὀφθαλμῶν, αὐτῶν τῶν ἰνδικῶν καὶ ἰνδικῶν, ut non nisi græcæ linguæ extreme rudibus ulla suspitio esse possit, de ullo alio succo quàm medico, ut dixi appellatione, fieri mentionem.

Proprie quidem stomatica appellantur quæ ad uuas, tonsillas, ac omnes quæ in ore sunt de repente inflammationes conueniunt. Hoc loco tandem in dicat Galenus quæ pharmaca proprie stomatica appellentur, nimirum ea quæ oris inflammationibus destinata sunt, atque eorum sylum mox iuxta autorum quorundam præscriptum subiungit. Cæterum quæ affectio sit uua, hoc est σπύλη, Galenus infra cap. 3. declarat. Tonsillas autem τριγλῆρας dixi, quibus uocibus & pars faucium, & affectus inflammationis indicantur. Videntur autem tonsillæ uelut Isthmus quidam inter gulam & asperæ arteriæ extremum locatæ. Vnde sanè etiam apud Græcos appellatio τριγλῆρας facta est, sicut latinis tonsillæ diminutiuua uoce à tolles, hoc est tumore dictæ sunt. Porro quodies σπύλη uox simpliciter ponitur, συνάρσις id est compositio, siue Ἀγγύς id est illino ad intelligenda est. Vnde sanè etiam Plinius simpliciter stomatice dicere solet, uelut 3. cap. 6. de malis punicis. Ex acerbo sit medicamentum quod stomatice uocatur, quum dicere potuisset, ex acerbo sit medicamentum stomaticum, generis congruentia seruata. Et cap. 7. eiusdem libri recenset compositionem pharmaci ex moris, quod Galenus paulò post hunc locum ex Hera habet. Sed adscribam Plinij uerba, tum ut locus corruptus emendetur, tum ut studiosi uideant quantum Plinij uerbis cum Galenicis conueniat. Fit inquit, ex pomo. panchrestos stomatice, eadem arteriace appellata, hoc modo. Sextarij tres succi e pomo leui uapore ad crassitudinem mellis rediguntur. Post Omphacij aridi pondus denariorum duorum, & myrrhæ denarij unus, croci unus. Hæc simul trita miscetur decocto. Sic sanè legendum est ex uetustiss. manuscripto exemplari, ex quo aliquando totum Plinium emendatissimum inuulgabimus. Habetur autem in uulgatis exemplaribus sextariorum duorum aut myrrhæ sextarij unus, & quædam alia uerba superfluent.

Multitudinem autem succi congruum esse iubet, hoc est sextarios sex Romanos. Quantū pendat congius uniuscuiusque liquoris, supra ex Paulo ac Dioscoride ostendi. Quoruero minores mensuras capiat ex hoc loco ostenditur, ubi Galenus

Ienus congium sex sextarios Romanos capere dicit. Sed & Paulus idem tradit, Verum quā corrupta sit lectio in uulgatis exemplaribus Galeni ac Pauli, etiam hunc locum à nobis restitutum adscribam, quo non de congiō solum, sed in unū uersum quodies quæq; mensura aliam minorem complectatur, clarum fiat. Pauli uerba hæc sunt.

ἡ ἰταλίκη κεράμειον ἔχει χέρας. ρ. ὁ χέρας ἔχει βίαιες ἑξ.

ὁ βίαιος ἔχει κοτύλας δύο, ἀπὸ τῆς καὶ τρυβλίας λίσσεται.

ἡ κοτύλη ταύτης μὲν ἀπὸ τῆς τρυβλίας, ἔχει μύστρα μεγάλη γ' ὀφύβατον δ' δ.

τὸ γὰρ μέγα μύστρον ἔχει ὀφύβατον. α. καὶ τριπλὸν αὐτῶ.

τὸ δ' ὀφύβατον ἔχει βίαιον. αε. ὁ δ' βίαιος ἔχει χέρας μικρὰς

ἑπὶ μύστρα μικρὰ δύο, &c. Hoc est.

Amphora Italica siue Ceramium habet congiōs VIII. Congiōs habet sextarios VI. Sextarius Corylas duas, quæ & tryblia appellantur. Coryla autem siue trybium magna mystra III. Acetabula uero IIII. Magnū enim mystrum continet acetabulum unum, & tertiam eius partem. Acetabulum uero sesquicyathum habet. Cyathus chamas paruas, aut mystra parua II. complectitur.

Octo enim drachmæ unciam efficiunt. Andromachus quinque rerum quæ in stomaticum ex punice conficiuntur, singularum octo drachmas conficere iubet, quod exponit Galenus tantundem esse ac si singularum unciam conficere iussisset, quum VIII. drachmæ unciam constituunt, sicut quatuor unciam dimidiam, ut mox subdit. Verum in græco exemplari, αὐτὰ γὰρ ἑστὶν ὁ δραχμῶν ὅπου δυνάμειον λεγέται, sed ego pro ὅπου lego ὅχιαν, quanquā etiam uox ὅπου tolerabiliter legi possit. Quo igitur tum uncia, tum drachmæ, itemq; reliquorum ponderum certa ratio nobis constet, de hac re etiam Pauli uerba adscribemus, quæ tamen nō ita ut superius recitata, in uulgatis exemplaribus corrupta habentur, nisi quod μὲν ἰαν σπυκι legendum suspicor, pro μὲν ἰαντικὸν uelut alibi declarauit.

ἡ μὲν ἰαντικὴ καὶ ἀγνοήσια ἔχει ρ. α.

ἡ μὲν ἰαντικὴ ρ. α.

ἡ λίτρα. ρ. αβ.

ἡ ὀγγία δραχ. α.

ἡ δὲ δραχμὴ ἔχει γγ. γ.

τὸ δὲ γέγραμμεν ὀβολός. β.

ὁ δὲ ὀβολός κεράμει. γ.

τὸ δὲ κεράμειον

χάλκος ἔχει β. καὶ δισμοίρον.

ὁ γὰρ ὀβολός ἔχει χάλκος. α.

Hoc est.

Minæ Attica & Aegyptia habet uncias XVI. Minæ Romana unc. XX.

Libra uncias XII. Vncia drach. VIII. Drachma scrupulos III.

Scrupulus obolos II. Obolus siliquas III. Siliqua æreos duos, duasq; tertias unius partes. Habet enim Obolus chalcos VIII.

Stomatica illitio ex Besafa, hoc est semine rutæ (syluestris.) βίαια & ἡρμαλία Syras uoces esse, rutam syluestrem significantes, etiam apud Dioscoridem legere est, & infra lib. 9. cap. 3. Asclepiades declarat, sed hoc loco tamen id ipsum, ὠγγανὸν ἄγριον uidelicet significari per Besafa & Harmala uoces Andromachus nō meminit, ut potest qui satis notam rem se his uocibus indicare existimauit. Cæterum in ipsius pharmaci partium enumeratione desunt in Græco exemplari tria simplicia, Cassia, rosetæ, & crocomagma, quæ unā cum suis ponderibus ex Actio adscripti, qui idem medicamentum recenset, & hæc ipsa tria simplicia habet. Ut autem non rite hic deesse, & isthic ex redundanti adscripta uideri queant, testatur abunde Galeni uerba, quibus hæc descriptionē, cum Heræ descriptione confert & quæ in hac amplius q̃ in illa legantur ostendit. Quare hæc uerba quemadmodum nos reddidimus, in græcorum exemplar sunt adscribenda. post aristolo-

chicæ longæ unciam unam, βίαια, ὅπου γὰρ αὐτὰ ρ. α. κεράμειον γ. α. α. Re-

liqua ab ipso Galeno sufficienter declarantur, ut non sit opus me quicquam addere, nisi quod in huius pharmaci tractatu duo usita præterire non libet, unum quod *μῆλον* expressum est pro *βάλαν*, Alterum quod *ἐν ἀφαιρέσει τοῦ ἐν πνεύματι* falso, pro *ἐν πνεύματι τοῦ ἐν ἀφαιρέσει* habetur, quanquam talium uitiorum plus uiginti in his stomaticis medicamentis reperierim, ex quorū numero sunt, quod *λεπτόν* pro *λατόν* de aceto legitur, & *ῥιζὴν γλυκίαν* *καυμένην* pro *καυμένην* excusum est. Reliqua ex collatione conuersionis nostra patebunt.

Aliud stomaticum eiusdem Andromachi ad omnia usita oris. In hoc pharmaco Sandarachæ drachmæ dimidiū, hoc est obolos tres habetur. Quod autem drachma dimidia obolos. III. pendat supra ex Pauli uerbis ostendi. Habet enim drachma integra obolos omnino VI. Sequitur mox Andromachum non prodidisse: Nam crudum, aut coctū, aut tantum despumatum mel ammiscere oportet, & propterea fateatur se despumato uni, quū tamen & cocti, & crudi, usus alius quis esse possit pro affectuum occasione, sed in Græco exemplari lectio est corrupta, quæ sic habet. *ἀντὶς μὲν ἐν ἀφαιρέσει ὅτις ἐξ ῥιζῶν, ὅτις ἐκ γλυκίαν τοῦ μὲν ῥιζῶν*. Aut igitur pro *ὅτις ἐξ ῥιζῶν* legendum est *ἐκ πρὸς ῥιζῶν*, aut ante *ὅτις* uocem interponendum est *μη ἀφαιρ.* utroque enim modo sententia perfecta fiet. At uero & in pharmaco ipso *γλυκίαν* *χολῆ* falso, pro *γλυκύνῃς* *χολῆ* habetur.

Aliud odorum tenerum ad inflammationes & crustas commodum. Nucum pinearum drachmas III. Quod hic nucum pinearum conuerit, in græco exemplari *πυγνὸν* habetur. *πυγνὸν* itaque simpliciter, nucum pinearum nucleū dixisse mihi uidetur, sicut etiam in sequenti capite, ubi idem medicamentum rursus recenset: aut certe pro *πυγνὸν* legendum est *πυγνὸν* *σπιδίων*, uelut infra lib. 7. inter tussicularia eclegmata habetur, atque accipiendi nuclei intra strobilos contenti. Aetius enim s. cap. 46. idem recensens pharmacum *σπιδίων* *καυμένην* pro *πυγνὸν* habet. Nisi quis omnino hic uelut etiam in præcedenti ante hoc quarto pharmaco *πυγνὸν* legere malit. Nam sic priuatim pinearum nucum nuclei appellantur. Pityides enim inquit Dioscorides, appellantur pinorum & piccarum fructus, qui in conis reperiuntur. Conos autem Diosco. dixit totam arboris nucem, quomodo etiam Theophrastus & ueteres græci in usu habuerunt. Sed Galeni ætate non amplius *καὶ* sed *σπιδίων* hæc pinea integra nux appellata est. Quare per strobilorum uocem, totam nucem pineam apud græcos medicos accipere oportet, quæ & *καὶ* & *καυμένη* ab ipsidem uocantur. Per pityidas autem ipsemet earum nucum nucleus indicatur. quanquam quū etiam *σπιδίων* *καυμένην* dicant, nil aliud indicent quàm nucleos nucum pinearum repurgatos. Sicut etiam nos hic nucum pinearum drachmas III. uententes, ipsos nucum nucleos intelligi uolumus. Ad integræ porro nucis pineæ similitudinem Erinaceum suas spinas rotare ac circumflectere Plutarchus in libello de animalium prauitate refert, quem locum eò libentius adscribam; quod & doctus quispitum citatum non probe reddidit, *σπιδίων* uocem flexibilis significatione accipiendo, & recens interpres nucis castaneæ calicem *σπιδίων* conuerit, tanquam *πύγρον* *λοπίμον*, de quo alibi dixi, per *σπιδίων* significetur. Verum ut similitudo quidem Erinacei rotantis spinas, ad Castaneæ hispidum calicē, à Plinio ea grana echinatum appellatum, existit: Ita non reperitur *σπιδίων* eius calicis castaneæ significatione. Et si etiam castaneæ calix *σπιδίων* uoce significaretur, tamen aprior omnino similitudo ad nucem pineam existit, utpote quū ille calix spinosus semper porrectus sit & maneat, Nux uero pini a culeos suos tacentes habeat, quos non nisi summa siccitate; & maxime aqua præmacerata ac postea arefacta furrigere solet

olet, quod facit etiam Erinaceus à uulpe impetitus. Ad nucleis igitur pini similiter
 dinem, Erinaceū suas spinas contra uulpem furrigere, Plutarchus refert his q̄
 bis. *Ἡ δὲ χερσαία ἐχίνα ἡ μὲν ὅτι αὐτὴ ἀμύνει καὶ φυλάκει ἀπὸ τῶν περὶ αὐτὴν
 ποικίλ' αἰδ' ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἐχίνα ἔχει· ὡς μὲν ἀπὸ τῶν γὰρ αὐτῆς γὰρ αὐτῆς ὡς φασιν.
 ὡς ἐρίβιλλος· αὐτὴ δὲ κενὸν ἐλπίδας ἀμύνει
 ὡς τοῦ λυγροῦ τοῦ καὶ δασύου ἐμύχιστος.* Hoc est.

Erinaceorum terrestrium pro seipsis pugna & tutela prouerbiū peperit.
 Scir multa uulpes, unū at amplū Erinaceus. Etenim ubi illa impetit, uelut aūt,
 Pini uelut nux furrigir spinas suas,
 Morsumq; contactūq; uitans gnauiter.

Sunt autem tres Senarij Plutarchi uerbis immixti. Cæterum inuenias & stro-
 bilon arboris pinastrī significatione apud Plinium 16. cap. 10. Artemidorum de
 som. interpret. 2. cap. 25. Constantinum Cæsarem 10. cap. 3.

Porro ad finem huius medicamenti addidit. Hæc ex ferula Cratippi esse ait
 Andromachus uidelicet hæc ex ferula Cratippi descripsisse testatus est. Est autē
 ferula, hoc est, *ῥολόγιον* libri Cratippi inscriptio. Quo titulo etiam Heras librum
 unum conscripsit, cuius supra lib. 1. cap. 1. huius operis Galenus mentionem fe-
 cit, & de eo etiam lib. 5. *Ἡ γὰρ* testatur. *ὁ μὲν ἦρας* inquit, *ἐν βιβλίῳ ἐπιτίτλει τὸ ῥολόγιον*
φαρμάκων συνδύνας ἀντὶ γραφίδων γάρβων. Quin & Sorani γάρβων citat Aetius 8.
 cap. 44. Arbitror autem receprum fuisse morem græcis medicis, ut libros suos
 medicamentarios *ῥολόγια* & *γάρβων* inscriberent, atq; sic etiam illud Cicerō
 nis 2. de finibus accipio. Jam doloris medicamenta illa Epicurea tanquā de Nar-
 thecio promant, si grauis, breuis, si longus, leuis. De Narthecio, hoc est, de libro
 medicamentario Narthecio inscripto, quanquā non igno rem aliquos pyxidem
 medicamentariam per Narthecium accipere, haud scio qua ratione ductos. No-
 bis certe cōsentit etiā Martialis poeta in apopho. qui eiusmodi Narthecia capsu-
 lise boreis inclusa fuisse dicit. Artis ebur medicæ narthecia cernis habere,
 Munera quæ cuperet Pacius esse sua. Nec ignoro alijs aliter hunc locum accipi.

In Caput II. de Crustis in ore.

Εσχέαι, id est, Crustæ uocantur, quæ per pharmaca *ἔσχαται* inde, hoc est
 crustam inducentia appellata, ad modum cauteriorum inuruntur, in ulceri-
 bus putrescentibus, ad compescendam ulterius semper proserpentē putrefactio-
 nem, quæ ipsa *καὶ* Plinio etiam usurpato uocabulo appellatur. Quomodo itaq;
 tum in alijs corporis partibus, tum in oris ulceribus, hæc ipse crustæ insiliantur,
 Galenus hoc loco pertractat, itemq; quomodo tollantur. Quin *ἔσχαται* uocantur
 etiam crustæ sua sponte in ulceribus profundis ac cauis obortæ, quæ colorem si-
 milem referūt crustis à ferro inustis, quæ proprie *ἔσχαται* appellantur. Nam quæ
 tales non sunt, *ἐπιδύστε* græcis medicis dicuntur, hoc est tectoria ulceri obducta,
 uelut nos aliquando his uertendis diximus, & alibi ostendimus. Dicit porro Ga-
 lenus ratio cinarione in his curandis eiusmodi utendum esse, ut contraria appō-
 namus, uelut Hippocrates dixit. Cæterum quod curationem sic instituere opor-
 teat, ut caussæ ac affectū ipsius morbi nos opponamus, frequens est apud Hip-
 pocratem, & clarissime in libro de flatibus, nuper à nobis cū alijs quibusdam in
 latinam linguam conuerso, ostenditur: ubi postquam indicauit morborum natu-
 ram corporibus esse contrariam, medicinam uero maxime secundum naturam
 esse adiectisq; exemplis quibus hæc dicta confirmauit, statim uniuersale pro-

nuncianum subiungit, τὰ ἑναντία τῶν ἑναντίων ἔστιν ἰσχυρά, quam sententiā etiam Galenus quinto cōmentariorum in sextum τῶν στοιχείων Hippocratis conscriptorum adducit, per eam exponens quod Hippocrates eo loco obscurius dixisse videtur, ἰσχυρὰ ἀντίστανται καὶ ἰσχυροὶ τῷ πάθῃ. Hic inquit Galenus, sermo idem est potentia cum eo de quo iam saepe differui, τὰ ἑναντία τῶν ἑναντίων ἔστιν ἰσχυρά, hoc est, contraria contrariorum sunt remedia, quod ipsum Hippocrates sexto morborum popularium particula quinta obscurius dixit. Sanatio fit per contrarium non consentiens affectui. Vel, Sanatio est, obliuctantem non consentire morbo. At uero uelut morbo contraria offerentes corpus ad sanitatem perducimus, Sic inculpatam corporum naturam similia exhibendo conseruamus quemadmodum Galenus eodem cōmentario in hanc Hippocratis sententiā, ἐξ ἡμετέρας ἰσχυρὰ ποτὰ καὶ βροτὰ παρασκευάζει, hoc est, calidis uentre fortes potiones ac cibiturbulenti sunt, refert his uerbis. ποτὰ δὲ καὶ μισθόμακρον ἄς τις πλὴν ἀντιπῆς φάσκει ἀφελῆναι τὴν ἰσχυρά, τὴν δὲ δύσχερῆτος, ἡ αὖθις καὶ τὴν νόσον, τὰ δὲ καθ' ἑαυτὴν αὐτῆς ἰσχυρὰς ἑναντία.

Andromachi stomaticum odorum tenerū ad inflammationes & crustas cōmodum. Composuit autem ipsum ex nucibus pineis, amylo, &c.] Hoc pharmacum etiam præcedenti capite recensui, ubi ostendi πυρῆν mihi dictū uideri pro nucum pinearum nucleo, atque id maxime ex Aetio, qui hoc loco pro πυρῆν habet, προβόλων λευκαρυβίων, quanquam etiam alias indicationes habeat isthic à me relaxas. Neq; adhuc uidetur mihi aliud per πυρῆν uocem indicari in hoc pharmaco, quod ad finem huius capitis rursus tertio referetur. Verum quod admonere uisum est, uetus interpres hoc loco solummodo recensens id ipsum pharmacum, quod Galenus dixit, στανίδιον αὐτὸν εἶναι πυρῆν, ἡμῶν, &c. hoc est ut ego reddidi, cōposuit ipsum ex nucibus pineis, amylo, &c. Componitur per pyrinum, id est, os oliuæ & amyllum, cōuertit: tanquam πυρῆν uox non nucis pineæ nucleum, sed oliuæ os siue nucleum significet, quod ipsum ex eo etiā panderidarum coaceruatur transcripsit ac approbauit. Sed uterq; manifeste falsus est. Nam πυρῆν hoc loco pro nucleo pineæ nucis dictus est, uelut euidenter præcedenti capite ostendi. Aliquando tamen πυρῆν pro oliuarum ossiculis accipit, etiam Helychius testatur, qui ait, πυρῆν, τὰ φῶς τῶν ἰλαίων ἐστίν. In uulgaris tamen exemplaribus Helychij πυρῆν habetur. Promiscue autem & πυρῆν, & πυρῆν dicitur, quomodo etiam Constantinus Cæsar lib. 9. de Agricultura cap. 18. & 19. usurpat. Porro sequitur mox illitio ad affectiones in ore, &c. sed in græco exemplari προχίον pro δάκρυς suppositus est, & paulò post, ἡ καὶ αὐτὴ σὺν μέλιτι, pro ἡ καὶ αὐτῆς σὺν μέλιτι legitur. Similiter autē & in sequenti Critonis pharmaco ante μισθὸν ἐστὶν ὁμαλ. 7. in græco exemplari deest, ἔστι δὲ, ut sit sententia. Sint autem Misyos torrefacti drachmæ tres. Sed & in sequenti Archigenis medicamento, quod sic conuerti. Aut atramentum sutorium purpuræ marinæ tomento inuolutum uriso, in græco exemplari habetur, ἡ χαλκῶν βερύματα δελαστίαν πυρῆν καὶ ἰλαίων σινάκων. Quare mihi omnino pro βερύματι uoce nullius significati, legendum esse uerisimile uidetur βερύματα, ut uidelicet per βερύματα, textura aliqua ex purpuræ cruore infecta lana accipiat, aut omnino idem quod κρεκίς significetur. βερύματα itaque aut βερύμαθι omnino substituendum censeo, uelut etiam reddidi, ut uidelicet atramentū sutorium tomento lanæ purpuræ marinæ cruore infectæ inuolutum accipiamus. lanarum enim uistarum & præsertim ex purpura infectarum, uis est ἀρχαῖα, Dioscoride libro 2. teste, ut aptissime sint hoc loco ubi de crustis tractat censendæ. Non esse autem per βερύματα

νότα διαλασσίας περιφέρει accipiendum aliud quàm tomentum siue floccum lanae, purpuræ cruore imbutæ, alio loco ostendit. Quod si tamen quis uerisimilius esse putet ut pro *λεπιδί* legatur *πύργον*, uel *πύλινον*, non repugno, modo nulla alia lana conuoluta accipiat ut quàm purpuræ flore tincta. At uero *πύργον*, & *πύλινον*, & *πύλινον*, & *πύλινον*, & *λεπιδί* pro haplo lanae siue lana conuoluta dici, alibi abunde declarauimus. Dicitur & *πύργον* *πέπλον*, tum *διπλόν*, tum *τριπλόν*, id est linæolum duplicatum ac triplicatum, sed & *πύργον* *διπλόν* Paulus lib. 6. cap. 9. appellat.

Aut rhoem coriarium in aqua sufficienter donec strigmentosus reddatur macerato, & coquito, & melle ammixto utitur, facit & Syriacus rhus cum melle.] Et hoc loco Galenus post Rhoem Coriarium, etiam Syriacum Rhum siue succum subiungit. Non est autem alius succus accipiendus quàm ex Rhoe in Syria nascente collectus, uelut etiam præcedenti capite ostendi, Vbi inter parabolia adstringentia hæc uerba habentur. *ἐφ' ἧς δὲ αὐτῶν ἀντίθεσις, πρὸς ἡ δὲ αὐτῶν ὁμοιότης, καὶ ἡ ἀντιθέσις αὐτῶν, καὶ ἡ ὁμοιότης αὐτῶν* *ῥι σενίας κομίζονται, οὗτοί τε μὲν αὐτῶν κατὰ ἑαυτὰν μίγνυνται. ἡ δὲ τῶν συνθεσέων, καὶ ἡ ὁμοιότης αὐτῶν πρὸς αὐτῶν ὁμοιότης αὐτῶν* *ἐφ' ἧς αὐτῶν ὁμοιότης αὐτῶν μίγνυνται.* Ex his uerbis palam apparet, succum Syriacum ex Rhoe esse, sed in Syria nascenti, cuius in uniuersum duo genera, Coriarium, & Culinarium, paulo ante hunc locum distinxit. Cæterum uelut etiam supra indicauimus, hic Syriacus succus penitus diuersa res est ab eo quem Dioscorides ac Plinius, & Galenus etiam alibi Syriacum succum appellant. Syriacus succus ex Rhoe adstringentem habet facultatem, sumach etiam hodie in officinis appellatur. Syriacus uero succus alter, ex silphio collectus, discussifortis ut prædictus est, & inter laesis genera recensetur à Dioscoride, tertio post Cyrenaicum & Medicum loco. Sed Plinius uigesimo secundo capite uigesimo tertio: Ex Syria inquit, nunc hoc maxime importatur, deterius Parthico, sed Medico mellius, extinctio omni Cyrenaico ut diximus. quibus uerbis indicat, Syriacum silphium eiusque succum Medico præstare. At uero hoc loco, καὶ ἡ σενίας κομίζονται, habetur. Ad intelligenda est itaque uox Rhus aut succus, id est, *πέπλον* aut *πύλινον*. Nam utro modo dicatur, succus rhois Syriacæ accipiendus est, qui Galeni tempore ex Syria maxime apportabatur, uelut ex uerbis præcedentis capitis, paulo ante citatis, aperte ostenditur. Sed & de ueteri interprete admonendum est, ne quis ipsius errori inuoluatur, qui Rhoem Coriarium aliquando *σινάχην*, aliquando rubram tinctorum uernit, & hanc maxime ubi Syriacum illi adiectum, sumach appellare ipsi uisum fuit, quum tamen omnia Rhoeis genera sumach Syria ut puto, aut Arabica uoce appellentur, & rubia tinctorum non sic ex Rhoeis generibus, sed *ὑπορίστων* sic Latinis uocetur. Sed deceptus est ex eo quod Rhus Coriarius *βυζοδάκτυλος* id est tinctorius coriorum appellatur.

Quæ Heracides Tarentinus ad crustas in ore scripsit.] Citat hoc loco ab Heracide scripta ad Antiochidein, foeminam uidelicet, ad quam etiam cum aliis, tum supra libro tertio capite quarto ad eruptiones sanguinis è naribus, ab eodem scripta recensuit. Quare lectio Græci exemplaris hoc loco ubique emendanda, quo participia *μυσάει*, *λίκναει*, *καταβάλλει*, & *καθιόνει* ad foeminam *ἀντιόχιδαν* referantur, pro his enim foemininis leguntur masculina *μύσας*, *λίκνας*, *καταβάλλας*, tanquam uir aliquis esset ad quem Heracides hæc ipsa scribat.

Aliud ad putredines in ore & gingiuarum abscessus.] Hoc loco gingiuarum

abcessus ἄλκα ἀφαιρόμεν dixi, quas easdem paulò ante Soranus ἀφαιρέσειν ἄλκα dixit, ubi disparatas per abcessum gingivas cōuertit. Disparatur enim & separatur unio cōtīnuitatis in omni abcessu. Vnde etiam ἀποσύναι & ἀποσύναι uoces sunt, eiusdem cum ἀφαιρέσειν & ἀφαιρέσειν originis, πρὸς τὸ ἀφαιρέσειν, ad quorum similitudinem etiam Latini abcessus dixerunt.

In Caput III. ad columellam siue gurgulionem.

His fortiora sunt myrti ac baccarum eius decoctum, & ex acerbis cotoneis malis, & uirgultorum ilicis, arbuti, similacis, ac phagi. Similacem arborem taxum Latinis uocari & Dioscorides & Plinius tradunt, sed in potu acceptam uenenatum pharmacum esse, & repentīnam mortem inducens, idem Dioscoridē libro sexto prōdidit. Imò non solum in potu acceptam lethalem esse, sed umbram etiam sub ea sedentibus aut dormientibus nociuā esse, ut plerique inde moriātur, idem Dioscorides libro quarto tradit, & Plinius 16. cap. 10. testatur, ut mirum uideri queat, eius arboris ramulorum decoctum hoc loco à Galeno ad columellam inflāmatam probari, maxime quum etiam ipse Galenus s. simpl. pharmacorum dicat, σμίλαξ ἢ τῆς ἀφαιρέσειν δὲ διαλύσειν δυνάμει. Sed pro τῆς non recte, ut equidem arbitror, λέγεται legitur, uelut etiam apud Paulum. Non esse autem de alia similace hic accipiendum, testimonio est id quod asperam & leuem, non similacem, sed milacem appellare solet, uelut alibi ostendi, & quod hoc loco inter ilicem, arbutum ac phagum recensetur, quibus aspectu similem taxum Plinius dixit, & Dioscorides tum folijs, tum magnitudine abieti similem scripsit. Arbitror itaque Galenum reuera taxi arboris ex genere Abietino & Ilicino, ramulos hoc loco probare, ut quorum decoctum uehementi adflictoria ui prāditum euadat. Non esse autem eam ubique lethalem & uenenosam ex eo patet, quod Dioscorides prācipue de Italica & in Narbonia Hispaniæ nascendi tradat, pro qua apud Plinium in Arcadiā, corrupte ut opinor, habetur.

Lapis quo sutores muliebria calciamenta expoliunt, uocatur autem Ageratus. Videtur sanè hic lapis Galeni seculo sutoribus familiaris fuisse, Nam & nonò simplicium pharmacorum de eo inquit. Ageratus lapis quo sutores uti uidemus, mixtam habet facultatem adstringentem ac discussoriā, & ob adstringentem quidem manifeste gurgulioni inflāmato auxiliatur, quamuis nullam manifestum adstrictionem aut acridinem in gustu exhibeat. Tantum quidem de eo Galenus, & ex ipso Aetius, ac Paulus tradunt. Verum qui lapis fuerit aut sit haud promptum est pronunciare, quum neque in sutorum, neque in Medicorum usu hodie reliquum esse sciam, & mirum est Plinium eum non nouisse, neque quicquā apud alios de eo lectum prodidisse. Ceterum appellatio ei à splendore attributa uidetur, & quod diuissimè integer maneat, neque senescens, neque marcescens. Habent quidem & hodie lapidem sutores, quo calciamenta expoliunt ut splendeant, sed ex uulgarī filicum glabrorum ac nigrorum genere is esse apparet, aliqui ipsorum spisso quodam utriusque genere ad eandem rem utuntur, ut neutrum ad Ageratum medicum referendum putem, nisi quis omnino filicum nigrorum generis Ageratum esse uelit, quod tamen lapidum genus hanc uim habere, ex nullius autoritate, neque etiam experimēto asseuerare possum, utpote qui eius rei periculum non fecerim.

(Et ex acerbis balaustiu, cytini, malicorium, galla, & magis exacte quā omphacis fuerit.) Que mihi uideretur esse omphacis græcis appellata galla lib. 1. sic dicaui, quo loco Pauli Aeginetæ uerba ad opinionis meæ confirmationem produxi

duci, neq; adhuc sententiam mutare uolo, nisi quis penitus corruptus apud Paulum locum docuerit, aut *omphacitis* ab eo substantiue, pro eo quod calycem Plinius dixit, & uulgo cupula glandis uocatur, dictum ostendat, & non *omphacitidis* uelut ego lego, sed *omphacitis*, uelut etiam in uulgato exemplari habetur, legendum conuincat. Ad hoc autem faciendum opus esset autore qui doceat palam, uelut Paulus habet, *omphacitis* *ἐν τῷ πύλῳ*, & *ἐν τῷ πύλῳ* *ἐν τῷ πύλῳ*, *ἐν τῷ πύλῳ* *ἐν τῷ πύλῳ*, *ἐν τῷ πύλῳ* *ἐν τῷ πύλῳ*, qui si non continget, malo adhuc in ea opinione perseverare, ut legendum sit *omphacitidis* *ἐν τῷ πύλῳ*, & non ut exemplar habet *omphacitis*, accipiendumq; omphacitidem gallam uisam, quæ scilicet sit id ipsum cauum ex quo glans quercina enascatur, & quo Coriarij utuntur. Quanquã ut omphacitidem gallam non hoc ipsum cauum esse quis credat, ex hoc Galeni loco persuaderi possit, ubi in Græco exemplari legitur *ἐν τῷ πύλῳ*, *ἐν τῷ πύλῳ* *ἐν τῷ πύλῳ* *ἐν τῷ πύλῳ* *ἐν τῷ πύλῳ* *ἐν τῷ πύλῳ*. Videntur enim hæc uerba significare, gallam magis ab ipso probari quæ exacte omphacitis, hoc est, uelut etiam Plinius ac Celsus dixerunt, immatura existat. Verum ego horum uerborum lectionem transpositam, existimo sic esse legendam, *ἐν τῷ πύλῳ* *ἐν τῷ πύλῳ* *ἐν τῷ πύλῳ* *ἐν τῷ πύλῳ* *ἐν τῷ πύλῳ* *ἐν τῷ πύλῳ*, ut uidelicet indicetur, gallam magis exacte adstringere quum omphacitidum generis sit, ita ut *ἐν τῷ πύλῳ* ad uerbū præcedens *ἐν τῷ πύλῳ* referatur, & non ad *omphacitis*. Sicut etiam consequenter facit, ubi ait, *ἐν τῷ πύλῳ* *ἐν τῷ πύλῳ* *ἐν τῷ πύλῳ* *ἐν τῷ πύλῳ* *ἐν τῷ πύλῳ* *ἐν τῷ πύλῳ*. Quin & Celsus lib. 5. cap. 12. in materia primo quum ait: Habet gallæ & immature & alterius, &c. Videntur immaturam gallam omphacitin uertere, eamq; alterum gallarum genus statuere. Sed uelut etiam supra dixi, quum immatura utraque & esse & dici possit, uidetur mihi omphacitis improprie immatura dici, maloq; adhuc cū Paulo omphacitin accipere pro eo quod Plinius calicem appellauit, quod uidelicet sit alterum gallarum genus, quanquam ipse Plinius supra calicis mentionem, duo gallarum genera faciat. atque hanc opinionem meam adhuc magis corroborare uidetur, quod hoc ipsum cauum ex quo glans enascitur, fortiori adstringendi ui, quàm galla altera omnibus nota, præditum sit, quam facultatem omphacitidi gallæ & Diosco. & Galen. & Paulus, & in summa omnes utriusque linguæ medici tribuunt, eaq; grata ubi forti adstrictione opus est, eius gallæ usum præscribunt. Quare etiam *omphacitis* ab acerbitate dictam existimo, & potius acerbam quàm immaturam latinis appellandam, maxime quum non solum *ἐν τῷ πύλῳ* *omphacitis*, uerum etiam *ἐν τῷ πύλῳ* *omphacitis*, Paulo Aeginetæ libro 3. cap. 26. dicatur.

Composita autem ex ipsis iuxta duplicem utilitatem sunt.] Græcum exemplar habet hic *ἐν τῷ πύλῳ* *ἐν τῷ πύλῳ* *ἐν τῷ πύλῳ* *ἐν τῷ πύλῳ* *ἐν τῷ πύλῳ* *ἐν τῷ πύλῳ*, hoc est, composita ex ipsis iuxta triplicem utilitatē sunt. Verum quando palam non nisi duplicem utilitatē componendi pharmaca Galenus consequenter declarat, certum est *ἐν τῷ πύλῳ* pro *ἐν τῷ πύλῳ* legendum esse. Vnam autem utilitatem esse dicit ex compositione simplicium eiusdem generis, quando uehemens cum molli committitur, in qua compositione magnam nihilominus uarietatem iuxta rerum copiam alias auctam, alias imminutā fieri posse ostendit. Alteram uero utilitatē ex cōpositione simplicium diuersi generis oriri dicit, quum uidelicet adstringentia & discussoria inter se cōmittuntur, cuius cōpositionis uarietatē etiam pluribus declarat. Sed Aetius 8. cap. 40. Hæc omnia paucis uerbis cōplexus est sic scribens. Ex his simplicibus & composita fieri possunt, quæ uehementi molle & lene quiddā adiungimus, aut discussorio quiddā adstringens admiscemus, iuxta temperaturā corporis cui medicemur. Ita sanè ego cōuersi exemplari græco quod unicū suppetebat, misere corrupto, ut tamen hanc genuinā sententiā utcumq; elicere possem, quā tamen libenter dam

ter damnabo, si melioris codicis ope potiozem assequi continget. Porro obiter indicat Galenus omnia pharmaca respectu ad aliquid aut commoda, aut incommoda esse, ut stulti sint qui de eiusdem generis pharmacis interrogent, quod ex ipsis melius sit, quum singula suo tempore optima ac reliquis præstantiora existant. atque hoc non solum in medicamentis, sed & in uino, alica, pissana, alijsq; cibis usu uenire ait, ut aliquid, corporum uidelicet ac morborum respectu, meliora aut deteriora sint censenda, quod ipsum etiam ab Hippocrate proditum asserat, & sane ab ipso in plerisque locis, præsertim in *ἀποδιαιτή* libris, & de uicibus in morbis acutis est factum. Ad hæc omnia grauissimam Herophilus subinfert sententiam, qui medicamenta & nullius rei, & deorum manus esse dixit: Nullius rei, si non habeant qui ipsis recte utatur. Deorum uero manus, si iustus ipsorum contingat usus. Atque hæc sententia Herophili producit etiam à Scribonio latino in præfatione, sed pro deorum manus, corrupte habetur diuinum munus, ut ex sequentibus eius uerbis passim declaratur, sed adscribam locum integrum à nobis restitutum. Inter maximos quondam habitus medicos Herophilus, Caius Iuli Calliste, fertur dixisse medicamenta deorum manus esse, & id quidem non sine ratione, ut mea fert opinio. Prorsus enim quod tactus diuinus efficere potest, id præstant medicamenta, usu experientiæq; probata: quanquam hæc ipsa epistola non Scribonio, sed Cornelio Celso adscribatur, à Marcello medicolano, non uetusto, quem nuper emendarissimum ex officina Frobeniana edidi.

Vua, inquit, laxata succum dissolutum admoue. Hæc Archigenis uerba ob geminum uitiū Galenus reprehendit, ignorantie uidelicet & obscuritatis. Et ignorantie quidem eum accusat, quod uuam laxatam dixit, existimans cum uulgo uuam appellari Columellæ inflammationem, quum *σφυλλή*, hoc est uua, non significet Columellæ inflammationem, sed aliam quandam Columellæ affectionem, quæ inde hoc nomen accepit, quod in ipsa extrema Columellæ pars uuæ fructui similis appareret. Sed in hoc tamen est minus peccasse inquit, quam quosdam Atticæ linguæ studio sese superciliosius efferentes, qui *σφυλλή*, hoc est uuam, ipsam corporis particulam appellari existimant, quum *σφυλλή* neuram harum significationum habeat, & neque inflammationem Columellæ, neque ipsam particulam, Columellam uidelicet significet, sed eum tantum affectum, quo gurgulionis extremum maius ac liuidum appareret, & suprema ipsius pars attenuata est, quod ipsum ex prænotionū Hippocratis libro ostendit, ampliusq; Dioclis ac Praxagoræ & Mantie autoritate confirmat, qui *σφυλλή* hunc ipsum affectum Hippocrati significare interpretati sunt, quanquā si quis negligentius Hippocratis uerba legat, possit etiā Hippocratem *σφυλλή* pro Columellæ particula, & nō prædicto eius affectu accepisse, existimare. Sicut etiā quod Archigenes dixit, *σφυλλή δὲ γυλαδίστης προσήκειν ἐπὶ λάρυ* uideri possit ita dictū esse tanquā per *σφυλλή* non Columellæ inflammationem, sed ipsam particulam indicaret, nisi Galenus apertis uerbis declararet ipsum *σφυλλή* pro Columellæ inflammatione dixisse. In summa itaq; *σφυλλή* non significat Columellā, non significat Columellæ inflammationem, sed significat affectum, in quo tota Columella laxata, extrema sui parte maior est & liuefacta, suprema uero tenuis, ut similitudinē præ se ferat fructus uuæ. Fructum aut uuæ dico, *πρὸς ἑξῆς τῆς σφυλλῆς*. *ῥάξ* enim in uua, non acinū hodie nobis dictum uelut quidam existimant significat, neque ipsum botrum siue racemum, sed singulas particulares uuas, & fructum qui ex succo, & parte quæ uelut caro est, & ex uinacis, & ambiente fornisece cute constat, ex quo Rhagē etiā Ragoides tunica oculi uiformis appellationem sortita est.

Ad eundem

Ad eundem modum etiam de toto fructu accipiēda est *ῥῆμα* uocis significatio, quum ob similitudinē ad uiam, de alijs fructibus usurpatur. Velut apud Diosc. lib. 4. quum de solano halicacabo ait. *καρπὸν δὲ ἔχει ὅτι θυλακίαις περιέσπται, ὁμοίαις φάκελαις, πῶδες φῶν, λίαν, ὅτι ῥῆμα πεφυλλῆς*. intelligendum est, Solanū halicacabū fructum habere rufum, rotundum, leuem, uelut uia fructū, & non uuarum acinis hodie dictis similem, quum non uia uinaceo, sed ipsius uia fructui toto similis existat solani halicacabi fructus, hodie uulgo cerasū Iudaicū appellatus & arabibus alkekengi corrupta ex halicacabo uoce. Sed tamen & Plinius ipse non aliter acinorū uocem usurpauit, libro enim 21. cap. 31. de eodem solani fructu, cui acini coccinei inquit, sic certe *ῥῆμα πύλλου* reddens, & lib. 17. cap. 8. de solano hortensū dixit, acinos habet nigros, quos *ῥῆμα μίλαντες* apud græcos legit. Quare penitus acinos non granorum internorū, sed totius fructus significationē Pliniano seculo habuisse purandū est. Sic enim ex lib. 13. ca. 1. apparet, ubi ait Nuclei acinorum eandem uim habent, paulo ante autē uinaceos dixit, quos hodie acinos appellamus. Idem ex his uerbis lib. 15. cap. 17. apparet. Uuas cum malleolo farmenti sui durō, demptis forsice corruptionibus acinis, in dolio picato recenti suspendi, &c. Sed & sic usupant Varro Columella & Palladius contra hodierni seculi usum, quod acinos pro uinaceis ab illis appellatis accipit, quanquam etiam ipse Plinius blandiores acinos mali punici lib. 12. cap. 19. dicat, acinos non pro toto fructu, sed pro internis granis usurpans uelut etiā lib. 12. cap. 13. asari semen acinosum dixit, quod apud Diosc. *αρίστου τινος γυγῆρος* habetur. Porro græci quoq; *ῥῆμα* exponunt *ῥῆμα*, non uinaceos sed totum uia fructū indicantes, uinaceos enim *γυγῆρος* appellāt. Quare animaduersione opus est, ne *ῥῆμα* & *ῥῆμα*, itemq; acinos, pro uinaceis accipiamus, quomodo fere uulgo usu uenire uidemus. Columella lib. XI. cap. 11. Si cū expresseris uinacea quæ acinis celantur, tam infuscata & nonnulla propemodum nigra fuerint. Carterum quod Galenus in principio huius capituli dixit, eorum neq; meminisse oportere, qui staphylen, id est, uiam particulam uocent, quæ *γυγῆρος*, hoc est gurgulio, & *λίαν* atq; *λίαν*, id est, columnaa & Columella recte tum græcis tum latinis appelletur. Videtur tamen frequens & usurpatum uicium, etiam ante Galeni tempora fuisse, quum Plinius palem eam particulam uiam appellet, græcorum præscriptum & fortassis ipsius Aristotelis: quæ Galenus ob hoc cū alijs reprehēdit: in hoc ut apparet sequutus. Sic enim habet lib. 11. cap. 37. consilia in homine, in sue glandulæ. Quod inter eas uia nomine ultimo dependet palato, homini tantum est. Sic etiā Celsus, sed & hodie latinis receptissimum est uia itemq; uulam ipsam Columellam uocari. Porro obscuritatis coarguit Archigenem Galenus, quod succum dissolutū ad moue dixit, & non quem succū uellet addidit. Veruntamen hoc excusabile esse dicit, quod apud omnes in confesso sit, Cyrenaicū succum optime facere ad Columellam inflammata, uelut etiam Diosc. tradit. Sed in hoc omnino peius eum deliquisse ait, quod inter adstringendū ui prædita pharmaca ipsum succum Cyrenaicum reulit, non admonens quando eo uti sit tempestiuum, quanquam quod Archigenes succum Cyrenaicum simpliciter succum dixit, per excellentiam ab ipso factum accipi possit, quia apud græcos receptum est *ἰσχυρὸν*, de Cyrenaiico Medico ac Syriaco intelligi. Velut etiam Galen. 2. simpl. phar. testatur, ubi ait. *πίσσε γὰρ ἐκ τινος οὐκ ἡ βασιλῆος τοῦ μανθίνου, ἀλλὰ ῥῆμα ἐκ τοῦ πικρῶς παχὺ καὶ γλυκύον, ἐπὶ τῷ διαφ. ὁ δὲ κατὰ τὸν δὲ αὐτὸν καὶ ὁ ὑποφύου τῶν αὐτῶν κυρνωτῶν ὅπως ὁνομαζοῦνται, καὶ τὸν μεθιδόν, καὶ τὸν στυγερόν*. Sed de hac re etiam alibi a nobis dictum est.

Aut Sycites uinum calidum. Sycites uinū ex caricis sicibus fiebat, sed quomodo Dioscorides lib. 5. ostendit, qui idem Catorchicē appellatū describit.

Memini

Quæ Crito ad aphthas scripsit.] In his pharmacis, aut æruginis uermiculatæ obolos III in uini heminae parte quarta tritos colluat, habetur, uelut ego conuer-
ti. Verum græcum exemplar *ἢ ὅτω κρύλλας τέσσαρες λυβέας*, hoc est in uini hemi-
nis quatuor habet, quæ mensura palam apparet nimia esse ad tres obolos ærugi-
nis in ipsa terendos ac colluendos, etiam si non ipse Galenus consequenter decla-
ret, *ἢ ὅτω κρύλλας πέντε* esse legendū; inoleuit autem is error ex scriptura nu-
meri quaternarii *δ* per cuius compendii scriba uoluit *ἢ τέσσαρες* indicare, non
sentiens se errorem propagare, quo per *κρύλλας δ* alius *κρύλλας δ* accipere pos-
set, quemadmodū infra in Apollonij & Archigenis pharmacis perspicue appa-
ret, ubi idem medicamentum repetitur. Cæterum ærugo uermiculata à simili-
tudine ad uermiculorū speciem dicta est, quomodo etiam græci *σβώλευθ' ὡς* uo-
cant, quem Plinius scolectiam dixit. Estq; duplex ærugo, altera naturalis & fossi-
tia, altera artificialis uelut Dioslib. 5 & Plinius 34 cap. 12 docent. Sequitur mox.
Quin & galla in aceto teratur & illinatur. Sed in græco exemplari habetur. *καὶ ἡ
λευκή δ' ἐπιβάδων ἢ ἐφ' ἰψήκες ψάμας*, loco ut apparet palam corrupto; lego itaq; *ἢ
ἐφ' ἰψήκες δ' ἐπιβάδων ἢ ἐφ' ἰψήκες ψάμας*. Sic enim legi debere ipse Galenus infra decla-
rat. Verum etiam sic, adhuc aliqua deesse uidentur quæ ad *ἰψήκες ψάμας* relata,
sententiam aliquam perficiāt de his quæ in cibo pueris infantibus sunt exhiben-
da, qualia postea ex Apollonio recenset, quæ si quis huc referre uelit, habet locū
indicatum. Nobis in exemplaris potioris inopia, meram diuinationem sequenti-
bus aliqua temere insulcire non est uisum; maxime quum de talibus Apolloniis
claram doctrinā producat. Sequitur paulo inferius. Aur uiolas albas siccas cum
melle tritas illinito. Violas autem albas *λευκὰς* dixi, id enim ipsa uox significat,
quanquam Dioscorides *λευκῶν* appellatione, & albo, & medino, & ceruleo, &
purpureo flore præditas cōprehendit. Verum de cōmoditate earum ad aphthas
cum melle, idem Dioscorides, itemq; Galenus 7 simp. phar. meminerunt, *χρὴν
ταὶ δ' ὁπὸ τῆς* inquit Galenus, *συνέλειπται καὶ πρὸς ἑσθλας*. sed idē eis facultatem
exterforiam, ac tenuium partium adscribit, ob quam sanē ad saluam multam in
aphthis profluentem extergendam, hoc loco commodæ produntur.

Folia pruni contusa ac lacte permixta colluīto.] In græco exēplari habetur,
φύλλα πικραμυδίας καὶ λακτὸς καὶ γὰρ ἀλεον ἰψῆας, αἶμα δ' ἀκλυς, hoc est folia pruni contu-
sa & lacte permixta, ex uino colluīto. Verum *αἶμα* superflue adiectum esse à quo
plam, ex Galeni uerbis mox sequentibus ostendit. Non enim uino, sed lacte mul-
to diluta folia pruni colluenda esse Apollonius docet, quāquam Dioscorides sa-
nē idem auxilium tradens, non cum lacte folia pruni cōtusa colluere iubet, sed fo-
liorum decoctum ex uino gargarsandum docet.

Quæ Archigenes scripsit ad aphthas.] Inter hæc pharmaca habetur, aqua olī-
uæ colymbadis appellatæ, hoc est murtæ innatantis. Per aquam itaq; nihil aliud
quàm murtam ipsam indicat, in qua oliuæ conditæ innatare uidentur, ut inde co-
lymbades quasi natatiles sint appellatæ. Sequitur paulo post. Aluminis scissi,
florum rosarū æquales partes, fructus myricæ duplum, utere siccis: sed græcum
exemplar pro aluminis scissi, hoc est pro *ζεῖσις* falso habet *χίρσις*. Cæterum pau-
lo post, myricæ fructū, etiam myricæ semen uocat, indifferenter & *σπέρμα* & *καρ-
πὸν*, eundem fructum appellans: quod in aliquibus sanē inculpate facere licet, in
quibus uidelicet idē est & semen & fructus in alijs certitudinis gratia uitare hūc
promiscuum usum oportet, quum differant hæc inter se, uelut alio loco indicaui.
Sequitur mox. Aur adipem suillum aut anserinū manna inspersa illinito: sed pro
anserinum, id est *χίρσις*, falso habetur *χίρσις* expressum, uelut infra ipse Gale-
nus declarat. Paulo post habetur. Aut oleæ germina trita ex melle, quo loco pro

oleæ germinibus *θαμία* in græco habetur. Tamen si enim *θαμία* & *θαμίαι* græci omnia germina dicant, tamen peculiariter & quasi per excellentiam de oleæ germinibus, non solū apud Atticos, sed apud omnes medicos *θαμία* usutatur. Sic enim Theophrastus, Dioscorides ac Galenus usi sunt. Et Paulus lib. 3. cap. 66 inter adstringentia infusa, ἐφ' ἑλκυσσιν ὀδόντων, ῥιζῶν, θαμίας, λυπαρίων &c. hoc est de coctum malicorij, rosarum, germinū oleæ, cupressi, &c. recenset. Est porro & alia locis lectio græca corrupta, quā ex uersione nostra emendare licebit. Sicut quod *καὶ τὴ συνήθει ἀπὸ τοῦ ἀφθῶντος πρὸς πᾶσι τοῖς καὶ φρονήσας*. pro *καὶ τὴν ἀφθῶντος* legitur. & *προφῶν* pro *προφῶν*, & quod *pharmacum* ex misy & uino hoc modo est emendandū. *ἔρχεται δὲ καὶ φαρμακὸς ἀπὸ τούτων μίσει χυλιδίου καὶ αἴματι σίφιων & ἀπὸ τούτων καὶ αἴματι τῶν διαισῶν αἴματι, πῶς μάλιστα ἢ ἡλίου σίφιων τὸν αἴματι καὶ τὸν πύριον καὶ ἡ γρόττον ἐξ ἡλίου καὶ σιφιδίου ἢ ἐκ τῶν μίσιων καὶ αἴματι μίσιων φαρμακῶν*. Si enim sic legas, efficietur ea sententia quam reddidi, & quam necessarīo intelligimus. Cæterū quod reddidi. Fortia *pharmaca* dico, tum quæ fortiter adstringunt, tum quæ mordent, & immoderatus discutunt penitus in græco exemplari mancum legitur, *ἔχουσιν δὲ διαισῶν λίαν φαρμακῶν, πῶς ἔχουσιν σίφιων*. Deest itaq; ut patam apparet, *καὶ ἀφθῶντος, καὶ ἀπὸ τῶν φαρμακῶν ἀφθῶντος*. De his enim in præcedentibus, item ut de astringentibus mentionem fecit, ea igitur omnino adscribenda censeo, quo sensus is quem reddidi etiam in græco exemplari integre consistat.

Si uero in putredinē aphtha uertatur, & exulcerationes faciat, neq; aphtham amplius affectionem nominare cōuenit. Supra in principio huius tractationis de aphthīs dixit, ulcerationes in superficie oris obortas, habentes quippā igneæ, caliditatis, aphthas appellari. Ad tales itaq; hæcenus *pharmaca* cōmoda prodidit, atq; iam de hoc commonescit, si putredinosa fiat ulceratio, & depascendo latius proserpat, non aphtham amplius hoc malum uocari debere, neq; *pharmaca* ad aphthas commoda appellari cōuenire, quæ talem ulcerationem curent. Sicut non rite erysipelatica *pharmaca* uocantur quæ discutunt fortiter iam liuefacta & indurata, sed tantum ea quæ erysipelatis in principio repellendi & restringendi influxus humorū gratia adhibentur. Si quis enim inquit, ad aphthas adhibeat, quæ cōueniūt putrefactis, & ad erysipelata admoueat calida & discussoria, quæ conueniunt iam liuefactis, & in scirrhum, hoc est abscessum durum induratis, ut trunque malum grauius reddet per indiscriminatum propriorum cuiq; affectioni *pharmacorum* usum. Cæterum non solum oris ulcerationes in superficie hærrentes, aphthæ appellātur, sed etiam aliarum partium, & maxime pudendorum. Sic infra lib. 9. cap. 3. medicamentum ad testes aphtha ulcere affectos habet, quos *ἀφθῶντες ἀφθῶντες* appellat, à uerbo *ἀφθῶν* quod ex aphtha ulcere laborare significat. Sed idem medicamentū etiam Paulus lib. 3. cap. 54. his uerbis habet, *πῶς δὲ ἀφθῶντες ἀφθῶντες γὰρ κυμαίνου καὶ ὀδόντων πύριον χυλιδίου, ἔχουσιν σίφιων*. Sed & *ἀφθῶντες πύριον & πύριον αἴματι*, pro pueris aphtha ulcere laborantib; græcis medicis frequenter dicuntur. Hippocrates quoq; de fistula pulmonis dixit & de morbis *ἢ ἀφθῶν ἢ σίφιων τὸ πύριον, πύριον ἢ ἔλκυσσιν*, &c. At uero sicut *ἀφθῶν* & *ἀφθῶν* factum est uerbum *ἀφθῶν*, sic ipsa *ἀφθῶν* uox, *ἀφθῶν* deducta esse uideat, propterea quod ignea quadam caliditate huiusmodi ulcera ardeāt, & sint quasi incensa.

Finis sexti libri commentariorum medicorum,
Iani Cornarij medici physici.

Iani Cornarij

IANI CORNARIII MEDICI PHYSICI

COMMENTARIORVM MEDICORVM, IN DE
cem libros Galeni de Compositione pharmacorum
localium, siue secundum locos cōscripto-

rum, Liber VII

In caput primum de affectionibus circa partes respiratio-
nis contingentibus.



AOS EST recentiorib. medicis arteriæ pharmaca arteria-
cas appellare, nō apponētib. num antidotos dicāt, an iux-
ta aliud significatum. Quemadmodum præcedēti libro
septimo stomaticas aliquot confectiones simpliciter appel-
latas habuimus, citra cōfectionis aut compositionis aut illi-
tionis additionem, Sic appellantur etiam arteriæ simpli-
citer citra ullam additionem compositionum aut antidoto-
rum. Appellantur eadem etiam eclecta, nō addendo phar-
maca, ut tamen intelligamus delingibilia esse medicamenta, quæ etiam eclegma-
ta substantiua uoce, latinis itidem & græcis usurpata, φλέβα καλέσθαι, id est à de-
lingendo, nominantur. Cæteræ arteriæ ab arteria nomen habent, cuius affectio-
nibus cōmodæ existunt. Meminit autem obiter Galenus translationis nominis
arteriæ ab ea particula, quæ quondam sola sic fuit appellata, fistula uidelicet si
ut canna quæ ex pulmone in laryngem emergit, à qua ad pulsatiles uenas, quæ
prius æque ut altæ omnes, uenæ appellabātur, nomen arteriæ translatū est. utq;
esset aliqua æquiuocationis dinotio, aspera arteria dici cœpit illa pulmonis fistu-
la, quam græci etiā bronchum uocant, propterea q̄ ex chartilaginosis partibus
quæ bronchia appellantur, magna ex parte constet. Pulsatiles aut uenæ simplici-
ter arteriæ uocare sunt, quantq; hoc ipsum arteriæ nomen latini serius receperint,
diuq; tum arterias, tum uenas promiscuo usu dixerint, uelut apud Celsum & Plī-
nium uidere est: itemq; poetas latinos, qui inculpaite uidentur uenas appellare
ipsas arterias, quod ipsum apud græcos mox uisio datum fuit, si quis φλέβα pro
αρτηρίαν dixisset, uelut annotauit quoque in notisbus atticis Aulus Gellius, qui
paulo ante Galeni ætatem uixit. Usurpat autem & ipse Hippoc. φλεβίαν ἀντὶ ἀρ-
τηρίας cum alibi, tum 6 epidem. partic. 6 aph. 2 φνδρμόστρων inquit, φλεβίαν αἷμα
τῶ πλινθῖ &c. ubi Galenus aperte docet, uenam pro arteria ipsum dixisse, uerba
eius sic habēt. φλεβίαν φνδρμόστρων ἀρτηρίαν δὲ τὴν ἀρτηρίαν, ὁμοιογενήτων ἀπὸ τῶν
τῶ φλεβῶν ἀρτηρίαν τὰ ἰσχυρὰ καὶ διὰ τὴν φλέβαν οὐχ ὑπο τὸ τοῦ μόνου, ἀλλὰ καὶ πολλῶν
ἀλλοιῶν παλαιῶν ἐνομασίῃ καὶ τῆς ἀρτηρίας. Videtur autem ἀρτηρίας appellatio fa-
cta, παρὰ τὸ τὴν ἀσπρά πνεῦμα, id est ab eo quod aerem feruet, ad utram tandem parti-
culam referatur. Ad aeris enim per respirationem attractionē, causa est & orga-
num uel præcipuū ipsa aspera arteria. Aeris aut siue spiritus arteriarū motus, cor-
dis & uitæ gubernacula temperat. Est enim pulsus siue arteriarū motus, actio ni-
talis, necessaria ac inuoluntaria. Sicut contra respiratione, actio est animalis, necessa-
ria ad uitā, uoluntaria. Verum quantū hæ actiones inter se differant ac cōueniāt
ab ipso Galeno in libris de difficultate respirationis doctissime est explicatū, qui
libri nuper à nobis cum alijs eiusdem argumenti latine sunt conscripti.

Organa uocis cum dico, arteriā accipite, & eius summā, ac fauces. In græco
sic habetur. ὅργανα δὲ φωνητικὰ λέγοντες μὲν τὴν ἀρτηρίαν ἀπὸ τῆς καὶ τὴν λαρυγγῆα, καὶ
τὴν φάρυγγα. Verum legendū est omnino τὴν φάρυγγα. Appellat itaq; Galen. hic
τὴν λαρυγγῆα asperitæ arteriæ summā partem, sicut τὴν φάρυγγα foeminino genere

R 2 fauces

fauces, hoc est omnem internam oris amplitudinē, uelut Galen. exponit, quem admodum præcedente libro indicaui. Hæc enim est uocis instrumentū, & non ὁ φάρυγξ, hoc est gulæ summa pars. Quamvis autem ὁ φάρυγξ etiā ἀντὶ τοῦ λάρυγγος usurpetur, cuius exemplū in sequentibus habemus, ubi dixi. Velut exempli gratia. In lassitudinibus tenuis, cum in summi ipsius asperæ arteriæ musculis sunt in græco sic habetur. αἰσθῶν τῷ ἐνδοδύῳ ὑπόπυ, ὅταν γὰρ πικρὸν τὸ φάρυγγος ὁρμῶνται μυσί. Vt autem τὸ φάρυγγος pro τῷ λάρυγγος usurpatum sit, ex Aetio palam sit, qui τῷ λάρυγγος hic legit lib. 8 cap. 21. Quamvis inquam: ὁ φάρυγξ ἀντὶ τῷ λάρυγγος usurpetur. Tamen neq; τὸ φάρυγγος hoc loco, asperæ arteriæ summum accipere possumus, cum id ipsum simul sit per τὸ λάρυγγος expressum. At uero sicut hoc loco τὸ φάρυγγος, id est fauces, pro uocis organo legendum est: sic paulo inferius ὁ φάρυγξ non pro faucibus, neque pro larynge, id est arteriæ summo accipitur, sed pro gulæ summo. Sic enim ait. Vna enim est tunica sibi ipsi coherens & cōtinua, quæ summo gulæ, summo asperæ arteriæ, gulæ etiam, atq; ipsi asperæ arteriæ intrinsecus prætenditur: quod in græco hoc modo habetur. οὗ γὰρ διαρτῶν τὸ χιτῶν σιωηχῆς, ἰ. π. γὰρ τὸ φάρυγγος, καὶ τὸ λάρυγγος, καὶ τομάχου, & ἀπὸ τοῦ πῶς τραχὺς ἐστὶ τὰ γόνα ὑπὸ τῆς παλῆς. Palam itaque apparet τὸ φάρυγγος ad ipsam gulam, & τὸ λάρυγγος ad asperam arteriam referri, utpote qui sint summæ istarum partium particulae. Cæterum hæc sæpius iam repeto, quod uideam interpretes græcorū medicorum mihi in his uocibus uertendis delirare, & nullo æquiocationis respectu ferè semper φάρυγγος quocumq; genere dicatur fauces conuertere. Nam neq; Plinius ipse libro 11 cap. 37 cum ait: Summum gulæ fauces uocatur, postremum stomachus: has particulas satis clare distinxit. Fauces enim non uocatur summum gulæ, sed omnis interna oris amplitudo. Et ὁ φάρυγξ quidem summū gulæ appellatur, hoc est ἡ ἀρχὴ τῆς τομάχου, sed hoc fauces appellare non cōuenit, ut sit inter fauces quas dixi τὸ φάρυγγος, & summū gulæ τὸ φάρυγγος discrimen. Neq; enim fauces, ut φάρυγξ, æquiuoce dicuntur. Videtur autem Plinius quod græci dicunt, ὁ φάρυγξ ἀρχὴ τῆς τομάχου ἔσθ, reddidisse: Summum gulæ fauces uocantur: atq; sic φάρυγγος æquiuocum confudisse, de quo æquiuoco etiam Dictionarij græcorum admonenti, præsertim Suidas sic prodens. φάρυγξ ἡ ἀρχὴ τοῦ στομάχου τὸ φάρυγγος φάρυγγος, ἢ ἡ ἀρχὴ τῆς ἐσθίας ἢ μετὰ τὸ φάρυγγος γλῶττις ἵσταν, ὅταν δὲ ἐξ ἐσθίας τοῦ στομάχου πρὸς τὸ λάρυγγος, & Iulius Pollux. ὁ μὲν τὸ φάρυγξ τομάχου ἀρχὴ, ὁ δὲ φάρυγγος λάρυγγος. Porro fauces significare internam oris amplitudinē post linguæ radicem, uel ex hoc doctissimi poetæ uersu ostenditur.

Obstupui, steteruntq; comæ, & uox faucibus hæsit.

Non potest enim in summo gulæ hære uox, quum ex stomacho non prodeat, sed in faucibus hæsit, iam per arteriam eiusq; summum progressa.

Vocæ autem aliqui exercitiōrū magistrī eiusmodi affectionem musculorū in quibus consistit lassitudinem inflāmatam.] Exercitiōrū magistrōs appellauit ὁ γυμνασιάρχης, qui puerorū corpora exercebant, non solum in lucta & palaestra, sed etiam in Musica ac canu. His enim artibus ingenui pueri instituebantur ac exercebant, insuperq; in literis, uelut tradidit Plutarchus, & in Thrafsybulο Galenus, quamvis lib. 1 γυμνασίου magis ad prædrombā spectare puerorū exercitationē tradat, utpote qui sit gymnasiæ minister, uelut cocus medici. Est enim gymnasiæ proprie qui exercitiōrū omnium uim doctus, & rationem & modū eorum singulis apte præscribit. Quare non solū gymnasiæ, sed etiam γυμνασιῶν, id est, nutriendæ sanitatis magistrī, & medici nomine eum dignatur. Prædromba uero omnes palæstræ actiones nouit quidē, sed quid efficere ualeant ignorat. Quemadmodū cocus be tam aut lenticulā aut puīanā, alias aliter præparat, neq; tamen quam uim habeat nouit

nouit, neq; quæ potior præparatio existit. Medicus uero quanquam fortasse nihil eorum similiter ut cocus præparare queat, omnium tamen præparatorum uisum nouit. Illi itaq; exercitiorum magistri affectionē musculorum ex uehementi clamore & uocis exercitio obortam, lassitudinem inflammatā, id est *κρίσις φλεγμονώδης* uocare solebant, similemq; esse affectionem dicebant cum ea quæ in manibus, cruribus, lumbisq; ac spina contingit, ubi etiam, hæ partes nōnium fuerint exercitate. At uero non solum lassitudinem inflammatā, sed etiam lassitudinem tensiuam, id est *κρίσις τενώδης* incidere dicit Galenus, maxime circa mūculos ipsū sum asperæ arteriæ summum mouentes, sed horum uerborum sententia in græco corrupta est, quam ex Aetij libri octauī cap. 51 restituiimus in hunc modum. *ἡ δὲ τῶν λάρυγγα, πῶς τῇ πληγῇ τῶν τε, καὶ τῇ λανούτωρ αὐτῶν μὲν βλάβη ἐξ ἐργασίας, καὶ τῆς ἀπὸ τοῦ ἀσθενεῖς ἐργασίας.* Vetus tamen interpretes uidetur paulo aliter legisse, hoc modo. *ἡ δὲ τῶν λάρυγγα, πῶς τῇ πληγῇ τῶν τε, καὶ τῶν μὲν φλέγγα, καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ ἀσθενεῖς ἐργασίας.* Cæterum quomodo *κρίσις τενώδης* & *κρίσις φλεγμονώδης* differant, Galenus libro 3 *ὕγιανόν* abunde ostendit, & Paulus lib. 1 cap. 10 de clarat, his uerbis. *ἡ τενώδης κρίσις περιήκειται πρὸς αὐτὴν ἐν καὶ ἄλλων λόγων ἐν καὶ τῇ σάμασι, ὅτι ἀσθενεῖς, ἡ δὲ οὗ μὲν τε καὶ τῇ τῶν ἀσθενεῖς ἐργασίας, καὶ ἡ τῶν ἀσθενεῖς ἀσθενεῖς. ὁ δὲ φλεγμονώδης καὶ ὅτι ἀσθενεῖς πλεονεξία ἢ φλεγμονώδης ἀσθενεῖς τῇ μολοῦ, ἀσθενεῖς συμπτῶσι πρὸς αὐτὴν, ὅταν ἐκφύμασθῃται ἰκανῶς, ἀσθενεῖς ἀσθενεῖς τῇ πρὸς κεχυμένην ἰσχυρὴν περιήκειται.* Quibus uerbis indicat, lassitudinem tensiuam in dicare, nullum memorabile recrementū corporibus insidere, sed iuxta mūculos ac nēuos affectionem quampiam fieri, in qua tendi sibi uidentur. Lassitudinē autem inflammatam esse, in qua partes uelut contuse aut inflammatae sentiuntur, quod tunc maxime contingere solet, quum plurimum excalesciat, ex recrementis quippiam atraxerint, quæ ipsis alias sunt circumfusa. Sed in uulgato Pauli exemplari *τῶν τε* pro *τῶν τε* legitur, & *ἐκφύμασθῃται* pro *ἐκφύμασθῃται*. Porro phonascos hanc affectionem frequenter incurrere subdit. & quomodo sibi imedeantur annectit. Phonasci autem dicuntur qui uocis exercitio magno utuntur, quales sunt, uelut ipse recenset, citharœdi, præcones, tragœdi & comœdi. Plinius uocis studiosos, & uocem sub certamine exercentes *φωνασκοὺς* dixit.

Per totum hoc tempus cibis utentes qui ex lacte, amylo, alica, ouis, & dulciarijs libis componuntur. Dulciaria liba dixi, *τὴν ἰσπίαν* græcis appellata, exponit autem *πικρὰ καὶ τραγὰνα*, hoc est placētulas & bellarta, quidam etiam *ἀπὸ σισάμου καὶ μέλιτος γράμματα* addit, hoc est esse placenulas ex sesamo & melle paratas, quæ non ex his solum parari solita fuisse *τὴν ἰσπίαν*, uel ex hoc constat, q̃ Dioscorides libro quarto papauer erraticum in mellita & dulciaria, *ἰσπίαν* uidelicet, addi scribat. Quare ego omnia liborum genera ex melle siue zaccharo præparata, in quæ & nuces pineæ ac amygdalæ adduntur, itemq; semina aliqua siue cucumeris siue cucurbitæ, siue papaueris aut sesami, *ἰσπίαν* appellatione uenireputo. Nam talia omnia in rem præsentē commoda existunt. Appellantur autem hodie talia liba seu dulciani panes, corrupta ex massa panis uoce, marzepanes, maxime quum prædictæ res cum zaccharo, & non cum melle, in formam panis coactæ torrētur, à qua præparatione cum friabiles fiant ipsi panes, *ἰσπίαν* etiam græcis appellata esse eadem quæ *ἰσπίαν*, Galenus in glossis Hippocraticis tradit, nimirum *ἀπὸ τῆς ἰσπίαν*, id est ab eo quod friabilia & *φύμασθῃται*, ut ipse ait, reddantur, à quo uerbo etiam *ἰσπίαν* deriuatum dicit, de quo alibi mentionem feci. At uero Galenus duplicem *ἰσπίαν* speciem 1 de aliment. facit, alteramq; *φύμασθῃται* uocari & præstantiorem esse, utpote cum melle præparatam, dicit alteram uero *λαγύαν* appellatam, deteriorem esse, crassiq; succi ac tarde cōmeantis, nimirum ex

tingere possit, ut putet quis theracum creticum esse repetitum: sed ut id ne accidat, per hoc satis commonemur, quod therinum inter duo asiana medium collocauit, inter caryinum uidelicet & imolites, quanquam etiam ex loco iam citato ex lib. *αἰθὴ διχυρίαις καὶ καρυχαμίαις* palam est *θεραῖον* debere legi. Nam sic isthic aperte habetur, & de theræo cretico paulo ante etiam isthic una cum scybelite egit. At uero scybelites uinum Actius esse tradit, quod sua sponte ex passis uinis distillat, ut pore uinum ulno effundentibus uinis, cap. 24. Porro quando in uinorum mentionem incidimus, quorum utilitas tum in iam citato libello, tum XII methodi, à Galeno proditur, obiter etiā de cæcubo locum isthic traditū explicabimus, quando sanè præter id quod uulgo credi possit, & plerisq; omnibus putatur, de cæcubo uino, eiusq; appellatione prodit. Nimirū q̃ non à loco aliquo sit hæc appellationem sortitū, sed ab ætate, situq; ac cubitione, sic em̃ ait. *ἀναμείζοντες δὲ φαίνεται τὸν οἶνον παλαιωθέντα καίριον, ὃν οὐκ εἰς τὴν γυναικίαντες δὲ ὑπὸ τὸν ἥλιον ἔσται.* & paulo inferius, *ὡς δὲ τὸ οἶνον ὁ παλαιωθέντος, ὃν ἔσται ὑπὸ τὸν ἥλιον ἀναμείζοντες δὲ φαίνεται καίριον, ὃν οὐκ εἰς τὴν γυναικίαντες δὲ ὑπὸ τὸν ἥλιον ἔσται.* Vult itaque Rhomanis cæcubum uinum omne dici quod diu cubuit, ita ut cæ extensiva sit particula, quemadmodum etiam est in uerbo castigo, ex ea & stigo composito. Sed hoc longe apertius XII meth. declarat his uerbis. *ὅσοι δὲ τὸν οἶνον παλαιωθέντα, φαίνεται καίριον οἶνον, ὑπὸ τὸν ἥλιον καίριον, ὃν οὐκ εἰς τὴν γυναικίαντες δὲ ὑπὸ τὸν ἥλιον ἔσται.* & paulo inferius, *ὡς δὲ τὸ οἶνον ὁ παλαιωθέντος, ὃν ἔσται ὑπὸ τὸν ἥλιον ἀναμείζοντες δὲ φαίνεται καίριον, ὃν οὐκ εἰς τὴν γυναικίαντες δὲ ὑπὸ τὸν ἥλιον ἔσται.* Ex his locis apertissime apparet, cæcubum uinum omne inueteratum, à longa cubitione dici, Galenum prodere, quod tamen haud scio an quisquam ex latinis tradiderit, ut sit ea eius appellationis etymologia. Plinius de cimo quarto, capite sexto, Diuum Augustum setinum uinum cunctis prætulisse dicit, uerum antea cæcubo, inquit, erat generositas celeberrima, in palustribus populetis, sinu Amyclano, quod iam intercidit, & incuria coloni, lociq; angustia, magis tamen fossa Neronis, quam à Basano lacu Ostiam usque nauigabilem inchoauerat. Ostendit itaque palam Plinius, cæcubum à loco & agro cæcubo appellatū esse, de quo libro secundo, capite nonagesimo tertio, sic ait. Similiter in Reatino quædam insula semper fluitant, sicut in agro cæcubo. & libro tertio, capite quinto. Hinc felix, inquit, illa Campania est, Ab hoc sinu incipiunt uisiteri colles, & temulentia nobilis, succo per omnes terras inclyto, atque ut ueteres dixerunt, summum Liberi patris cum Cerere certamen. Hinc setini & cæcubi obtenduntur agri &c. Verum paulo ante hunc locum ait. Ibi fuere Amyclæ à serpentibus deletæ, deinde lacus fundanus. ad quod respexit, quum dixit libro decimo quarto, capite sexto, in palustribus populetis sinu Amyclano fuisse nasci. Sed hoc ipsum etiam Martialis poeta ostendit in Xenijs. Cæcubum.

Cæcuba Fundanis generosa coquuntur Amyclis,

Vitis & in media nata palude uiret.

Ex his omnibus locis apparet cæcubum uinum à loco & agro dici, ut neq; suspicio aliqua esse possit de eo etymo quod Galenus huic appellationi adscribit. Nisi quis ex eo Plinij loco lib. 23 cap. 1 ubi ait. Cæcubum tam nō gignitur, suspicari uelit, si iam nō gignitur, ergo uel factitū est, uel aliunde est appellatio eius quod cæcubum dicitur. Sed tamen ut ne quis etiā id suspicetur, nō addit Plin. de eius uiribus ac facultate quicq̃, tanquam qui non gignitur non quod natiū amplius non sit dixerit, sed quod in totum perierit, ut de eo frustra quis uerba faciat. At uero quando post Plin. & Martiale uixit Galenus, & cæcuba uina nouit, de eorumq;

uirsibus tradit, certū est eam appellationem, uelut ipse tradit, à uero excubo abq̃
lino, translatam postea fuisse ad omnia uina inuesterata, nouumq̃ nominis ery-
mon, uelut dixi excogitatum, de quo neminem apud Latinos mentionem facere
scio, quanquam nihil adeo bonorum scriptorum à Galeni seculo nobis extet.

Sorbisio item ex lacte & melle diutius coctis, amylo iniecto, & si amyllum nō
adfit, siligine Romanis appellata iniecta. Siliginem pro amylo in sorbitionem
ex lacte & melle addi posse Galenus ait, siliginisq̃ uocem Romanam esse addit,
qua usus esse græcæ eius rei significantis penuria uidetur, uelut libro primo de ali-
menti testatur, ubi purissimum esse siligineum panem, & ab eo similaginem tra-
dit, sed tamen silignitem, id est siligineum, se non græce appellare inquit, uerū pro-
pterea id facere copactum esse, quod non habeat quomodo aliter appelleret, sed ad-
scribam ipsa uerba. ο μὲν κριθῶντες & αἴψης ὀνομαζέσθαι σιγνίτης. ἢ δὲ ἰσχυρὸν αἰψὸν
σιμολαλίτης. ἀλλ' ἢ μὲν σιμολαλίη ἐκ κριθῶν τε καὶ παλαιῶν ὀνομαζέσθαι σιγνίτης δὲ σιγνίτης
καὶ μὲν, ἢ τῆς αἰψῆς ἢ αἰψῶν ὀνομαζέσθαι σιγνίτης. προσημαζέσθαι μὲν αὖτὶς σιγνίτης αἰψῆς, ἢ
αἰψῆς δὲ σιμολαλίτης, καὶ τριτὸν ὀμῆς τε καὶ συλλαμῆς ἢ καὶ αὐτοπυρῆς, ἢ δὲ ἢ τῆς
σῆς δὲ, ἢ τῆς συλλαμῆς αἰψῆς, ἢ ἢ καὶ ὀπυρῆς, ἢ δὲ καὶ αὐτοπυρῆς αἰψῆς. His
uerbis quinq̃ genera panis ex tritico recenset, quorum omnium purissimus est
siligineus, utpote ex siligine purissima tritici farina constans. Secundo autem lo-
co similagineum, semidalitem græcis dictum ponit, ex similagine paratum tritici
farina non adeo absolute pura: cui tertius succedit autopyrus, cui nihil furfurū
rum decessit, sed ex toto tritico constat, unde etiam appellationem duxit. Sequit̃
tur deinde quarto loco sordidus, magna ex parte ex furfure constans: hinc poi-
stremus omnium furfuraceus totus. Est itaque siligo Romana uox græcis usum
pata, qua purissima tritici farina significatur, quam hoc loco amyli uice usurpari
posse dixit. Fit autem etiam ipsum amyllum ex tritico, sed sine mola, unde etiā no-
men habet, modo à Dioscoride libro secundo, & Plinio decimo octauo, capite se-
ptimo ostenso, qui etiam hodie ubique gentium nouissimus existit. Imò non so-
lum purissima tritici farina siliginis nomine accipienda est, sed etiam ipsum opti-
mum ac purissimum triticum siligo appellatur, ex qua adeo Marcus Cato *de
mylum facere* docuit. Amyllum enim inquit Plinius, ex omni tritico ac siligi-
ne, sed optimum ex trimestri. & idem capite octauo eiusdem libri, siliginem pro-
pe dixerim tritici delicatam. & rursus capite decimo sequenti. Siligo nunquam
maurescit pariter, nec ulla segetum minus dilationem patitur propter teneri-
tatem. Sed capite nono eiusdem libri cum ait: Et siligine laudatissima panis, pi-
strinarumq̃ opera laudatissima: siligo tum pro optimo tritico, tum pro optimi
tritici farina accipi potest. In summa itaq̃ optimum triticum est siligo, eiusq̃ fari-
na etiam siligo appellatur: sed quod penultimè ex ea depuratum est flos latinis
dicitur. Ex tritico uero communi farina, similago, & græcis semidalis dicitur, &
purissimū ex ipsa pollen appellatur: quod ipsum Plinius manifestis uerbis capi-
te decimo iam citati libri docet sic inquisens. Similago ex tritico fit laudatissima.
Ex Africo iustum est è modijs redire semodios & pollinis sextarios quinque. Ita
enim appellant in tritico quod florem in siligine. Quare palam uidere est quā
hæc uox siliginis hodie à uera significatione sit deuorta, quando ea frumenti spe-
cies quæ typha & olyra quondam dicta fuit, hodie uulgo siligo appellatur.

In caput secundum de arteriacis ab Androma-
cho conscriptis.

Arteriaca dia codion ex capitib. papaueris. In hac arteriaca *μείλις ἐκ κώχου*
A. in græco exēpl. hoc est atticū mellis cōgios IIII habet, sed uetus interp. li-
bras. IIII legit et uerū, ut fortassis, p. χ. d. legēdū sit λ. A. q. error facillime ob simili-
tudinem

nudinem characterū potuit cōmitti, quare etiam ego libras IIII reddidi, cum IIII congiorū mēſūra sextarios XXIII cōplectēs, nimia ſit reliquorū cōparatione. Quātam autem copiam mellis eſſe oportear in talibus medicamentis Galenus infra tradit, ubi etiam varias huius pharmaci dia codion à papaueris capitibus ſive calicibus appellat, deſcriptiones recenſet.

Tertiam deinceps confectionem arteriacam Andromachus hanc prodidit. In hac arteriaca fecis ungēti malabathrini drach. vi uerri, ſed in græco exemplari *μάγματι μαλαβάθρι* pro *μάγματι & μαλαβάθρι* habetur, quāq; etiam *μαλαβάθρι* pro *μαλαβάθρι* dictū eſſe poſſit, ſicut *καρδίον* pro *καρδίον* dictum alibi oſtēdit. Magma autem fecem ungenti ſignificare, etiam Plinius teſtatur. Malabathrinū uero fecē hoc loco cōferre, ex eo quod uim ſoporiferā habet uelut crocinū & amaracinum, ſatis manifeſtum puto. Ad ſinem porrō huius arteriacæ habetur. opium & caſtorii in forti fluxione ipſi ammiſceri, ſed in hiſ qui ſtomacho male affecti ſunt, ea ipſa uitamus: pro quibus poſtremis uerbis in græco habetur, *ὅτι τὸ καστορέιον αὐτῷ τῷ φαρμάκῳ*, quæ uerba cum ſint palam corrupta, pro eiſ ſic lego. *ὅτι δὲ τὸ καστορέιον αὐτῷ φυλαττέμεθα*, uel *αὐτῷ τηρούμεθα*, & eueniet ſenſus quem ego reddidi. Similiter autem & conſequenter *ὅτι αὐτὸ τὸ χύσινος ἐγχεῖται* legitur, pro *ὅτι αὐτὸ τὸ χύσινος ἐγχεῖται*, ſed talia ut manifeſtaria uita illibentillime adſcribo, quum ex conuerſionis collatione ſiant ſatis conſpicua.

Quintam ex ordine compoſitionem Andtomachus talem prodidit. In hac quinta arteriaca quod dixi, crocum autem & myrrham in compoſitiones dolo-rem leuantes miſcere pluribus placuit in græco legitur, *κρίκος ἢ μυρρίαν ἢ ὀπίον ἢ τὸ πικρὸν ἀνδριανῶς πικρὸν πικρὸν πικρὸν*. Manifeſto itaque errore *ἢ ὀπίον* pro *καὶ σμύρνης* expreſſum eſt, quum opium ipſum & nihil aliud, hoc pharmacum *ἀνδριανῶς* reddat, crocus uero & myrrha ei addita, affectiones cōcoquant. Eſt porrō & ſextima ſequens arteriaca aliquot locis corrupta, quam ex noſtra uerſione emendabis: præſertim ubi *καρδίον* ſic pro *καρδίον* habetur, & *ἀνδριανῶς* pro *ἀνδριανῶς* expreſſum eſt. Videtur autem picatam ollam ad radicem ſilicis cocturā probare, ſi modo non deeſt particula *αὐτῷ* ante *ἀνδριανῶς* inferenda, ut uacuulum ſive ollam non picatā accipiamus: de utriſque autem alibi à me dictum eſt, ſed & quod dixi, radices ſilicis per diem unam perfrigerantur, in græco eſt, *ψύχονται ἑνὴν ἡμέραν*. Eſt autem hic mos græcis medicis maxime, ut horam pro die uſurpēt, uelut etiam alibi indicaui. Sed hoc ipſum etiam inferius ex Aſclepiadæ arteriacis perſpicuum ſit, ubi eadem ex ſilice arteriaca repetitur, & *ψύχονται ἑνὴν ἡμέραν* legitur. Quin & in ſequenti octaua arteriaca, *ἀνδριανῶς* pro *καρδίον* legendum eſt, ſed *καρδίον* nimis exiguum pondus, expreſſum habetur.

Nonam arteriacen poſt has Andromachus hiſ uerbis tradidit. Arteriace Marini. Marinus quem hic Andromachus citat, huius arteriacæ autorem, ſi eſt ſemibī uiderur, qui in Hippocratis libros commentarios ſcripſit, cuius in commentarijs in aphoriſmos Hippocratis Galenus ſæpe mentionem facit, & libro ſecundo, de ſemine in fine: peruenit autem uſque ad ætatem Traiani, quam fortalliſ etiam ipſe Andromachus arigit. Nam pater eiſ ſub Nerone uiuit, eiſq; archiatruſ fuit, ut Galenus de antidotis tradit. Meminit autē Marini ut medicū ſui Plinius decimo libro epiſt. ad Traianum hiſ uerbis. Proxima infirmitas mea domine obligauit me Poſthumio Marino medico, cui parem gratiam reſerre be-neficiū tuo poſſum, ſi precibus meiſ ex cōſuetudine bonitatis tue indulgeris &c. Cæterū in hac arteriaca theriūm uinum creticū, hoc eſt *θηρίον τὸν κρητικόν* habet, quem fortalliſ declarādī gratia ſic depinxit, ne quiſ therion, id eſt *θηρίον* alianum

asianum pro eo accipiat, de quo quale esset paulo superius memini.

Tertiā decimā arteriacā Andromachus his uerbis tradidit.] Ad finem huius confectiois Galenus adiecit. Recte fecit & hic quod tum ea quæ promittit hoc pharmacum, tum quomodo præparetur adscripsit: quæ uerba in græco sicut
 γὰρ ἐπιτίθει καὶ τούτων τῶν ὑπερχαλίων καὶ τῶν συνήθων ἐπὶ αὐτῶν. Pro τούτων
 itaque legendum est τούτων, & pro συνήθων reponendum σκελεσίων.

Decima quarta arteriaca est de qua sic prodit.] In hac arteriaca conuerti, habet uim secandi & attenuandi ac calfaciendi ex multis pharmacis, sed in græco est, ἡ δὲ τριπτικὴ καὶ λιπτικὴ καὶ θερμὰ πικρὰ φαρμάκων. Pro καὶ θερμὰ igitur legendum est aut καὶ θερμαντικὴν ἢ uelut ego reddidi, aut καὶ ἐν θερμότητι ut sit sententia. Habet uim secandi & attenuandi iuxta caliditatem multorum pharmacorum.

Decima sexta ex ordine sic scripta est.] In hoc pharmaco aristolochia dactylitis habetur, quæ eadem est cum lōga, quæ & mascula appellatur, respectu rotundæ, quæ foemina: legitur tamen in græco δακτυλιδῶ pro δακτυλιδῶ. Cæterum post enumerationem eorum quæ in hoc pharmacum recipiuntur, ubi de præparatione subiungit, etiam χίονα exprimit cum reliquis cōiundendum & in uino macerandum. Verum χίονα in enumeratione penitus non meminit, neque pondus eius absentis expressum est, ut aut in prima enumeratione χίονα desit, aut in præparatione superflue adiectus sit. De quo admonendum duxi, ut si quis pharmacum præparaturus sit, secum expēdat an pro affectionis subiectæ ratione, ammiscere χίονα præster, an non: & si omnino ammiscendum putauerit, uelut per incuriam exscribentis elapsum, cassiæ & nardi celticæ pondus adiiciens nihil peccarit. Vis autem χίονα in superioribus sæpe declarata est. Sed & in præcedenti decimaquarta arteriaca, floris χίονα, id est iunci rotundi odoratus usus fuit. Nos porro cum in totum reliquimus, nulli præiudicantes tamen qui cum ammiscere uelit.

Decima septima cōfectio talis ab eo traditur, arteriaca alia ut Heraclides Tarentinus.] In græco exemplari nō ut Heraclides Tarentinus, sed & Eudides Palantinus, id est ὡς Εὐκλείδης ἢ Πаланτιῶ legitur, haud scio an non falso, quando alias nusquam hic Euclides Palantinus in his libris citetur, ab ullo aliquo eorum quorū scripta Galenus adducit. Sæpe numero autem Heraclidæ scripta tum Galenus protulit, tum alij quos Galenus transcribit, uelut hic Andromachus, et in præcedenti libro ad aphthas Crito, ut omnino putem Heraclidem Tarentinum pro Euclide Palantino mihi ignotissimo legendum, donec certius de ipso constiterit. Interim tamen utraq; lectio sine periculo tolerari potest.

Edegya faustianū appellatum. Vini falerni sextarium unum &c.] Hoc edegma faustianum à uino falerno faustiano uidetur appellatum, ex eo enim solo & melle attico constat. Cæterum falernum duplex esse, & alterum suauius proprie faustianum appellari, Galenus libro primo de antidotis tradit. His uerbis. Δυσὶν δὲ ὄντων εἰς αὐτὸ καὶ τὴν ἀλλήλων διαφέροντων ἀρετῶν, ἡ δὲ πλεονεξία τοῦ ἀπιδότου ἢ γὰρ ἡντιοῦ ἐκ γαλζῆται, καὶ καλεῖται αὐτὴν ἰδίως φαιστιανήν. Sed & Plinius libro decimo quarto, capite sexto. Secunda nobilitas inquit, falerno agro erat, & ex eo maxime faustiano, & paulo post subdit. Tria eius genera, austerum, dulce, tenue. Quidam ita distinguunt, summis collibus Gauranum gigni, medijs faustianum, imis falernum.

Confectio ex capitibus papaueris Hera.] Hanc dia codyon cōfectionis ex papaueris capitibus descriptionem, iuxta Hera præscriptum etiam Plinius lib. 10 cap. 19 recenset: ubi de papauere syluestri loquens, sic ait. Medicamentum quoddam dia codion,

Dia codion & arteriace vocatur, utilissimum. Fit autem huius papaueris aut cuiusq; syluestris capitibus CXX in aquæ cœlestis sextarijs tribus biduo maceratis, in eademq; decoctis, deinde saccatís, iterumq; cum melle decoctis ad dimidias partes uapore tenui. Addidere postea drachmas senas croci, hypocisthidis, thuris, acaciae, & passi cretici sextarium. Hæc ostentatione, simplex quidem & anti qua illa salubritas, papauere & melle constat. Hæc uerba Plinij propterea adscripsi, ut ipsis cum Heræ, & aliorum descriptionibus collatis, amplius constet simpli cissimam compositionem esse optimam, quod omnes ex æquo cōsistentur: & ut Plinij lectio emēdetur, in qua in uulgaris exemplaribus, dia codion & arteriace, pro dia codion & arteriace legitur: & dein siccatis, pro, deinde saccatís, habetur. Dixit autem Plinius saccatís pro excolatis, hoc est per saccum siue colum trans missis, de qua re lib. 1 à nobis dictum est. Vtitur eodem uerbo Plinius 29 cap. 2 de sordibus pecudum præparandis, quæ pinguitudo utraq; inquit, frigida aqua la uatur, ac linteo saccatur ac sole torretur, atq; hanc lectionem uetus exemplar ma nuscriptum habet, cuius alibi quoq; mentionem feci. In uulgaris uero, & in linteo siccatur, habetur. Sed & pondera rerum, quæ uariam faciunt hanc cōfectionem in Plinio nimis aucta sunt, ad tantillum capitum numerum, & aque sextariorum trium mensuram. Heras enim singulorum drachmam unam tantum habet. Plinius uero drachmas senas, ut fortassis per negligentiam, harum rerum pondera ex Cri tonis cōfectione hanc præcedente huc transsumpserit: in ea enim sextarij aquæ LXXX ad tertias coctæ, cum X libris mellis habentur, quibus sanè harum rerum pondus partim XII drachmarum, partim VI indendum (idem Crito adscripsit. Neq; uero dubium esse debet, quin ex iisdem autoribus unde Galenus, aut certe illis unde hi quos Gal. citat, sua acceperunt Plin. etiam sua sumpserit. Porro ad finem cōfectionis Heræ habet, ipsaq; cum modico passo terunt, atq; ita indunt ac simul coquunt, quod in græco sic legitur. καὶ λαοτριβόντων τὴν σὺν ὀλίγῳ γλυκῆ καὶ ὑπερπρόσσει καὶ σικκίνῳ. Significat enim ὑπερπρόσσει insuper indunt, ἱεροσσε enim euacuare, & μεταρῶσαι transeuacuare est, & λαοτριβῶσαι deopplere, hoc est ex uno uase in aliud transferre est, quorum uerborum frequens usus, apud Gale num atq; omnes græcos medicos occurrit.

Confectio ex capitibus papaueris Damocratis. Hi Damocratis uersus iam bici, sunt quidem corrupti, sed ita ut etiam à literatoribus serè, magna ex parte emendari possint, præsertim nostra adhibita translatione, quapropter eam transla liemus, de hoc saltem admonentes, quod septimus à fine uersus sic nobis legen dus uidetur. πικρὴν ὀνιχοειδέα καὶ τὸ λευκὸν ποικίλον. Puto autem nihil aliud quàm succum Rhois ab ipso indicari, de quo in superioribus ad plenum disserui. Eupa toricam uero & ponticam Rhoem maxime probat, sicut supra Syriacā Galenus laudauit, quanquā Eupatoricæ & ponticæ Rhois, neq; Diosc. neq; Galenus usq; quod sciam, meminerunt. Vltimum deinde uersum hoc modo restituendum exi stimo. συνιέμεν ἀπὸ τῶν ἑνὸς καὶ ὀλίγου, uelut etiam conuerit.

Brassicæ uiridis cauliculos depuratos manducandos præbe. De brassica quæ λεωμῆς græcis dicitur, tum apud græcos, tum latinos autores multa produntur. Verum quod succus eius cauliculorum ad uocem interceptā commodet, ob uim ipsius resiccatoriam & extersoriam euenire uerissimile est, per quas citra acrimo niam fluores extergentur, ut sit ex medio ordine arteriacorum pharmacorum, su præ in principio huius septimi libri à Galeno relatorum, censenda. Dioscorides ta men idem de folijs manducatis prodit, quod Asclepiades hic ex Musæ præscri pto de cauliculis tradit. καὶ ἡ ἀγρία, inquit, ἡμασσοειδὴ φωνὴ ἀπὸ τῶν λεωμῆς, καὶ ἡ λεωμῆς κατὰ πικρὸν. Cæterum brassica nihil aliud est, quàm uulgare illud olus,

quod caules appellamus, atq; hoc uel ex Martiali poeta discere licet, qui Xenio-
rum libro, eos caules per nitratam aquam uirides conseruari ait, quanquā Pallā-
dus lib. 3 cap. 24 non nitratam aquam, sed ipsum nitrum tritum cribellatū defu-
per spargi iubeat, dum caulis est trium uel quatuor foliorum, inde enim celerius
coquitur, ait, uisrore seruato. Meminit & Columella π cap. 3 & Cōstantinus Cæ-
sar lib. 12 cap. 17 & Plinius 19 cap. 8 quanquā loco ab ipso non intellecto, aut cer-
te postea corrupto, quod ex græcis uerbis à Cōstantino citatis ē ueteri quopiam
scriptore, Didymo fortassis, apparet, quæ Plinius uidetur exprimere uoluisse. Plī-
nij uerba sunt hæc. Sunt qui semen trifolij nitrumq; simul tritum aspergāt folijs,
nitrum etiam in coquendo uiriditatem custo dīt. Constantini uerba habent hoc
modo. *αἰσθηταὶ γὰρ ἐπὶ τῷ λεράμῳ τὸ ἐλμυρὸν τῶν ἀνθρώπων πρὸς αὐτὸν, διὰ τὴν τριφύλλου
τῶν τριφύλλων, ὡς τὸν λεῖον ἢ ἐλμυρὸν αὐτὸν γὰρ ἐστὶν ὡς κροκίον καὶ ποικίλων πικρῶν ὡς δὲ αὐτὸν
ὡς τὸν πεπρωμένον. τῶν γὰρ τῶν τριφύλλων καὶ ἐλμυρὸν αὐτὸν γίνονται.* Plinius itaq; trifolij se-
men habet, pro τριφύλλου λεράμῳ γρομῳ, id est brassica trium foliorū, ueluti recte
Palladius reddidit iudē ex græcis ut apparet. At uero Martia. sic habet. Coliculi:

Netibi pallentes moueant fastidia caules,

Nitrata uiridis brassica fiat aqua.

At uero hanc brassicam, id est λεράμῳ, à ueteribus fuisse item *ῥαφανον* dictam,
Aristot. 5 de animal. hist. testatur, ubi de brassicarum crucis ait. *αἱ δὲ γίνονται καὶ
τῶν φύλων τῶν χλωρῶν, καὶ μέλαινα ὡς ἡ ῥαφανὴς, ἢ καλεῖται τῶν λεράμῳ. & sic fane*
etiam Theophrastus uocat, atq; inde natus error uidetur eorum, qui cramben &
brassicam, raphanum hodiernū esse existimāt, equiuoco raphani decepti, qui
ueteribus etiam de brassica, ut dixi, hodie de ea tantum quam radicem & radicu-
lam appellamus usurpatur, uelut etiā Gal. 2 de aliment. testatur. Plinius certe lib.
17 cap. 24 sine raphanū ex Theophrasto ut apparet, itidem raphanum reddi-
dit, quam brassicam oportuit, uelut ex eodem, lib. 20 cap. 9 manifestum sit, ubi de
brassica idem repetit. Et ex Constant. Cæsare lib. 12 cap. 17 & lib. 7 cap. 31 Itē cap.
29 & 33 eiusdem lib. 7 quibus duobus locis non λεράμῳ sed *ῥαφανον* habet, à no-
bis brassicam redditam, cum nuper id opus latine à nobis cōscriptum ederemus.
Porro à raphani fracturæ similitudinē, per transuersum uidelicet, fracturæ ossis
consimilis modus *ῥαφανοειδῶν* fieri dicitur, id est raphani modo; sicut ubi secun-
dum longitudinem fractura sit, *γυμνοειδῶν* fieri dicitur, id est fissim aut assulose,
uelut Plinius de calamo lib. 12 cap. 12 ait, meliorē q̃ minus fragilis, & qui assulor
se potius quā raphani modo frāgitur. Quod propterea indicare uisum est lo-
cō ita serente, quo locus apud Galenū 8. methodi 2 studiosis emendetur, ubi *ῥα-
φανοειδῶν* os fractum à recentioribus medicis appellari legitur, quod uarie & mul-
tiformiter contritum sit, improbātq; Galenus tales nominum effictiones, à quib;
Hippocrates abhorruerit, qui consuetis uocabulis rem declarare satius esse
duxerit, aut etiā orationē integra circumloqui ac interpretari. At uero *ῥαφανον*
αὐτὸ eo loco minime est legendum. Est enim *ῥαφανοειδῶν* facta fractura, non multis
formis ac uariā, sed per transuersum ut dixi, atq; eadem quæ *καυλαίῳ* facta dici-
tur, quam etiam eodem loco Galenus recensuit. Quare pro *ῥαφανοειδῶν* omnino
substituendum est ac legendum *ἐλασμοειδῶν*, id est ad potentæ speciem. Sic enim
recentiores eius tēporis medici uocabula studiose excogitabant, ut id quod mul-
tiformiter fractum ac contritum esset, *ἐλασμοειδῶν* κατὰ γένος appellarent. Sic au-
tem uerba Galeni legi debent *ὅτι αἱ δὲ τῶν καυλαίων ἰατρῶν ἀπὸ τοῦτο ἐλασμοειδῶν
πικρῶν τῶν κατὰ γένος τῶν ἐλασμοειδῶν ἰδιῶς ὀνόμασιν ἐκλεβάνθη, ὡς καὶ ἐλασμοειδῶν τὸ αὐ-
τῶν γένος, οὐκ ἀπὸ τοῦτο τῶν λόγων διακρίσσει τὸ πλεονεκτῶν ὡς σωματικῶν ὀρίων ὡς αὐτῶν.* id est,
Quidam ex recentioribus medicis usq; adeo cōtendunt omnes fracturā differ-

rentias

[illegible]

Alia arteriaca Charixenis, facit ad sonum uocis fractum, defillationes (in artem
riam, uocem interceptam & raucosam, ad interceptiones uocis ex distentione.)
Sonum uocis fractum dixi, quem, ἄρεν γράκι uocāt, Sed Actius ferē ἄρεν ἢ φωνή
ἄρεν, dicere solet. Defillationem autem in arteriam conuerti ἀρεν, qui
& Raucedo dici potest, ita ut defillatio sit causa, Raucedo uero ipsum πῆθος.
Verū interceptiones uocis ex distentione dixi, πῆθος ἐκ ἀσπίδων ἐκαστης, hoc est,
ab exercitio & contentione obortas: quanquam ἀσπίδων falsò pro ἀσπίδων in
exemplari græco legatur.

Alia hypoglossis Dioscoridaz.) In hac arteriaca nuce pineae confusae numero sexaginta leguntur, sed in graeco tamē *hexaptychia* pro *hexaptychia* id est confusae habetur, nisi *hexaptychia* potius legere uelis, aut ea ipsa per *hexaptychia* accipere. Totae enim nuce pineae etiam in sequentibus frequenter habentur.

Alia Scribonij Largi hypoglossis. Hæc hypoglossis est apud Scriboniū Lar-
gum latine inuulgatum, titulo siue capite aut compositione ex ordine LXXV. &
non deest, uelut Ruellius medicus Galliarum celeberrimus, qui eum librum Scri-
bonij inuulgauit, existimauit: & hanc compositionem ex hoc Galeni loco eouer-
sam, pro compositione Scribonij LXXII. restituendam prodidit. Neq; enim ulla
aliqua compositio illo Scribonij loco deest, sed quod in fine ab ipso dicitur: Com-
posito autem hæc est, ad sequentem LXXIII. pertinet. aut legendum potius ue-
lut Marcellus ex eo transcripsit, composita autem hæc ad tumorem arteriæ maxi-
me profunt, papaneris syluatici, &c. Quare temere isthic inferatur, quæ compo-
sitione LXXV. rursus repetitur, plane eadem quæ hic ab Asclepiade describitur,
sed pluribus uerbis, & ponderibus aliquotulum uariantibus, quod unum excri-
bentium putandum est. Itaq; conferēdi gratia (ipsum Scribonij locum totū adscri-
bam): Arteriacæ qua melior non est, refertur autem ab Asclepiade nostro, facit ad
omnia superius dicta efficacius, & quicquid in arteria uitij est. Cōstat ex his, myr-
rhæ optimæ pinguis. * . P. XXIII. Tragacanthi cōdidi. * . P. XXVIII. glycyrrhizæ
radicis. * . P. XVIII. resinæ terebinthiæ ueræ. * . P. XVIII. Tragacanthum sic

est contundere, & per cribrū tenuibus foraminibus ejicere oportet: deinde myrrham tritam seorsim admiscere, & rursus utraq; in unum diu terere, atq; ita in pilam cōjungere, & ibi cum coalescentia pili, cerebinthi nam paulatim miscere, donec omnī unitas fiat. Postea glycyrrhizam contusam & cribratam, mortarioq; nihilominus tritam sensim aspergere oportet. Vbi hæc bene mixta fuerint, dum calet medicamentum, plures accedant, & pilulas faciant magnitudinis fabæ. Fit enim durissima hæc arteriace, & hoc ipso præcedit cæteras, quia linguæ subiecta non facile soluitur, & ita diutius exhibet suum effectū. Hæc est ipsissima compositio Asclepiadæ, quam Galenus hoc loco habet, & sic refertur quoq; à Marcello cap. 14. paululum variantibus ponderibus & uerbis. Quod autem Asclepiades Scribonium citat, & Scribonius rursus Asclepiaden, indicat ipsos contemporaneos fuisse & amicos, atq; ita mutuum honorem nomenclandi præstitisse, unde etiam ab Asclepiade nostro, Scribonius dixit. Cæterū ætate longe grandior Scribonius fuit, Nam sub Claudio Cæsare floruisse, eiusq; medicum fuisse, ex cōpositione LX. palam sit, ubi ait, Nam Messalina Dei nostri Cæsaris hoc unū, & cōpositione CLXIII. Quum Britanniam peteremus inquit, cum deo nostro Cæsare. Hic autē Cæsar non alius quàm Claudius fuit, cui uxor Messalina erat, & Britanniam eundem petisse, Sueton. In uita eius scribit. Verisimile est autē eundem esse hunc Scribonium cum eo qui mathematicus apud Suetoniū in Tiberio spopondit etiam regnaturū, ut uidelicet & medicinam & mathematicā disciplinam coniunxisset, uelut Crinas Massiliē. apud Plinium 29. cap. 1. Sed nihil adfirmo. At uero Asclepiades iunior fuit. Nam in his arteriacis paulo post, Andromachi pharmacum ex filice citat, cuius pater Neronis Archiatus fuit, Galeno lib. 1. de antidotis teste. Sed & suprà lib. 8. cap. 4. Galenus duorum Asclepiadarū meminit, qui post Andromachū uixerint, & de pharmacis scripserint, de quibus etiā alio reperam aliqua loco, ut sub ipsum Vespasianorum & Domitianū imperium floruisse hunc Asclepiaden certum sit. fortassis autē iuuenis cum Scribonio senemicitiam contraxit, ut sic alter alterius nomen celebrarit, ac mutuum honorem detulerit. Porro non esse hunc Asclepiaden cum de quo Plinius 26. cap. 1. dixit, quod ætate Magni Pompei Rhetoricæ artis magister fuerit, & totā medicinam ad causam reuocauerit, palam ipsa tempora arguunt, alias possit etiā Scribonius is grammaticus putari, quem Suetonius inter illustres grammaticos recenset, ita ut ille relicta rhetorices, hic grammatices professione, sed ad medicinā contulissent. Sed neutrum uerum est, A Scribonio enim grāmatico, qui à Scribonia Augusti uxore priore redemptus & manumissus est, ad hunc Scriboniū medicum, anni ferè octo aginta intercefferunt, Et ab illo Asclepiade, qui medicinam ad causam reuocauit, ut Plin. ait, ad hunc Asclepiaden pharmacorū scriptorem, cuius scripta tam frequenter in his libris Galenus producit, anni plures quàm centum interfuerunt. Sed & illius Asclepiadæ Scribonius in præfatione libri sui meminit, ipsum de hoc excusans, quod Plin. & alij de eo prodiderunt, quod uidelicet negauerit aegris danda medicamenta. In libro inquit, qui *ἡγεμονία*, id est, præparationum inscribitur, cōtendit ultimæ fortis esse medicum, qui non ad singula quæq; uitia binas ternas uel cōpositiones & expertas protinus paratas habeat. Meminit item Galen. lib. 1. cap. 1. huius operis, eum uerustorem & Bithynū appellans. Sed quādo huius Asclepiadæ etiam hic mentionē fecimus, obiter Plinij locum de ipso scriptum emendabimus. Trahebat, inquit Plinius, præterea mentes artificiomirabili, uinū promittēdo aegris, dandōq; tempestiue, tum frigidam aquā, & quoniam causas morborū prior scrutari Herophilus instituerat, Vini rationē illustrauerat. Cleophrantus, Dolipsychros ipse cognominari se frigida danda præferens

tur atq; ita imponitur, uelut malagma quoddā, sed de his alio loco nobis dicetur.

Alia ad tussim & spiritus prolationem, ualde probe expurgans. In hac placetula primum Nasturtij uncia una, sicut reliquorum habetur: deinde ad finem, & pro nasturtio sinapi duplum conijcito, conuerti. Verum in graeco exemplari utroque loco *καρδάμουν* pro *καρδάμου* legitur, manifestario errore, sed in graecis medicis non infrequenti, quando sanè nasturtium & sinapi sint inuicem succedanea, & non sinapi ac cardamomum, uelut etiam apud Paulum in fine, in *ἀντιβαλεῖν* uidere est, quanquam etiam *ἀντὶ συνάπτειν καρδάμουν* falsò, pro *ἀντὶ συνάπτειν καρδάμου* legatur. Porro in hoc pharmaco etiam melle coctio excipito dixi, quod graecè est, *κατασφραγι μίλιτι ἀπιφθον*. Significat enim ἀπιφθον coctum, hoc est ἀπὸ φθίνου, cōpositione ex *ἀπὸ* & *φθίν* cōstante, non ex *α*. priuatiua particula & *φθίν*, uelut quidam graecorū medicorū interpretes sunt opinari, & uerterunt. Galen. 4. Meth. *ἀπὸ δὲ τῶν τριῶν, ὅς τις εἰς οὐλὴν ἀγαγὼν ἢ κτλ. αὐτὰ βαλεῖται τὸ ἔλαιον ἀντὶ τῆς τῆς καὶ γὰρ καὶ καὶ ἀπὸ πῦρος. ὃ δὲ ἀπὸ καὶ ἔλαιον, συνάπτειν μετρίως. εἰς μὲν δὲ τῶν πάντων ἄριστον μίλι ἀπιφθον.* hoc est ad repurganda & moderate ex tergendā gulæ ulcera mel coctum in cibo acceptum optimum est. Paulus lib. 1. cap. 8. *πνεῦμα χυρίου καὶ ἐσθίου ἀλάμμου δι' ἔλαιον ἀπιφθον, στυπτικόν ἐστὶν ἐλίου πῦρος.* id est, unctiōne ex oleo coctio, modica cera cū ipso liquata. Quomodo enim cera liquari possit cum oleo, si crudum oleum & non coctum per ἀπιφθον ἔλαιον uocē accipias. Sed & ἀπὸ φθον uox frequens medicis graecis est, quæ planè ἀπὸ φθον opponitur, & non coctum significat.

Confectio Proxeni, ad tussis inueteratas. Hæc confectio σύμφωνος à cōcordi ac conueniente efficacia appellata uidetur, ad affectus curādos quibus est destinata, iuxta quam rationem etiam præcedens ἁρμονία uocata est, & quæ hanc præcedit σιγή, itemq; πνεύμα, ab omnimoda nimirum medelæ efficacia, & ordinis sui certitudine ac constanti conseruatione. At uero σύμφωνος appellata, etiam λεψιπύρετος bona est, hoc est optime sedans ac finiens febrem. Tales autem confectiōnes quæ tum hanc uim, tum appellationem habeant, multæ à graecis medicis produntur. Meminit earum etiam Plinius 20. capite 18. de papauere, ubi ait Ego tamen damnauerim collyrijs addi, multoq; magis quas uocant lexopyretos. Ita enim legendum est, & non lexypyretas. Est enim λεψιπύρετος adiectiuum generis communis, in quo intelligitur δυνάμει siue ἀντίδοτος, id est cōpositio seu antidotus. Vox ipsa ex λήγω & πυρετός constat, ut non rectè à quibusdam λεψιπύρετος pro ea legatur, ab ἀλγῶ & πυρετός cōpositione facta, uelut apud Scribonium cōpositione 90. falsò habetur.

In Cap. III. de confectiōibus ab Andromacho libro secundo de confectiōibus internis conscriptis, ad tussim.

Confectio ad tussim, qua utor, Sacrificuli bona. Hæc tussicularis confectio πῶς ἱερῶς inscribitur in graeco exemplari, accipio itaque per ἱερῶς uocem sacrificulum, qui eam in usu habuit, nisi proprium putandum sit nomenclatiuius, qui ἱερὸς fuerit appellatus, aut ἱερὰς potius legendum sit, cuius Hieracis nomenclationem aliquot collyrijs præfixam etiam libro quarto habuimus. Sequitur paulo post Potio Rhipali Menodorios & Ambrosia appellata: habetur enim in graeco sic, *πέντα δὲ χύμα, τὸ παρὰ ριπάλου ὃ πολλὰ ἰσχυρίσται. μενδορίος ἐστὶν ἀμβροσία.* Sed & hic obscurus est autor Rhipalus. Verum pharmaci appellationes uidentur ab effectibus ipsius deductæ. Nimirum quod utentibus eam, tam in multos menses producat, hoc enim *μενδορίος* significare uidetur. Nisi quis proprium autoris nomen id esse uelit, ut ab eo pharmacum Menodorum appellatum

appellatum putandum sit: & quod incorruptos & quasi immortales reddat. hoc enim ἀμρροσας uox significat. A consimili porro potentia etiam Isotheos, quæ paulò post sequitur, nomen accepit, quod uidelicet parē deo uim possideat. Verum in censu malorum quibus commoda est isotheos compositio, græcū exemplar corruptum est, Quod enim uerti, prodest urinæ suppressæ, doloribus laterum, præcordiorū, ad fluxum muliebrem, & uteri strangulationem: in græco est, ἰσχροσύνη, πλῆθυσιν πίσις, ἰσοχονδρία, βρω γυναικεία, πλεγάς. legendum est itaq; pro ἰσχροσύνη, ἰσοχονδρία & pro πλεγάς, ὕστεραις πινυάς. Sic enim habet Aëtius libro 8. cap. 55. ubi pleraq; omnia reliqua etiam pharmaca hic à Galeno relata habentur. Cæterum quod dixi fluxum muliebrem, non est de mensstruis accipiendum. Aliud est enim fluxus muliebris, à mensstrua siue lunari foeminarum purgatione. Hæc enim omnibus mēsis in omnibus foeminis sanis à XII. usq; ad L. annum prodit. Ille uero uteri quidem fluxus est, sed per quem totum corpus expurgatur. & diuersi coloris, secundū quod diuersi humores in corporibus ipsarum uitiatas redundant. Nimirum ruber à sanguine, albus à pituita, pallidus à bile, aliquādo autem penitus aquosus. Verum maxima animaduersione opus est; ubi penitus purus uelut in uenæ sectione profluit, ne id ex uteri erosione contingat, quemadmodum Paulus libro 3. cap. 63. tradit sed lectione corrupta, quam ut studiosi integram habeant, à nobis restitutam adscribam. βόματισμός δὲ ἡ ὕστερος ἐστὶν ἄλυσιν τῆς σάμας· ἐκκαθαρίζεται. τοῦτον δὲ δὴ τὴν ἰσχυρὰν τὸ λευκοῦ μύλον, εἴη καὶ τὸ πλεονάζον. τὸ μὲν βροχρὸν εἴη ἰσχυρὸς αἷμας· ἰσχυρὸν δὲ λευκόν, ἐπὶ φλέγματι· ὡχρὸν δὲ ἔκτο, τὸ πικρόχολον. ἔκτο δὲ ὕδατος· ὡς πικρὸν δὲ αἷμα λευκόν, ὡς ὅτι φλεβοσταμία φέρονται, περισχυρὰ ἀκρίβειος μῆτις ἀσθενείας γέγονεν ὅτι τῇ μήτρα. Sed & Galenus manifeste inter mensstruas purgationes, & hunc muliebrem fluxum distinguit, quum alibi tum primo de alimentis, ubi de lentis cibo sic ait. οὐκ ἀντὶ τούτου δὴ οὐδ' αἶμα μῆνους καθάρισις, παρὰ καὶ διύστερον βραχὺ μὲν τὸ αἷμα, τῷ δὲ καλονομῶν βῶ γυναικεία χρῆσι μὲν τῶν. Vocantur itaq; mensstruæ purgationes græcis καθάρσεις ἡμῶν, & μῆνις & ἐμῆμα & κατὰ μῆνα, & πὶ γυναικεία, uelut apud Hippocr. 3. epidem. γυναικεία κατὰ βῆνα πρῶτον τότε, παρὰ βῆνα γὰρ ἔστω. Verum ab his omnibus appellationibus eandem rem significantibus, diuersum malum est βῶς γυναικεία, id est, fluxus muliebris appellatus. Dioscorides libro primo de palmæ fructu. ἐστὶ δὲ βροχρὸς, συνηθὺς πινυά· οὗν οἶνον αἰνερὸν πῶς διαλύεται καὶ βρω γυναικεία, quod Plinius lib. 23. cap. 5. male reddidit. Aluum & menses sistit in uino austero, quū muliebrem fluxum pro mensibus oportebat.

Scribonij ad tussim, Seminis apij drach. II.] Hæc quidē confectio ad uerbum non habetur in uulgato Scribonij libello latino, Sunt tamen isthic quædam relata quæ cum hac conferri possint. At uero præcedens hoc loco catapotion ad tussim Crispi Liberti, apud Scribonium composit. 88. apertis uerbis habetur, ut fortassis transpositæ sint inscriptiones, ita ut Scribonij nomen ad catapotium, & Crispi Liberti ad confectionem sit referendum. Cæterum quod in fine habetur. Datur magnitudo fabæ non febricitantibus ex aceto mulso, febricitantibus cum aqua. in græco nō ita legitur, sed pro ex aceto mulso: δι' ὕστερα μάλιστ' habetur. Verū quū Hydromeli etiam febricitantibus dari possit, malo δι' ὕστερα μάλιστ' uelut uetus interpres habet legere, ut sit idem exhibitionis modus qui in Ambrosia Rhipali est præscriptus. Nisi forte δι' ὕστερα μάλιστ' potius legendum sit, id est, ex uino mulso, quod ipsum sanè febricitantibus dare non expedit.

Thespiana Apollonij ad internos abscessus. Hæc cōfectio Thespiana siue Thespiana etiam infra cap. 5. huius libri ex iisdem penitus rebus constans habetur,

nisi quod hoc loco *σινωνίς*, hoc est ut ego reddidi, sinopidis rubricæ, infra *σινω-
νίς*, id est, sinonis expressum est, magna quidem rerum diuersitate, sed tamen ut
utraq; suæ commoditatis gratia, cōfectioni possit apta uideri. At uero Aetius 3.
cap. 55. in eiusdem Thespianæ descriptione, horū loco *σινωνίς*, id est, sinapis habet.
Ego itaq; ex una uera lectione, quā uocis *σινωνίς* aut *σινωνίς* esse puto, has
diuersas lectiones obortas auguro, ob similitudinē quam hæ uoces inter se ha-
bent, & tamē nolui mutare neq; hoc loco, neq; apud Aetium à me translātū, publi-
cam lectionē: quanq̃ sinapis lectionem in Aetio penitus suspectā habeā. & Sino-
pidem rubricā non utiq; libenter ipse ammiscēam, utpote fortiter rescicātem &
adstringentē: nisi putandū est dauci semen has eius facultates cōperare posse, &
eadem gratia ammixta esse huic cōfectioni, qua supra in arteriacis decimaquar-
ta ex ordine. Andromachus rubricam lemniam addidit, sed tamen minore pon-
dere, quam tamen his utriq; uiribus debilior sit quā Sinopica rubrica. Verum
Sinonis siue Sisonis semen concoctorium, & uiscera deoppilans, omnium liben-
tissime admittam, nulli tamen præiudicans, sed liberam relinquens quamcunq;
quisque uelit lectionem apprehendendam. Appellatio porro cōfectionis The-
spianæ siue Thespianæ, à magnitudine præstantiæ deducta uidetur. Significat
enim *θεσπιάς* magnum, diuinum, numine plenum, *σπῆς* τὸ *σπῆς*, & *ισίδια* τῶ
ῆς, ut quidam eius nominis erymōn deriuant.

Cōfectio finiens febrem Pamphili pharmacopolæ bona. Huius pharmaci
autor Pamphilus *μυρατονάρης* in græco habetur, hoc est, qui pharmacorū mī-
xuras uendidit, quem pharmacopolam frequentius uocare solemus. Verum
idē pharmacū in Scribonij libello latino habetur, sed loco corrupto, ut uel ex eo
uno colligere quis possit, Scribonium latinē nō scripsisse, sed esse eum libellum à
quopiā græco Scribonij cōuersum; de qua suspitione mea etiā alibi dixi. Adscri-
bam autem Scribonij locum cap. 95, ut ex collatione facta cuiq; hoc ipsum manū
fessū fiat quod dixi. Alterū medicamentum ad tussim aridam. Nasturtij anima-
ti seminis P. uncia, alerci seminis P. uncia, opij P. uncia, myrrhæ P. uncia, croci P.
semuncia, sulphuris uiui F. semuncia, piperts albi P. quadrans. Melle colligitur
medicamentū. In hoc itaq; Scribonij medicamēto omnia habentur quæ in Pam-
phili cōfectione, præter colitū, euphorbiū, & uidem illyricā, quæ fontalis excide-
rūt. Deinde piperis pondus quadrātis euariat à Pāphili descriptione, quæ drach.
III. & dimidiā tantū habet, atq; hæc uel exscribentis uel exēplaris culpa admissa
esse queant. Verū quod Nasturtij animati legitur, partim interpreti imputandū
esse opinor, partim exscribenti: exscribenti quidē qui lectionē nō assequutus, ani-
mati pro inaniti uel exinaniti uel certe exenterati scripsit. Interpreti uero quod
nasturtij pro *νεφελίμης* cōuertit, fortassis græci exemplaris uitio, quod *νεφελίμης*
pro *νεφελίμης* habuit deceptus, quæ suppositio nō parū frequēter in græcis me-
dicis occurrit, uelut alibi itē indicaui. Si enim sic ipse Scribon. latinē prodidisset,
ad græcorū uidelicet exemplariū fidē & imitationē, uilisceret certe eius apud me
auctoritas, quæ tamē in his Galeni libris magni sit per Andromachī & Asclepiā-
dē auctoritatē, qui ipsius pharmaca ut nō uilia citāt. Puto itaq; Scriboniū omnino
græcē uelut Pamphilū hoc pharmacū prodidisse, & ut hic habet *νεφελίμης*. *ἢ*
νεφελίμης τ. α. scripsisse, qd̄ interpret ei⁹ Nasturtij inaniti uel exenterati, ut dixi
cōuertit, errore exēplaris in nasturtio deceptus, pro inaniti autē postea animati
uox nulla penitus significatione huc pertinēte surrepsit. Nisi animatū pro pleno
& integro, et euacuto cōtrario ac opposito accipi debere putandū sit quod si nō
est, etiā cōpos. LXX. apud eundē, Cachryos animati, pro cachryos inaniti habet.
Est

Est autē *καρδαμύμων* *ἡ ἰσχυρὸς* nō quod ab internis purgātū est, & interiore sui parte euacuātū, alio uidelicet electo, ut propterea inanitū à Scribonij interprete sit dictū: sed cui exterior cortex detractus est, albo interno grano in usum assumpto, contraria planē ratione ei qua suprà cap. 2. huius septimi libri in Andromachi arteriaca duodecima, radix dulcis *ἡ γλυκύριος* dicta est, ex qua eiecta est medulla, & radix reliqua in usum accepta. Nolo tamē dissimulare etiam apud Marcellū utroq; loco ex Scribonio mutuato, itidē animati legi, ut nō librarij, sed planē ipsius interpretis etiam hic error sit, si tamen error appellari debet, quod *ἡ γλυκύριος* Animatum reddidit, Nam quum etiam Marcellus animati nasturtij habet capite 15. & cachryos animati capite 15. itemq; misyos animati, quod in Scribonio deest, uidetur omnino animatum, & non inanitum uel exenteratum, Scribonij interpretem uertisse, quod tamē haud scio quomodo *ἡ γλυκύριος* uocem exprimat, Nisi animatum id quod dixi, aut decorticatum & delibratum significat, hoc est, à cortice externo purgatum, quæ significatio mihi apud nullum latinum scriptorem occurrit, ut & hoc argumento sit, Scribonium sub Tiberio & Claudio Caesaribus latinissimo seculo latine nō scripsisse, sed eius græcum opus, uergente iam latina lingua paulisper ad ruinam, à quopiam esse translatum, sub ipsam Valentiniani imperatoris ætatem, qua fortassis animatum eius significationis fuit. atq; sic sanē etiam Marcellus, qui paulō post hoc seculum uixit, usus pat cum alibi tum capite uigesimo in Pertice Cosmiana, in qua nucū iuglandum animatarum denarij sex, & nucum pinearum animatarum denarij. XII. habentur, hoc est, purgatarum & decorticatarum. Palladius porō plantas rigationibus & liquoribus animari aliquoties dicit, quæ significatio & iuglandibus & pineis animatis appellatis cōuenire possit, ut uidelicet uirides aut in aqua reuirescentes accipiamus, Verum ut ne de cardamomo siue nasturtio uiridi intelligamus, quod dixere animatū Scribonij interpretes & Marcellus, prohibet hic Galeni locus, qui *ἡ γλυκύριος* *καρδαμύμων* habet, hoc est, ut ego reddidi exenteratum, quod certe uiride non existit, neque rigationibus animatum, Nisi rigationibus animatum propterea fuisse accipiamus, ut eo promptius esset id decorticare. At uero Cardamomum, & non Cardamum, hoc est, Nasturtium, legendum esse, ex eo certum est, quod tum in superioribus tum in sequētib; pharmacis aliquoties, item Cardamomū habetur, uelut in antidoto Darj, et potione Abascari, Nisi fortassis his omnibus locis non *καρδαμύμων* uelut habetur, sed *καρδάμω* legendum est: Galenus certe lib. 7. simpl. pharm. Nasturtiū pharmacis quæ asthmaticis exhibētur ammisceri tradit, tanquā quod crassos humores fortiter secare possit. Sed eodem loco Cardamomum etiam multum calida facultate præstare ait, sed non adeo fortius uelut nasturtium, sed quanto est iucundius & magis aromaticum, tanto esse nasturtio debilius, ut uel ex hac ratio cinatione quis utrumlibet legi posse asseuerare queat, & fortassis ab horum pharmacorū autoribus partim *καρδάμω*, partim *καρδαμύμων* scriptum est, secundum quod alterum altero magis unusquisq; ipsorum probauit. Ego tamē Cardamomum insicere malim, si usus ita ferat, maxime quum Dioscorides ad tussientes ex aqua potū facere testetur, quod testimonium nasturtio non præbet, Sed & Cardamomū decorticari magis quàm Nasturtium opus habet. Imò omnino decorticatur externo cortice ab ipso adempto.

Catapotium ad tussim & alia multa commodum, & præsertim ad tussim humidam, In hoc catapotio iunci odorati drachmas VI. conuertit, hoc est, *χαίρου* *φρυγ.* sed in græco exemplari *χαίρη φρυγ.* hoc est, aluminis scissi drachmas VI. habetur. Alumen autem ineptū esse ad tussim uel ex eo apparet, quod nusquam

alias in his tussicularibus pharmacis habetur, Contra uero aptissimum esse iun-
cum odoratum, tum ex eo quod & in præcedentiâ, & in sequentiâ pharmaca re-
cipitur apparet, tum ex facultate ipsius addiscere licet, moderate calida et adstrin-
gente, quam in omnibus suis partibus Galeno testè habet, & magis tamen in ra-
dice, quam etiam hoc loco accipiendam puto, quum simpliciter *χαῖν* pro *χαῖν*
relictum uideatur, & in reliquis ubi floris usum magis probat *χαῖν* *ἀνθιν* ha-
beat. Porro in fine, sunt catapota araci magnitudine reddidi, ex eo quod Græ-
cè est, *ἰσχυρὰ ἀράκων ἀνθιν*, sic enim habetur, sed pro *ἰσχυρὰ* malo legere *ἀν-*
θιν uel tale quoddam uerbum, quo plena sententiâ reddatur. Est autem *ἀνθιν*
per *α* scriptum, eadem quæ cicercula, hoc est *αλδιν*, uelut Galen. libro primo
de alimentis ex quorundam sententiâ tradit. Sed & ibidem *ἀράκων* per *α* scriptū,
ab eo distinguit. Nimirum esse *ἀράκων* agreste quiddam rotundum & durum eruo-
minus, quod inter Cereales fructus reperiatur, & quod abijci soleat. Quin & pau-
lō post eodem libro similia quædam recenset aracho ex frugibus degeneranti-
bus proueniencia uelut est *ἀράκ*, id est, lolium, & *μυλόμενον*, id est, nigrum triti-
cum ex degenerante tritico, agilops ex ordeo, orobanche ex eruo, *ωλιώ*, id
est securidaca, & arachos ex fabis transmutatis, omnia dura & rotunda semina,
& in cibis inepta. Insuperq; aparine, non solum in cibo non conueniens, sed fa-
bas etiā ipsas strangulans, non aliter quàm orobanche eruum consueuit. In sum-
ma itaque Arachi inter Cerealia semina ac fabas reperiuntur. Araci uero Lathy-
ri sunt. Ad utrorum uero magnitudinem quis catapota finxerit nihil peccatis.
Paulus lib. 3. cap. 20. *πίνια* *ῥίζη*, *περίεως* *λακύν*, *κόπον*, *σύνθη*, *μικρὸν*, *ἰσχυρὰ*, *ἀν-*
θιν *ἀράκων* *ἰσχυρὰ* *ἀνθιν*. Id est, araci magnitudi-
ne dato euntibus dormitum.

Potio prodita à Cletio Abascāto ad tabescentes. In græco exemplari sic ha-
betur, *πίνια* *παραλυσίαν* *ἀβασκάντων* *πλὴς* *ἀνθιν* *ἀράκων*, &c hoc est Potio Para-
cletij Abascanti. Verū satis obscurum est, qui fuerit Paracletius Abascantus, si-
cut etiam aliquot alij obscuri hodie pharmacorum autores in his Andromachi
medicamentis citantur. Quare non compositam *παραλυσίαν* appellationem pu-
to, sed seorsim legendū *παραλυσίαν*, ut accipiamus esse proditam à Cletio Aba-
scanto hanc compositionem, quemadmodum in sequentibus *παρὰ* *ῥίζη*, & *πα-*
ρὰ *συνιέρετον* habetur simili dicendi modo; quanquam neque sic constabit quis
ille Cletius Abascantus fuerit, & sanè non multum referte puto, talia nobis igno-
ta esse. Meminit tamen Plinius iunior 10. epistol. libro cuiusdam Abascanti, in ea
epistola in qua Marini medici mentionem facit, de quo superius dixi. Verum is
non Cletius, sed L. Satrius Abascantus ab ipso Plinio appellatur. Citatur & Co-
lica Abascanti infra libro nono capite quarto.

In cap. iiii. De refectione sanguinis.

C Vratio etus quidem quæ ex apertione osculi alicuius uasis contingit, per
obturationem fit otis uasis dilatati. Recenset Galenus tres affectus uaso-
rum, in quibus sanguinis relectio contingit, eorundemq; curationem annexit.
Primum osculi uasis apertionem, quæ *ἀνέστησις* græcis appellatur. Secundum,
rupturam uasis *ῥήξις* græcis dictam, qui tamē affectus si leuior est, & neq; ex uul-
nere, neq; contusione, sed tunica rarefacta, & sanguine attenuato cōtingit, etiam
ἀνέστησις à quibusdam uocatur, à sanguinis uidelicet persultatione, uel ut suprà
libro quinto ostendi, & 4. meth. ab ipso Galeno declaratur. Tertius affectus ex
uenæ erosione, *διόλυσσις* appellatus est. Meminit horum affectuum etiam Cel-
sus libro quarto capite quarto de tussi, sic inueniens. Autoresq; medici fuerunt,
uel ex ea parte aliqua, sanguinē exire, uel rupta, uel ore alicuius uenæ patefacto.
primam

primam διαβρωσιν, secundam φθymασμον, tertiam ἀνασφμασιν appellant. ultima mi-
nime nocet, prima grauissime. Hæc Celsus, & φθymασμον quidē quasi hiantem
rupturam dixit, si modo hæc uox genuina in ipso legitur, & non potius separa-
tim legendum est φθυμα aut χολομα, ut altera uox alteram exponat. Cæterū quod
Galenus ait corrota renutriti per boni succi cibos & per pharmaca sarcotica car-
nem gignētia, de quorum facultate in secundo opere huius tractationis dixeris,
de methodo accipiendum est, in qua de his medicamentis quæ carnem gignūt,
præsertim libro tertio docuit. Dixit autem methodum eam secundum opus hu-
ius tractationis, de pharmacis uidelicet, esse. Primū enim opus est de simpl. phar.
uiribus undecim libris ab ipso comprehensum, & tertium hoc quod in manibus
habemus de compositione pharmacorum. In quibus omnibus hic ordo est, ut
ad tertium opus quis peruenire non possit, ut uidelicet rite pharmaca compo-
nat, nisi ex primo omnium simplicium uires probe notas habuerit, & ex secun-
do componendi rationem & methodum didicerit. Sicut enim in primo opere fa-
cultates singulorum simplicium traduntur, Sic in secundo ratio quædam præscri-
bitur, iuxta quam tum simplicia, tum composita recte in usum assumenda inue-
niantur: de quibus quum isthic nulla uel rarissima mentio fiat, utpote quum ge-
nera ipsorum tantummodo indicentur, frustra methodum uersat, qui non ex pri-
mi operis lectione eò progreditur, & mox ad hoc tertium opus se transfert. fru-
stra etiam quis hos tertij operis libros uersauerit, nisi quæ in illis traduntur me-
moriam tenuerit, atque huc accommodarit. De qua re etiam in præfatione hor-
um commentariorum mentionem feci. & Galenus in octauo libri sequentis ca-
pituli primi sine nos rursus commune facit. Potrò prædicti tres uasorum affectus
si in uasis pulmonis, aut thoracis, aut arteriæ, siue eius summæ partis, stomachi
item ac uentris, & alicuius intestini oboriantur, sanguinis reiectionem aut edu-
ctionem per os efficiunt. Si uero in alijs corporis partibus oboriantur, Osculo-
rum quidē uenarum apertio siue ἀνασφμασις, itemq; ruptura ac ρήσις, sugillata
& ιχυμώματα producit, de quibus supra libro quinto tractauit. Osculorum ue-
ro arteriarum apertio siue ἀνασφμασις, itemq; ruptura ex uulnere & contusione,
affectum producit qui ἀνώρομα appellatur, qui sanè tumor est ex uulnere arte-
riæ tum oriens, quum incumbens ipsi arteriæ cutis ad cicatricem peruenierit, ue-
rum arteriæ ulcus neque concreuit, neque cicatricem recepit, neque carne obnu-
ratum est, uelut Galenus s. meth. & in libro de tumoribus docet his uerbis. ἀρτη-
ρίας δὲ ἀνασφμασίδος, καὶ πῶς δὲ ἀνώρομα καλεῖται. γίνεται δὲ καὶ τραυμάσας αὐτῆς,
ἢ παλαιὸν ὡς οὐλὴν μὴ ἀρῶσθαι καὶ προσκείμενον αὐτῇ σίγμα, μέλαν δὲ τῆς ἀρτηρίας ἐλ-
κός, μήτε συμφύσας, μήτε σπασυλαβήσας, μήτε ἑρπεκὶ φραγθεῖσας. Διαγινώσκειται δὲ
ὅτι ταῦτα πεδήματα τῇ σφραγιδὶ τῶν ἐργασαμένων ἀρτηρίων, ἀλλὰ καὶ διλιγορεύον
ἀφανίζεται πᾶς ὁ ἑλκός, παλινθεομούσας αὖ τὰς ἀρτηρίας. Πι ἐργασθεὶς αὐτὸν οὐσίαν,
ἢ ἰσχυρὰν ὅν ἔστιν, ἢ μαλίσθον καὶ φαυλὴν εἶναι αἰμώτι πρὸς ἑαυτῇ λελθῶ καὶ πολλὰ συμ-
μυῖς. At uero hic aneurismatis affectus uulgo medicorum, corrupta uoce Em-
borisma, & Emburisis, itemq; mater sanguinis appellatur. Græcis uero à dilata-
tione uasis ipsius arteriæ nomen habet.

Quæ Andromacho ad sanguinis reiectionem scripta sunt. In secundo horū
Andromachi pharmacorum, redige in pastillos triobolares uertit, quod græcè
habetur, ἀναλαμβάνει προχέσκουσ τριόβολον. Legendū est autem uel τριόβολον ἔργον-
ται, aut τριόβολαίους, uelut aliàs loqui solet. Deinde in quinto conuerit & ad san-
guinis fluxum ex aqua frigida, uerum in græco est, καὶ πῶς αἰμαίνεται τὴν ὕδατι
καὶ σφραγιδῇ, pro σφραγιδῇ itaque lego ψυχῇ. In sexto deinceps, Datur nucis ponticæ
magnitudine

magnitudine ex aquæ cyathis tribus conuerti, sed in græco exemplari ὁ δὲ αὐτὸς
 uox deest, & solum μετα κινῶν. γ. habetur. cum aqua autem reliqua ferè exhibe-
 re iubet, & partim etiam cum posca, ut neq; hic alius liquor accipi debere uideat-
 ur. In penultimo deinceps pharmacorum dixi. Dato cum uistello oui assati, ex
 aquæ lactosæ cyathis tribus. quod in græco est, δίδου μετα λευκὸν ὀψῆος μὲν ὁ δὲ
 πρὸς γαλακτῶδους κινῶν. γ. &c. ὁ δὲ αὐτὸς itaque γαλακτῶδους aquam lactosam dixi.
 Solent autem Græci medici sic appellare aquam tepidā, quam Celsus egelidam
 dixit, hoc est quæ neque calida est neque frigida: atq; sic accipiendum est quod
 Dioscoridēs libro tertio de aloe dixit, δίδωμι δὲ ἔχει κελίας τε λυγικῶν καὶ σπέρμα
 ἀκροκαρτεριῶν καλλισέλων. β. πλὴν δὲ, μὲν ὁ δὲ αὐτὸς ψυχρὸν ἢ γαλακτῶδους πινεῖν βίβει.
 id est, cum aqua frigida aut lactosa, hoc est egelida, data in potu. uel ut rectissime
 Hermolaus uerit, cum frigida aqua uel quasi lac gelida: quanquam hoc potissim-
 um Dioscoridis loco pro lactis aqua, hoc est pro sero ipso, ὁ δὲ αὐτὸς γαλακτῶδους δι-
 ctum uideri possit, quando sanè etiam ipsa uelut aloe, uim habet excretionem ci-
 tra actedinem ciendi. Sed hanc non esse ὁ δὲ αὐτὸς γαλακτῶδους significationem,
 uerum illam priorem, aliquot locis productis clarius indicabo. Sic itaq; frequen-
 tissime usurpat Aetius, ut lib. 8. cap. 68. ubi mastichen tenuissime tritam scrupul-
 orum nouem pondere μὲν ὁ δὲ αὐτὸς χλιαρὸν ἢ γαλακτῶδους bibendum offerre iu-
 bet. & nono, capite de cardiacis ὁ δὲ αὐτὸς γαλακτῶδους absorbendum propinat. & 9.
 cap. 49. frustra panis duo aut tria ægro exhibenda ex aqua frigida aut lactis præ-
 cipit. & 12. cap. 48. ut plurimum uero χλιαρὸν ὁ δὲ αὐτὸς ἢ γαλακτῶδους καὶ τοῦ ἐδάω, id est
 tepida aut lactei temperamenti aqua perfundatur. Sic enim ferè conuerti, & alii
 quando lactis aqua simpliciter, quæ non alia accipienda est quàm quæ instar la-
 ctis tepet, quam uidelicet hoc loco lactosam dicere malui, ut ne quis serum la-
 ctis per aquam lactis accipiat. Tepidam autem siue egelidam dicere nolui, quo
 etiam huius uocis γαλακτῶδους significationem propius redderemus, & eius ue-
 stigium agnosceretur. Sed hanc γαλακτῶδους uocis significationem idem Aetius
 nono, capite sexto euidenter declarat, ubi μάλιστα γαλακτῶδους τῇ ἀφ᾽ αὐτῆς dixit,
 id est, aquam mulsam quæ lactis speciem in tactu de se præbet: ea autem species
 non est alia quàm tepor per tactum deprehensus. Est enim tepor ex primis qua-
 litatibus quæ tactui obijciuntur. Non autem aliquam secundarum qualitatum,
 uelut lubricitatem, aut lenitatem, quæ item tactu deprehenduntur, eum indicā
 re: ex undecimo eiusdem libri, capite trigésimo manifestum redditur, ubi ait. Cæ-
 terum naturales aquas experiri nō inutile fuerit, aluminosas uidelicet & sulphu-
 rulentas & consimiles, quales sunt Albulæ & lactei temperamenti, hoc est τὰ ἐλ-
 βουλά καὶ τῇ κρήνῃ γαλακτῶδους. Temperamentū enim & κρήνης nihil aliud quàm
 teporem & calorem significat hoc loco, sicut altas etiam de primis qualitibus
 dicitur. Sed hanc significationem uocis γαλακτῶδους apertissimis uerbis decla-
 rat Galenus 7. meth. χλιαρὰ δὲ τὰ ἐδῶσι ματὰ πινόμενα, ἢ καλῶν ἰδῶν δὲ τοῖς ἰα-
 τράσι γαλακτῶδους θίγους δ' ἰστέον, ἢ καλῶν καλῶν. hoc est Edulia uero tepida ex-
 hibebimus, quæ medici Lactosa appellare in consuetudine habent. Si uero sit
 æstas, quæ ejdem Fontana uocant. Lactosa itaque edulia appellari ait quæ ad la-
 ctis modum tepent, sicut fontana quæ frigida sunt instar fontanæ aquæ. Hunc au-
 tem locū etiam Aetius ex Galeno mutauit, sed tamen ut Galeni locum ma-
 gis exponat quàm reddat, lib. 9. cap. 36. sic inquit, χλιαρὰ δὲ ἢ τὰ ἐδῶσι ματὰ πινόμε-
 να, ἢ καλῶν γαλακτῶδους ἢ χαμῶν ἢ θίγους δ' ὄντος, ὡς τὰ λευκῶν ὁ δὲ αὐτὸς μὴ ἀντὶ
 ψυχρῶ. Ad eundē itaq; modū ubiq; in græcis medicis γαλακτῶδους uox accipienda
 est. uelut apud Diosc. lib. 4. de Betonica. δίδου τῇ ἢ ἀμαρτῆσιν ἄλλῃ τριμῶν μετα
 κρῆματος

κερματι & λυλθεν ενος γαλακτωδους. *κερμα* enim *γαλακτωδης* dixit uinū dilutum tepidum. Sicut Paulus lib. 2. cap. 42. *ερεωσμηζον* *δαι* το *πρωτον* *εφεκρωτω* *γαλακτωδης*. Postquam lactosam eam quæ tepida est dixit. Vbiq; inquam, sic accipiēda est *γαλακτωδους* uox, nisi per adiectionem aliarum uocum alia significatio indicetur. Velut apud Galenum 9. simp. pharm. de lapidibus spongiarum. *λυνουται* *δε* *εξ* *χυλον* *ετοι* *γαλακτωδης* *τιω* *χρεια* habetur, hoc est soluantur in succum lactei coloris. Quæ omnia longius explicare uisum fuit, ut certam huius uocis significationem ostenderem, quæ omnibus serè græcorum medicorum interpretibus imposita. Porro in ultimo Andromachi pharmaco: Dato hoc totum pro duabus uicibus in potu conuertere, hoc est *διδου* *το* *ολον* *πινει* *δύε*. sed in græco *πινει* pro *πινεις* falso habetur.

Pharmacum Arrhabiani quod Ponticum appellatur. Quisquis fuit hic Arrhabianus huius pharmaci autor, Ponticum uicq; appellatur, ab eo quod in Ponto præparetur, in quo uua urfi nascitur, uelut Galen. hic docet. fructus ruber, & rotundus, gustu austerus: apud alias itaq; gentes pharmacum parari non potest, ob uuae urfi inopiam.

Pastillus ex succino, facit hæmoptoicis, diurnæ & recenti tussi, phthysicis, sanguinem reijcientibus, suppuratis. Quos sanguinem reijcentes hic dixi *ανφεριτω* in græco exemplari sunt, & alias etiam græcis medicis appellantur. Nimirum quod ex infernis partibus sanguinē sursum efferant, hoc est *εξ* *τ* *αν* *φεριτω*. Videnturq; ab Hæmoptoicis eo differre, quod undecunque sanguis feratur sursum per os, Hæmoptoici uocetur. Estq; hæc uox *ανφεριτω* frequēs in his pharmacis, itemq; apud alios medicos græcos, Dioscor. Aetium & Paulum; quanq; aliquando *ανφεριτω* pro *ανφερικαις* suppositi sint, apud hos ipsos autores.

Pastillus Neapolitæ. In hoc pastillo opium hispanum habet tanquam quod reliquis præstet, uelut etiam supra lib. 4. in collyrio diasmyrno Synerotis. Aetius tamen aliquando Asianum, aliquoties etiam Achaicum probat, uelut 8. cap. 67. in catapotio ultimo, *οπιον* *εχρηται* *η* *απανω* habet. Alij Thebaicum præferunt. Scribonius compositione 22. opium laudat quod ex lacte ipso syluatici papaueris capitum sit, non ex succo foliorum eius, ut pigmentarij institores eius rei compendij causa faciunt. Illud enim cum magno labore exiguum conficitur, hoc sine molestia & abundanter teritur. Quod ipsum etiam Plinius 20. cap. 18. dixit his uerbis. Quum capita ipsa & folia decoquuntur, succus Meconium uocatur, multū opio tgnauior, &c. Nam eadem Dioscor. etiam lib. 4. tradit. Galen. tamen & autores qui ab ipso in his libris citantur, indifferenter modo *μεκωνιον*, modo *οπιον* dicere uidentur, & nos: *μεκωνιον* succū papaueris, *οπιον* itidē ut græci opii reddidimus.

Aphrodisiacum Clidion. In græco exemplari *κλειδιον* pro *κλειδιον* legitur, Verum *κλειδιον* legit Aetius 8. cap. 63. & Paulus lib. 7. cap. 12. ubi hoc pharmacum ex Galeno citat in hæc uerba. *ελα* *ο* *πινει* *δ* *ε* *υ* *γαλνεις* *αφροδισιακον* *κλειδιον* *ω* *χρηται*. Verū Aetius tum clidion, tum pastillum ex spina Aegyptia hoc pharmacum appellat, in cæteris cōuenit, nisi quod zingiberis drach. iii. pro myrrhæ drach. ii. leguntur, uitio exemplaris quod ego in Aetio uertēdo sum sequutus, uelut alibi item indicaui.

In Cap. v. de confectionibus dolorem sedantibus, tabescentibus, & sanguinem reieciantibus commodis.

DVplex genus dolorē sedatiuum pharmacorū Galenus hoc loco distinguit, quorū alterum propriū colicorū est, hoc loco ineptū, sed colicis ob magnitudinem doloris accommodatis. Alterum uero Hæmoptoicis & phthysicis aptum est, & ad dolores ac affectus pulmonis, arteriæ, ac thoracis, imò etiam aliarū partium

tium, colicis tantū exceptis, Verum lectio græci exemplaris corrupta & transposita, hoc modo restituenda est, contingetq; ea sententia quam ego expressi. καὶ πρὸς ἄλλας ὁδούς τι καὶ ἀφθυσίας ὁραὶ κατὰ τὴν ποσὶν μεταξὺ καὶ ἀφθυσίας καὶ ὁδῶν, καὶ ἔτι καὶ τινὰ μίγμα σμικρὰνται, ἀλλὰ τῶν καλῶν ἀφθυσίων γὰρ αὐτὰ τῶν ἰδίων καλῶν εἰς μαζήδων, &c. Sunt autem utriusq; generis pharmaca græcis à sedando & leniendo dolore, ἀνῶδων appellata.

Quæ Andromachus scripsit ad prædictas affectiones.) In secunda harū confectio quæ Marcellini est, conuerit: trita cum aqua in pastillos triginta duos redigebatur enim in græco, λῆπ σὺν ὕδατι ἀποπλάσσει τρεχίσκους λβ. estq; hæc lectio recta, quum enim totum pharmacum drachmas X. & obolos IIII. habeat, eueniet ipso in pastillos triginta duos coacto, singulos duorum obolorum esse, quod pondus etiam in sequentibus aliquot confectioibus exhibendum prout ce exprimitur: quanq; maxima ipsarū pars triobolari pondere formetur: quod si etiam in hoc pharmaco præstidum esset, non τρεχίσκους λβ. sed κβ. legendum esset, & deessent tamen duo oboli uniuerso pharmaco, ut pastilli triobolares uiginti duo ex ipso formarētur. Vetus interpret non λβ. sed δραχ. β. id est, pastillos duarum drachmarum legit ac uertit. literæ λ. tricenario caractere, in characterem drachmalem. 4. conuerso. Sed hoc pondus ut nimium in eiusmodi pharmacis, refutamus. Cæterum hæc ipsa pharmaca etiā Aetius lib. 8. cap. 63. partim etiam 9. cap. 4. 8. habet, si quis conferre uelit. At uero quam Achillæ Aurigæ esse dixi, in græco ἀνῶδων ἀχίλλῃ ἀγκυρῶν habetur. Accipio itaq; ἀγκυρῶν τὸ pro aurigæ, & equorum stimulatore. Quanquā fortassis in duas dictiones diuisa hæc vox legi debeat, ut uidelicet accipiamus Achillam ἀνῶδων hoc pharmacū accepisse & prodidisse. Sed in his obscuritatibus nihil decerno, maxime quū non multū referat, quis sit autor pharmaci, & unde ipsum habeamus, modo integrū sit, & usus eius probatus nobis constet.

Alia Aster appellata sistēs dolorē.) In hac cōfectione siue pastillo Astere inscripto, dixi, facit & ad paralyti resolutos: sic enim in græco in enumeratione affectionum quibus hic pastillus commodus est, habetur. καὶ ὁδῶν πρὸς ἀνῶδων, ἀλλὰ ἀνῶδων, καὶ ἀνῶδων. Sunt autē ἀνῶδων idem quos ἀπῶδων & ἀπῶδων appellat, qui sanē tales ex diuturna podagra aut ischiade, & arthritide sūt. Ut autem hanc significationem uocis ἀνῶδων hoc loco esse putem, ex Aetio inducor, qui 9. cap. 10. hunc pastillum recensens, paulò tamen aliter, eum ad articulorum dolores & podagram, gentianæ decoctio dissolutum ac potatum, cōmodum esse scribit, quod & Galen. infra lib. 8. cap. 3. prior tradidit, ut idem pastillus paulò tamē aliter, ut dixi describitur. Nam Aetius inde transcripsit: alias malim pro καὶ ἀνῶδων legere, πρὸς καὶ ἀνῶδων, ut uidelicet accipiamus pastillum ipsum etiam facere infusum per clysterem, atq; hanc sententiam etiam uetus interpret agnouit: quanquam infusilem esse hunc. Pastillum neq; Galenus, neque Aetius meminit: qui tamen prædictis locis uarium ipsius usum produnt, pro affectionibus uidelicet cōuenientem semper liquorem, in quo dissoluatur ac potetur, assignantes. Porro quum sint qui etiam per ἰσχυρῶν, uocem non alios accipiant, q̃ quos Græci dicūt ἀπῶδων, ἀπῶδων, & ἀνῶδων, Visum est hic obiter de ἰσχυρῶν addere, Sunt itaq; ἰσχυρῶν non paralytici, neq; attoniti, hoc est apoplectici, uelut in toxico apud Dioscoridem Marcellus conuertit, neq; tabefacti, uelut Marcelli censor Manardus, non paulò minus quàm ille græcæ linguæ indoctus temere ut solet ferè pronunciauit, neq; hæctici, aut phthirici, uelut idem Manardus ex Auicenna citat: sed stupidi & dubii ac uacillantis rationis, quæ admodum nos apud Aetium serm. 13. cap. 70. reddidimus. Idem enim Dioscoridis locus ab Actio

Aetio isthic, sicut à Paule lib. 5. cap. 53. usurpatur, uerba ipsa sic habent. καὶ ἄτινις μὴ τὸ φάρμακον τὸν λίνθινον, πολλὰ χρόνον ἐλυσσεν τὴν ἀσθενείαν, καὶ ἀποπέμψεν τὴν ἀσθενείαν τὸν χρόνον διάγουσι, hoc est: Quod si quidā etiā periculū effugiunt, multo tamen tēpore in lecto decumbēt, & stupidi ac dubiæ uacillantisq; rationis etiā ubi surrexerunt per reliquū uitæ tempus manebūt. Significat em̄ proprie ἐπισημῶδες, quod nos germanice uortrenet dicimus. Est aut̄ uox participij, preteriti perfecti, ἐπισήμαι cuius thema est ἐπείμαι, cōsternor & præ timore stupeo, ut Marcellus Virgilius nō male attonitos ἐπισήμους uertisset, nisi ipse adeo attonitos alio loco latine dici ἐποπληκτικούς solos tradidisset, atq; ea gratia inuito ac reluctāti collo à Manardo captiuus ducitur. Constan. Cæsar de agricul. lib. 16. cap. 1. inter notas generosi equi habet ἐὰν μὴ ἂ ἐπισήμους, μὴ δὲ ὑπὸ τῆς ἀσθενείας φανερῶνται ἐπὶ τῇ ἀσθενείᾳ, si non sit consternatus, neq; à subito apparentibus perturbetur. Idem lib. 3. cap. 10. ἐὰν γὰρ ἐκ τῶν τῶν ἀσθενείας τῶν βρογχίτις ἰσχυρῶς ἐπισήμους τίνες ᾖ τῶν χυμῶν, id est consternatos & dubiæ rationis futuros.

Alia dolorem sedans portio Rufi qua utor. Ad finē huius portionis habetur. Dantur ex aque calidæ cyathis duobus, cholericiis, hoc est biliosa superne & inferne reddentibus, ex frigida. Hoc est, διὰ τὴν σὺν ὕδατι θερμῇ λυσσῶναι διουρίαν, καὶ ἐκ τῶν ὕδατι ψυχρῇ. Esse autem uocis χοληρικώντων itemq; χοληρικών eam significationem, & Galeno, Aetio, & Paulo constat, qui hunc affectum sic describunt, χοληρὸν ἔστι γαστρίᾳ δὴν ἄμυστον ἐκ τῆς αἵματις, κατεσθίει τε καὶ ἐκ τῆς γαστρίδος, ὥστε προσχῆν τὸν σπλῆν ἐκ τῆς αἵματις. Sequitur mox alia confectio sedans dolorem, in qua: Cassiæ nigrae, myrrhæ, opij, styraçis, croci, singulorum drachma 1. conuertit, sed in Græco exemplari, pro styraçe συσπείρας habetur, quam uocem ut supposititiam expungendam censeo, & ueram σύρακα eius loco succenturiandam, quum styraçis usus ad has affectiones cōmodissimus, etiam in alijs confectiōibus aliquoties habeatur: aluminis autem usus & ineptus est, & nusquam in alijs pharμαeis hoc loco relatis habetur. Facilis autem fuit occasio lapsus, συσπείρας pro σύρακα supponendi, ob uicinatē scripturæ, sicut in præcedenti capite etiam χάρις pro χάρις suppositum ostendit. Sequitur mox trigonus pastillus, à triangulari figura qua elingebatur, ut puto, cognominatus, de quo etiam alibi dixi, nisi quis à tribus rebus ipsum constituentibus cognominatū potius uelit, quam quā non ex tribus, sed quatuor rebus, & Aetius, & Paulus eum cōponant, sed Galenus hoc loco apij semen non habet, haud scio an ultro relicti, an alias deperditum & elapsum. Sequitur mox duæ cōfectiones, in quarū prima βίσις βοτάνης in secunda βίσις simpliciter habetur, pro quibus ego saluix herbæ reddidi. Est enim βίσις pro βίσις utroq; loco substitutendum. Est autē βίσις una aliqua apPELLATIO ἐλελισθησίου, quam nos saluiam dicimus, uelut etiam in adscriptiōis ad Dioscoridem uocibus habetur, & Plinius 16. cap. 6. alteram bechij speciem saluiam appellari testatur. Alterius autem bechij tum foliorum, tum radicis usum, & Dioscorides & Galenus & Plinius in suffusionibus tantum probant, ut ea hoc loco non sit accipienda, sed altera elelispachos uidelicet, & saluia appellata, quā ob uim calfaciōriam, urinam, mensesq; ac foetus detrahare in potu acceptā Dioscorides dixit. Sequitur deinceps alia dolorem sedans iucunda appellata, quæ eadem planē est cum pastillo ex succino præcedenti capite quarto ex Asclepiade à Galeno adscripto. Est autem appellatio ἐκσυμῶδης Latina, à græcis medicis Roma degentibus in usum assumpta. Sequitur paulo post Catapotium ex libris Aphrodisi, in quo dixi: facit & ad calculosos, dysentericos, & iā desperatos, atq; anxios. Ita enim in græco habetur. πικρὴ καὶ πρὸς τοὺς λιθιῶντας, καὶ δυσουτερικοὺς, καὶ ἐσπεράτους, καὶ τοὺς πόδα ἐκπαρκεύουσιν, καὶ ἀσπασμένους. ἀσπασμένους itaque anxios dixi, eos

significare uolens; qui nullam decubitus formam facile ferunt; sed se perpetua inquietudine iactant, quæ affectio ualde pernicioſa eſt, & propterea tam deſperatis adiecit. Sunt autem duplices *ἀσυνένοι*, qui & *ἀσυνένοι* dicuntur, hi quos dixi, & alteri quibus os uentris à uicioſis humoribus cōmordetur, ut nauſcabundū reddantur. Sed de hac gemina ſignificatione τῶν ἀσυνένων & ἀσυνένων, Galeni uerba ex ſecundo commentariorum in prædictiones Hippocratis adſcribam. *οἱ γὰρ ἡσυχάζοντες ἀσυνένοι τῶν κακῶν τῶν, ὅτι μὲν πρόπαν ὅταν ἡ διαίτα ὅτι τῶν σαρμάτων διακρίνεται, ὅς μὲν τῶν φέροντων ἔστι, ἰσχυρὸν δὲ τῶν τῶν σαρμάτων τῶν γαστρὸς ὅτι μὲν ἔστι, αἱ πρὸς τῶν μὲν ἐλπίδων διακρίνεται. ταυτὸς δὲ ὅτι τῶν σαρμάτων.*

Quæ ab Aſclepiade ſcripta ſunt ad eaſdem affectiones. Eclegma, farris Cluſini appellati ſextarium dimidium. Hoc eclegma, itemq; ſequens ſorbitio mire corrupta ſunt, per typographum, aut potius per eū qui caſtigatōni operis præſuit, ut paſſim apparet. Nam quum ueram lectionē aſſequi non poſſet, aut etiā integram haberet ſuſpectam, ut quam non intelligeret, hanc quæ in græco exemplari legitur, ex diuinatione ſua aſſequutus, ut rectam ſuppoſuit, quæ ſic habet. *ἐλεγκτὸν φάρμακον ἐλεγκτὸν, αἴνα. ἢ. σ. πρῶτον χυλὸν ἀφ' ἑφ' ἑμαρτῶν. ἢ. α. τὸν τε βαλὼν ἐπ' ἑφ' ἑμαρτῶν ὑποκῶν, ἀρχιγενεῖα ὑποκῶν καὶ ἡρίων. τῶν δὲ ἀπὸ τῶν, μέλας τε φάρμακον, ἀπὸ τῶν χόνδρων Βερίχου, καὶ ὅταν παταλῶς ἐλεγκτὸν, ἐλεγκτὸν ἢ ὑγρὸν, καὶ τὸν τε βαλὼν αἴ. σ. καὶ ὅτι τῶν πρὸς τῶν σαρμάτων, καὶ ὅταν σαρμάτων, ὅτι μάλιστα ἔχον τὸ πῶχον, ἢ τὸν τε δίδωται μύρον πρὸς τῶν σαρμάτων, καὶ μὲν τῶν σαρμάτων τῶν σαρμάτων.* Hæc itaque lectio penitus corrupta nullam ſententiā exhibet componendū pharmacum quale Aſclepiades ipſe præſcripſit. Vt quid enim uinum & marrubij decoctum in uitreum uas coniecta, macerari per diem & noctem quis ſinat, ut ſequenti die pharmacum emollire ad alicæ maceratæ modum poſſit, quum utraq; res ſit liquida per ſe, nec maceratione, nec emollitione opus habens? Quare deſt res aliqua, quæ uino ſuppoſtitio relecto, ſubſtitui debet, & quæ in marrubij decoctio maceranda eſt, & inſtar alicæ emollienda, atque hæc nulla alia eſt quàm far maxime Cluſinum appellatum, cuius etiā Plinius meminit lib. 12. cap. 7. In tranſpadana, inquit, Italia ſcio uſcenas quinas libras farris modios pendere, circa Cluſium & ſenas. Meminit & Aetius 9. cap. 45. ibidemq; farris ex frumento præparandū modum ex Archigene docet, qui locus in ſecundo horum commentariorum à me eſt reſtutus. Sed & Columella lib. 1. cap. 6. Far quod appellatur Cluſinum, candoris uidi eſſe ait. Farris itaq; Cluſini ſextarij dimidiū, in marrubij uiridis decoctio ſextarij meſura macerari debet, & uelut alica emolliri. Quemadmodum enim far ex frumento ſiue tritico, ſic alica ſiue chondrus ex zea præparatur, uelut alibi oſtendit. Porro quod ſequitur *ἐλεγκτὸν ἢ ὑγρὸν, ἢ τὸν τε βαλὼν αἴ. σ.* ſimiliter corruptuſ eſt. Deſt enim res quæ expreſſo liquori ex farre & marubij decoctio, amiſceſci debet & cum qua ad mellis craſſitudinem ſit redigendus. Et ſane ſuſpiciamus ſum aliquandiu *μέλις* uocem deſſe, ut uidelicet mellis libram dimidiam addi iuberet, ſed damnata tandem hac mea ſuſpiciōe, nihil aliud deſſe exiſtimo, quàm *λίπος* uocem, qua pinguedinē ſiue adipem aliquem injici iuber, nullo certo pondere aut meſura additis, ita ut αἴ. σ. meſura, p uoce *λίπος* ſit ſuppoſita. Quæ admodū enim in ſequenti ſorbitione *λίπος* *λεῖος* *κατ' ἑφ' ἑμαρτῶν* *σ.* *γ.* injicere iubet, itemq; pollinis acetabulum: ſic in hoc eclegmate, itidē adeps aliquis cōijciendus eſſe apparet, pro polline uero far ipſum ſucceſſit, quanquā etiā in ipſa ſorbitione *λίπος* *σ.* qui nullus eſt, pro *λεῖος*, id eſt adipe arietis ſiue pinguedine legatur. Poſſit autem etiā alius quiſpiā adeps accipi, quū non habeant multum diuerſas facultates. Quare lectio omnino ad hunc modum reſtituenda eſt, quam non dubito ſiſſe in exemplari expreſſam, & temere ut dixi corruptam. *ἐλεγκτὸν φάρμακον ἐλεγκτὸν*

αἰσθητοῖς f. c. πρασις χλωρὸ ἀφ' ἑλμας θ' f. a. ταῦτα βαλὼν οἷς ἀγ. θ' ὀδονῶ, βρῖ-
χιδω καὶ ῥικία καὶ ἀνίρα: τὰ δὲ ἐπὶ τῷ μολισσῷ τὸ φέρματι, ἀσπὲρ τὴν χροῖαν βρῖχ-
μι, καὶ ὅταν πικρὰ λῆς ἐσλυνῶ, ἐκλυσθε τὸ ὕγρον, καὶ τότε ἀνβαλὼν λιπὲρ καὶ βαρὺ
πυρὲς ἔψα, &c. Hoc enim modo continget sententia compositionis huius phar-
maci quam ego reddidi, & quā neq; ex ullo exemplari, neq; ex ueteri interprete,
quicquam non habet, sed iuxta apertissimam ut arbitror cōiecturam, rectissimam &
genuinam esse iudico.

Aliud [Nicerati, facit suppuratis dyspnoiciis.] Inter vires huius eclegmanis, in
Græco exemplari habetur, καὶ ταῖς μετὰ τὸν καθαιρεμένην κατὰ γὰ γάλα, πικρὰ καὶ
πικρὰ ἀποφῶσι διδιδόναι ταῖς τροφαῖς. Hoc est eis quæ post partum purgantur lac
deducit, prodest etiam infantibus alimentum non sentientibus, si in cibis præ-
beat. Verum ego corruptam lectionem sic puto restituendam. καὶ ταῖς μετὰ τὴν
καθαιρεμένην κατὰ γὰ τὰ δίδιδοναι, πικρὰ καὶ πικρὰ ἀποφῶσι διδιδόναι ταῖς τροφαῖς.
Hoc est uelut ego reddidi secundas deducit & detrahit, & si nutricibus præbea-
tur, non pueris. Pro γάλα itaq; τὰ δίδιδοναι lego, uelut etiam infra in panichresto
habetur. καὶ γυναῖκα ἰκμῶτα, καὶ ἰκαταλαμψαῖα ἐκ φλοῦς τὸ πικρὸν δίδιδοναι κατὰ γὰ.
Lac enim detrahre mulieribus à partu nō est opus, Nam augere aliquando con-
tra oportet diminutū: Sed & hanc uim detrahendi secundas prasio Dioscorides
tribuit libro tertio ubi inquit. δίδιδοναι καὶ ταῖς μετὰ καθαιρεμένην γυναῖκα: ἐχοντὴν ἐν
πικρὰ καὶ ἀποφῶσι. Potissimum autem in hoc pharmaco est ipse prasi siue mā-
rubij succus. Deinde pro τροφαῖς lego τροφαί: Pueris enim in cibo exhibere tam
forte pharmacū non conuenit, sed nutricibus exhibitū, uim suam in lac (psūrum
distribuit, ex qua per succum lactis nutritis infans participat: τροφὴ αὐτὸν cibum,
τροφὴ nutricem significat. Cæterum alimentum non sentientes dixi πικρὰ ἀποφῶσι
quāτας, sic enim Plinius eos reddit lib. 12. cap. 25. de eruo. Et quæ cibum, inquit,
non sentiant atrophia appellata, tostum & in nucis auellanae magnitudinē melle
colleclum deuoratumq; corrigit. Verum lib. 18. cap. 9. ab imbecillitate vires re-
colligentes eisdem dixit. Sic enim de lacte ait. Et bibitur ab imbecillitate vires re-
colligentibus, quos atrophos uocant.

Aliud Scribonij Largi Succi marrubij sextarios vi.] Hoc eclegma non est in
Scribonij libello uulgato, sicut neq; carapotium, quod paulò post item Scribonij
Largi nomine citat ab Asclepiade, fortassis p̄ctatis intus elapsa ac deperdita.

Antidotus Aristarchi, compositio admiranda, hanc Paulinam appellamus.]
Hæc antidotus est etiam apud Aetium s. cap. 63. sed tum hic, tum apud Aetium,
aliquo modo per atasē corrupta, ita tamen ut utraq; descriptiones inter se colla-
te, unam integram reddere ualeant, quam sanè me hoc loco expressisse puro. Ae-
lius itaq; antidotus Aristarchi habet, sed in Galeni exemplari ἀερίος ἀερίωνος,
id est, Aristei Aristomaci habetur. Aetium itaq; hac parte sequendum existimo.
In Galeno enim duplex nomen auctoris à typographo expressum indicat: esse cir-
ca ueram lectionem hæsisse. Deinde Aetius singulorum in hanc antidotum am-
mixtorum unam etiam unam habet. Galenus autem ἀερίος ἀερίωνος, id est singulorum
drach. unam, nimis exiguo pondere ad sextarium mellis, quare & hac parte Ae-
tium sequi sumus, maxime quā Asteriscus adiectus indicet typographum circa
lectionem dubitasse, & quā fabæ Aegyptiæ magnitudo tantum exhiberi debeat.
Si enim drachmæ tantum singulæ singularum rerum indetentur ampliori copia
exhiberi possit, atq; tantum quidem ex Aetio sumpsimus ad huius pharmaci in-
tegritatem restaurandam. Verū Aetius ipse nicissim ex hoc Galeni loco iuuari
potest, quo & ipse hanc antidotum integram habeat. Primum itaq; desunt apud
Aetium aliquæ affectiones, quibus hæc antidotus cōmoda est. Deinde surdastros

quos ex uoce *λευγέρ* reddidi non recte legitur. Debet enim *ἀποποιε*, id est, cibum non sentientes pro *λευγέρ* legi. Sed quid facerem quā exemplar quod ego in Aetio uertendo unicum & ætate corrolissimum sequebar palam *λευγέρ* haberet & tum non ad manum esset Galenus, unde opem ferre potuissim? Indico itaque libentissime errorem non meum, sed exemplaris, quanquam neq; meum consilii erubescam, si uel hac uel alia parte communi mortalium incertitudine & fragilitate deliquissem. Postea Aetius mellis choenicem habet, hoc est, ut exemplar græcum habuit *μελίτης χοι. κ.* Sed malim ipse cum Galenio f. κ. legere, quam utrunq; legi possit, & in plerisque alijs locis Aetius choenicem, hoc est, sexquixtarium habeat, in quibus apud Galenū sextarius habetur, nisi uel apud Aetium *χοι. κ.* temere pro sextario suppositus est, uel apud Galenum sextarius pro choenice irrepsit. Malim tamen aliquot locis apud Aetium choenicem pro sextario suppositum esse credere, quam apud Galenū sextarium pro choenice, maxime si choenicem duorum sextariorū mensuram accipiamus, uelut quidam tradunt. De hac re ob id libentius rerum medicarum studiosos commonefacio, ut in eiusmodi mensuris ac ponderibus ipsi diligentem æstimationem faciant, quantum sit satis, reliquorum ammiscendorū comparatione. Hoc enim ipsi iubent nos facere aliquoties pharmacorū autores, præsertim circa mellis mixturam, ut non simus uel ad huius sextatiū, uel ad alterius choenicem adstricti, tantum quam quibus nihil inde immutare liceat. Licet enim mutare tum augendo, tum minuendo, iuxta affectuum, locorum, temporū anni, hominū, ætatum, et cuiusq; adeo palati rationem. Postremum in Aetio habetur, irrorato podice ex modico aceto: quæ lectio penitus corrupta est per typographum, qui podice pro pollice legit. Sic enī scripserā, irro rato ex pollice modico aceto, quod id ipsum est quod Galenus hoc loco dixit, uelut ego reddidi, irroratis de digito guttis acetī nouē, hoc est, *ἡμισφαιρίων τῷ δακτύλῳ ἑξῆς ἀγρίων θ.* Sed Aetius nō certū numerum guttarum irrorandarum expressit, & alias etiā corrupte habebat exemplar *ἡμισφαιρίων δακτύλῳ ἑξῆς ἀγρίων θ.* Pro quo legendum est *ἡμισφαιρίων δακτύλῳ ἑξῆς ἀγρίων θ.*, hoc est uelut iam dixi, irrorato ex pollice modico aceto.

In Caput VI. de Orthopnoea.

A Sdepiadæ pharmaca ad dyspnoicos conscripta. In quarto ex his pharmacis ruta trientem, & seminis apij, comæ thymi, utriusq; unciā unāq; conuerū, sed in græco exemplari primum pro rutæ trientem, id est, *ωγύανον ρα. δ.* habetur falso, ut equidem opinor, *λιβάνον ρι. δ.* Deinde *σαλινς αωρίμας* & *καὶ θύμιον ἡμισφαιρίων δυά. ρ. κ.* habetur. Sed ego pro *ἡμισφαιρίων* lego *ῥήμας*. Quod autem rutæ usus in hac pharmaca potior sit, uel ex Dioscoride discere licet, qui libro tertio de ruta ait: *πικρὰ δὲ καὶ ὑπὸ πλεονεξίᾳ πύον καὶ διάρροιας, δύσπνοιας, βήχος, πνευμονίας, &c.* Sed & tantum thuris pondus in eiegma miscere non au deam, quod & infaniam moueat, & aliquando occidat eodem Diosco. liba. autore. Quin & in sequentibus pharmacis *ωγύανον*, id est, ruta habetur. Nusquam uero in eisdem thuris mendio sit, ut uel ex eo indicium habeamus, etiā hoc loco *ωγύανον*, & nō *λιβάνον* legendum esse. At uero sicut hoc loco *θύμιον ῥήματος* falso habetur pro *θύμιον ῥήματος*, id est thymī coma, sic infra in septimo ex ordine pharmaco, etiam *ἀνισόν* pro *ῥήματος* falso pro *ῥήματος* expressum est.

Quæ pharmaca Andromachus ad huiuscemodi affectiones conscripsit. In tertio horum pharmacorum dixi, & post semihoræ spacium, datur aquæ mulæ hemina dimidia, hoc est, *σικκίοντες ἡμισφαιρίων διδύς μελίτης ωγύανον ρ.* Sed in græco exemplari *ἀνισόν* habetur. Reliqua neminem morari possunt qui simpliciū cognitionem

gnitionem tenet. Et nos non nisi difficultum, & qui alias in Galeno non temere occurrunt, enarrationem instituiamus, & ut exemplaris tum Græci, tum Latini lectio integra in studiosorum manus perueniat. Integer enim et emendatus liber nullo ampliori commentario opus habet. Cæterum ad finem in Eugenij phar-
 macum Misyos drachmæ quatuor recipiuntur, de quo uehementer dubito an in exemplari Græco recte *μισυος φαρ. δ.* legatur, quum sit Misy ustorium & crustas infligens pharmacum, cum forti adstringendi facultate, ut uideri possit ad has affectiones intra corpus sumendum ineptum, atque adeo nocuum, nisi reliquorum mixtura intelligamus hanc eius uim mitigari. Plinius certe Misy præcipue utile tonsillis contraq; anginas & suppurata lib. 34. cap. 11. tradit, & ibidem præparandi eius rationem subiungit. Sed neq; Dioscorides, neque Galenus de usu eius ad hos affectus meminerunt. Noli tamen immutare lectionē publicā, maxime quā & uetus interpres Misyos drach. 1111. conuerterit, alias suspicio est mihi *μισυος φαρ. δ.* id est, anisi drach. 1111. eius loco esse legendū. Nam & hoc in præcedēbus habet & minore periculo q̄s usurpet. Porro Valens qui in sequēti mox pharmaco, ab Andromacho citatur, is esse uidetur, quē Scribonius cōdici pulum suum, sub præceptore Apuleio Celso fuisse cōpositione 94. testatur. Sic enim inquit: Hoc medicamentū Apuleij Celsi fuit præceptoris Valentis & nostri. Legitur tamen apud Marcellum cap. 16. loco ē Scribonio transcripto sic: Hoc medicamentum Apuleij Celsi fuit, & præceptoris nostri Valentis, quæ uerba si quis Marcellum de se scribere putauerit, longe in temporum ratione fallēs, quum Apuleius Celsus, Valensq; ac Scribonius sub Claudio Cæsare uixerint. Marcellus autem sub Gratiano & Theodosio, uelut etiam in præfatione ante Marcellum à me nuper editum indicat. Videtur itaq; mihi Marcelli lectio hoc loco, sicut plerisq; alijs rectior esse, ut uidelicet Scribonius dicat, hoc pharmacū tum Apulei Celsi, tum Valentis præceptoris sui fuisse, quanquam alias hic confusus prodendi modus, & ad uerbum transcribendi, citra auctoris nomenclationem, non parum auctoritatem Marcelli eleuet. Plinius certe li. 29. cap. 1. Vectum Valentem nouam sectā instituisse tradit, quum eam potentia ex adulterio Mes-
 salinae Claudij Cæsaris nactus esset. Valentis itaque factator Scribonius fuit.

Finis Septimi libri Commentariorum.

IANI CORNARII MEDICI PHYSICI

COMMENTARIORVM MEDICORVM IN DE-
 cem libros Galeni de cōpositione medicamentorū secun-
 dum locos conscriptorū, Liber Octauus.

In Caput Primum de Pharmacis stomacho congruis.



IN ANQVE per laxatorium medicationis ductum, citra amixtionem facultatis robur addentis, curentur: periculum incurrunt de ipsa uita.] Laxatorium medicationis ductus uariis est, & non ex una quapiam auxiliorum specie constans, quemadmodum neq; simpliciter uno aliquo modo *αἰματισ*, hoc est distensio contingit, quæ uidelicet *χέλις* est, hoc est laxationem requirit, sicut uicissim Laxitas tensionem siue distentionem, uelut Hippoc. *ἀσπυρ & οὐδὲν ὀνέγειν*, *ἡλκασε, οὐκ ἔστι τὰ πρὸς αὐτὴν*, quanquam non in cute solum, sed in ipsis etiam articulis, ambo hæc contingant. Et Laxitas quidem ex humectis immodice lig-

mentis ac tendinibus efficitur. Distentio autē non simpliciter, sed circa articulos quidem aut amplius resiccaros, aut perfrigeratos, aut inflāmatos, aut induratos. In cure vero non his solum modis, sed etiā ubi musculi intra ipsam iuxta quemcūq; modum in tumorē augecūt. Quare etiā ex carnis abundantia quibusdam sepe cutis distenditur, & in inflāmationibus hoc ipsum uel maxime perperitur. Itaq; nō una aliqua species uelut dixi. Laxatoriorū auxiliorum est, sed aliqua humectando laxant, aliqua calfaciendo, aliqua molliendo, aliqua euacuando, aliqua tumores præter naturā destruendo, aliqua uero cōiunctim ex his quēdā efficiendo. Quare & in oris uentris affectionibus & præsertim inflāmationibus requiritur laxatorius medicamentis ductus; qui sapē per olei dulcis forū, cataplasmaq; ex ordeo, & semine lini ac foeni græci in aqua mulsa coctis fieri poterat. sed ne utiquā esse hoc cōmittendum Galenus nos hoc loco docet, ut uidelicet tum stomachoy tum hepatis inflāmato, citra adstringentis ammixtionem laxantia adhibeamus: uerum per adstringentis additionē utraq; pars roboranda est, quū si hoc non faciamus, stomachici in animi deliquiū inducantur. Hepatie uero in totū interest, atq; id sola medici Methodum ignorantis culpa. Quæ autē sint quæ laxantibus ammixta, adstringendo corroborēt, ipse mox indicat, quū ea ipsa aliquos Amethodos per ignorantia etiā ammiscere dicit, uelut est absinthij coma in oleo feruēfacta, mastiche iſe chia, & aloē, ungento nardino ammixta, aut potius melino, ut magis adstringenti; quare etiā malum ipsum cotoneū in oleo decoqui in eundem usum possit. atq; hæc quū ab illis per ignorantia facultatis pharmacorū fiat, laxatorij ductus esse medicatio ab ipsis puratur, quū sit uera adstringentibus uidelicet ammixtis curatio, quam sic per ignorantia recte apprehendunt, uisaturi si talem agnouissent, utpote quam improbenī falsis Methodicorū sectæ opinio nibus additi, qui huic medicationi contradicunt, quam tamen & Empirici sua experientia ut ueram agnoscunt, & dogmatici in artis operibus custodiunt, iuxta quorum præscriptum deinceps Galenus pharmaca stomachicis apta recenset. Porro *συντασις* uox non significat contractionem, qua uidelicet laxata cōgantur & cōtrahantur, (poterat enim hoc modo uox ea accipiēda uideri, tanquam laxata contractione opus habeant, quū & cōtrahi, & distendi amplius ac explicari possunt, & ideo laxitatis & cōtractionis oppositio aliqua esse uideat) sed planē altera oppositio *ξηλασις*, hoc est laxitatis existit, significatq; distentionem ac tensionē, qualis in quibusdam ex carnis redundantia & in inflāmatis palam cernitur. Quare etiā *συντασις φάρμακα* non recte cōtrahentia dixeris, quanquam etiā ipse Linacer sic reddiderit, sed distendentia, hoc est, quæ partes laxas tendant, & quasi explicent, atq; sic accipiendum est illud quarto Metho. *τί τε γάρ ὑγραίνοντε καὶ θερμαίνοντε φάρμακα, καὶ ταῦτα δὲ τὴ συντασὶς ἀποπνέοντες* *ξηλασις*, καὶ τούτων ἕκαστον μὲν πρὸς τὸ ψυχρότερον ἀππικιζέμεν, ὅπου δὲ σφόδρὰ ὀδὸν φέρῃς δὲ συνταστικά, τὴν ἐκχυρομαχίαν ἀππίντων ὅτιν ἰάμεντα, hoc est: Humectantia enim & calfacientia medicamenta, & hæc sanē quæ recepto apud omnes uocabulo laxantia appellantur, & ex his ipsis quæcūq; paululum ad siccitatem uergunt, nondum autem manifeste & euidenter distensiuā sunt, omnium suffusi onum medelæ existunt. Cæterum *συντασις* pharmaca ualide siccantia existit, quando uelut dixi, laxitas ex humectis immodice ligamentis ac tendinibus contingit, uelut docet Galenus libro quinto simplicium pharmacorum.

Ceratū igitur quo assidue utor ex aloē, & mastiche, & cera pontica amara, atque ungento nardino constat. Componitur autē hyeme ad VIII. drachmas ceræ, uncia una mensurali Romana unguenti nardini cōiecta, Aestate autem ad VII. eadem ungenti proportionē. Hoc ceratum componi ait hyeme ad VIII. drachmas ceræ

cerae uncia una mensurali Romana ungenti nardini confecta, æstate ad VII. eadem ungenti proportionem. Videtur itaque uelle, paulo spissius hyeme parandum esse ceratum, quum drachmam cera detrahi subeat æstate, qua tamen detracta non multo liquidius euadet. Octauo sanè Methodi libro, ceræ & nardini pares partes conficere iubet, atque sic citat etiam Aësius 9. cap. 16. nimirum utriusque unciam unam conficiendam, Sed huius distinctionis de hyemis & æstatis ratione, meminit etiam Paulus lib. 3. cap. 37. qui hinc locum transcripsit. Cæterum Galenus hoc loco diligentem distinctionem inter unciam mensuralem, & ponderalem facit, quum tamen æque XII. uncia mensurales libram mensuralem, uelut XII. ponderales libram ponderalem constituunt. Fuit autem hæc mensura libree mensuralis uulgaris Rhomæ ad oleum dimetiendum, duo decim lineis in ipsam incisis, quæ singula singulas uncias indicabant, uelut Galenus cum alibi, num tertio *ἡ ἑξήκοντα* palam ostendit his uerbis *ἡ δὲ πρὸς αὐτῷ μέτρον, ὃ δὲ ἑλάνω ἐκμετρήσαντες τὴν τετρακτύα ἡράματα διακρίσαντες δὲ σύμμετρον ἔσται μέτρον δὲ ἑκάστης, ὃ δὲ ἑλάνω μέτρον ὅτι αὐτὸν λίτρα. ἡ δὲ ἑκάστη δὲ αὐτῆς ὄγκος*. Sed et lib. primo eiusdem operis æquiuoce esse ait libree appellationem ad pondus solidarum rerum & mensuram liquidam, sic inquit *ἡ ἑκάστη γὰρ ὅτι ῥωμαίων ἑκατόντα ἐστὶν ἡ λίτρα. ἡ δὲ ἑκάστη τῶν σιμάντων τῶν λίτρων μέτρον ἡ ὄγκος, ὃ πρὸς πολλὴν καὶ ὀλίγη τὴν πόλιν ἔχει ὅτις ἡ ἑκάστη γινώσκουσιν*. Quod autem non perpetuum fuerit in liquidis rebus uti uncias mensuralibus, & in solidis siue siccis, ponderalibus, uel ex hoc loco colligere est, ubi ceram appendit, ungentum uero mensura uncia accepit, de qua Aësius hunc locum uelut dixi citans consiluit, simpliciter utriusque unciam unam conficiendam dicens: Ex re autem esse ut semper in libris suis pharmacorum scriptiores id obseruent, & quas nam libras siue uncias liquidorum pharmacorum confici oporteat indicent, idem Galenus libro sexto operis iam citati ostendit his uerbis. *αὐτὸς γὰρ ἐξ ἑκῆς τετρακτύος ἡ τὰς φαρμακῶν βίβλος πρὸς ἰατροὺς ἐπὶ αὐτῇ καλεῖται βέλαια τὰς ὄγκους ἢ τὰς λίτρας ἡ ὄγκος φαρμάκων, πρὸς τὰς μετρητὰς ἢ τὰς σιμάντας, & libro primo eiusdem operis, ubi ait. τὰ δὲ ἑλάνω ἐστὶν ὅτις, ὃς ὅτι ἑκατὸν γινώσκουσιν, πλὴν δὲ κατὰ τὴν ἑκάστην, ὃ λίτρα ἐξ ἑκάστης τὸν ὄγκον καὶ τὸ ἑλάνω, καὶ ὀλίγους ὀπίσσω ὄγκους βέλαια ὄντα τὴν κατὰ τὴν ἑκάστην ἢ μετρητὰς, καὶ γὰρ σιμάντα το βέλαια καλεῖται ἡ σιμάντα, καὶ δὲ μετρητὰς τὴν ὄγκον*.

Sæpenumero iam dictum est quod Medici in more habent os uentris, ueluti Cardian; hoc est cor, sic etiam stomachum appellare. *καρδίας* uocem non de corde, sed de uentris ore ueteres medici usurparunt. Vnde sunt adhuc in medicorum Græcorum usu *καρδιαλγία*, & *καρδιασπασμός*, & *καρδιογόνος*, quibus oris uentris dolores & affectiones significantur, non ipsius cordis. Quamquam apud Hippocratem quarto aph. 65. ubi ait *ὅτι πρὸς πνεύματι πρὸς τὴν καρδίαν κατὰ τὴν ὄγκον καὶ καρδιογόνος, κατὰ*. per uocem *καρδιογόνος* quidam interpretes non oris uentris puncturam acceperunt, sed ipsius cordis motum quandam densum & uelocem ac quasi uibratum, Cardilogmon exposuerunt, uelut Galenus in commentario in eum aphorismum recenset. Quemadmodum autem *καρδίας* æquiuoce de corde & uentris ore usurparunt, Sic etiam *σίμωρον* de eodem uentris ore dixerunt æquiuoce cum illa particula quæ cibum ex ore in ipsam defert, quam sanè Latini gulam, Græci etiam *ὠσφάγον* appellant. Gula enim proprie *σίμωρον* Græcis appellatur, cuius principium idem *ὠσφάγον*, & postremum item *σίμωρον*, idest os uentris dicunt, quod Plinius undecimo capite trigesimo septimo ostendere uolens: Summum gulæ fauces uocantur *ὠσφάγον*, postremum stomachus, sed tamen non satis clare distinxit *ὠσφάγον* fauces appellando, quæ *ὠσφάγον* appellatione ueniunt, uelut alibi indicant.

Sed Budæus tamen si nihil cōstituat, tamen legendum putat, uelut hircus uel tragos, aut ueluti hircosum tragonta, ut scilicet latīna uox per græcam exponatur, quum strabonem recte legi posse uideatur, ut uidelicet hircosus & strabo morbos esse accipiantur, non morbosum autem esse os alicui olere, quū hoc ex ingluuie ori accidat. quo loco certe non recte illuuiē pro ingluuie legendum ratiocinatur, ex eo quod ingluuiēs non oris est, sed illuuiēs quæ græcè ut ait, ἐλυνία dicitur. Nam neq; illuuiēs, quæ ἐλυνία itemq; ἐλυνία græcis medicis frequenter dicitur, oris proprie est, sed totius corporis, & τὴ ἐλυνίᾳ planè τὸ λῶν opponitur, sed de totius corporis illuuiē, & à balneis abstinentia usurpatur. Sic Galenus in consilio comitali puero scripto, ἐλυνίᾳ δὲ πρῶτικα inquit, τὴ πικρὰ, καὶ πᾶς πικρὰ ἀπορρίπτει μὴ ἰδὼν ὅστις γίνεται μετὰ τὸ γινώσκειν, hoc est à balneis abstinere cōuenit, &c. ut certum sit non illuuiē hic legi posse, sed omnino uelut lex habet ingluuie, legendum esse, ex qua ori foetorem accidere magis euidentius est in crapulosis & gulae deditis hominibus, quàm ut demonstratione opus habeat. Quare si ori accidere legis, & non oris uocem ad inglutiem retuleris, integram habebis legis sententiam; quam rem ut Budæus non assequeretur, nōminum ac uocum studium fecit, ad quod se conuertit rerum æstimatione relicta, uelut multis alijs locis, sed non uocat nobis, & præter institutum est talia persequi.

Fiunt autem & morsus quidam in ipso, quema dmodum etiam magnæ fames & anxiosæ affectiones. Anxiosas affectiones hic dixi τὴς ἀνάσας ἀσθενείας à Galeno appellatas. Indicaui autem præcedente libro ἀνάσας duplici modo ægros fieri, ut hic non sit necesse repetere, priore modo hic accipimur, & infra cap. 1. à principio ubi dixi, & quandam ægre tolerabilem anxietatē habet, & paulo post, quibus iustus eiusmodi cum molestia quadam & anxietate & subuersione contingunt. Est enim in Græco primum λυσιπτα δύσφορος ἀπὸ ἰχθ. Deinde ἰδὼν ἰπὸν καὶ πικρὰ καὶ μετὰ δύσφορίας πινεῖ καὶ ἀσπὶς καὶ ἀσπὸς καὶ γίνεται. Sic etiam apud Paulum libro primo capite trigesimo octauo ubi ait, ἀποτρέμει δὲ αὐτὸς ἐπὶ ταῦτα ἀσθενείᾳ λαφελῶντι βαρύνοντα καὶ ἀνάσας γίνεται, hoc est anxij redduntur uarietq; se tactant, corporis uidelicet facultate ob seminis multitudinem aggrauata. Sic item apud Gale. 6. Metho. λῶν δὲ λευκὴ ἐπὶ τριπλῇ ὁ πικρὸς, ὅπως μὴ ἂν τὴ γέννηται, μὴ λῶντος αὐτὸς σκεπιδίῳ τὸ μείον, hoc est, ne qua anxietas oborietur. Verum posteriore significatione, pro nauseabundis uidelicet, ex oris uentris per uisidos humores morsu, Galenus infra capite tertio in pastilli Amazonum declaratione accepit, ubi inquit, ἢ ἀσπὶς ἢ μὴ αὐτὸς αὐτὸς ἢ τὸ σῶμα ἢ καὶ ἰδὼν, hoc est, aut nauseæ calidæ sensus circa os uentris contingat. Et Dioscorides libro secundo de Lapatho. πινεῖται ἀφελόμεν μὲν ὑδατὶ ἢ αἵνῳ πρὸς ἀσπὶς σμάχου, id est, ad stomachi nauseam. & eodem libro cepas, hoc est, τὴ λεγόμενα, ἀσπὶς dixit, hoc est nauseabundas. Et sic sane multis alijs locis accipitur. Hos autem indicare uolui, ut utriusq; significationis tum ἀσπὶς, tum ἀσπὶς uocis, usus clarius redderetur, qui ab omnibus ferè Græcorum medicorum interpretibus penitus est confusus & obscuratus.

In Cap. 11. de Confectionibus stomachicis Andromachi.

Qui uero per solam experiētiam auxilia accumulāt, ipse suam fortuitā occasionē expectat, & à prioribus tradita re legit. Galenus his uerbis incertitudinē Empiricæ sectæ indicat, duasq; præcipuas empirices species proponit; quarum altera ex fortuita occasione quā τὴς πρῆξιν dicitur proficiscitur, Altera ex relectione & repetitione eorū quæ priores ex propria inspectione prodiderūt, atq; hæc pars μιμησις, hoc est, imitatio appellatur. Est autē et tertia species extempo-

ralis, hoc est, *ἐμπειρική* dicta, quando sua sponte ad experimentū faciendum progrediunt. Verū quando hæc secta uel in primis hodie regnat, & ab ignorantibus etiā ipsam colitur & exercetur, quo eius sectatores se suāq; bona cognoscāt, omnem Empiricēs eiusq; partium originem ex Galeni lib. de sectis adscribam: Empirici inquit, artem hoc modo conflatam esse aiunt. Quum multas uiderent affectiones, tum sanis, tum agris accidere, partim sua sponte, uelut sanguinis ex naribus fluxum, aut sudores, aut alui profluvium, aut aliud quicquam tale, damnum uel commoditatem afferens, non tamen efficientem causā, sensibilem habens: partim uero ex apparente causa, nō tamen ex nostra uoluntate, sed ex contingenti, uelut exempli gratia, cōdigūt alicui ex casu, aut plaga, aut aliter sauciato, sanguinem manasse, & ut appetentiæ gratificaretur in morbo, frigidam aquam, aut uinum, aut aliud eiusmodi bibisse, quæ singula aut in utilitatem aut damnum cesserunt. Priorem igitur speciem commodantium aut lædentium naturalem uocabant, secundam contingentem & fortuitam. Vtriusque uero primum conspectum, occasionem fortuitam appellabant, *ἐπιτηδεύματα* Græce dicunt, propterea quod inconsulte & ex improviso in eiusmodi res inciderent. Et talis sane est species experimenti per fortuitam occasionem, quæ *ἐπιτηδεύματα* ab ipsis Græce appellabatur. Altera uero extemporalis est, quando uolentes ultro ad experimentum faciendum progrediuntur, aut somnijs impulsī, aut alio quopiam modo ad opinionem inducī, hæc *ἐμπειρική* uocatur. Quin & tertia Empiricēs species est *μιμητική*, id est, imitatoria appellata, quando id quod aut naturaliter aut contingenter aut extemporaliter profuit aut nocuit, rursus in iisdem uitijs, in experimentum assumunt, atq; hæc species uel maxime ipsorum artem constituit. Non enim his aut ter solum, sed sæpius id quod prius iuuit imitantes, deinde in iisdem uitijs idem auxilium facere reperientes, eiusmodi memoriā ut plurimum speculationem appellant, et certam iam artis partem existimant: postquam uero multæ eiusmodi speculationes ab ipsis fuerant coaceruatae, tota hæc congeries Medicina ipsis erat, & ipse coaceruator, Medicus. Appellabatur autem eiusmodi congeries græce *ὠπεία*, hoc est, propria inspectio, memoria quidam existens eorum quæ sæpe & eodem modo uisa sunt. Ipsam uero traditionem historiam uocabant. Idem enim obseruanti *ὠπεία* est, obseruatum uero discendi, historia. Hactenus Galenus. Quod itaq; conuerti, & à prioribus tradita relegit, in græco est, *κρίσιν τῶν ἐμπειρῶν ἰστορίαν ἀναλίσκοντα*. Ipsa enim traditio historia appellatur, uelut Galenus aperte declarauit.

Secundam à præscripta compositione Andromachus sic ad uerbū tradidit. In hac compositione ad finem habetur. In uulneribus & inflammationibus dilutum aceto mulso imponitur, hoc est, *ὡς δὲ τῶν τραυμάτων ἢ φλεγμονῶν διδόν, μὲν ἰσομελὲς πινά ἀπὸ πεδάθρου*, sic enim legendum existimo, sed græcum exemplar habet. *ὡς δὲ τῶν τραυμάτων ἢ φλεγμονῶν διδόν ἰσομελὲς πίνες ἀπὸ πεδάθρου*. De esset itaq; liquor quò pharmacum diluendum sit, ut crassitudine aceti mulsi imponi possit. Quare ego pro *πίνες* lego *πινά*, & intelligo simpliciter aceto mulso dilutum pharmacum impositum facere ad uulnera & inflammationes, quemadmodum sequitur idem pharmacum in oculorum inflammationibus succo mentæ, aut calaminthæ, aut solani dilutū ac impositum facere. Sequitur mox eodem pharmaco sicco ad unguinum abscessus, *στυμνοχίτης* græci uocāt, utendum esse, & ad sanguinis eruptiones succum cum aceto, & ad crustas in ore ex passio gargarisandum esse, sed græca lectio corrupta est, quā sic restituendā censeo. *χρὲ δὲ ἢ ὡς πτυμνοχίτης φάρμακον μόνον σὺν εὐδίνῳ, ὃ πρὸς ἀποφθάζει φάρμακον σὺν ἴσῳ, ἢ πρὸς ἀρχίαν ὃ εὐμαρ, ὃ γλυκὺ ἀνακατασκευάζοντα πινά*. Describunt autē græci medici

παρυγχία ἀπὸ τοῦ ῥιζῶν τοῦ ὄνυχος συνιστάμεται, hoc est paronychia est abscissus circa radicem unguis consistens, Latini reduvias appellant.

Ad stomachicos hiera Antipatri.) Ad finem huius hieræ dixi: Vtere arido trito quemadmodum alijs. Verum in græco habetur *χρῆ λείον σπῆνδον ὡς αὐτὸ Πλάτων*, nulla evidenti sententia, quare legendum puto, aut *ὡς αὐτὸ τοῦ ἔλαιου*, quemadmodum conuerti, aut *ὡς ἡδὴ τοῦ δὲ ἔλαιου*, hoc est, utere arido trito, quemadmodum in alijs ex hoc compositis est dictum.

Stomachica Galli affectioni quæ calferi & secari postulat utilis existit.) In græco sic habetur. *σπαραχὰ γάλακτι διερμαίνονται καὶ οἱ τρυφῶντες ἀσθῆσι χρίσιναι δύνανται*. Videtur itaq; deesse uerbum *χρῆσθαι*, quod ante uocem *ἀσθῆσι* insertum sententiam hanc efficit quam ego reddidi. Cæterum quod de Alcetio sophista ad hanc compositionem adiectum est, quod uidelicet acetæ sextarios sex, & mellis libras duas conijciat, in Græco exemplari *καὶ ἴσως. f. s.* hoc est acetæ sextarij dimidium habetur, quæ mensura ut nimis exigua tot rebus in ipsa macerandis ac coquendis, à me reprobata est, maxime quæ duæ libræ mellis addendæ præcipiantur. Quare pro *f. s.* lego. *f. s.* quæ tamen mensura si cui nimis uideatur, quantum omnino satis uidebitur is qui paraturus est medicamentum conijciat, habita affectionis & hominis qui usus est ratione. Fuit autem facilis exscribentis lapsus ut pro *s.* caractere numeri senarij, supponeret *s.* caracterem, medietatem cuiusq; rei cui additur significantem.

In Cap. III. Stomachica phar. ab Asclep. in 1. interiorum conscripta.

Confectio ex fructibus, facti ad stomachi subuersionem.] Galenus supra lib. 6. cap. 1. Pharmaci ex fructibus meminit, quod ad oris inflammationes, tum illitum, tum gargarissatum commodet, de cuius compositione inquit, dicitur paulò post, quod ipsum tamen ab eo libro sexto factum non est, sed ut credo in hunc usque locum dilatum, quo oportune ad stomachicos item commodum idem pharmacum ex Asclepiade tradit. Recenset autem duas ex fructibus confectiones, in quarum prima fructus ex aqua coquuntur, & postea ad expressum liquorem mel additur. In secunda uero fructuum coctura in musto sit, ad cuius expressum liquorem nihil mellis additur. Verum de quo dubitari poterat, hoc est, in prima confectione aquæ congij septem leguntur, hoc est, *χρῆς* quæ nimis uideri queat mensura, maxime quum typographus eam fecerit aliterisco adiecto suspectam, sed ego omnino rectam iudico lectionem. quum enim ad tertias coctura liquoris à fructibus reiectis expressi redigi debeat, supererit ex toto sextarij 14. cum quibus adhuc postea quatuor mellis libræ permixtæ coqui debent, donec spissetur medicamentum. Ad eundem autem modum & in secunda confectione, Musti sextarij 48. accipiuntur, qui congios octo efficiunt, aut amphoram unam. Est enim congius sextariorum sex, & amphora sextariorum 48. uelut etiam alibi indicaui. Habet porro & Plinius medicamentum ex fructibus compositionem, quam oporicen uocat, sicut hic, *δὲ ὀπωρῶν* appellatur, quam confectendi cū hac posteriore gratia adscribendam duxi, ex lib. uigesimo quarto cap. 14. in hæc uerba. Vnū etiamnum arborū medicinæ debetur nobiscum medicamentum, quod oporicen uocant. sit ad dysentericos, stomachiq; uitia, in congio musti albi, lento uapore decoctis malis cotoneis quinque cum suis seminibus, puniceis totidem, sorborum sextario, & pari mensura eius quod Rhyn Syriacum uocāt, croci semuncia. Coquitur usq; ad crassitudinem mellis.

Catapota ad stomachi subuersiones Origeniæ.) In his Catapotijs palmarum passæ parati græcis dictæ habentur, quæ quales sint alio loco declarauī.

Ait enim ardori stomachi ipsum conuenire, & propterea sitim extinguere (statuatur, unde etiam adipson graeci appellant.) *ἑδύωρ* uocant graeci quod sitim arceat, quanquam etiam simpliciter quod sitim non facit, *ἑδύωρ* appellent, atque haec gemina significatio etiam plerisque alijs est, quae eandem compositionis formam habent, uelut sunt *ἑδύωρ* & *ἑδύωρ*, & *ἑδύωρ*, quemadmodum alibi ostendi. Dicitur & *ἑδύωρ* ἀντὶ τῆς *ἑδύωρ*, quemadmodum paulo ante hunc locum Galen. dixit. *ἡ δὲ ἑδύωρ ἀντὶ τῆς ψυχρότητος τῆς διαθεσεως εἶναι πρὸς τὸ τὸ καμνόντες ἀδύωρ, ἢ ἑδύωρ*, hoc est, sufficiens signum est frigidae affectionis, si aeger se non sitire percipiat. hic enim pro non sitire, & sine siti esse, & plane pro adipsia accipitur. Verum in praesenti catapodio adipso appellato, *ἑδύωρ* uox sitim extinguens significat. Quemadmodum autem *ἑδύωρ*, hoc est non sitire, hoc est, *ἡ ἑδύωρ* frigiditatis signum esse Galen. dixit: Sic Hippocrates celeberrima sententia, *ἡδύωρ ἀντὶ τῆς ψυχρότητος* est, pronunciauit, hoc est. Non sitire innoxia res est, & quae correctionem non requirit, quam sententiam etiam Plutarchus in libello de utilitate capienda ab amico citauit. Non solum, inquit, *ἡ ἑδύωρ* uelut Hippocrates ait, sed silentium quoque ubique innoxium est. Ad eandem quoque sententiam respexit Dioscorides lib. 5. ubi de facultate uinorum agens ait. *καὶ τὸ μὴ δύωρ δὲ ἕρπυς ἐστὶν ἀντὶ τῆς ψυχρότητος*, hoc est. Non sitire est optimum praeconium.

Fugienda itaque sunt haec duo pharmaca ex Chrysobalano & radicis mandragorae cortice composita.] Haec duo pharmaca improbat Galenus, & fortassis propterea etiam in tantum aucta pondera expressit, ut per eorum copiam usuros ipsis auerteret. Nam uetus interpretes in primo pharmaco uncias pro libris uertit, In secundo drachmas cum pro libris, tum pro uncis reddidit, sed quando eorum usum ut dixi, improbet Galenus, non est quod simus curiosi de ponderibus & componendi ratione. Sequitur tamen paulo inferius item Asclepiadae pharmacum in quod etiam chrysobalani recipiuntur, quo quis securius utique ueretur, ob reliquorum quae adduntur ipsis praestantiam ad earum malitiam corrigendam. Videntur autem Chrysobalani non esse aliud quam balani myrepiscae, hoc est, glandes ungentariae appellatae, quanquam Chrysobalanum libentissime crediderim non esse aliam quam nucem molchatam hodie appellatam, quam myrobalanorum generis esse me suspicari, alio item loco ostendi. Ad stomachica autem pharmaca ab Asclepiade assumptos esse ob id crediderim, quod habeant qualitatem amaram cum aliqua adstringendi facultate, ob quas & extergere, & secant, & condensant, ut stomacho debili & nauseabundo non sint ineptae putandae. Reprobare uero easdem Galenus propterea uidetur, quod uomitum ciunt, & drachmae pondere cum aqua multa potatae non solum uomitum mouent, sed saepe etiam aluum subducunt, uelut idem Galenus lib. 5. simpl. pharmacorum tradit, & Dioscorides libro quarto. Mandragoram porro ob nimiam frigiditatem, per quam etiam soporem inducit, improbare apparet, quanquam cortex radicis non solum fortiter refrigeret, sed etiam resiccat, ob quas tamen facultates cum Asclepiades in stomachica medicamenta probauit.

Iuxta hanc itaque rationem Hippocrates in pleuritidis purgatiuum exhibet.] Hic locus est apud Hippocratem lib. 2. de uictu in morbis acutis, & isthic à Galeno in commentarijs abunde declaratur, sicut & hic, quantum intelligendis Hippocratis uerbis ab se citatis satis est, adiecit.

An uero & ob nimiam euacuationem fiat singultus, uelut etiam conuulsio dignum consideratione est.] Meminit Galen. hoc loco aphorismi Hippocratis ex sexta particula trigessimoni in quo passim contineri in omnibus. ferè exemplaribus ait, quod conuulsio fiat aut ex repletione aut euacuatione, sic & singultus; atque ita etiam

etiam ipse in sexto commentariorum in illum ipsum aphorismum legit & exponit. Sed hanc questionem quam hic proponit, an uidelicet ob nimiam euacuationem fiat singultus, tum isthic, tum hoc loco indeterminatam relinquit. isthic qui dem permittens singultum appellari stomachi conuulsionem, quanquam potius sit motus quidam eiusdem ut ipse ait cum uomitu genetis, uerum incertior & uer hementior illo. Verum quinto libro aphorismorum Hippocratis expositionis, in huius aphorismi expositione quarti ex ordine, in nimia purgatione conuulsio aut singultus succedens malum: uidetur planè concedere singultū ex nimia euacuatione fieri, nempe qui nihil aliud sit q̃ stomachi conuulsio, οτι δὲ καὶ ὁ λυγμός inquit, αὐτομὸς ἐστὶν οὐκ ἔστιν ὅτι ἡ πικρὰ ἀποτὶναι γινώσκουσιν δὲ πικρὰ. Quomodo autem conuulsio ex nimia purgatione siue euacuatione fiat, in expositione eiusdem libri supra primum aphorismum Galenus abūde ostendit, ubi Hippocrates dixit, conuulsio ex ueratro mortalis.

Antidotus hiera, id est sacra Themisonis. In hoc pharmaco habetur, aridum ut ne trāspiret seruato, hoc est φάλαττι ξυρόν καὶ ἐδάπνδυσον. Sed in græco exemplari δάπνδυσον habetur. Significata autem ἐδάπνδυσον, quod contextum seruatur, ut neque à uento aut aere lædi possit, neque exhalare & in acrem transpirare. Cæterum in græco paulo post legitur, ἐφ' ὧν οὐρα λυνῶν πιδόξμεθα, legendum est enim πιδόξμεθα, hoc est, quibus urinam ciere uolumus. Deinde autem habetur. Est medicamentum insperfile in pulueris ac farinæ formam redactū, quod totū in græco dicitur. ἐστὶ δὲ κατὰ πικρὰ. Significat itaq; κατὰ πικρὰ pharmacū insperfile & puluerosum. Sic infra libro nono, capite primo, huius operis habetur. ἀλλο κατὰ πικρὰ, ἀγχοῦς λαστίτης καλ. ε. δὲ δ' αὖ μετ' ὕδατος ποτίμεται πίνων. hoc est, aliud insperfile pharmacum. Anchusam tenuissime tritam cum aqua potabili bibendam dato. Non solum autem pro insperfili in potū pharmaco, sed quod etiā corpori utcumque inspergitur, κατὰ πικρὰ apud omnes græcos medicos accipitur. Sic Actius duodecimo, capite quinto, farinam lupinorum ægro in balneo super exudatoria tabella prostrata inspergendam ἰχμαθίου κατὰ πικρὰ uocat. Talia etiam κατὰ πικρὰ itemq; πικρὰ ματα ac δισπασμὰτα appellantur. Plinius uigefimo primo, capite decimono de rosa, diapasmata inde fiunt ad sudores coercendos, ita ut à balneis inarescant corporibus, deinde frigida abluantur. Sic enim legēdum puto, ut sit quod Dioscorides dixit. καὶ οὕτως δὲ καὶ πικρὰς ἐν δισπασμοῖς ἐν συγχύσμασι μετὰ τὸ λουτρὸν. καὶ μετὰ τὸ ξυρῶν θῆναι, καὶ ἐκλουσθῆναι ὑδατὶ. Idē Plinius 3. cap. 2. Siccis inquit, odoribus constant quæ diapasmata uocantur. Diosc. lib. 1. de Agallocho, καὶ δισπασμὰ δὲ διον σάμας ἐστὶν. Martialis poeta libro 1 ubi ait. Quid q̃ olet grauius mixtū diapasmate uirū. Diapasma siccos odores qui in passillos inspergebantur dixit, ante enim dixerat. Passillos Cosmi luxuriosa uoras. Quanquam uideri poterat ipsos passillos diapasma dixisse. Porro de cataplasmatis etiam alio loco mentionem feci.

Asclepiades reliquorum singulorum singulas uncias ammiscuit, hoc est drachmas argenteas octo, aut septem & dimidiam. Galenus hoc loco aperte ostendit, quod etiam alibi dixit, unciam ab aliquibus drachmarum VIII ab alijs VII & dimidia censeri. Sicut ab alijs rursus septem tantum drachmarum esse traditur, uelut libro quinto, πῶς ἔστι γὰρ ἰδὲν πρόδιδι his uerbis. καὶ τὸ ἐν γένει οἱ πικρὰς ἐστὶν ἡ καὶ ἡμεῖς δισπασμῶν ἐστὶν φαρμακῶν ἐστὶν ἡ μόνον, ἡ τοῖς ἡ. Sequitur mox: ad tardas enim concoctiones drachmam unam dari iubet, cum aquæ frigida cyathis quatuor. Opinor autem ipsum dicere drachmam argenteam, sic enim ferē recentiores medici appellare in more habent: facit his uerbis Galenus palam distinctionem inter drachmam argenteam, & atticam seu cōmunem & medicam.

Drachmam itaq; argentream hoc loco subdit, plane idem esse quod Denarius est Rhomanis, quorum septem unciam constituunt iuxta Celsum & Scriboniū, uelut alibi dixi. Drachmæ uero atticæ siue medicæ octo, unam unciam pendebant. Quamquam si diligenter hæc uerba expendimus, uidemus Galenum plane sibi ipsi contradicere. Primum enim unciam drachmarū argentearū octo, aut septem & dimidiæ dixit. Iam uero drachmam argenteā idem quod Romani Denarium, se reliquosq; omnes appellare ait. Quare prior locus mihi est suspectus, & si hæc distinctionem uncie in septem drachmas argenteas siue Denarios integram habere uolumus, nō erit legendū, *ἡ ὀκτωδραχμὴ ἢ ἑπταδραχμὴ μίση, ἑπταδραχμὴ ἀργυρεὴ ἢ ἑπταδραχμὴ* u. *ἢ ἑπταδραχμὴ*. sed pro *ἢ* substituendum erit *ἢ*. hoc est, non octo drachmæ argenteæ ad unciam constituendam legendæ erunt, sed septem, ita ut *ἑπταδραχμὴ ἀργυρεὴ ἢ ἑπταδραχμὴ ἡμῶν* legamus: aut certe nō *ἑπταδραχμὴ ἀργυρεὴ*, sed simpliciter *ἑπταδραχμὴ* *ἢ* legendum est. Sed nolo tamen quicquam asseuerantius hac parte adstruere, quum promiscuus fuerit usus Rhomæ medicinam exercentibus græcis, ut modo in septem, modo in septem & dimidiam, modo in octo drachmas unciam diuiderent, & maxime quum ipse Plinius hanc distinctionē inter drachmā atticā & argenteā siue denariū argenteū nō obseruari: libro enim uigesimo primo, capite ultimo inquit, Drachma attica (fere enim attica obseruatione medici utuntur) denarij argentei habet pondus. Et Marcellus in ponderibus operi suo præmissis, Denarius argenteus inquit, est drachma una, quod facit scrupulos tres. Sed & Galenus se opinari dicit ab Asclepiade drachmam argentream indicari, quæ eadem est cum Denario Rhomano, ut uel hic unus locus suffragio esse possit his qui unciam octo denariorum apud Rhomanos, uelut est octo drachmarum græcis, esse tradiderunt: Quum enim dicat Galenus drachmam argentream idem esse quod denarium Rhomanum, & supra dixerit unciam octo drachmarum esse, consequens est etiam unciam octo denariorum esse. Quod autē hoc loco non multū referat attica an argentea drachma exhibeatur, uel ex eo clarum sit, q̃ Galenus hoc pondus ut minimū, nulla ratione ab Asclepiade proditum dicat, quum ad drachmarum sex pondus exhiberi queat: *δύοις* inquit *ἢ ἑπταδραχμῶν*. hoc est dosi ad drachmas sex progrediete. Legitur tamen *ἑπταδραχμῶν* corrupte. Sicut etiā paulo post corrupte legitur, *ὅτι καὶ ἡμῶν τὰ ἑπταδραχμῶν καὶ ἡμῶν ποσὶν ἐστὶν οὐρα καὶ τὰ ἑπταδραχμῶν* &c. nulla enim reddetur sententia nisi pro primo *ἑπταδραχμῶν* legatur *καὶ ἡμῶν*, ut sit sententia. Ita enim & distributionem ac delationem ex uentre in urinam deducit, & quæ circa &c. Nisi potius pro *ἡμῶν τὰ ἑπταδραχμῶν* legendum est *ἡμῶν τὰ ἑπταδραχμῶν*, ut tota periodus sic legatur, *ὅτι καὶ ἡμῶν τὰ ἑπταδραχμῶν καὶ ἡμῶν ποσὶν ἐστὶν οὐρα, καὶ τὰ ἑπταδραχμῶν μάλιστα συντελεσθῆναι ἡμῶν* hoc est. Ita enim simul & quæ circa distributionem & delationem ex uentre in urinā, & quæ circa uteros instāt, secar ac dissoluit, quomodo sanē sententiā

Aster in exuperabilis. In hoc pastillo habetur. Similiter etiam his (reddidi, quæ ab utero suffocatur auxiliatur, quod in græco est, *ἐπιπλοὶς καὶ τὰς ὑπερπλοὶς πρὸς τοὺς βλάστους*. Verum *ἐπιπλοὶς* pro *ὑπερπλοὶς* legendum est. Plinius hoc malum uulnam conuersam, & uulnæ cōuersionem appellare solet. Sic libro septimo, capite 52 de his qui elat reuixerūt. Fœminarū, inquit, sexus huic malo uidetur maxime opportunus, conuersione uulnæ, quæ si corrigatur, spiritus restituitur. Paulus libro tertio, capite septuagesimo primo sic describit, *ἡ ὑπερπλοὶς πρὸς τὴν ἀσπὴν* hoc est, uterina suffocatio est ipsius uteri ad superna decursus, agēs in affectionē per cōsensum particulas principalissimas, uelut caronidas arterias, cor, & cerebri membranas. At uero descriptio pastilli huius aliquantulum uariat ab eā quam

ab ea quàm Aetius 9 capite decimo; & Paulus 7 cap. n. tradunt, ex collatione tamē integram descriptionem quis cōficere possit, nos nihil immutauimus à præscripto exemplaris, tantum hoc quod habetur τὸ σῶμα καὶ τὸ σῶμα, legendum putamus, ἡ σῶμα καὶ ἡ σῶμα, quemadmodum etiam reddidimus. Nisi diuinitas uoces putare uelimus, quæ nobis ob ἀποκρίσεις minime placent.

In cap. IIII. Quæ Archigene in 1 pharmacorū secundum genus prodidit de affectionibus circa stomachum.

A Principio mox huius capituli, exemplaris graeci lectio uitiata est, quam tamen omnino eo quo sententiam reddidimus, modo restituendam censemus. Sic *ἡ δὲ ἀρχὴ τῶν ἐντολῶν πολλῶν καὶ πεντήκοντα ὄντων, καὶ τῶν ἁγίων ἀποστόλων ὡς ἐπίσκοποι ἐκτελέσαντες, καὶ τὸ ὅλον αὐτῶν ἀποστασάντων, καὶ πλεονάζοντων ἡ δὲ λαοὶ ἀκούσαντες, ὡς πολλοὶ ἀνέστησαν, μετὰ δὲ ὄντας τοὺς καὶ ἀνέστησαν, ἀπὸ τῆς ἀρχῆς. καὶ δὲ ἐκτελέσαντες, ἀπὸ τῆς ἀρχῆς.* Ex hac enim lectione sententia sequetur à nobis expressa: ex illa uero quam uulgatū exemplar habet, nulla alia erui potest q̃ hæc ipsa, sed tamen locis prius, per typographum ueram lectionem non affectū corruptis, restituis. Sed adscribam etiam ipsam corruptā lectionem, ut ex collatione appareat, typographū à uera lectione delirasse. *ἡ δὲ ἀρχὴ τῶν ἐντολῶν πολλῶν καὶ πεντήκοντα ὄντων, καὶ τῶν ἁγίων ἀποστόλων ὡς ἐπίσκοποι ἐκτελέσαντες, καὶ τὸ ὅλον αὐτῶν ἀποστασάντων, καὶ πλεονάζοντων ἡ δὲ λαοὶ ἀκούσαντες, ὡς πολλοὶ ἀνέστησαν, μετὰ δὲ ὄντας τοὺς καὶ ἀνέστησαν, ἀπὸ τῆς ἀρχῆς. καὶ δὲ ἐκτελέσαντες, ἀπὸ τῆς ἀρχῆς.*

Verum ructu acido affectis coriandrum cochliarij mensura ante reliquum cibum edendum dato, & merum insuper bibendum.) Ructu acido affectos *ἀσπυγίους* dixi. Est enim *ἀσπυγίος* vox, ex *ἀσπυ* & *σπυγῶν*, id est acidis ructibus composita, quum sint etiam *ἑσπυγίους* *ἀσπιδ*, ructus non acidi, sed nidorosi, quos *ἑσπυγίους* greci dicunt: sunt autem utrique ructus, ex corruptione ciborum in ventriculo. In calidioribus & biliosioribus natura, & qui uentriculum calidiorem habent, ac calidis ac biliosis excrementis refertum, nidorosi. In frigidioribus uero & pituitosis, & qui frigidiorē uentriculum habent, frigidaq; similiter in ipso excrementa acidi siue acescentes.

Aut nuces pineas XX. & feminis cucumeris grana XXV. baccas myrti XX. croci obolum dimiditū, & rosarum duarum folia, ex aqua hibenda exhibeto. In graeco exemplari huius medicamenti lectio corrupta est. Deest enim foliorū rosarum numerus, & pondus croci obolorū duorum, nimirū ad reliquorum portio nem uidetur. Sic enim legitur, *βρώσιον ὀβάλος ε. ρόδων φύλλα μετ' ὀβάλος διὰ πέντε*. Quare hac parte ueterē interpretem secutus, sic legēdum puto, quemadmodum etiam conuertit. *βρώσιον ὀβάλος. καὶ ε. ρόδων φύλλα μετ' ὀβάλος*.

Porro his qui salivam multam in stomacho aggregarunt, aridam conyzā manducandam dato. Et hoc unum ex stomachi vitium est si salivofus est, multa videlicet pituita salivofa in ipso aggregata, *σπαιμώδης* græci hoc vitium vocant, & hoc modo affectos *σπαισώτες*. Meminit etiam Paulus lib. 3 cap. 37.

In cibo stomachicis conveniunt. Supra capite 2 per longum recensuit Gale-
nus, quor & quibus stomachi utiqs appellatio stomachicorum accommodetur.
Verum veteribus stomachici proprie appellantur, qui cibum continere nō pos-
sunt, sed reuomunt, uelut Aetius lib. 9 & Paulus 3 cap. 37 testatur. *ἄσθμα*, in-
quit Paulus, *ἡ ἐκ τῆς γαστρὸς τῆς τροφῆς, ἢ ἐκ τῆς ἐν τῇ πύλινῃ ἐναισθητικῇ ἀναμάχῃ*. Cae-
terum hoc loco Archigenes cibos stomachicis, commodos enumerat, atq; inter
hos etiam melapira habentur. Sūt autem Melapira mala, quæ & malorum & piro-
rum aliquam speciem præ se ferunt, unde etiam nomen habent ex pomis & piris

compositum, atq; hoc est quod Plinius dixit lib. 15. cap. 14. Cætera è caussis traxe-
re nomen, germanitatis coherentia & gemella, nunquã singula in foetu, coloris
serica, cognationis melapia. Neq; enim accipiendum est melappia, (sic enim fere
in omnibus exemplaribus legitur) cognationis nomen à gente uel familia accep-
pisse, sed à cognatione quàm ea ipsa mala ad pira habent. *ἐμπερ* enim pirum est
græcis, quemadmodum *μᾶλον* malum siue pomum. Quod autem neque Plinius
ipse aliter quàm melapia scripsit, & sic ut dixi, accepit, ex eo clarum est, quod in
præcedentibus Appianorum malorum mentionem fecit, quæ ex Appio è Clau-
dia gente sunt cognominata, & melapiorum nomen non ex gente, sed ex caussa
cognationis, hoc loco tractum esse ait. Cæterum & is ipse locus de Appianis ma-
lis corrupte legitur. Eum uero partim alibi in his commentarijs explicauit ac resti-
tuit. Nunc autem totum integrum, uelut legendum existimo, adscribam. Ergo ha-
bent originem à Matio, Celtioq; & Manlio, item Claudio. Quin & cotoneo in-
fuso ab Appio è Claudia gente, appiana sunt cognominata. Porro hoc Archi-
genis loco paulò post, teneri lentisc, aut myrti, aut rubi ramuli habentur; sed pro
myrti, id est *μυρτίνος*, in græco *σμήρνος* expressum est, quemadmodum paulò post
etiam *ἐπεσθιμιαπύρ* pro *ἐπεσθιμιαπύρ* legitur. Sequuntur mox inter olera enume-
rata *μεκωνίδες*, quas ego meconides lactucas conuertit. Appellat enim meconis
quoddam lactucæ atræ genus, à copia succi ac lactis saporiferi, similitudine quadã
ad meconium, hoc est papaueris succum, *μίκων* enim papauer græcis dicitur. Sed
de hac re Plinij uerba adscribam, quum non temere apud græcos medicos *μικ-
ωνίδες* uox occurrat. Plinius 19. cap. 8. de lactucis. Est etiamnũ alia distinctio, atræ
quæ meconis uocatur, à copia lactis saporiferi, quanquam omnes somnum pa-
rere credantur. Apud antiquos Italiæ solum hoc genus earum fuit, & ideo lactu-
cæ nomẽ adeptæ. & rursus libro 16. cap. 7. Et amara lactensq;, quam meconidem
appellauimus. Sic enim eo loco legi debet. Reliqua animalium, uolucrum, ac pi-
scium genera in hac diæta stomachicorum ab Archigene enumerata, ex Aristo-
tele quarto de animalium historia, & Galeno secundo de alimentis, ac Plinio per-
tere potes.

Deinceps post præscripta Archigenis de fame ingenti, bulimo græcis appella-
ta, (itemq; de singultu prodit quæ sequitur.) *βούλιμος* græcis (ingentem famem
significat, quæ tamen non usquequaque perdurat. Nam qui sic affecti sunt, re-
pente animo linquuntur, cum extremarum partium perfrigeratione, & spiritus
defectione. Compositio uocis ex *βού*, intensiua particula est, & *λίμος* constat; quo-
modo humastus uua apud Plinium, mammarum modo tumens, & humelia a-
pud eundem fraxinus in Macedonia amplissima lentissimaq; appellatur. Neque
uero idem malum est bulimos & caninus appetitus, de quo supra capite secundo
huius libri Galenus meminit. Caninus enim appetitus, hoc est *ἀρεστής βουβήσις*, et
tiam esuritionem magnam excitat, sed ut sic affecti plurima edant, & grauati ma-
ximè paulò post uomant, atque sic se leuent, rursusq; expleant, ac rursus ad uom-
tum reuertantur. Bulimo autem affecti, si non statim cibum habeant, animo lin-
quuntur, & pleriq; ipsorum auxilij facultate destituti, ex instanti pereunt. De utrisq;
autem seorsim agit Aetius lib. 9. cap. 6. & 11.

In cap. v. de pharmacis quæ forinsecus ori uen-
tris imponuntur.

A Sclepiadæ qui philophyſicus dictus est, hoc est naturæ studiosus. Huius
Asclepiadæ philophyſici appellat etiam supra lib. 7. cap. 5. meminit hic A-
sclepiades, ex quo hæc pharmaca Galenus adscripsit. & qui pharmacion à medi-
camentariorum librorum editione est appellatus, uelut *φάρμακον* Galenus de
quodam

quodam pharmaco ait. *ἔστω δὲ φάρμακον οὐκ ὀνόματι τῆς ἐστὶν ἀσθενείας, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἀσθενείαν* *καὶ τὴν φαρμακίαν τῶν γραφῶν ἐν ὧν.* Meminit autem utriusq; Asclepiadæ: tum pharmacionis; tum philophysici appellati, Galenus supra libro sexto, capite 4 uelut etiam alibi commemorat. Quare Asclepiades pharmacion hoc loco, & supra item libro septimo, capite quinto, alterum suum contemporaneum Asclepiaden philophysicum appellatum citat, & ob id in græco exemplari non recte, *ἔστω φάρμακον τῶν ὀνομασθέντων φαρμάκων*, legitur. *Ἐξ ὧν τῶν φαρμάκων* enim pro *Ἐξ ὧν τῶν φαρμάκων* substitui debet. Cæterum quando tam saepe in his libris Asclepiades pharmacion citatur à Galeno, & in hoc capite etiam eius pharmaca ex quarto exteriorum adducantur, Quæ Marcelle inscribit, semel omnino ostendere operæ precium fuerit, quomodo hoc ipsum accipiendum sit, ex ipso adeo Galeno, qui libro primo comp. pharmacorum, *ἡ γὰρ ὁρμή*, ad finem fere, Asclepiaden hunc decem libros scriptissimè dicit, quinque pharmacorū exteriorum, quos primum, secundum, tertium, quartum ac quintum Marcellam inscribit, & quinque alios interiorum pharmacorum, quos primum, secundum, tertium, quartum, ac quintum Mnafona cognominet. Sed adscribam super hac re ipsa Galeni uerba, quores quæ alias studiosis obscura esse queat, dilucida fiat. *ὡς τὸν ἐσκληπιάδην οὗτον ἡσθὲς μεταβάλλει, παραβύσσει τὰς ἐν αὐτῷ γραφὰς ἐκ τῶν φαρμάκων ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ τῆλῳ τῶν ἡνίκα βιβλίου τῶν ἐκ τῶν ὀνομασθέντων φαρμάκων αὐτῶν, πρῶτον μαρκίαν, καὶ δευτέρω, καὶ τρίτῳ, καὶ τετάρτῳ, καὶ πέμπτῳ. ὡς δὲ τὸ τῆλῳ τῶν ἡνίκα βιβλίου τῶν ἐκ τῶν ὀνομασθέντων φαρμάκων αὐτῶν, πρῶτον μαρκίαν, καὶ δευτέρω, καὶ τρίτῳ, καὶ τετάρτῳ, καὶ πέμπτῳ. ὡς δὲ τὸ τῆλῳ τῶν ἡνίκα βιβλίου τῶν ἐκ τῶν ὀνομασθέντων φαρμάκων αὐτῶν, πρῶτον μαρκίαν, καὶ δευτέρω, καὶ τρίτῳ, καὶ τετάρτῳ, καὶ πέμπτῳ. ὡς δὲ τὸ τῆλῳ τῶν ἡνίκα βιβλίου τῶν ἐκ τῶν ὀνομασθέντων φαρμάκων αὐτῶν, πρῶτον μαρκίαν, καὶ δευτέρω, καὶ τρίτῳ, καὶ τετάρτῳ, καὶ πέμπτῳ.* Quare etiam hoc loco falso legi in græco exemplari, *ὡς τὸν ἐσκληπιάδην οὗτον ἡσθὲς μεταβάλλει, παραβύσσει τὰς ἐν αὐτῷ γραφὰς ἐκ τῶν φαρμάκων ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ τῆλῳ τῶν ἡνίκα βιβλίου τῶν ἐκ τῶν ὀνομασθέντων φαρμάκων αὐτῶν, πρῶτον μαρκίαν, καὶ δευτέρω, καὶ τρίτῳ, καὶ τετάρτῳ, καὶ πέμπτῳ.* ex his ipsis Galeni uerbis palam est.

Malagma Nilo inscriptum. J Hoc malagma facere, & ad exarticulata & luxata dixi, quod in græco habetur, *πρὸς καὶ πρὸς τριμματα καὶ λυγίσματα*. Verum nō τριμματα, legendum est, sed uel *παρατριμματα*, qua uoce attrita significatur à Plinio dicta, aut ex mutuo partium inter se affricu, aut ex equitatione aut etiam cinctu, aut calceatu, quidam intertrigines latine appellant: atque si sic legas uertendum erit, facere ad attrita uel attritus: uel quod magis probo, legendum *παρατριμματα*, hoc est, ut uerti, exarticulata: hæc enim cum luxatis melius coherent, quam attritus, & uidetur altera uox alteram exponere ac declarare, quum *παρατριμματα* nihil sint aliud quam *λυγίσματα*, nō tamen perfecta. *παρατριμματα* enim à ueris luxationibus quæ *ἐξ ἀρθρώματα* sunt illi, distinguit, quod hæc sint *ἐκ τῶν ὀνομασθέντων*, illæ magis *παρακινύουσιν*, hoc est emotiones, atque sic fere connectere hæc uoces Galenus solet: sicut secundo comp. pharmacorum, *ἢ γὰρ*, de Moschio nis emplastro ad fracturas *πρὸς* inquit, καὶ πρὸς παρατριμματα καὶ λυγίσματα. Verus tamen interpres hoc pharmacum ad attritiones & singultum conferre dixit, quanquam pharmacum ipsum nō subiungat, ut inde appareat, ipsum *παρατριμματα* legisse, & per *λυγίσματα* singultū accepisse, similitudine uocum *λυγισμὸν* & *λυγίσματα* deceptum. At uero *λυγίσματα* tametsi à græcis dictionarijs per *συγκλάσματα* & *ἀνεκλάσεις* exponantur, tamen non contrafacta & collisa, quæ his uocibus significantur, per *λυγίσματα* apud medicos accipiuntur, sed luxata tantum ac intorta, & quæ alias etiam *τριμματα* appellare solent. Significat enim *λυγίσμα* τὸ πρὸς τριμματα, & intorquere. Constantinus Cæsar libro decimo, capite uigesimo monono de agricultura, de malis punicis loquens, *χλαρεῖς δὲ* inquit, *ἐπὶ τῷ δέντρῳ* *ἐφ' ὧν ἀμείβουσιν τὸ τῶν ὀνομασθέντων λυγίσμα*, τούτῳ πρὸς τριμματα, *ἔστω δὲ* *ἢ οὐκ ἔστω ἀνεκλάσεις*, hoc est, si ramulos ex quibus dependent intorseris. Dicuntur & *λυγισμοί*. Dioscorides libro quarto de personata. *πρὸς καὶ τὰ ἐκ τῶν λυγισμῶν*

σπῆν πρὸς τὰ ἄρθρα ἐλγόμενα καταπλαστέον ἰσά. hoc est, dolores ex luxationibus articuloꝝ obortos trita in cataplasmate imposita sedat. Idem lib. 5 de cinere sarmētio, σὺν ἱερῷ καὶ ἰσά λάλιν καταπλαστέον, δλάρματα νόσων, καὶ ἄρθρων, λυγίσματα ἀφιλῶ, hoc est, luxatis & intortis articulis prodest, quod ipsum etiam Celsus libro septimo, capite primo testatur.

[Malagma Asclepiadæ ex meliloto, Hieroticon, id est pontificiū inscriptum.] Hoc malagma Hieroticon hoc est pontificiū, ut ego uerū, propterea inscriptum uidetur, quod cyphi ἱεραμῶν, quod idem cyphi pontificum aut sacrificuloꝝ dici potest, recipit. Qualis autem fuerit cypheos confectio, ostendit Dioscorides libro primo ex multis descriptionibus unam recēdens, quam suffumigij loco dijs gratissimā esse, & qua sacrificulos Aegyptios large uti tradit. Habet uero & Paulus libro septimo, capite uigesimo secundo, duplicem cypheos descriptionem, alteram ex 36 rebus constantem Niliacam, Alteram ex 28 Seleniacam appellatam, quas ambas item Aetius lib. 13 cap. 117 & 118 refert. Nec multū dissimile pharmacum est quod Paulus eodē lib. cap. 13 recenset Masucha Aegyptia uoce, & à quibusdam Masnaphium appellatum, & Aetius item eodem libro, cap. 118 sed diuer- sa à Pauli descriptione. Habet idem tum cypheos, tum masnaphij usum in malagma Polyarchio tertio, lib. nono, cap. 34 & cap. 44 sed hæc posteriore loco masucha appellat, quod priore masnaphij dixit: quod indicare ob id uisum est hoc loco, ne studiosi in his uocibus peregrinis hæcant, aut eas uirgatas putent. Nam Marthæus Syluaticus pandectarum medicarum autor, se ignorare quid sit masucha faceret, quod tamen apud Paulum esse dicit, & sanè est libro tertio, cap. 77 sine, ubi pharmacum ad exolutum & debilem stomachum recenset, quod masucham recipit. Porro hoc ipsum pharmacum Hieroticon appellatū in græco exemplari corruptum est. Nos autem ex Aetij libro nono, cap. 116 ueram lectionē restitimus, quam etiam reddidimus. Legitur autē ἱεραμῶν τῶν πυλῶν φραγ. π. Verum pro φραγ. π. legendum est φραγ. π. Deinde deest in totum oleum cyprinum, post ceræ minam unam adscribendū, sic ἰσάς λιν πρὸς φραγ. π. Nā & oleū uel hoc, uel aliud consimilis facultatis necessario ammiscetur, & cyprinū tanto pondere ipse Aetius habet.

[Polyarchi pharmacum accommodatum.] In hoc polyarchio medicamento ἱερῶν λαρύγγος γ. habetur, sed λαρύγγος legendum est pro λαρύγγος, resinaq; accipiēda ex larice arbore, quæ qualis sit apud Plinium uidere licet. Dioscorides ex galatia ad alpes sita resinam apportari libro primo dixit, quæ uernacula istius gentis lingua larix uocetur: & paulo post, melli similem eandem resinam dicit. Estq; omnino larix ex picearum genere, ut etiam resina eius picæ resinæ facultatem habeat.

[Malagma polyarchi ex epistola.] In hoc malagma ad finem adiectū est, ἰσά καὶ βαλάνος πλεονέχου φραγ. π. hoc est, Ego etiam bdellij drachmam unam addo. Verum ego non φραγ. π. sed μνῶς π. legendum puto. Est enim omnino extreme minutum pondus φραγ. π. reliquorū molis comparatione, quæ omnia minæ tum simplicis, tum multiplicatæ pondere recipiuntur. Quin & compositio quæ sequitur tertia, ubi ait: Vt ego componere soleo, idem est in ponderibus corrupta, & primum quidem similiter drachma pro mina expressa est: Deinde in quibusdam rebus μνῶς π. habetur, hoc est minas IIII. Verum non μνῶς π. sed μνῶς πλεονέχου legendū est, quum planè nimis sit quatuor minarū pondus in his rebus, & quæta minæ pars aptissima uideatur, ut eam etiā censeam legendā, non quidem hac parte ex Aetio, aut Paulo, aut etiam ueteri interprete adiutus. (Nam is hunc partim reliquit, & silendo uelut solet, sibi optime cauit) sed coniectura & rei usu inductus

ductus: quam ut itidem studiosi facere possint, ipsū locum corruptū ut habet, adscribam. *ὅς δ' ἐν τῷ λυπεύει, καὶ διαμύμει, ἀμύμει, βδολαί, λελάναι, ἀνὰ θναχ-α καὶ μῆς ε-φρῖναι φρενὰς ἢ τέρμωνθιναι μῆς δ, λυπεύει καὶ τὸν ἄλλω α. βλαστῆς μῆς δ, ἀμμυνισκῶ ἐν μῆς μῆς δ, πέρδεν δινάκας, κέρκας, σμύρναι, ἀνὰ μῆς δ, αὐθ-δινάδ' α.* Vera autem lectio hæc est quam etiam reddidi. *ὅς δ' ἐν τῷ λυπεύει, καὶ διαμύμει, ἀμύμει, βδολαί, λελάναι, ἀνὰ μῆς α. καὶ μῆς ε-φρῖναι φρενὰς ἢ τέρμωνθιναι, μῆς δ, λυπεύει καὶ τὸν ἄλλω α. καὶ σμύρναι μῆς τὴν πέρδιν, ἀμμυνισκῶ ἐν μῆς μῆς τὴν πέρδιν, πέρδεν δινάκας, κέρκας, σμύρναι, ἀνὰ μῆς τὴν πέρδιν. αὐθ-δινάδ' α.* Nec uero tantę religionis res est, ut non quisq; pro sui iudicii modo, harum rerum pondera, tum minuere, tum augere possit.

In caput septimum, de hepate & eius affectionibus.

NOS autem experientiam in omni arte magnum quid posse persuasi, speculationes tum per rationalē methodum, tum per rationalem indicationē in uēras ad ea quę ab ipsis de iudicationis hīstoria tradita sunt, apponimus, demonstrantes qualem facultatem ad ambulandum utrunq; erus exhibet, talem in medicina, experientiā & rationem habere.] Hæc sententiā in græco exemplari corrupta est, sed integrā sic legi debet, quemadmodū etiam à nobis est reddita, *ἐμὲ δὲ τὴν ἐμπειρίαν ὅτι πᾶσαν τὴν τέχνην μὲν γὰρ τὴν διδάσκειν περὶ παθῶν, πᾶσι δὲ λογικῶς μετὰ τὴν θεωρητικὴν ἐν ἐμπειρίᾳ, πῶς πῶς λεγόμενος ἰσχύει ὡς αὐτὴν ἀρετὴν εἶναι, καὶ πᾶσι δὲ τὸ λογικῶς ὅτι δέξεται θεωρητικῶς, διὰ τὴν ὅτι ἐν ἐμπειρίᾳ, ἰππῶν διδάσκειν ὡς τὸ βαδίζειν ἐκείνων ὅτι σκαλῶν ἐν φρεσίν, διὰ τὴν ὅτι ἰατρικῇ τὴν ἐμπειρίαν καὶ τὴν λόγον ἔχει.* Comprehen- dit itaque Galenus his uerbis tres sectas medicorum, quę coniunctę perfectę omnem artem constituunt & absoluunt. Nimirum rationalem speculationem, & rationalem indicationem, quibus si accedat iudicationis per experientiā cognitio, tota res absoluta est. Vocat autem hanc ipsam iudicationis per experientiā cognitionem, *ἰσχύει πῶς λεγόμενος*. Sed quum in græco codice *τὸ πᾶσι λεγόμενος ὡς αὐτὴν ἀρετὴν εἶναι* legatur, atq; ita etiam à ueteri interprete uersum sit, sit ut et ab illis, & ab alijs ita uera sententiā obscureretur, quam nūc pro *πῶς* & *λεγόμενος* pro *κράτιστε* lectione substituta feremus. Memini autē supra cap. 2 huius libri *ἰσχύει* ab empiricis uocari, traditionem ipsam earum rerum, quę priores empirici per propriam inspectionem cognouissent, ita ut eadem res his qui inspexerunt *αὐτῶν* dicatur, eis uero qui traditam ab illis legerent, hīstoria esset.

Nam & in hoc hepaticā affectionem dicunt, quemadmodū etiam in ore uentris affecto, pleriq; medici ac idiotę stomachicā affectionē uocāt.] Quēadmodū supra cap. 2 Galen. uaria stomachi symptomata ac uicia recē sunt in quibus tamen omnibus æqualiter stomachicorū appellatio usurparetur, & stomachica in generali affecto appellaretur: sic etiam hic ait, hepaticę affectionis appellationē pluribus hepatis uitijs accommodari, quę etiam in contrarijs inter se affectionibus accedunt. Sed desunt in græco aliqua uerba, quibus insertis ea sententiā integra fiet, Sicergo legendum est. *καὶ γὰρ αὐτὸ καὶ τὸν ἰσχυρὸν διδάσκειν ἀλγῶν, καὶ διὰ τὴν καὶ τὸν αἵματός τ' ἰσχυρὸς πέρχεται, αὐτὸ πᾶσι δὲ τὴν ἰατρικὴν καὶ τὴν ἰδιωτικὴν, ὁνομάζουσι σημαίνειν διὰ τὴν αὐτὴν πᾶσι δὲ συνεκτιμώμεται, οὐ γὰρ μὴν ἐκπῶς γινώσκουσιν διδάσκειν, ἐλλὰ τὴν πᾶσι δὲ, μὲν μὲν πᾶσι γινώσκουσιν πᾶσι δὲ καὶ μεταμειωμένης &c.* Ceterū ad finē huius capituli hęc totā rem omnino planius declarat, hepaticā affectionē, & hepaticū hominē appellari dicens, cū ipsū uiscus in proprijs actionib; est debilitatū, atq; hoc ipsum p intemperie contingit, citra manifestū aliquot malū, uelut est inflammatiō, abscessus, duricies, aut aliud eiusmodi. His em hepaticorū appellatio nō accommodat. Sed hepatici proprie sunt q ob hepatis debilitatē cruenta, eaq; liquidiora p se dem egerunt, quales sunt loturę carniū animalium recens mactatorum, quos ipsos ignarum uulgus dysentericos iudicat. At uero hoc loco de contrariorum

[illegible]

intestina; *πτεγασθίς*. Galenus dixit. Ab horum potè sarciminū *ἀλάντων* græcis appellatorum similitudine pellicula altera, quæ duplicata cîtea eminentiores ipsius fœtus in utero partes incumbit, *ἀλανθασθίς* uocatur, hoc est sarciminialis, uelut nos nupèr in uersione librorū de semine, & libri de uteri dissectione ex Galeno reddidimus, cum hæc uocem intellexerit, & qui doctissimi hodie in scholis uideri uolunt, tantoidē appellant, æque ignorantes & huius uocis significationē. Adscribam autē de duabus pelliculis fœtus, Galeni ex libro de uteri dissectione uerba, quibus tota res clarior reddetur. οἱ δὲ ὁράειν inquit, ἡ δὲ *ἀλανθασθίς* τῷ ἰμὲρίῳ, ἢ ἰτρίῳ ἰπικῶτι, διπλοῦς ἔστι τὰ ἐκτὸς ἔχοντα αὐτῆς, λεγόμεναι, καὶ γλουθῶ, ὅτι πῶδες, καὶ ἔστιν ἰσχυρὰ αὐτῆς, τὸ μὲν ἀραιὸς, τὸ δὲ ἀλανθασθίς ἀλάνη γὰρ οὐκ ἐστὶν, ἀλλ' ἐστὶ τὸ γῆμα ἰσχυρότερον ὅτιον αὐτῷ. Cæterum *ἀραιὴ* pelliculam, quæ totum fœtum amplectitur, agniam cōuertit. Videtur enim ab agnellorum tenetudine & candore appellata: Subdit enim eo loci Galenus, ambas has pelliculas esse albas & tenues, ad aranear telæ formam. Quæ omnia obiter, loco ita ferente, præterire in longiorem studioforum torturam nolui.

In cap. VII. Quæ pharmaca ad hepaticos ab Andromacho sunt conscripta.

Compositum est autem ex moderate adstringentibus, & resiccantibus, ac discutientibus uitiosos serofos humores, & corrigentibus humorū malitiam, & contrariam uim habentibus aduersum putrefactiones. Græcum exemplar hæc uerba corrupte habet: Desunt enim post uocem *ἰπανερθεύμεναι*, hæc uerba. *τὴν πεποχρῆμαι, καὶ φαντασμένην*, quæ inserta plenam sententiam efficient, hoc modo. *οὐ γὰρ τῶν δὲ ἐκ τῆς μητρὸς ἐκφύοντων καὶ φεραμένων τε καὶ ἀσφοδευμάτων ἔστιν ἐκμεθέρως ὅτι ἰπανερθεύμεναι τὴν πεποχρῆμαι, καὶ φαντασμένην τοῖς σπινθίν. Sed* quæritur mox etiam *δοματίων φαρμάκων*, corrupte pro *θανασίων*, & *ἐκπεχόντων* idē pro *ἐκπεχόντων φαντασιών*. Sic enim legi debet, *ἀλλὰ καὶ θανασίων φαρμάκων, ὅτιον γὰρ καὶ διὰ τοῦτο ἐστὶν ἀνταρθεύμεναι ἀραιὴν ἐκπεχόντων φαντασιών*. hoc est, uim corrigens lethaliū pharmacorū; quemadmodum & feris uirus ciaculātibus contrariū existit.

○ Nectareq̃ antidotus ad hepaticos & arquato laborantes.] Nectarea uidet̃ hæc antidotus esse appellata ab helenio quod recipit, id ipsum enim Nectarium appellatur, unde & Dio scōridi Nectarites uinum dictum est, ex nectario, id est helenio confectum, uelut idem lib. 5 testatur. Nec uero aliud esse putatur à quibusdā pharmacum quod Helena apud Homerum 4 odyssæ in uinum coniecit. Nepenthes ipsi poetæ appellatum, tantam læticiam concilians, ut nec flere queat quispiā aut lugere eo hausto, sē u patris seu matris mortem, nec fratris aut filij cædem, etiam ob oculos contingentem. Inquit enim:

*αὐτὴ γὰρ ἄς οἶνον βάλε φαρμάκων ὅδ' οὐκ ἴππων
Νέπτην δὲ τ' ἄχαρ' ἡδονῶν ἰπιδόνων ἀπώτων.*

Plinius, certe lib. 11 cap. 11 de helenio loquēs, easdem uires ei tribui testatur, quas Homerus ad Nepenthes retulit. Attribuit, inquit, & hilaritatis effectum eidem potæ in uino, cumq̃ quem habuerit Nepenthes illud prædicatum ab Homero, quod eo tristitia omnis aboleatur. Et ob hanc sanē uim Nectarium appellatū uerisimile est, quod uelut deorum quispiā potus omnes curas disperdat, peper, quamq̃ læticiam pariat, quæ deos immortales frui ex Nectaris potu poetæ prodiderunt. Habet autem & Constantinus Cæsar uini nulli præparationem, quam Nectar appellari testatur lib. 1 de agricultura, capite 24.

Antidotus hepatica à Nearcho laudatā, radicis panacis, rubiæ &c.] Græcū q̃dem exemplar *ἀντιπνευστὶς* p̃s̃ hoc loco habet, sed legendū est *πέναντος*, aut certe p̃s̃ uox ad sequens *ἰγυθισίωνων* referenda est, ut uel priore modo radicē panacis recipiendam

recipiendam accipiamus, uel posteriore lectione per *ἐμπύρετα* panacis succum intelligamus, qui tamen inter reliquas radices ineptior uideri potest, ut malior priorem lectionem sequi.

In cap. viii. confectiones hepaticæ ab Asclepiade conscriptæ.

Recitat hoc loco mox à principio tria pharmaca ab Asclepiade prodita, primum succum cichorii, secundum filicis uel anethi succum: tertium picridis recentis aut seridis recentis succum. Legitur tamen secundū corrupte *μετὰ μάλιν πικρὸν δραχ. γ* pro integro quod nos reddidimus, *μετὰ μάλιν πικρὸν καὶ χυλὸν γ*. Deinde tertium sic græce habetur, *ἰριως ἐπελὸς ἢ ὀρίως ἐπελὸς γ χυλὸν*, hoc est iridis recentis, aut seridis recentis succi, non esse autem *ἰριως* hoc loco legendū, palam sit ex subiectis ipsius Galeni uerbis, in quibus iridis non meminit, sed exponens ipsum Asclepiadem, cichorii ac seridis facultates explicat: filicis item & anethi, nō taciturnus si iridis succi potius hoc loco ab Asclepiade indicaret. Quare pro *ἰριως* omnino legendū est *πικρὸς*, uelut nos reddidimus. *πικρὸς* enim agrestis seris est, & plane eadem quæ cichorii antea ab Asclepiade appellata est, & propterea picridis uocis Galenus nullam mentionē fecit, nimirum quod de ipsa sub cichorio proderet. Repetit itaq; Asclepiades in tertio pharmaco cichorii succum, quem in primo prodidit, sed aliō nomine appellans, picridis uidelicet aut seridis recentis succi cyathū unum, cum aquæ mulsæ calidæ cyathis tribus bibendū tradens: in primo aut eundem succum simpliciter, cum aquæ calidæ cyathis tribus bibendum dari fuisse. Admonet autem nos huius genuinæ lectionis hoc loco *πικρὸς* uocis, Aetius lib. 10. cap. 3. *πικρὸς ὁ ὀρίως ἢ ἰντύβιον χυλὸν* cyathū unum bibendum præbere iubēs: alius suspicio erat, *πικρὸς* pro *ἰριως* legi oportere, ita ut filicis succi potum in secundo pharmaco proditū etiā in tertio repetiūset. Porro seris appellatur tam domesticū q̃ syluestre intybi genus, & propterea Aetius *πικρὸς ὁ ὀρίως ἢ ἰντύβιον* dixit, hoc est seridis uel intybi sylvestris, quæ pictis appellat. Est autem intybi appellatio latīna, ex qua corruptā hodie uulgius medicorum *Endiu* uiam appellatā habet. Quin & *πρωσίμων* appellatione seris & intubus uenit, uelut Constant. Cæsar lib. 12. cap. 28. de agricultura, ubi de seride siue proximis ex Didymo refert, habet. *ξῆς* inquit *ἐντοῖς πρωσίμω ὅ ἔστι βαπτύμενα καὶ ἐν ἰντύβιον σαρδύκα καὶ πῖμαλα*. Id est seris, hoc est troxima si aceto tingant, & edantur stomacho grata sunt. Et intyba appellari troxima etiam coaceruator pandectarū medicarū anno tauit. Et sic etiā Aetius 9. cap. 48. usurpauit, cum in quodā pharmaco ait, *ἀνελόμεναι χυλὸν πρωσίμων*, id est succo seridis seu intybi excipiet: quanquam fuit tempus cum succū uuarum maturarū siue escariarum & eduliū, per *χυλὸν πρωσίμων* acciperem, & hoc per Angelum Politianū deceptus, qui lib. 7. epist. *πρωσίμων* uocē ad uuā duntaxat edulem pertinere scripsit, etiā si uuæ uox non adiciat: qui sanè his locis redarguitur, quibus ad intuba & seridum genus *πρωσίμων* appellationē spectare ostenditur. Atque haud scio an uel hoc saltem obtinere Politianus possit, quod tamen post ipsum etiā Budæus asseuerauit, ut in pandectis in cap. qui sumum uox *πρωσίμων*, quæ deest, ex antiquis quæ uterq; aduocat exēplaribus restituta, integrā Pauli uerborū lectionem faciat, in hunc modū. Qui fundū uendidit pomum recepit, nuces & ficos, & uuas dūtaxat duracinas, & purpureas, & quæ eiusdem generis essent, quas non uini causa haberemus, quas graci *πρωσίμων* appellāt, recepta uideri. Nam cū *πρωσίμων* priuatim & substantiue appellēt intyba, Didymo, Constant. Cæsari, & Aetio: uidetur *πρωσίμων* uox adiectiua ad nulum genus eorum quæ cruda eduntur pertinere, nisi id ipsum pe culiariter exprimat, tantum abest, ut de uua duntaxat *πρωσίμων* uox accipi priuatim debeat. Atq; intuba quidem propterea Troxima appellata arbitror, quod cruda ex ace-

Nam & præcedentia aliquot pharmaca, cum aqua calida & simul, & insuper bñ bēda, sunt præscripta. Quin & μετ' οἶνον κικραμμένον legi queat, Nam cū uino diluto mox sequens pastillus hepaticus exhibetur. Nisi οἶνος κικραμμένος & ὁ δισκος κικραμμένος eandē rem significant, uelut dixi; nempe quod alias κρομα simpliciter, alias cum additione κρομα οἶνον ὑδαρὸς appellari solet. Nobis lectio μετ' οἶνον κικραμμένον magis placet, propterea quod ob uiciniam scripturæ cum μετ' ὕδατος, pro diuini subreperere potuit: quanquam & uiciniam habeat μετ' ὕδατος κικραμμένον lectio, sed aquæ mulsæ tamen usus in solis febricitantibus in sequentibus probatur, ut eius lectionē hic non probem, alias possit etiam κικραμμένον uox ei sic conuenire, ut aquā mulsam dilutiore acciperemus, quæ alias ὕδατος κικραμμένον ὕδατος κικραμμένον appellat.

Alia antidotus accommodata, facit & ad alias internas affectiones. In hac antidoto seminis fraxini, & seminis cestri utriusq; uncia una habetur. Seminis autē fraxini in hunc usum Dioscorides nō meminit. Et Galenus de fraxino in totum sinit. Verum Plinius 24. cap. 8. Semen inquit folijs eius inest, quo medetur iocineris & lateris doloribus in uino. Aetius porro idem medicamentū Asclepiadæ, ex Philagrion citat, & Orbasium fraxini semen non recipere scribit, additq; fraxini semen, uel fructum, esse arboris ex qua fraxinea ligna quocunq; ite opere apta ac operæ obediētiſſima caduntur. hoc est ὅτι τὰ ἐκ τῆς φραξίνης καὶ τῆς φράξινος ὁμοῦ ζῆται. At uero cestri semen est betonica latine appellatæ Dioscoride, aut gallice, Plinio teste, qui latine ferratulam dictam ait.

In Cap. IX. Quæ Archigenes ad hepaticos in 2. phar. secundū genus scripsit. Senecionis decoctum ut ualde commodum exhibeto, Nascurur autem huius scaulis maxime in tegulis. Senecionē esse latinis ἀργεῖοντα à græcis dictam ex Plinio constat, Quod autem hepaticis in potu conueniat, idem testatur, Quiddam inquit regio morbo cum uino dederunt, & contra omnia uelicæ uitia, item cordis & iocineris. Sed & idem in tegulis nasci, & in muris tradit, uelut etiā hic ab Archigene proditur. φύνει δὲ τὸ τοῦ ἐκκαλὸς ὑπὸ πῆς κερδωμῶς. Dioscor. uero, φύνει μέλαινα inquit, ὑπὸ θερμοῦ καὶ πρὸς τὰς πόλεις. hoc est in septis murorū & circa urbes.

Aut dauci & fœniculi radicis utriusq; minam dimidiam cum aceto mulso ad tertias coquito. In græco exemplari non est expressum pondus minæ dimidiæ quod ego reddidi, ita enim habetur ἡ δόσις καὶ κατὰ μέρος ἐκ τῆς ἡμισυ οὖνου ὅσον ἑνὶ μίλι καὶ μέγιστον τριῶν λαφθῶν ἑξήκοντα. Videtur itaq; omnino ὅσον ἡμισυ, id est dimidium, ad præcedens pharma cum referendum esse, ut eius uidelicet dimidium sit accipien- dum, sed non quod proxime præcedit: sic enim utriusq; oboli tantum dimidium esset cōiiciendū, quum præcedat pseudobuni obolus unus, Inepta autem esset tam exigui ponderis coctura in aceto mulso. Quare ad alterum quod pseudobunium præcedit referendum ὅσον ἡμισυ existimo, ut uidelicet eius dimidium accipiat, habet autem hoc ipsum corticis radicis rubi minam unam. quare in præsentis pharmaco dauci & fœniculi radicis utriusq; mina dimidia accipiēda esse uidetur, Nisi omnino sic accipere græca uerba oportet, ut dauci radicis incertū pondus relinquatur, & quantum tandem quis eius pondus accipiat, eius dimidium de fœniculi radice assumendum sit, & in sufficienti aceto mulso coquenda utraq; que. Nam neq; huius certam aliquam mensuram expressit.

De cataplasmatibus. Inter hæc cataplasmata habetur, Aut palmulam relecto interno nucleo diligēter tundito, quod græcè est, ἡ φάρμακον ἀλκατὶ ὀντοκρίστου καὶ τῆς ὀντοκρίστου, &c. ὀντοκρίστου itaq; hoc loco Archigenes pro nucleo siue ossiculo palmulæ dixit, quū alias etiā internā partē cuiusq; rei ὀντοκρίστου græci medici dicant, hoc est ὁ ὀντοκρίστου. Sic ὀντοκρίστου & σπύνης, & κατὰ κεκομδὶς, & σπύνης dicitur, quam aliqui medullam uerterunt: quanquam & in palmula os, non male quis medullam

ex fuffitu utriufq; experimentū facere nō queamus. Sed tamen ego penitus nul-
lam aliam ſententiā Dioſcoridis uerborum eſſe opinor, quā eam quā a prin-
cipio dixi, atq; ita etiam Galeni locos à me citatos accipio, quemadmodū etiam
ſum interpretatus. Quid ergo ad Plinij multos candidos ungues dicemus? Neq;
enim libèter errorem eius inuulgamus, excuſaturū pronius, ſi modo bona aliqua
ſpēcie id fieri poſſit: quanquam ad trecentos locos in hos commentarios retule-
rimus, qui partim temporum iniuria in admirandum illud totius naturæ opus ir-
reperunt, partim præ illius ſtudiorum multitudine, & officiorum publicorū ma-
gnitudine, ex negligētia ſunt admiſſi. Videtur itaq; mihi ominino Plinius expoe-
ta quopiam, & fortaiſis ipſo Damocrate: Nami cum etiam alibi ſequitur & citat;
uelut alio loco oſtendit: deceptus, τὸς δολιχὰς δακρυγῶς ὄνυχας (cōcedatur aſit hæc
lectio quaſi exemplū aliquod eius quā ſequutus eſt lectionis) accepſſe, quaſi hæc
uerba candidos bdellij ungues ſignificēt. Nimirū δακρυγῶς uocē ἀδρυγῶς ab ipſo
reſata, quū non ſit accuſandi hic caſus, ſed genitiuus ad δολιχὰς uocem pertinēs.
atq; hoc grāmaticum peccatum mirū uideri non debet, quando alio loco Braby-
la uocē nominatiui pluralis neutri generis, pro ſingulari generis fœminini agno-
ſcens, fructum in herbam tranſmutauit, metamorphoſi mira, ſed quali etiam nu-
per quidam græcorum interpres γίγγρα deſcribendo arida eſt & frigida, uina-
ceos in herbam gigartam transformauit. Itaque Plinius multos candidos bdellij
ungues dixit, nulla alia ſententiā quā qua exiſtimauit τὰς δολιχὰς δακρυγῶς ὄν-
υχας græcos prodere, quaſi τὰς δολιχὰς δακρυγῶς ὄνυχας indicarent, quum non can-
didi ungues, ſed bdellij pellucidi onyches illis uerbis ſignificētur. Et quemadmo-
dum Bdellii onyx locutio eſt per appoſitionē, ſic bdellij onyches locutio expoſi-
toria eſt, ne quis ueros onychias conchylij uidelicet Indici teſtam accipiat. & ſic
utiq; poſſit æque recte Damocratis uerſus ſic legi, δολιχὰς ὄνυχας καὶ τὰς ἰσας συ-
μφύεας, hoc eſt onychasq; bdellij pares alumini: quāquam prioris lectionis ex-
emplum ex eodem poeta produxerim. Porro ſi Pliniū ſic accipiamus, ut qui un-
gues ὄνυχας reddiderit non humanos reſpiciendo, ſed ipſius bdellij, & candidos
pro pellucidis dixerit, ſalua erit & res, & ſententiā Pliniana, nec aliud quā am-
biguum, ob uocem multos, in eo reſiſterit momē reprehendendum, à nobis uer-
ro benigne illi indulgendum, quum multi candidi ungues, dici poſſint in multa
bdellij mole: quod patrocinij loco à me dictū accipi uolo, ne quis putet nos car-
pendi Plinium ſtudio, huc progreſſos eſſe. At uero uigelimus primus Damocra-
tis quarti malagmatis uerſus ſic mihi legendus uidetur. οἶνον καὶ τὸ μικρόν τ' ἰεὶ
νον μέγας, quomodo tum hunc, tum reliquos ſuprà à me iudicatos, pro ſua quemq;
ſententiā reddidi. Legitur autem in exemplari uulgate ἰεργυμῶντι καὶ μικρὸν ἰεργα-
μῶν, nulla ſana ut opinor, ſententiā. Quare pro ἰεργυμῶν quod tamen ἰεργυμῶν
expreſſum habetur, legendum cenſeo οἶνον. Vini enim mox uſus ab ipſo prodit-
tur, quod tamen antea ab ipſo recipiendum non eſt præſcriptum, niſi hoc adeo
loco, quo ἰεργυμῶν, id eſt, lomentī fabacei nomenclaturā pro uīno irrepiſit: quanquā
fortaiſis neq; ipſum lomentum ineptum in malagma futurum erat, ſi eius uocis
lectionem uerſus toleraret: & ſi uinum non deſideraretur, ἰεργυμῶν
pro eo ſuppoſito. Nolo tamen hac partē quicquam per-
tinacius aſſeuerare, donec melioris exem-
plaris ſuffragium acceſſerit.

IANI CORNARIII MEDICI PHYSICI

COMMENTARIORVM MEDICORVM IN DE
cem libros Galeni de Compositione pharmacorum
localium, siue secundum locos cōscripto-
rum, Liber IX

In caput primum De Ictericis.



ICTERI morbi qui latinis Regius & Arquatus dicitur, & bilis per totum corpus diffusio describitur, tres præcipuas differētiās iuxta triplicem causam, hoc loco Galen. assignat, Nimirum salubrem primam, quando in febribus ratione bonæ iudicationis cōtingit, Alterā uero ex obturatione meatus uasorū, & Tertiam ex hepatis inflammatione. Aetius & Paulus plures præscripserūt, sed serē sub his comprehensas. Ad singulas autem species siue differētiās certa pharma-

corum discretimina mox subdit, quā nō eadem omnibus conueniant. Ad primam itaque ut minime malam leuia auxilia prodat, oleorum uidelicet & ungentorum discussiorum affricum, atq; inter ea etiam Crócinum habetur, quod in græco exemplari *λεονοπαρυσ* est expressum, ut dubium sit an *λεονοπαρυσ*, aut *λεοναρ* sit legēdum. Quum uero *λεονοπαρυσ* fiat ex ungento Crocino, expressis aromatis & in massam coactis, non multum retulerit utro quis utatur, quum uiribus inter se non multum distent. Ad reliquas duas species tum singulatim, tum simul coincidētes, fortiora prodat pharmaca, sed tamen ut etiam in his diligētem discretiminationem faciat singulorum usus. Si uero coincidant simul, inquit, obturatio & inflāmatio *ἡ γαλβύλη* nō ēναι ὅτι συνίσταται *χρῶμα* γίνεσθαι, hoc est & laxantiū & extergentium simul usus erit. Sed in græco exemplari uerba *χρῶμα* γίνεσθαι desunt, necessariō reponenda. At uero operæ pretium est considerare quæ uera origina- tio uocis *ictēris* existat, quādo sanē alij ab auctore ictero, alij ab auctore ictero, alij ab ictero de mustela specie deriuent. Et Plinius quidem 30. cap. 11. contra regium morbum auxilia tradens, Auis Icterus uocatur inquit, à colore, quæ si specietur sanari hoc malum tradit, & auem mori, Hanc puto latine uocari galgulum. Quibus uerbis Plinius auem icterum à colore uocari tradit, Nimirum eo quem icterici habent, quum tamen uicissim Icterus morbus ab icteri auis colore rectius appellatus uideri possit, quando certe auis prior morbo extiterit, sed alio fortassis nomine, galguli uidelicet ut Plinius putat, aut *μαύς* græce. Theodorus enim *μαύς* Aristoteles galgulum conuertit, quum Icteron Aristoteles non habeat. Alij uero icteron galbulam uocant & apud Plinū legunt, ut & *μαύς* & *ictēris*. & galgulus & galbula eadem auis uideatur, quum Plinius galbulæ non faciat mentionem, sicut Aristoteles icteron reliquit, ut pote quem *μαύς* appellet, sicut Plinius galbulam galgulo nocat. Et galbula sanē satis nota auis est, uel ex xenij Martialis poetæ. Galbula decipitur calamis & retibus ales. Turget adhuc uiridi quum rudis una me- ro. An uero hæc ea sit quā Plinius galgulum ex ictero reddidit, nō habeo quod pronūciem. Non esse autem galbulam eandem quam ficculam, iuxta quorundam traditionem, ex eodem poeta eodem libro apparet, ubi de ficcula seorsim sic prodat. Quum me ficus alat, quū pascar dulcibus uuis, Cur potius nomē non dedit uua mihi? Cæterum Aetius serm. x. cap. 17. ait Icterus à similitudine ad an- malculum, quod icteris, id est uiuerra appellatur, nominatus est: Est autem mustela syluestris, quæ auricolores oculos habet. Quare planē incerta & inconstans origi- natio

ginatio est huius appellationis, ut & ad miluū referri possit, qui etiam icterus & icterus appellatur. Nam & hic oculos giluos ac auricolores habet. At uero nūc refertur unde appellatio icteri morbi deducta sit, quā de re ipsa & morbo cōstet, qui Ari-
 quam nomē laetis à coelestis arcus similitudine inuenit, & Regius ob delicatio-
 rem uicē quē is morbus requirit dictus est, ut Celsus lib. 3. cap. 22. testatur. Plin-
 etiā felle suffusus hoc morbo laborātes dixit. Porro nō solum bilis flaua per cor-
 pūs diffundī solet, uerū etiā atrabilis humor qui uelut fex sanguinis existit,
 & ex qua atra bilis gignitur, uelut sequenti capite huius libri Galen. dicit, itidem
 per totū corpus fertur ac dispergitur, atq; hic morbus similiter icterus, sed melius
 à Paulo appellatur, ut in hoc nulli superiorū originationū locus exret, sed adscri-
 bam de hoc ipso Pauli uerba. τὸ αἰκλὸς ἐλκερ παρὰ τὸν ἰκτερὸν ἐστὶν ἡ ἀπὸ τοῦ χολέ-
 ρος χυμὸς οἷον ἰλὺς ἐστὶν ἄσπετος, εἰ μὴ ἡ ἐλκτικὴ τῶν οὐρανῶν ἀδύνησι, ἡ παρὰ τοῦ
 φερεῖος δὲ τῶν ποταμῶν ἐλκτικὴ, μελὰς ἰκτερὸς στοιχεῖται, τὸ αἰκλὸς ἀσπιδεὶς καὶ
 ἄλλαν φερεῖος δὲ σάμα. Meminit utriusq; icteri Hippoc. 2. epidem. 2. Icterus inquit,
 εἰ ἀπὸ τῆς ἀπὸ τοῦ οὐροῦ, εἰ δὲ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, εἰ δὲ ἀπὸ τοῦ φερεῖος, εἰ δὲ ἀπὸ τοῦ
 μελάντος. Galen. de ictero nigro hic nullā mentionē facit. Sed Aenius loco pau-
 lo ante citato itidem ait atrae bilis humorē unā cum sanguine ad cutem deferri, at-
 que hāc affectionē omnino altera grauiorē esse. hic morbus hodie frequēs apud
 septentrionales populōs ultra citaq; Oceanū magnū habuitates est, uulgo schor-
 buch appellatus, nec dissimilis multum ab illo est qui in superiore Germania, ra-
 ro tamen apparēs, breue uocatur. Sed & Stomacace ac Scelotyrbe apud Str-
 bonem & Pliniū non dissimilia uisū sunt: quanq; Plinij uerba 25. cap. 3. sic tacent,
 quasi hae appellationes non ad affectus ipsos, sed ad fontem pertineant, ex cuius
 potu dētes labefactati intra bieriniū deciderūt, cōpagēsq; in genibus solute sunt.

De pharmaciis ictericis à Asclepiade scriptis in ternio internorū. J. In cēsurā
 Galeni de his pharmacis mox à principio cōnuerti, ubi uero omnino nihil appo-
 nit, in non febrilentibus magis utendū est, hoc est ὡς τὸ ἀπυρετικὸν ἐστὶν μελὰς χολέρας.
 Sed πυρετῶν falso pro ἀπυρετικῶν expressum est. Quemadmodū paulō post in
 Nicerani pharmaco ciente urinā, ἀσπεργῶν ἐλκτικὴ καὶ διόλου ὡς ἀπὸ τοῦ falso legitur
 pro ἀσπεργῶν ἐλκτικῶν τὸν χυμὸν χροσπιδεῖς, σκιδεῖς καὶ διόλου ὡς ἀπὸ τοῦ, &c. id est, ut ego
 reddidi. Asparagorū palustriū radicū pparato ac dato ut dicitur est. Sic
 autē legendū esse ex sequenti pharmaco apparēt, in quo hāc lectio expresse habet.

Quae pharmaca Archigenes ad ictericos conscripsit. J. Principiū huius tracta-
 tionis in græco corruptū est hoc modo. ὡς δὲ τὸ ἰκτερικὸν τῆς ἀρμεδίου διακρί-
 νει τὸν οὐροῦ καὶ τὸν ποταμοῦ ἰκτερὸν, καὶ πολλὰ ἐστὶν ὡς τῶν ἀλκυμῶν πρὸς τὸν οὐροῦ,
 καὶ καὶ τῶν ποταμῶν καὶ τῶν φερεῖων. Legendū est autē ὡς δὲ τὸ ἰκτερικὸν τῆς ἀρμεδίου
 διακρί-
 νει τὸν οὐροῦ καὶ τὸν ποταμοῦ ἰκτερὸν, &c. efficietur enim hoc modo sententia quam
 nos reddidimus, & quā sane ipse Archigen. prescripsit. Ceterū supra uocatas quas
 fomēta sicca reddidi, uarijs modis fiunt, quemadmodū etiam ex humidis rebus
 uarie adhibētur, uelut in libro τῶν γυναικῶν φόνος uidere est apud Hippocr. Sed
 & Celsus lib. 2. c. 17. aliqua fomēta recēset, cuius uerba partim obscura partim
 corrupta adscribam, ut & is locus studiosis redintegretur. Fomēta quoq; inquit,
 calida sunt, miliū, sal, harena, quodlibet eorū calfactū & in linteum cōiectum. Si
 minore ut opus est, etiam solum linteum, At si maiore extincti lateres, inuolutiq;
 panniculis, & sic circūdari. Quinetiam calido oleo replentur utriculi, & in uasa
 fictilia ad similitudinē quas lenticulas uocāt, a qua coniicitur. Sic quidem legen-
 dum opinor, sed in exemplaribus uulgatis lateres uox de est, & quaedam nō late-
 res sed tiones habent. possunt autem cōmodius lateres fomenta uicē præbere
 quam tiones igniti & extincti, maxime quā Hippocr. iam citato loco testas ca-

lentes & ignitas id est, *ὑπεραισθητικά* in fomentis probet. Quod uero Celsus dixit, & in uasa fictilia ad similitudinem quas lenticulas uocant, aqua conficitur, sic accipio, ut uasa fictilia indicet ad lenticularum similitudinem formata, in quibus aqua excepta fomentii gratia admoueat, ut plane ea sint quæ *περιπυριαι* Aetius. 9. cap. 18. appellat. Fomenta quoque, inquit, adhibenda sunt ex furfuribus, & per pyriateria phacota id est, uaporaria lenticulata, & per uescas bubulas ex oleo semiplenas, hoc est, *ὑπεραισθητικά* *περιπυριαι*; quanquam non solum phacota, fomēta dicta fuisse, sed etiam *περιπυριαι* substantiuo, id est, ut Celsus dixit, Lenticulas, Galenus ostendat in glossis Hippocraticis his uerbis, *ἀραιὰ, περιπυριαι* *ὑπεραισθητικά* *περιπυριαι*, id est, utres, appellat tegulas, quas etiam lateres & lenticulas uocant. Nisi apud Galenum *περιπυριαι* *περιπυριαι* sit legendum, id est, fomenta lenticulata. Quod si recta est lectio Galeni, *περιπυριαι* omnino Celsus Lenticulas reddidit, sicut *περιπυριαι* per lateres, siue titiones expressit, utra tandem uox est apud Celsum genuina. *περιπυριαι* enim græcis medicis non solum Galeni ætate, sed etiam ante Celsum, dictæ sunt reliquæ ab igne exemptæ, siue lignorum siue testiarum hæc essent partes, quæ exinctæ & panniculis inuolutæ, fomēti gratia adhibebantur, ut & titiones, & lateres apud Celsum legi possint, ex *περιπυριαι* conuersi. At uero aliud est genus *περιπυριαι* *ὑπεραισθητικά* ab Aetio serm. 10. cap. 18. proditum, ubi in cura Ictericorum exudationes & ad solem, & in balneis, & ad pyriateria sicca probat, cum niri & fecis uini inpersione. Vocatur autem idem genus etiā *ἰκτερίκιον*, & à Cor. Cello capitis supra citati principio Laconicum. Sudor etiam inquit Celsus, duobus modis elicitur, aut sicco calore, aut balneo. Siccus calor est, & harenæ calida, & Laconici, & Cilibani, & quarundam naturalium sudationes, ubi è terra profusus calidus uapor ædificio includitur, sicut super Balas in muretis habemus: præter hæc sole quoque & exercitatione is mouetur: Laconici autem appellatio est à Laconibus, id est, Spartanis, quibus fuit in usu, uelut indicat Martial. poeta lib. 6. epigram. de therinis Hetrusci. Ritus si placeant tibi Laconum, Contentus potes arido uapore, Cruda uirgine Martiaq; mergi.

Meminit Laconicorum etiā Columella in præfatione operis sui de re rustica: Mox deinde ut apri ueniamus ad ganeas, quotidianam crudiatem Laconicis excoquimus, & exusto sudore sitim querimus. Ex quibus uerbis palam citatis auctoribus declaratur, quod etiam nunc hodie in balneis tepidarij nostris pyriaterium, & tholus, & Laconicum existit. Nimirum testudo illa, unde uapor siccus egreditur ad sudorem ciendū, corporibus interim in uicina tabula exudatoria prostratis eum excipientibus: ut mirū sit quomodo ptylisma aut potius *περιπυριαι* exercitationis genus, à Galeno lib. 2. *ὑπεραισθητικά* proditum, Angelo Politiano alias doctiss. & magni in literis indicij uiro usum sit, in Laconicum uaporarium siue sudatorium producere, tanquam uidelicet in Laconico *περιπυριαι* se exercerent, quum id nullo modo fieri possit, ut aliquis summis pedibus ingrediens, (Sic enim Galen. exercitationem eam describit,) protentisque manibus celerrime progrediens, alteram retrorsum, alteram prorsum ferens, in Laconico consistat, rotundo, calenti, ignito, & ad cursum in eo faciendū inepto: maxime quum ibidem declaret Galen. eos qui hoc gymnasio exercentur, ad murum consistere, ut sicubi lapsentur, apprehenso muro facile se erigant, atque ita exercentium lapsus lateant, & ipsa exercitatio leuior existat. Quid quod ibidem Politianus Miscellaneorum cap. 32. contra seipsum asserit, Laconica fuisse in orbem constructa, ut *περιπυριαι* penitus in ipsis uersari non potuerint. Producit autem locum Vitruuij ex lib. 5. de architect. qui sic habet. Laconicon sudationes quæ sunt coniungendæ tepidario, æque quàm latæ fuerint tantā altitudinem habeant, ad imam curuaturā hemisphærij, mediūq; lumē in hemisphærio relinquuntur.

ur, ex eoq̃ dypeũ aneũ catenis pendeat, per cuius reductiones, & dimissiones perficietur sudationis temperatura, Ipsumq̃ ad circinũ fieri oportere uidetur, ut æqualiter à medio flammæ uaporisq̃ uis per curuaturæ rotundationes peruageatur. Hæcienus Vitruuius ostendit Laconicon esse id, cuius imago si non ex toto, saltem magna ex parte hodieq̃ in balneis nostris uisitur, & quod Laconicon ac Pyriaterium uelut idem Politianus uoluit, recte appellatur, Sed quod in eo orbe exercere se pityliffantes potuerint, nihil uerissimile habet, neq̃ credibile omnino existit. Ceterũ Iuuenal. poeta satyra ii. quĩ ait, Qui Lacedæmoniũ pityliffmate lubricatorbẽ. nõ de pityliffmate quod Politianus ex Galeno profert intellexit, sed de pityliffmate quidẽ sensit, uelut etiã legendũ est, & non pitysmate, uelut quibusdã uisum fuit. Significat autem Iuuenali pityliffma, motũ ac gesticalationẽ manuũ, qua & Senatores & equites Romani Lacedæmoniũ orbe, id est, anulos lubricos facere solebant, Quales gesticalatores quosdã etiã hodie uidere est, in magnis hominũ cõuentibus ac cõlessibus uel maxime anulos digitorũ lubricantes, eos detrahẽdo ac digitis rursus addendo: ut hĩc rectẽ senserit, & immeritõ reprehensus sit ẽ Politiano Domitius, qui per Lacedæmonium orbem anulos, quorum à Lacedæmonijs usus manauit, intellexit. Verũ quod idẽ pitysmate legit, & pitysma irrationem leuis sputi exponit, quo uidelicet anuli lubricentur, hoc certe male cõfinxit. Nam ut demus pitysma hoc significare, tamẽ nõ solum ineptũ sit, sed etiã sordidũ, sputo subinde digitos inquinare, quo anulus lubricus fiat. Et hoc etiã fieri nõ solet, nisi anulus uehementer sit digito impactus. Quĩ autem satyrica periphrasi Senatores ac Equites Iuuenal. notare uellet, eos qui anulos manuũ motu ac gesticalationẽ lubricat dixit. Quod aut pityliffma manuum motũ ac gesticalationẽ significet, Hesych. docet, qui uocẽ πύλισμα exponens ait, πύλισμα, σποράκι τ' ἄλλοις ὅταν πυνκτῶς ὑποφίεσθαι. Ab hac itaq̃ uoce formatur uerbũ πυνκτίζω, unde est uerbale nomen πυνκτισμα, à Iuuenale usurpatũ. Sed & exercitatio à Galeno prodita pityliffma ab hoc uerbo uocatur. Nam & in ea manuũ exercitatio motus fiebat, uelut supra ostendi, ut sic à parte aliqua sui, appellationem eam inuenerit. Quare ex his iam relatis omnibus clarũ sit, Politianũ & in Lacedæmonio orbe, & in pityliffmate, toto celo aberrasse. Domitiũ aut in pitysmate tantũ. Fuit p̃terea uetribus & hoc genus ad exudandũ paratũ. Dolia nãq̃ parabantur uaporatoria, in quibus æger desudabat capite extra doliũ extrẽto, quo frigidi aeris inspiratio cõtingeret, reliquũ uero corpus omne sudore diffunderet, q̃d iĩ dẽ ὁλος ἦεν, & testudo, à similitudine uocari potest. Eius meminit Actius ser. ii. c. i. eiusq̃ usus aliquis etiã hodie superest, cupas quasdã nobis obuelatibus, atq̃ ita quasi in doliõ sedentibus, uapore uel ex herbarũ decocto, uel silicibus ignitis perfusis ad nos ad sudorẽ eliciendũ allato. Meminit eius etiã Paul. lib. 3. cap. 4. 3. οἱ πυρκαῖαι καὶ λελάνθαι ὅτι τοῖς διαπύρροις δι' αὐτῶν ἐμβαλεῖται τινὰ τὴν πυρκαῖαν σμικρὰν. Porro nõ solũ uasa fomentatoria, φακωτὰ greci appellant, à lenticulari ut Celsus dixit similitudine, sed etiã φακωτὰς ἐκκαπνίας, hoc est lenticulata scalp̃ra habẽt, quorum mentionẽ facit Galen. vi. Meth. libro, quos describit esse eos qui τὸ ῥ' φακωτὸς ἐστὶ τῆς πύρας πρὸς τὸν ἀμλὺν καὶ λαοὺ ἔχον, τὸ δ' ὅτι κατὰ τὸ μῖκρον ἐστὶν. hoc est Lenticulata incisoria scalp̃ra sunt quæ lenti similem partem in extremitate præminem obtusam & leuem habent, acutam uero secundũ longitudinem rectam, hoc modo.

qui autem huius excisoriĩ scalpelli usus sit ibidem Galenus abunde ostendit. Sequitur paulò post. Aut Hyperici drach. i. ex uino mulso propinato, uel aque mulse cyatho uno, sed in græco τρ. z. unciam l. legitur, quod pondus ut nĩmĩum præsertim in cyatho liquoris uno accipiendũ reprobo, drachmãq̃ legendã existimo.

quemadmodū cōtra in sequenti mox pharmaco immīnuta mēsurā mellis mihi videtur, in græco sic expressa, ἡ κωνία ἰσχυρὰ. το. β. μετὰ μέλιτος. το. α. ὡς ἐμέπε. γ. ἡ δὲ οὐ πίνε. quare pro το. α. id est uncia dimidia το. γ. id est quadrātem lego, velut reddidi, Sed & paulo inferius καὶ δ' ἔρωμαι pro καὶ δ' ἔρωμι legitur, & ὅτι ἄλλω ἰλασμοῖς pro ὅτι ἄλλω ἰλασμοῖς. Est enim non ad potionem referēdum, sed ad ipsum ægrum insolatum.

Aut adiāt & myrrhæ eius dimidiū ieiuno à balneo exhibeto in uñi hemina dimidia. Hoc medicamentū sic prōdit ut liberum relinquat adiānti pondus, ita ut quantū tandem quis accipiat, eius dimidiū de myrrha addat, quomodo etiam præcedenti lib. 8. cap. 9. de dauco & forniculo accipi posse iudicauit. Sequitur paulo post. Aut adiānti drach. i. myrrhæ drach. ii. mentæ drach. i. in aquæ heminis duabus coquito, &c. sed in græco codice hoc pharmacū cū præcedenti connexū est, per interuētionē particulæ ἡ, id est aut, rursus dirimendū. sed & σμόρις φραγ. id est myrrhæ drach. viii. expressæ habētur. pro quibus ego φραγ. β. id est, duas drach. reddidi: ut sic in græco hoc pharmacum legatur ἡ δ' ὡς τὰ φραγ. α. σμόρις φραγ. β. ἡ δ' ὡς τὰ φραγ. α. &c. Addit autē ad finem huius pharmaci, exhibendū esse ipsum à deambulatione & frictione, spiritu adhuc sublimiore existēte, hoc est ἐν μετὰ σμόρις φραγ. γ. καὶ δ' ἔρωμαι ὡς ἐν μετὰ σμόρις φραγ. γ. καὶ δ' ἔρωμαι dixit spiritū sublimem ab exercitatione deambulationis redditū. Sic autē appellare solet tum Hippocr. tum Galen. paruū & ueluti uideri alicui possit, ad fauces usq; tantū modo progredientē, non ad profunditatē thoracis descendētē, uelut lib. 3. de difficultate respirationis ipse Galen. declarat, ostendens ab Hippocrate sublimem spiritū dici paruū & modice densatū. Sequitur mox. Aut herbat Orontion appellatā coquito & cum decocto lauato. Quā hīc Archigenes Orontion herbat appellat, dubito equidē an hīc rectē legatur in græco exemplari, ἡ τὴν λεγόμενὴν ὀρόντιον ἡ τὴν, quā Orontion herbat apud nullum utriusq; linguæ scriptorē reperiā, Quare merito mihi diu locus suspectus fuit, donēc tandē in eam opinionē uenerim, Orontion herbat nullam aliam esse quā Origanū aliās appellatā, & fortaiss etiā ἰσχυρὰ pro ἰσχυρὰ est legendū, nisi & hæc una est appellatio quā Origanon significatur; huius enim suspitionis gratiā lectionem mutare nolimus. Hoc tamen apertē afferentes, nullam aliā esse ἰσχυρὰ, siue rectē siue corruptē dictā quā origanū, facultatis sectioniæ, attenuatoriæ & calfactoriæ à Galeno descriptā, ob quas uires utiq; hoc præstat, quod hoc loco de ea Archigenes testatur, Nimirū quod decoctū eius in balnei usu ictericis utiatū colorē detrahat, ita ut ipsa decoctū aqua statim utridis reddatur, atq; huius rei testimonium nobis ex Diosc. suppetit, qui lib. 3. de Origano sic ait. ἡ κωνία ἰσχυρὰ ἡ ἰσχυρὰ ἡ ἰσχυρὰ ἡ ἰσχυρὰ καὶ αὐτὴ ὅτι ἰσχυρὰ ὡς αὐτὴ. Quin & eius rei ego testis esse possum, qui & antea q̃ hūc locū legerim, & postea ac nuper ad eō aliquoties ab eius lectione, cōfidentius eiusmodi decoctio pro lotura ictericorū usus, origani hanc facultatē esse sum expus.

In Cap. ii. de splenis affectionibus.

Recenset Galen. hoc loco tria pharmacorū genera spleni indurato auxiliaria, Attenuantia uidelicet citra calfactionē, amara item & austera ad corroborationē; & secundū primā rationem, hoc est ex attenuantiū citra calfactionem genere, acetū & acetū mulsum esse dicit uisceri cōmoda, quibus ualde amara cōmiscēt, & aliqua austera, adstringentiū uidelicet generis. Ultra hæc uero tria genera quædam apponuntur materialia pharmaca, hoc est quibus reliqua excipi queant, & cōmodius applicari, uelut est cera, resina, pix, bitumē, sed uerba quibus hæc postrema sententiā exprimitur, corrupta sunt in græco exemplari, hoc modo. ἡ δὲ ἄλλω χρίσµατος ἡ σπινθὴρ, καὶ τὴν ἡ σπινθὴρ, καὶ τὴν ἡ σπινθὴρ. Restituēda sunt autem

autem sic. *ὅς δ' ὅλλω χροῖμα πῶς τῆν ὑπερμετῶν τε καὶ μαλαγμάτων, &c.* uelut nos reddidimus. Quin & proxima ante hanc sententiā linea *ὑπερμετῶν* pro *ὑπερμετῶν* habet. & in fine huius tractationis ante Andromachi *pharmaca*, uox *ὑπερμετῶν* deest, quæ inserta & restituta plenā sententiā efficiet, quam ego expressi, ut sic legas, *ὅς δ' ὅλλω χροῖμα πῶς τῆν ὑπερμετῶν τε καὶ μαλαγμάτων ὑπερμετῶν*.

Pharmaca potabilia ab Andromacho ad splenicis conscripta. In primo ex his pharmacis nasturtij nigri sesquidrachmam cōuertit, hoc est *καρδάμον μέλαν* *δραχ. ας.* Sed in græco exemplari *καρδάμονος μέλανος* habetur, qui error ob uiciniam utriusq; uocis non infrequens est in græcis autoribus, uelut iam sæpe indi caui. Esse autē Nasturtij nigri, & non cardamomi legendū, tum ex Dioscoride apparet, qui nasturtiū *πυλῶνα μύρω*, id est splenem minuere palam tradit, hoc ipsum de cardamomo ut uiribus imbecilliore penitus silens: tum ex Plinio ostenditur, qui lib. 20. cap. 13. duo nasturtij genera facit, album, & alterum nigrius, cuius sanè usum Andromachus hoc loco probat. Quamq; autē idem Plin. ex cardamomi generibus tertium breuius atq; nigrius depingat, tamē huius usum hic imbecilliorē puto, et cardamon, id est, nasturtium iuxta Dioscor. testimonium accipere malo, maxime quum & uetus interpretas nasturtij nigri legerit. Quare in sequentibus duobus pharmacis, in primo nasturtij drach. III. in secundo. VI. reddidi: quamq; non *καρδάμον* sed *καρδάμονον* in exemplari græco expressum sit.

Pharmaca potabilia ab Asclepiade ad splenem cōscripta. Inter hæc pharmaca habetur, Aut herbam pelargitū appellatā tufam ac cribratam dato ut prædictū est, hoc est, *ἡ βοτάνη ἢ λεγόμενη πελαργίτις ὡς καὶ ἡ σῖζας ὁ δὲ καὶ πωρῶνται.* Sed fateor me tamen dubitare an *πελαργίτις* uox hic rectè legatur, & si rectè legitur, palam confiteor me nescire quæ sit hæc herba, quando sanè apud nullum utriusq; linguæ autorē hanc herbæ appellationem repertā. Plin. quidē *daphnoides* fruticē *pelasgū* appellari dicit, sed Dioscor. eo loco *πέπλος* habet, ut eo non libeat animū acclinare quo *πελαργίτις* uox ex *pelasgi* appellatione facta sit, modo quo Artici *pelasgos* populos *pelargos* dixerūt, Strabone lib. 4. autore: quum *daphnoides* ipsum, uulgo laureola dicta, hūc usum nō præbeat, in quē hoc loco *pelargitis* assumenda proditur. Suspicio est quidē magna ponisse *πελαργίτις* pro *πυλῶνι μύρω* irrepere, sed & hæc frutex est potius q̃ herba, aliās & à Diosc. & Galeno, itemq; Paulo ac Plinio lienem eliquare & absumere prædicatur, certo dierū spacio drachmæ pondere ex uino tum semine, tum folijs eius acceptis, ut hic locū habere possit, nisi neq; seminis, neq; foliorū, neq; eius ponderis mentio fieret, sed totius herbæ tūdendæ ac cribrandæ, & in potu exhibendæ, uelut dictum est. Dictū est autē ab eo in præcedenti pharmaco, cochlearia duo fructus myricæ cum aceti mulsi cyathis tribus exhibenda esse, ut & hæc herba eadē mensura ex eodē liquore sit accipienda. Quare in re incerta nihil pronunciare ausim. Est & suspicio *πελέωνος* pro *πελαργίτις* fortè legendū esse, proditur enim *pelecinos*, hoc est securidaca appellata herba, aut frutex potius, uiscerum obturationes expurgare, ob uim amarā & subacerbā, atq; hæc uis & in semine eius, & in ramulis cōtinetur Galeno teste. Quin & *λογίτις* & *φρυγίτις* uoces, similitudinē ad *πελαργίτις* herbam habent, ut hæc pro altera earum supposita uideri possit. Est autem utraq; appellatio aspleni, quæ & *scolopendria*, & *hemionitis* uocatur, atque hæc omnium aptissima hoc loco existat, & suprà ab Andromacho, & ab ipso etiam Dioscoride ac Galeno splenem absumere prædicata, Nihil tamē pronūciamus, liberam relinquētes iudicationem, quā fidem nostram in interpretando præstiterimus, præscriptam *πελαργίτις* herbam fideliter reddentes.

Pastillus splenicus tumorem eliquat. Hunc pastillum drachmæ unius pondere

dere ex tribus acetī mulsi cyathis dandum conuerſi, ſed in græco exemplari *διδαται δραχ. γ. καὶ ἡμίονος πένθος γ.* habetur, hoc eſt Dantur drachmæ III. & acetī mulſi cyathi tres. Eſſe autem drachmarum pondus nimium uel hoc indicat quod antea ex pharmaco paſtilli drachmales formari iubentur, hoc eſt ut ipſe ait, *γίνονται τρεῖς παſτίλλαι ἀπὸ δραχ. α. ἑκατοῦ.* hoc eſt fiunt paſtilli drachmæ pondere, quorū uidelicet unus pro uice exhiberi debet: aliās haud dubie trium drachmarum paſtillos effingere iuſſiſſet, ſi trium drachmarum pondus pro uice ſumī oporteret. Sed & Aetius ſermone 10. capite 11. hoc pharmacum bis recensens utroque loco drachmam unam tantum, cum acetī mulſi cyathis tribus propinat. Quin eſt *δραχ. γ.* rectè legeretur, oportebat etiam *διδαταται* legi pro *διδοται*, quod quum non fiat, certum eſt numeri ternarij notam, γ. pro unitatis numero α. irrepiſſe; & ſuppoſitiuiam eſſe.

Chryſermi paſtillus ſpleneticis, hydropicis, cit urinam, mollit aluum.) Hic paſtillus Archigenis nomine ab Aetio loco iam indicato citatur, ἡſδὲ penitus per omnia uerbis & ſententiā, niſi quod ſeminis dauci ſimpliciter uncia una habetur, pro qua hoc loco *δαύνου ἀνίρμας* & *ἡμίονος*, i. da. 10. α. hoc eſt ſeminis dauci acetabulum, quod eſt uncia una legitur: & uerba quæ ſequuntur, *ἔχον δὲ καὶ πρεσπυκάνθος πένθος δ.* Aetius in totum non habet, quæ etiam nos ut ſuper ſua & hoc non pertinētia reliquimus. Sed & quod diximus, erui moliti choenice, id eſt *ἡμίονος ἀνιρμάς* χινηται, Aetius farinæ erui uncias XXV. habet. Quod itaq; legitur *ἡμίονος* i. da. 10. α. penitus falſum eſt, quum oxybaphum ſiue acetabulum non unquam unā capiat neq; menſuralē, neq; ponderalem, neq; liquidarū, neq; aridarū rerum, ſed ſesquicyathū, uelut alibi ex Paulo & Galeno oſtēdi, & iuxta diuerſos li quores, pōderalis librę diuerſas partes. Habet enim acetabulū olei drach. XVIII. id eſt, uncias duas, drach. II. Vinī uero drach. XX. id eſt uncias duas & dimidiā. Mellis drach. XXV. hoc eſt unc. III. drachmas tres: quemadmodū item ſuprà nobis ex ἡſδὲ autoribus eſt cōmonſtratum. Quin & iuxta diuerſitatē rerū aridarum diuerſas item librę partes acetabulum pendit, ſed tamen ſerē olei pondus drachmarū ut dixi, XVIII. ipſi attribuitur. Quare omnino uitata & falſa eſt hæc lectio, pro qua iuxta Aetiū uncia quidem una eſt reſtituenda, ſed oxybaphū penitus reiſciendū. & ut hac parte ſententiam meam explicem, opinor *ἡμίονος* uocem pro *δαύνου ἀνίρμας* irrepiſſe. ſi enim ſic legas, *δαύνου ἀνίρμας* & *δαύνου ἀνίρμας* i. da. 10. α. id eſt ſeminis dauci octo drachmas, quod eſt uncia una, habebis omnino pondus in Aetio expreſſum: & hoc ipſum octo uidelicet drachmas unciam unam efficere, ab ipſo Galeno eſt declaratum ſuprà lib. 6. cap. 1. ubi & nos ponderum rationem explicauimus. quod ſi quis tamen *ἡμίονος* non delendum cōtendat, neceſſario penitus eius capacitatem pro ſuperius indicata ratione ex Paulo augebit, ſed hoc faciens Aetiū lectionē non ſequetur, qui cum huius ſeminis, rum ſequentium aniſi, ſeſelis, radicis panacis, iridis, ſingulorum unciam unam habet, quam ego ſequutus ſeminis dauci drachmas VIII. hoc eſt unciam unam, conuertit, uitata lectione uelut dixi reprobata. At uero quod erui moliti Choenix hic præſcribitur, cuius loco Aetius uncias XVI. habet, magna ponderis & menſuræ diuerſitate dictum eſt: quādo iuxta Pauli ſententiā Choenix ſextariorum duorum eſt. Sextarius autem unciarū XVIII. ponderaliū olei ponderis, iuxta eundem exiſtat. Quare ſuſpicionem habeo quod *χινηται* uox pro *ſιςται* ſuppoſita ſit, quæadmodū in Aetio idē aliquoties cōtigſſe ſuprà memini. Sextarij enim menſura duab. tantū uncijſ Aetiū pōdus ſuperaret, cuius nulla ratio in hoc pharmaco habēda eſſet. Quamq; ſi iuxta Galeni traditionē ſextariū expēdere uelimus inuenimus in ſextario Attico uncias menſurales XVIII. ponderales uero, XV. & in Romano

Romano sextario mēsurales uncias **XX**. ponderales **XVI**. drach. **V**. scrupulum **I**. Tradit enim libro quinto pharmacorum τῶν κατὰ γῆρα compositionis, Corylam atticam pendere drachmas **LX**. utpote quæ unciarum nouem Italicarum mensuralium existat, quæ nouem uncia mensurales, septem & dimidiū ponderales uncias pendant, quæ drachmas **LX**. efficiant, uncia una octo drachmatum constituta. Sed adscribam de hac re ipsa Galeni uerba. ὁ μὲν γὰρ ἦρας ρπ. δραχμαὶ ἑξα-
ψαρ, εἰς σάβμωρ ἀνδράγων, οὐκ εἰς μίτρον τὸ ἔλασιν, ὥς εἰ. δραχμαὶ ἑλκυσσας πλ. κτύλρι. καὶ
γὰρ ἔλας ἦν ἀπὸ τῆς ἑ. οὐγγιώνους τῶν ἰταλικῶν. ἑλκυσσι γὰρ αἰθ. οὐγγίαι ἰταλικαὶ, αἰθ. ὅτι
ταῖς κατὰ τὴν μεμβρίαν κίρσιν, ἐπὶ τῇ καὶ ἡμισίαν οὐγγίαι σάβμωρ, αἰτίνθ. εἰ. δραχμαὶ γίνον
ταί, πῶς μίαν οὐγγίαν. εἰ. δραχμαὶ ἑλκυσσας. Iuxta hanc itaq; ratiocinationem sextarius
Rhomani uncias **XVI**. drach. **V**. scrupulum **I**. ut dixi pendit, & Atticus uncias
XV. Verum uero pro choenice hoc loco legas & accipias, non longe à **XVI** un-
cijs erui moliri ab Aetio præscriptis aberrabis. Nolo tamen alicui autor esse mu-
tandæ lectionis, quādo etiam ipse iuxta exemplaris præscriptū, choenicem con-
uenterim, diuersitatem tantum lectionis indicare uolui, ut studiosos ad similia di-
ligentius æstimanda excitem. Quod uero Choenix duorum sextariorum sit, Pau-
lus libri 7. sine de aridorum mensuris explicat, quem locum etiā hic adscribam
integrum, ut quum suprā & pondera & mensuras liquidorum ex eodem expli-
carim ac restituerim, etiam hic locus integer & explicatus, atq; sic tota pōderum
& mensurarum ratio, habeatur.

πῶς μίτρον φησὶν.

ἡ λίγυσις ἀπὸ τῆς ἑ. α. μο. γ. ὁ δὲ μόδιος ὁ ἀγνύσις. ὁ δὲ ἰταλικὸς ἔχει χείνικας. κ. ἡ
δὲ χείνις. εἰ. β. ὁ δὲ ξίσις ἡμίσις. β. αἰθ. καὶ ἡμίσις πρὸς γογόνουσι. ἡ δὲ ἡμί-
σις ἔχει λευκόνους. κ. ὁ πῆις μίσις ἔχει ἡμίσις. ιβ. ὁ δὲ ἡμίσις ἔχει χείνικας. α. αἰθ.
ὅτι τὸ μίσις ἔχει μο. ε. χείνικας. κ. εἰ. γ. τῶν δὲ τῶν σάβμωρ ἀπὸ οὐκ ἀνδράγων
ἐστὶ τῶν φησὶν ἀπὸ οὐκ ἀνδράγων ἐστὶ τῶν φησὶν ἀπὸ οὐκ ἀνδράγων. Hoc est.

Aegyptia Attaba continet Modios **III**. Modius Aegyptius & Italicus habet
Choenices **VIII**. Choenix sextarios **II**. Sextarius habet semisextarios duos,
qui sanè & heminae appellantur. Hemina autē habet cyathos **VIII**. Atticus
Medimnus continet Hemiecia **XII**. Hemieciū uero seu Semodius choenices
III. Quo fit ut Medimnus habeat modios **VI**. choenices **XLVIII**. sextarios
XCVI. Ceterum pondus harum mensurarū nō facile est proferre, quod immen-
sa diuersitas rerum aridarum iuxta lancis momentum & inclinationem existat.

Alius Eugerasia. Hic pastillus à nobis ad uerbum redditus est, sed sic tamen
ut lectionem quam exemplar præscripsit, quam uidelicet expressimus improbe-
mus, atq; sic legendum putemus, non quidem ex Aetio qui eum non habet, aut
ueteri interprete qui ipsum pro more suo transfiliuit, sed rei æstimatione commo-
ti, non quidem alicuius iudicio præscribentes, sed rem in communi æstimadam
proponentes. Sic itaq; legendum puto. ἄλλο θυμαρίσις, σκίλλης ὀπῆς λευκαπυλίου
μῆς δύο, βρυονίας ξίσις μῆς. β. πεπέρσις λευκοῦ τὸ ἴσον, πεπέρσις λευκοῦ
πρὸς τὸ ἴσον. ἑλκυσσας ἀλλὰ μῆς τὸ ἴσον. καὶ σκίλλης. εἰ. β. βρυονίας εἰς ὅσον
τα. κ. ἑλκυσσας. πῶς ἑλκυσσας. αἰθ. τα. γ. εἶναι φαλκίον εἰς ἀνδράγων ὅσον ἑλκυσσας.
αἰθ. πῶς ἑλκυσσας. καὶ φησὶν ὅτι σκίλλης, ὁ ἴδου δισκ. α. καὶ εἶναι λευκαπυλίου καὶ γ.
Hoc est. Alius Eugerasia. Scillæ affatæ depuratæ minas **II**. radicis bryoniae
minas **II**. pipēris albi tantundem, petroselinī tantundem, seminis dauci cretici tan-
tundem, erui moliti tantundem, cedridum sextarium dimidiū, macerentur in
aceti beffe, iridis, radicis panacis, myrrhæ, singulorum quadrantem. Vinī falerni
quod satis est his excipiedis, & in pastillos cogendis. Formatos autem pastillos
in umbra delicca, & drach. **I**. cum uini diluti cyathis tribus exhibe.

Epithemata & emplastra eiusdē Aſclepiadæ.) Hæc medicamēta ſerè omnia
bis à Galeno relata ſunt. Nam mox poſt horum enumerationem rursus præſent
bitur titulus, pharmaca ab Aſclepiade in quarto externorum cōſcripta : & con
ſequenter eadem pharmaca omnia repetitū, aliquibus tamen interſeritis & ad
ditis, ſortè quod in quarto externorum hæc poſtrema diſcuſionis Aſclepiadæ ſer
ries contineatur, & alio quopiā loco priora pharmaca ab eodem Aſclepiade ſim
perdita, aliis temere eadem in eodem libro bis inculcarentur. In prima itaq; enu
meratione pharmacū quo uſus eſt Tryphon Gortyniates habetur, ſed idem in
ſecūda enumeratione repetitū, Critoni Gortyniati Cretenſi inſcribitur, Quare
λεβντον pro *τρίφων*, aut uiciſſim hoc pro illo eſt ſuppoſitum, Tryphonis ta
men inſcriptionem utrobique legi & reddidi. In prima inſuper enumeratione plu
ra ſimplicia in idem pharmacum recipiuntur, & uſus ipſius certus præſcribitur.
In ſecūda uero ea ipſa quæ in prima ſunt, deſſe exēplaris uitio puto, ut primam
deſcriptionem rectam et ſinceram exiſtimem, niſi quod uerba quæ reddidit phar
macum autem impoſitum ſaſciolis complecti, & obliga, in græcis corrupta ha
bentur, hoc modo. *ἰσθδὰς τὸ φάρμακον καταλαμβάνεται ἰδίαις*. Sunt autem ſicreſti
tuenda uelut expreſſi, *ἰσθδὰς τὸ φάρμακον καταλαμβάνεται τιμῆς*. Porro in præce
denti ante hoc pharmaco ad finē, uiſci trientem conuerti, ſed in græco *ἔξοντος*
habetur, id eſt, aceti trientem. *ἰς* itaq; pro *ἔξοντος* reſtituendum eſt, uelut in eodem
pharmaco in ſecunda enumeratione repetito habetur. Quin & in ſequenti phar
maco *καρδωμικον* pro *κάρδιαμον* falſò expreſſum habetur, quod in ſecunda enu
meratione recte *κάρδιαμον* ſcriptum legitur, & legēdum eſſe in his omnibus phar
macis ſuprà oſtēdi. Quod uero ad finem huius pharmaci præcipitur, Tertia die
gymnaſijs utendum eſſe, quæ ſpiritu acutum reddere ualeant, hoc eſt *ἐκφύοντος τὸ
πρόβλημα διαφύοντος*, ſic accipiendū eſt, ut non deſinant ab exercitijs priuſq; anhel
ſiant, ſpiritu ipſorum acuto reddito, hoc eſt uehemētèr paruo & denſo, talis enim
ἐκφύοντος πρόβλημα appellatur, uelut in III. de ſpirādī difficultate ipſe Gal. declarat.

Malagma ex Cedria ſpleneticis, hydropicis, medicamētum accommodatum.)
Pharmaca quæ in hoc malagma recipiuntur, in pellem albam infarta a ſtēcūs lo
cis imponere iubet, quomodo etiam in priori enometatione idem pharmacum,
ſed ex calce & uiſco ſolum cōſtans, alba pelle infartum imponere iuſſit. Sic enim
habet, *ἰμπαλῶδες αἰς δίσκου λευκὸν ἀντιπῖδα*. Verum hoc loco *ἰμπαλῶδες* ἢ *δίσκου* λευ
κόν, τὸ αὐτὸ ἀντίπιδος λευγρόν, *ἰσθδὰς* expreſſum eſt, atq; haud ſcio qua ſignificatio
ne accipiendum ſit, τὸ αὐτὸ ἀντίπιδος λευγρόν, & dubito an hic recte ea uerba legan
tur, & non ſuppoſititia exiſtant, maxime quum ſuprà ſimpliciter pellis albæ me
minerit, Nam quæ pellis *αὐτὸ ἀντίπιδος*, id eſt, à ſpina detrachi poſſit non uidet. Sed
tamen quum non pellem à ſpina detractam dicat, ſed à ſpina appellatam, ſuſpica
tus ſum *δίσκου* τὸ αὐτὸ ἀντίπιδος λευγρόν, eſſe pellem Herinacei, quem *ἐκφύοντος* ap
pellari, Galenus huius operis libro. I. cap. I. ſine teſtatur. At uero quum pellis aut
cuticulæ Herinacei hunc uſum eſſe, nulquam proditum ſciam, ambigo an Heri
nacei pellem albam hoc loco accipere oporteat, quam uſtam ſanè alopecijs pro
deſſe, & Galenus loco iam citato, & reliqui ſerè omnes medici græci ac latini me
minerunt. Poſſit fortaliſs alterius alicuius animalis pellicula accipiēda indicari,
ſed quis de hac diuinare queat aliter quàm ego iam diuinaui? Quare ſi cui diui
natio mea placet, eam pro libito ſequatur, Ego ut fidem meam in uertēdo præſta
rem, pellem albam à ſpina appellatam, conuerti. liberum relinquens ut accipiat
quiſq; quā uelit. Si quis tamen Herinacei pellem accipiat, habet ſatis euidentem
appellationis rationem. Eſt enim *δίσκου* αὐτὸ ἀντίπιδος λευγρόν, idem quod *δίσκου*
τὸ πρὸ ἐκφύοντος, ut ſortè non minus rectè, ſed tamen minus ænigmatice, *δίσκου*
λευκόν

αδύνη τοῦ αἵματος. Legi queat, quod tamen pharmaci scriptori nō placuisse patam est, ut qui rem ultro illis uerbis obscurare uoluit.

Aliud Fabullæ cōpositum ualde præclarum. Ad finem huius pharmaci habetur, *pharmacū est tussile*, id est, quod cōtunditur, quod in græco exēplari sic habetur, *κοπήν δὲ τὸ φάρμακον*. Appellant itaq; *κοπήν φάρμακον* quod non coquitur, sed tunditur, ac liquoribus modice adstillatis ad malagmatis formam redigitur, nisi res tūdenda per se moderate humectæ existant. Eitq; hæc locutio, *κοπήν δὲ τὸ φάρμακον* eiusdē significati, sicut quā dico *κοπήν τὸ φάρμακον*. Suntq; ambæ loquutiones multi apud græcos medicos usus. Paul. lib. 4. cap. 55. ad contractos articulos emplastrū refert, de quo ad finē dicit *κοπήν δὲ τὸ φάρμακον*. Ita ἡ κοπήν ἐν γαστρὶ ἐστὶ λυγρὴν ἰένειν, ἢ λυγρὴν, ἢ διαφρίναι, id est, Tussile est pharmacū. Est autem & nō tussum bonum, si irino, aut cyprino, aut laurino dissoluatur. Sic enim apud Paulum legitur. Possit tamen fortassis rectius, pro *κοπήν* legi *κοπήν*, ut medicamentū lassitudinem eximens accipiamus, quorū usus est ita cum unguentis dissolutionum, per mollem & perseverantem affricū, uelut ibidem Paulus subiungit.

Pharmaca ab Archigene ad splenicis in primo medicamentorum secundum genus cōscripta. Inter cataplasmata hic ab Archigene tradita habet. Aut Capy parim maceratam aceto ac tritam ceratō cyprino exceptā. hoc est, *ἡ κοπήν δὲ βεργυρίου ἐν ὀφθαλμῶν ἀνθρακῶν λυγρὴν λυγρὴν*. Sed in græco *ἀνθρακῶν* pro *ἀνθρακῶν* habetur. Paulō post habetur. Aut lepidij folia impōnitō. hoc est, *ἡ κοπήν δὲ λειπιδίων φύλλων*. Sed in græco legitur, *ἡ κοπήν δὲ λειπιδίων φύλλων*. Porro tum in his, tum in precedentibus sæpe, retrinimenta ab excepta myrobalo relinqua, conuerti in *πύσμα* *μυροβαλάνη*. Neq; enim aliud accipiendū his locis uidetur; quanq; & succus ipse *πύσμα* uocetur aliquāidō, uelut libro 1. ostendit. Ceterum quod ad finem capituli de uena retro sinistra aurē secanda legitur, in græco exemplari corrupte habetur hoc modo. *τὴν ὑπὲρ τὸ ἀριστερὸν ὄμα φλέβα λύναι*. Legendū autē est sic. *τὴν ὑπὲρ τὸ ἀριστερὸν τὴν κερδαίνου φλέβα λύναι*, uelut ex Aetio ser. 18. cap. 11. patam uidere est qui idē auxiliūmi prōdit.

In Cap. iiii. de hydropē siue ā aqua inter cutem.

Inter pharmaca Asclepiades ex quarto externorum Marcellæ inscripto; quam falsō *πύρ* *ἰσός*, id est, interiorum pro *πύρ* *ἰσός* legatur; mox ā principio habetur. Farris quod zeam uocant, moliti sextarios 11. id est, *φάρμακον ὁ καλὸς ζεαμ, ἀλλὰ σπυρίον* f. b. Far itaq; & zeam his uerbis pro eadem re Asclepiades agnouit, quā tamen sint diuersæ, uelut suprà lib. 2. abunde ostendit. Sed quæ aliquāidō inter se confundantur, maxime quum eundem usum præbeant. Zea enim proprie est ex qua sit alica, sicut far ex frumento siebat, iam quum res facitūæ pro nauyalibus usurpentur, & facitūæ etiam inter se, itemq; naturales inter se, ob similitudinē appellationes mutuuntur, uelut ibidem indicauit, sit ut far res facitūæ prium pro frumento ponatur, & mox etiam pro zea quæ frumētī species existit. Quanquam hanc græci exemplaris lectiōnem, ā me ut habet reddidit, corruptam existimem, & non *φάρμακον ὁ καλὸς ζεαμ*, esse legendum, sed *φάρμακον καλὸν ζεαμ*, *ἀλλὰ σπυρίον* f. b. quo modo sanē Aetius (ipse, sermone 10. cap. 22. apertis uerbis habet. ubi planē idē Epithema recēset. Quomodo autē fieret far Clusinum alijs locis ostendit, in quibus item eius lectiō fuerat extincta, & ā nobis denuo est restituta. Siue igitur hanc Aetij lectiōnem sequeris, siue farris & zææ expositionem quam ergo retuli acceperis, rectam sententiā habebis. Nimirum ut farris farie nā sextarios duos in pharmacum assumes.

Aliud ex Critone, scenigræci moliti ac cribrati sextar. 11. Ad finē huius epithematis in græco exēplari, post uerba. *ἡ ὑπὲρ τὸ ἀριστερὸν ὄμα φλέβα λύναι*, sequuntur

sequuntur uerba. *ἡρὸν λίτρα.α. πέντες θυγῶς λίτραν μίνα, τὰ πικρὰ κατὰ τῶν θυγῶν*, quæ penitus sunt delenda, utpote quæ neq; ad præcedens neq; ad sequens pharmacum pertineant, neq; per se pharmacum iustum nobis præscribant. Quod autem dicit, utere subscripta confectione, de malagmate ipoterio accipiendum est, quod proxime sequitur. quæq; non *μαλαγμα τὸ ipoterion* legatur quomodo conuerit ex Actij præscripto, sed *μαλαγμα τὸ ipoterion ὡς χαφίμλον* id est, Malagma poterium inscriptum. esse autem hanc nō rectam lectionem, ex Actio persuasus sum, qui *ipoterion* habet, & ex secundo ipoterio mox sequente, cui præscriptum est. *ἄλλο γυνῆαν ἢ ipoterion φάρμακον*, ita ut ἢ uocem connectendam putem cum uoce *ipoterion*, κ. tamen in ι. commutato, & legēdum *ἄλλο γυνῆαν ipoterion φάρμακον* uelut red didi, Aliud præclarum Ipoterium pharmacum. Nisi quis penitus nobis persuadeat, *ipoterion* dictum esse hoc medicamentum, quod instar poculi resorbeat humiditates ex alto, nam & hæc uerba pharmaco sunt adscripta, Nempe *ἀναμίνα πικρὸν ὃν δάδι ὅ γράσις*. Ipoterij appellatio autorē potius referre uidetur.

Aliud Bithynum appellatum.) In hoc emplastro, farinæ loliaceæ libram dimidiam conuerit, sed in græco exemplari *ἀλδύρον ἰρίνου λίτρας,ε.* habetur, hoc est, farinæ irinæ siue iridis. Et sanè iris tum in præcedens tonsoris emplastrum, tum in sequēs ex seminibus recipitur, ut & hic aptissima esse uideatur. Sed quum tamen in illis emplastris non *ἰρίνου ἀλδύρα*, sed *ἰριος* simpliciter & *δαυεικὸς* legatur, uisum fuit mihi hoc loco non *ἰρίνον* esse legendū, sed *ἀλδύρον*, quum lolio ut semini *ἀλδύρα* id est, farinæ appellatio potius conueniat quàm iridis radici, quanquam apud latinos Plinius sanè omniū rerum pulueres farinas appellare soleat. Habet autem tum lolium, tum iris uim calfacientiam & resiccandi, sed lolium iride amplius, iris autem magis tenuium partium existit. Sequitur paulò post aliud emplastrū, in quo iridis dlyricæ minæ quartam partem, hoc est, drach. xxv. conuerit, sed in græco codice drach. xxx. habentur, asserisco tamen adiecto, indice lectionis dubiæ & quam typographus nō sit assequutus, hoc modo. *ἰριος δαυεικὸς πικρὸς τίσις πικρὸς δὲ δάδι λ.* Vidēdum igitur de minæ pondere, ut inde ueram lectionem assequamur. Minæ itaq; triplices medicis græcis in usu fuerunt, Attica, Medica, & Alexandrina. Attica drachmarum centum fuit. Medica drach. c. xxxviii. Alexandrina drachmarum. clx. Si itaq; Atticam hoc loco accipere uelimus, minæ quarta pars drachmæ. xxv. erunt. Si medicam, drachmæ. xxxii. Si Alexandrinam, xl. Videtur autem omnino mihi accipiendæ esse Attica Mīna, cuius quarta pars hoc loco drachmæ. xxv. legendæ sunt hoc modo. *ἰριος δαυεικὸς πικρὸς τίσις πικρὸς δὲ δάδι λ.* ita ut α. character sit elapsus. & κ in λ. transmutatum, atq; huius coniecturæ meæ hanc rationē habeo. Totū hoc pharmacū ex rebus cōstat, quæ aut minæ pōdere aut minæ dimidiæ, aut minæ quartæ partis recipiuntur, præterq; pipet, quod drachmarum xii. & dimidiæ pondere accipitur. Ex hoc itaq; coniecturam facio, drachmarum. xii. & dimidiæ pipetis pondus, esse dimidium pondus quartæ minæ partis, & totius minæ octauā. Nam alias non tam exacte dimidiā drachmam ad. xii. drachmas addidisset, nisi drachmarū xxv. hoc est, quartæ minæ partis medietatem uoluisset indicare, ut ita à minā integrā ad octauam eius partem symmetria simplicium rerum in medicamentum receptarū descendat ac progrediat. Et iuxta talē planē modum Galen. ipse libro. γ. πικρὸν γυνῆαν Iclesij emplastrū Critonis descriptione recensens, ipsumq; cum Heræ descriptione cōferens, coniecturam facit, Minam ab ipso Critone drachmarum cētum usurpari, quum Heras centum drachmas pro minā exprimat, & consequenter ubi Crito minæ quartam partē habet, ibi Heras drach. x. xv. scribat: additq; Galenus eodem loco dissensionem eorum qui de ponderibus & mensuris scripserunt, quorum alii qui

qui unciarum XVI. aliqui unciarum XX. minam prodiderunt, Sed tamen Crito-
nem solere Minam centum drachmarum pondere usurpare, quæ uncias XII. &
dimidiam efficiunt. Sed adscribam Galeni de hac re uerba, ex quibus tota res cla-
rior reddetur. *Ἐκ περὶ φάρμακων δὲ πρὸς τοὺς τῶν παλαιῶν καὶ νέων γραμματέων, ὅπως εἶναι
ὁρίσας τοὺς μὲν, ὧν μὴ ἐκκαίδεκα λεγόντων ὀγγίων εἶναι τὴν μινᾶν, ὧν δὲ ἄποσι, ὧν δὲ
καὶ διανοσσορέων, καὶ τὴν μὲν ἀλεξασθοικίῳ ἄποσι φασκόντων εἶναι ὀγγίων, τὴν δὲ ἄλ-
λων ἐκκαίδεκα. καὶ ὅσοι μὴ ἐστὶ μικρότερον. ἀλλὰ τῶν εἰς δραχμὰς ἀναγόντων τὴν μινᾶν, ἐ-
στὶν οἱ φαίνοντες ἑκατὸν εἰς δραχμῶν, ὧν δὲ πλεονάζοντες καὶ τὴν σύγκρισιν οἱ πλεονῶσι, ἢ ἐπὶ
καὶ ἀρίστως δραχμῶν εἶναι φασιν, ὧν δὲ ἰ. μίονον, ἑτέροι δὲ γ. τῶν ὅπως ἰχόντων, πῶσων
δραχμῶν καὶ λογισαδὶ τὴν καὶ λεγόντες ἑκατὸν δραχμῶν μινᾶν εἶναι, καὶ πῶσων ὅσων. φαίνοντες
δὲ καὶ ὅτι ἄλλοις γ. δραχ. διελόμενοι εἶναι τὴν μινᾶν. καὶ ἄποσι ὅσοι οὕτως ἔχουσιν, ἐξέ. ἐξ. expendit.*
enim consequenter Critonis descriptionem cum Heræ compositione eo quo di-
xi modo. Quod autem dicit Galenus, Quidam Alexandrinam unciarum XX. &
aliā XVI. statuisse, uel ex Paulo Aegineta palam sit, qui uice uersa Aegyptiam
& Atticam unciarum XVI. facit, Romanam uero unciarū XX. uelut supra à no-
bis loco productio est ostensum: quanquam suspicor in Paulo ἰατρικῇ pro ἁπλῇ
legendum esse, quum Galenus iam citato loco Atticam palam centum drachma-
rum pronunciet, & aliā, quam Medicam accipio, unciarum sedecim. Nisi forte
nec ipsa Attica certo centum drachmarum pondere, hoc est unciarum XII. & di-
midia ab omnibus fuit æstimata. Porro sicut hoc loco secundum hanc coniectu-
ram, minam Atticam accipiendam iudico, pondus uidelicet centum drachmarū,
Sic in alijs quibuscūq; pharmacis reliquæ minæ usurpantur, tum in his libris, tum
in alijs, de comp. pharmacorum κατὰ ὄρον conscriptis, ut hac parte studiosos rei
medicamentariæ diligentem æstimationem facere oporteat, quæ Mina singulis
locis sit accipienda, atq; hac parte plerumq; etiam ipse Galenus nobis exemplo
esse potest, exacte diligēs uir in priorū medicorum cōpositionibus expēdendis.

Ex Archigenis secundo libro pharmacorū secundum genus.] Inter hæc phar-
maca habetur: Porro per omne curationis tempus unam aliquā ex his pononī-
bus ipsis propina, coryledonis drach. i. scillæ aridæ mūdæ drach. i. in uino mulso
diluto quotidie exhibet: sed in græco σκίλλης καὶ πρὸς ἑκὼς λίτραν α. legitur, pon-
dere palam nimis aucto. Sed & cōsequenter ubi habetur, καὶ ἰωνίου καὶ ἰωνίου καὶ
λαίου καὶ ἰωνίου δραχ. γ. χυλίσας, ἐξ. legendum est, καὶ ἰωνίου καὶ ἰωνίου καὶ
χυλίσας, ἐξ. ueluti conuerti. Quint & quod sequitur pharmacū hoc modo. Optū
me facit & hoc, Cancrī fluuiālis sicci tritū, pedibus ac eminentijs omnibus ampu-
tatis, drach. i. asari drach. i. misceto aqua ex ipso flumine unde cācri extracti sunt,
accepta: & propinato. Aliquando uero pro asaro, opobalsami par pondus addi-
tur. In græco sic habetur. κάλλιπ δὲ πῶς πῶς καρκίνος ποταμίου φαρὸν καὶ τῶν πῶ-
σων καὶ χαλῶν ἀλαμίνων δραχ. α. ὅπως ἐξελῶν. α. μίαν ὕδατι δὲ αὐτῷ ποταμοῦ ὅπως οἱ
καρκίνος, ὅπως πῶς ἐπὶ τῷ δὲ αὐτῷ ποταμῷ, ὅπως ἐξελῶν ὅπως. Pro ὅπως
itaq; ἐξελῶν. α. legendum est ὅπως. δραχ. α. Sic enim Aetius decimo, capite 36. le-
git: quanquam pondus utriusque rei, & cancri & asari, libra una sit expressum
in Aetio, quod hic drachma una habetur rectius omnino, nisi in Aetio etiam de
utraque libra singulas drachmas exhibendas esse accipiamus, quod omnino est
necesse. Sed & Asari esse uim calfaciōriam, urīnam cientem, & ob id hydropicis
commodam, Dioscor. & Galenus testatur, quæ uires in opio non sunt, pharma-
co somnum cōciliante, & dolorē sedante, quibus auxilijs hydropici non habent
opus. Sequitur paulū post. Hydropicos in balneo cum sale & oleo illinendos
esse, & solis testibus exudatibus ablutis, educendos esse, primum linētis, deinde
etiam reliquis amiculis contextis, hoc est ut in græco habetur. πρῶτον λινοτύβης,
Y 2

ἀπὸ τῆς λαοτικῆς πρὸς ἑλληνιστὶς συνουσιότητας. Sunt itaq; λῆγνια hoc loco uoce latina ab Archigene usurpata, sed uocalibus syllabarum transpositis, λῆγνια enim lintea appellantur. Usurpat eam uocem etiā Constan. Celsar lib. 10. cap. 22. λῆγναι inquit πάλαι καλεῖσθαι καὶ πρὸς ἡμᾶς αἰσινμαται, ἢ λιντια ἄκρωστα. Helisyh. πρὸς ἑλληνιστὶς exponit, quemadmodum etiā paulo post latina uoce usus est, φαρμακὶς ἄγρια, id est, fumaceum panem, edendum dare iubens. Quomodo autem fumaceus qui alias græcis ἰαννις est, ἢ clibanite differat, alibi indicauit. Sed & utnum nigrum Italicum aut Spicarium hoc loco mox sequitur. Spicarum itaq; cum dicere puto, ex spica nardi factum, Nardites Dioscoridi lib. 5. appellatum, & hydropicis uelut etiā alta eius generis, commodum ab eo proditum, quod ipsum paulo post Archigenes uinum Nardinum uocat; Nisi potius ἰαννις pro αἰσινμαται legendum est, ut Hispanum uelut Italicum gentilitia appellatio existat.

Inflatos uero maxime locos, uelicis magnis probe inflatis quotidie continenter pulsato.] Hoc auxilium item Aetius 10. cap. 29. prodit ex Herodoti & Archigenis autoritate. Meminit etiā Celsus. 3. cap. 21. Autotresq; multi sunt inquit, inflatis uelicis pulsandos tumores esse. Sequitur mox de Scarificatione talorum, & gestatione in lectica, quod in græco sic est. διὰ τὴν δὲ τὴν σφοδρὰν αὐτῶν, ἢ καὶ γὰρ ὅτι σφοδρὰ ἀνάσσει. Verum pro σφοδρὰ substituendum est σφοδρὰ, & efficietur lenis quem ego expressi. Sequitur ad easdē affectiones, Confectio Biennij, quam ego hoc loco supposititiam existimo, ut quæ ad sequentis capitis finem pertinet, tibi etiā rursus scripta habetur. Nolui tamen eam hic expungere, sed iuxta præscriptū exemplaris itidem adscribere. Legitur autē infra cōfectio Breniti, id est, ἄρνις, hic uero Biēnij, id est, βέννις, altera lectione corrupta, uel fortassis utraq;. Nam infra lib. 10. cap. 1. βέννις habetur de qua tamē nihil habemus quod pronūciemus, quō obscurus nobis sit hic autor, uelut etiā alij pleriq; in his libris citati, & sanē autoritatis rationem non multū referre ad pharmacorū facultatem, tam saepe dixi.

In Cap. iiii. De pharmacis dolorē sedantibus anodynis & Colicis appellatis.

Distinguit hoc loco Galenus inter pharmaca dolorem sedantia, duplicia existentia. Altera enim tussientibus commoda sunt, de quibus supra egit. Altera Colicis tantum conueniūt, de quibus hic pertractat. Est autem lectio uerborum quibus Galen. hæc dicit corrupta, quæ duplici modo restitui ac legi potest. Vel sic. αὐτὰ δὲ τῶν διὰ τῶν φαρμάκων σωθῆσθαι τοὺς βλαπτὰς ἀνασφαινοὺς ἀσθῆναι ἐν γαστρῇ. Vel sic quomodo etiā reddidi. αὐτὰ γὰρ τῶν τοῦτων φαρμάκων σωθῆσθαι οὗτοι τῶν βλαπτὰς ἀνασφαινοὺς ἀσθῆναι ἐν γαστρῇ.

Philonis Antidotus.] Hæc antidotus à Philone penitus ænigmātice uersibus elegiacis prodita est, quorum tamen sententiā ipse Galen. abunde declarat, ut hic me longiorē cōmentationem affuere nihil sit opus, Reddidi autē eodem carminis genere eadē item ænigmātica obscuritate custodita, ad quam tamen æque ut ad græcam intelligendam, Galeni expositio sufficiens existit, ad quā etiā hæc super addam. Versu quarto pro ἀνοδύν, quam nos difficile lotium reddidimus, uetus Interpres legit ἀνοσφαινοῖς. & sanē utraq; lectio recta est, quum & ad dysuriam, & ad dysenteriam, antidotus hæc cōmodet, uelut etiā Marcellus medicus in empiricis cap. 22. docet. Quare si dysenteriae lectionem quis malit uersum quantum latinum nostrū sic legat. Siue lapis uexet, siue dysenteria. Decimus ex ordine uersus sic legendus est.

Βῆχά τε καὶ πνιγμὸν, λιντια τε καὶ κιστῆριον.

hoc est,

Tussim, singultum, destillantēsq; fluores

Verum exemplar habet

Σίσιτο, etiā si quid strangulet excipio.

Βῆχά τε καὶ πνιγμὸν, λιντια τε καὶ κιστῆριον.

Pro λύσσει itaq; legendū est λύσσα, quā λύσσει rabiei significationis, uersus non ferat. λύσσα autē iudem ut λύσσει dici, palam est ex multis locis, Sed & Diosc. lib. 5. de facultatibus uinorū, Vinū sincerū immixtum natura austerū ad λύσσα σαρμάχου facere dixit, Verum Interpres eius pro sua sapientia dicit λύσσα pro singulis, hoc est, λύσσα λύσσει nō reperiri, Imō uocē λύσσα nihil significare, mutatq; temerarius lectionē, λύσσα σαρμάχου legendū adstruēs, magna suę ignorantię proditiōne, quā λύσσα, æque ut λύσσει. εν. etiā in uulgatis græcorū dictionarijs singultus significatiōnem habere prodatur. Versu deinde 19. πυρρός lege pro πυρρόδης. Et 24. ἰσθ pro ἰσθί a uerbo ἰσθί, id est, unio. Reliqua recte habent. At uero quod dixi, Inde Menœtiadæ occisoris ponito drachmam,

Qui pectoris densis uentribus excipitur.

In græco est,

καὶ τρίτον γὰρ πρόσωπον μετατιθεῖσθαι φωνή
δραχμῶν πλὴν μέλων γὰρ εἰς σαρμάχου.

Hoc est ad uerbum.

Et tertio loco conijce drachmā occisoris Menœtiadæ, id est Patroclī, qui occisor in uentribus ouis seruatur, estq; hic occisor nullus alius quā Euphorbus, qui uis delicti Patroclum occidit, Homero 16, Illados teste, uelut ipse Galenus declarat. Sed hic Euphorbus ænigmatice pro Euphorbio positus est, quod uentribus ouis excipitur & seruatur: Menœtiaden autem uocat Patroclum patronymica appellatione, hoc est Menœti filium, Sic enim Homerus ait. μεταίτις ἔλαμον ὕμιν, Vi detur tamen mihi in primis uersu, καὶ τρίτον potius quā ἢ τρίτον legēdum esse, ut sit hæc sententiā: & tertij inter Troianos occisoris Menœtiadæ drachmam ouium uentribus seruata. Hoc est enim quod ipse Patroclus Hectori postremo suo occisori obijcit, quod uidelicet prius a deo Apolline, & uito Euphorbio læsus sit. Sic enim apud Homer. 16. Illad. ait.

ἄλλῃ σὺν ἔκταρ μέγα δ' Ὀφρεῖ, σὶ γὰρ ἐπὶ δαίμον
πίνων ζυγὸς κροῖσθ' καὶ ἀπὸ πλάγῃ, αἰ μ' ἐπὶ δαίμονισιν
Nunc te iacta Hector, ubi quod uictoria cessit,
Qui loue sic taceo facile atq; ab Apolline uictus.

Id est,

Et paulo post,

ἄλλῃ με μὲν ὄλον καὶ λυγρὸν ἔκταρ ὕμιν
αἰ δ' ἴσθ' δ' Ὀφρεῖ, σὶ δ' ἐμὲ πρὸς ἔξω σαρμάχῃ
Sed me parca ferox, Latōne & filius aufert,

Id est,

Atq; uir Euphorbus, post quem tu tertius iustas.

Estq; ipse Euphorbus hoc modo tertius occisor Patroclī à Philone dictus nō ad ordinē, sed ad numerū respiciēte, Ioue tamē & parca, id est, satis exceptis. Porro quod Euphorbiū per Euphorbum indicatū, ouis uentribus excipere oporteat, itemq; seruare, etiā Diosc. lib. 3. tradit, Iubæ regis tēpore inuentū esse perhibens, Sed Galen. hic amplius Iubæ regi de Euphorbio libellū paruū scriptū esse testat. Plin: Euphorbiū ab Euphorbo Antonij Musæ fratre appellatū, per ipsum Iubā regē Mauritanizæ tradit: eo enim medico rex usus est, uelut Augustus Cæsar Antonio Musæ. Sic enim ais lib. 23. c. 7. Inuenit & patrū nostrorū ætate rex Iuba quā appellauit Euphorbiā; medici sui nomine & fratris Musæ; à quo diuī Augustū cōseruatum indicauimus. & addit. Idem fratres instituerē à balneis frigida multa corpora adstringi, & ut certum sit Euphorbiū Musæ fratrem, & utrosq; medicos artis dōctos fuisse. Ceterum uersus qui sequitur,

Viginti & drachmas candentis conijce flammæ, In græco sic habetur,

ἄλλα δ' ἀργυρίου πυρρόδης ἄνθος βαλάντιον, πλὴν ὅτι πρὸς σαρμάχῃ
Appellauit itaq; candentem flammam, ipsum piper album, à flammico seruiore quē habet, unde etiā πυρρόδης ἀργυρόν, quasi ignis candidū Philo dixit. Triā autē piperis genera uulgo nota distinguit & Dioscor. & Galen. hoc modo, ut primus

in nigro & longo pipere sit, quorū alterum alter .XXIII. drachmarū pondere, alter sex recepit. album uero in utroq; inter res sex drachmarū pondere amixtas habetur, & ἀγλαία a seniore appellatur. Ceterū reliqua in Philonis antidotum recepta sufficienter ab ipso Galeno explicantur, & ex collatione uersionis nostræ intelligi possunt. Verū Natarū tauri texturā, hoc est, *ταύρου θυγατρὸς γάλακτος*, dixit ipsum mel, propterea quod ex putrescentibus tauris apes generantur, quæ mel rexunt ac conficiunt, quod etiam Nicander in Theriacis testatur hoc uersu.

ἴππῳ δὲ σφακίῳ σφρίσῃ, ταύρου δὲ γάλακτος.

hoc est.

Et auro nascuntur apes, uel pæq; caballo.

Idem tamē uersus in primo epigrammatum græcorū ex Pallada citatur. A Mar. autem Varrone lib. 3. de re rust. ad Archelaum refertur. Verum quomodo hæc apum generatio ex bubulo corpore putrefacto fiat, luculentiss. docet Constant. Cæsar de agricultura lib. 15. cap. 2.

De Colicis pharmacis ab Andromacho conscriptis. Inter hæc Colica pharmaca habetur, Colica Cassij, cuius descriptio pōdere tamen uariante, est itē apud Scriboniū compositione. 119. Sequitur postea, Colica admirabilis qua utor, cuius descriptio est genuina Philonis, quomodo etiam Aetius eam habet. Verum pondas in ipsa duplicatum est ad superiorē in elegia descriptionem. Deinde *ὀνίς* *δραχμ.* in græco habentur, quum *ὀνίς* *δραχμ.* legendum est, uelut conuerti. Non longe post sequitur, Colica ut Scribonius, quam iuxta exemplaris præscriptum reddidi, sed non integram, ut apparet ex descriptione Asclepiadæ non longe post sequente. Quin & quod continenter ab eo sequitur pharmacum. Colica qua utebatur, præscriptum habens, non integra est, quæ itidem ut prior, postea integra inter Asclepiadæ pharmaca refertur.

Quæ Asclepiades ad colicæ affectus prodidit. Inter medicamēta Scribonij Lar gi pharmaci antea ab Andromacho relatum continetur, sed integrius quam supra uelut dixi, ut uel ex Aetio apparet, qui 9. cap. 31. penitus eandē descriptionem ad uerbum habet. Verū in Scribonij libello latino uulgato hæc compositio non habetur, neq; hac, neq; superiori descriptione. At uero quæ paulo post sequitur, Pacci Antiochi cōpositio, in eo ipso Scribonij libro continetur, compos. 122. sed tam longis uerborum inutilium ambagibus, ut uel inde appareat bellum eum a Scribonio non esse latine conscriptū, sed ab aliquo translātū qui forte de suo aliquid adiecit. Aetius tam citato loco descriptionē hanc nostrā habet in paucis euariantem. Porro quod dixi uino falerno per faccū nō excolato affuso, in græco est, *αἶνον ἀπὸ καλλυβίου φαρμάκου ἀδινύσιον. ἀδινύσιον* itaq; non defecatum est, & non excolato, quod per faccum fieri solebat, & ob id *καυκίον* appellabatur, uelut alibi memini. In Scribonij libello, hoc ipsum uinum falernum non saccatum uocatur. Aetius tamen falernum mari mixtum accipere iubet.

In caput. v. de dysentericis.

S Vpra libro 8. cap. 6. Galenus indicauit qui proprie hepatici appellarentur, quo loco etiam id a nobis additum est, pleroseq; falli qui hepaticos pro dysentericis agnoscunt. Quare etiā hoc loco Galen. ueros dysentericos esse ait, in quibus neq; hepatis affectum est, neq; alia affectio adest, præterquam ulcerationem intestinorum uel nuda uel cum putrefactione depascendo proserpente, nome græcis appellata. Ceterum signa dinotionis fluxus hepatici ab excretionē dysentericæ, longius ab Aetio serm. 9. cap. 43. & Paulo, 3. cap. 42. proditur. Galen. uero ea ipsa hic reliquit, ut qui propositū habeat, nō ipsas affectus dinotiones docere, sed rei medicamentariæ cōpositionem affectibus cōmodam prescribere; quancūq;

neq; duodecimo methodi, cuius hic meminit, illam partem fufius tractarit. Vox ipsa *Ανδρομαχίας*, malignam intestinorū affectionē indicat. Vnde etiā latini Tormina intestinorū dixerunt, neutra appellatione satis indicante ipsius morbi affectum ulcerosum.

Quæ ab Andromacho ad dysenteriam scripta sunt. Recenset Andromachus confectionē ex ordine secundam ex fructibus constantem, sed cuius descriptio nem corruptam haud facile strestinuere, quod hi fructus quos in hoc pharmaco recipiendos censet, nobis non extant, & ne nominibus quidē satis non sint, expendemus tamen omnes diligenter quorū antea in his cōmentarijs non meminimus, ut aliquam saltem cognitionē adipiscamur. Et primū quidem uidebimus quæ sint sorba Ephesina ab ipso appellata, quorum duos sextarios recipere iubet, habet enim *ἑνὴν ἰσχυρίαν*, f. 8. Videtur itaq; nobis *ἰσχυρία* vox corrupte legi, & pro ea aut *ἰσχυρία* substituendū esse, ut patriam intelligamus esse appellationem: quanquam de Sorbis Ephesinis me nusquā legisse meminerim: aut *ἰσχυρία*, ut accipiamus sorba colubentia, alui uidelicet fluxiones: hanc enim uim præcipue habent, ob *τὴν εὐφροσύνην* in ipsis facultatem, ita ut *ἰσχυρία* uox idē quod *εὐφροσύνη* significet. Verum ut hanc in ipsis facultatem esse cognoscāmus, & qui sint fructus sorba appellata discamus, locū de his ex 3. libro Galeni de alimentis adscribemus, ubi de mēspilis & sorbis simul agit, his uerbis. *καὶ τὴν αὐτὴν τὴν λέγουσιν ὅτι τὴν ἰσχυρίαν, εὐφροσύνην γὰρ ἔχουσαν, πολλὸν δὲ μᾶλλον ἔχει τὴν μάστιγα, διὰ τὴν συμφορὰν τὴν ἰσχυρίαν ὅτι ἔστιν ἰσχυρία, ἡ δὲ ἰσχυρία ἔστιν ἰσχυρία τὴν αὐτὴν, τὴν ἰσχυρίαν γὰρ ἡ δὲ ἰσχυρία ἔστιν ἰσχυρία, καὶ ἡ δὲ ἰσχυρία ἔστιν ἰσχυρία, καὶ ἡ δὲ ἰσχυρία ἔστιν ἰσχυρία.* Plinius porro lib. 15. cap. 21. quatuor sorborum differentias siue genera facit, & de quarto sic inquit. Quartū genus Torminale appellant, remedio tantū probabile, assiduū prouētū, minimūq; pomū, &c. Quod itaq; Torminale uocari Plin. dicit, uehementē suspicor id esse genus quod Andromach. hoc loco *ἰσχυρία* appellauit: ut quemadmodū Ephedricorum appellatio a sistenda alio est, sic Torminalium a commoditate quam torminosis, hoc est dysenteritis exhibet, ut deducta. Reddidi tamen Ephesinorum appellationem, non quidem asserens sic esse legendum, sed in medio relinquens ancipitem lectionem, nullius iudicio hac parte præscribens. Sequuntur mox in eodem pharmaco pira Terentiana XX. hoc est *ἑνὴν πεντηκονταία*. n. Sed & hic dubito an Terentiana pira recte legantur, quum Plinius in pirorum nomenclaturis explicandis diligentissimus, Terentianorum pirorum mentionem non faciat. Suspicio itaq; Tarentina legenda esse, hoc est *ἑνὴν πεντηκονταία*. Plinius enim libro 15. capite 15. inter pira quæ patriæ nomina habent, græca & in his Tarentina recenset. Nisi forte apud Plinium Tyrraniana pira falso pro Terentianis leguntur paulo ante hunc locum, ubi ait. Sed confessis urbis uocabulis autores suos nobilitauere Decimiana, & ex eo tractum quod Pseudo-decimianum uocant, Dolobelliana longissimi pediculi, Pomponiana cognomine mammosa, Liceriana, Severiana, & quæ ex his nata sunt Tyranniana, longitudine pediculi distantia. Sequuntur mox Mala Cestiana XXX. de quibus alio loco dixi, sicut etiam de siliquis, id est, *καρπια* quæ mox sequuntur. Sed in græco exemplari falso habetur, *μᾶλα ὅτι ἔστιν ἡνδάνη καὶ σιγὰ*. n. pro quō ego legendum censeo, *μᾶλα ἡνδάνη*. n. de coroneis enim antea meminit. At uerō quemadmodū in hoc pharmaco Sorba Ephesina, & pira Terentiana, nobis obscura & ignota leguntur, Sic in sequenti mox pharmaco item ex fructibus constantē, & appellatō, Mala Hermiblanca nobis ignotissima habentur, quādo sanē inter tot malorum nomina, neq; ipsorum Plinius mentionem facit. Habemus tamen fortissimā suspicionem ex characterū similitudine, Orbiculata hoc

lata hoc est *ἰσχυρά* pro *ἰσχυρά* legendum esse. Hæc enim Plinius ait ex figura orbis in rotunditate circūacti, esse appellata, additq. Hæc in Epiro primū prouenisse, argumento sunt græci, qui Epirotica uocant. Quare etiam *ἰσχυρά* pro *ἰσχυρά* legendum esse, culpam uideri possit. Sed ego cōiecturas meas indico, nihil definitio. Quod si uero pharmacū hodie nobis parandū esset, tum pro malis Hermiblacis appellatis, tum pro piris Terentianis, ex malorū ac pitorū genere inulsi adstringentia accipere nō dubitaremus, quū in his non aliud spectetur q̄ adstringēdi facultas, per quā dysentericis fluxionibus, eas sistendo, mederi possunt. Porro hi fructus nō solum dysentericis fluxionibus cōmodant eas restringendo, Verū etiam cibum nō cōtinentibus cōmode in cibo exhibentur, ita machi adstringēdi ac corroborendi, itemq. proritandi gratia, uelut Scribon. numero uulgatæ editionis 104. tradit, qui locus quū sit corruptissimus, in studiose rum gratiā à nobis adscribetur restitutus, nō quidē ex cōiectura, quā tamen partim adhibuimus, sed iuxta Marcelli medici præscriptū, qui hunc locum sicut pleroq. alios, ex Scribonio mutuatus est, cap. 20. Sic itaque utrobique legendum est. Atq. ita uarietate ciborū & perunctionis stomachum proritare, ita ut reficiatur halica ex mulso, aut malorū cydoneorū succo, uel ex granis punicis facio, aut si quos magis delectabit, frigida posca, secundū quæ sumpta & hapala proderunt oua, & intubi cocti, uel nō cocti ex aceto dati, itemq. lactuæ, & caules haplofiles ex posca decocti, aut ungula porcina excocta & madida: uulua quoq. & murices, & pelorides plurimū iuuant, & pomorū præcipue sorba, & mala orbiculata, & pira scauriana, crustumina, signinaq. in olla reposita. Item profunt uua ex olia sumpta, &c. At uero Scribonij corrector admonuit pro uulua, Volema pomorum legendū esse, ex cōiectura ut apparet, inducū ut de Volemis piris appellatis Virgilio & Catoni, poma faceret, memoriæ uidelicet lapsu, eiusdem deinde cōiecturæ cōfidentia, Scandiana legisse uidetur, nimirū pomorū Scandianorū apud Plin. & Columel. respectu. Verū in Marcello à nobis inuulgato, Pira Scauriana eo loco aperte habentur, quorū tamen mentionē Plinius nō facit, nisi Seueriana pro his supposita sunt apud Plin. aut cōtra Scauriana pro Seuerianis apud Marcellum. Cæterum caules Haplofiles pro teneris recte legi apud Marcellum, & legendos esse item apud Scriboniū, nō dubitandū existimo, quū lectio Scribonij uulgata facile potuerit ex hac uera nō intellecta fieri. Dixerunt autē Haplofiles græca uoce in latinā formā reducta, pro Hapalis uidelicet, quomodo etiā oua Hapala, q̄ tenera aut mollia, uocare maluerūt. Sunt porro Haplofiles caules, idē qui & prototomi, & asparagi appellantur, uelut etiā alibi in his cōmentarijs indicauimus. Et sanē nō leue argumentū ex eo habemus, quod non longe post eandem diatam repetens Marcellus, Edulia inquit, quoq. profunt hæc, Intubi, lactuæ ex aceto, brassicæ, &c. brassicas enim hic quas suprà Haplofiles caules dixit.

Infusa dysentericis cōmoda. Inter hæc infusa Faustianū habetur, quod non aliud est quam ex pastillis Faustini cōstans, quorum descriptio eodem planē modo ut hic, habetur apud Aetii serm. 9. cap. 49. & Paul. lib. 7. ponderibus tamen aliquantulū uariantibus, rebus nihil mutatis. Quod autē dicit hic Andrōmachus, infundendū esse cum plantaginis succo, in quo ipsamētā incocta sunt, Per pisisamenta sanē accipiēda sunt pharmaca adstringendū uel prædita, uelut est rubus, myrtus, flores mali punici, folia salicis, coma cupressi, Rhus, radix symphyti, & alia huiusmodi quæ in plantaginis succo incoquenda esse hic dicit. Aetius uero non plantaginis succo hæc incoquenda esse prodit, sed eorū decoctum simplex ex aqua accipiendum, & cum ipso pastillum infundendum. Sequitur mox, Infusam quo uxor Athenæi, cōcordans Harpocræ, Magno Philadelpho, Aristolao, &c.

lao, &c. Hoc itaq; infusum cōcordare ait cū infusis siue pastillis infusilibus Hap-
pocræ. Magni Philadelphi, Aristolai, Horum autem descriptiones habentur par-
tim apud Aetium, partim Paulum locis iam citatis.

Si vero non moretur pharmacū retentum, ante eius usum polygoni succū aut
muria infundito.] Hæc uerba sic habentur in græco, *ἰσὺ δὲ βρασμῶν, πρὶν πάλιν
γὰρ χυλῶν ἂν ἄλῃ*. Lego autem sic, *ἰσὺ δὲ μὴ βρασμῶν, ἢ ἰσὺ δὲ μὴ κρατῶν*. Quod au-
tem Muria præsertim oliuarum albarum hunc usum præbeat, itémq; sal ammo-
niacum, etiám Aetius 9. cap. 49. docet, eodemq; loco testatur, Quod si quis infu-
sum non contineat, sed statim ipsum reieciat, omnino mortis propinquum esse iu-
dicandum, ueluti sæpe se expertum assertit.

Infusum quo utor Aphtha appellatum.] Hoc infusum siue pastillus infusilis
plane is pastillus est qui *ἄφθα φιλῶν* ab Actio & Paulo appellat, propterea quod
suber recipit. Sicut *ἄφθα* appellatio indita ex eo uidetur, quod *ἄφθες*, id est, ulce-
rationibus penitus inflāmaris & incensilis confert. Variant tamen aliquantulum
descriptions. Nam *λευκῶν κυκλωδίων* pro *κυκλωδίων* in Galeno falsò legitur, si-
cut etiā *φιλῶν λευκωδίων* *φασκ.ν.* falsò pro *φασκ.μ.* habetur, ueluti ego reddidi.
Rhoem itē Syriacum neq; Aetius, neq; Paul. habet. Aetius autem & omphacii
drach. iiii, & scisuiui usq; drach. v. habet, quorū neutrum Andromachus aut
Paulus ammiscet. Nam quod in Paulo *σφικτῶν λευκωδίων* legitur, *φιλῶν κυκλωδίων*
legendum est, aliàs pharmacum *ἄφθα φιλῶν* appellationē non ferret, si *φιλῶν* nō re-
ciperet. Iubet autē Aetius *φιλῶν* ex *λευκωδίων* *οἶνον πικρὸν λευκωδίων*, id est suberis ex
uase siue dolio uini ueteris accepti ac usti, accipere : cuius usum item Paulus ad
eruptionem sanguinis ex utero præscribit lib. 3. cap. 62. *ἰσὺν δὲ* inquit, *ἢ φιλῶν
λῶν τῷ ἄφθῃ* *ἢ ἰσχυρῶν λευκωδίων* *καὶ φασκ.ν.* *ἢ ἰσχυρῶν πικρῶν*. Meminit & Plinius
lib. 24. cap. 4. Quod autem suberis usus in dolijs ac cadis obturandis fuerit, Plin.
lib. 16. cap. 8. declarat his uerbis. Vfus eius ancoralibus maxime nauium, piscan-
tiumq; tragulis, & cadorum obturamētis, præterea in hyberno sceminarum cal-
ceatu. Quamobrem non infacete græci cortices arborū appellant. atq; hanc qui-
dem lectionē magis probo, quàm quod quidā corticis arborem legunt. Est enim
maior facetta in eo quod suber arbor per se, arborū cortex appellatur, quàm si su-
ber corticis arbor dicatur. Puto autem Pliniss apud græcum aliquem scriptorem
legisse, *φιλῶν* ap pellari item *σφικτῶν φιλῶν*, quæ uox arborum corticem significat.
Nisi *φιλῶν* insinuassee potius putandum sit. Nostra cerre lingua suber cortex
pta ex cortice uoce, Corde appellatur. Sicut calceamenti genus quoddā, solem
ex subere habēs, Pantophellum uocamus, corrupta ex græcis uoce, qui *πανφί-
λῶν*, *ἢ τῶν παντῶν* *ἢ φιλῶν*, hoc est ab eo quod calcetur suber, nuncupauerunt.
At uero quem Andromachus in hoc pharmaco panem Alexandrinum appel-
lat, Aetius & Paul. simpliciter *ἄφθα φιλῶν λευκωδίων* dicunt, uidetur itaq; Alexan-
drinus ab ipso Andromacho probari, quem ego nauticum accipio, & quem ho-
die nautæ biscoctum appellant. Est enim is uehementer siccus ob duplicem uī
delicet cocturā, per cuius beneficiū etiā à carie & mucore illaesus, per multum
tempus asseruatur. Ceterū uelut hic panis recte biscoctus est, & appellatur, Sic
non recte apud Galenum 7. Meth. aqua biscocta legitur, & reddita est ab inter-
prete Linacro, uelut alibi in his commentarijs ostendi. *ἰσχυρῶν* enim legendum
est, & non *ἰσχυρῶν* uel *ἰσχυρῶν*, accipiendāque decocta, de qua à se iuuentis
Nero in extrema rerum desperatione, aquam ex subiecta lacuna potaturus
hauriens dixit, Et hæc est Neronis decocta, Suetonio in uita eius autore. Ve-
rum quum ille ipse Galeni locus non hac parte tantum corruptus sit & obscu-
rus, eum denūo adscribam totum, & exponam hoc loco, quum nullo alio id
fieri

prodit, quum Melcam ut fieret diligenter uelut indicauit, prodiderit : aliàs quod ad usum atinet, in quem à medicis græcis præscribitur, nihil refert utrum porrigas, spumofum ne concussione redditum, an spumã etiam inconcussio superstantem, nimirum ad calidam uentriculi intemperaturã per hæc refrigerata corrigendam. Quem usum præstare possit etiam oxygala, à Columella ac Plinio quomodo fiat descriptum, ut melca ex Constantino à me rectata eius species quædam uideri queat. At uero *ἀγλαα* quod lac ouis permixtũ reddidimus, cibus est dysentericis commodus, tum ab Aetio 9 cap. 45 tum Paulo 3 cap. 42 proditus, ad acredinem humorum cõtemperandam, supra nutrimentum quod abunde inde corpori accedit quare etiam ut refocillandis uiribus defectis congruens, ab eodem Aetio 11 cap. 18 præscribitur. Sed satis euagatum est, ad propositum itaque pharmacum reuertamur, in quod panis Alexandrini sicci usti drach. xv recipere iubet, hoc est nautici bis cocti uelut ego accipio. Recipiunt porro & gallarum ustrarum, id est *λευκαυστῶν* drach. xv in hoc pharmacũ iuxta Pauli & Aetij præscriptum. Verum hoc loco Andromachi *λευκαυστῶν*, id est ustrarum habetur, facili lapsu ob uicinãtatem uocum: quare & nos ustrarum cõuertimus, quum etiam reliquã usta recipiantur, & Aetius ac Paulus ita præscribant, quos sequuti etiam subentis usti drach. xv reddidimus, licet *πανὸς λευκαυστῶν δραχ. ιι.* exemplar Galeni habeat. Sed & hic facilis est lapsus *ιι.* pro *ιι.* substituendi.

Infusum Nicotratum ad dysentericos quo Menander usus est.) Ad finem huius infusi ait, res quæ in ipsum recipiuntur in pastillos cogendas esse cum uino; eosque reponendos reliquijs ab expresso uinarum succo restantibus stipandos, ne transpirent: hoc est ut ipse ait. *ἐκπνέουσι καὶ ἐκπίπτουσι φύσιν ἢ καὶ ὑγρῶν. σιμύματα* itaque φύσιν, reliquias ab expresso uinarum succo restantes reddidit; omnes enim solidas reliquias tum actinorum, tum radicum racemiorum unde uix ipsæ dependent; ab expresso ipsarum succo restantes, ea uox significat, uelut etiam alibi me mini. In has reliquias, pastillos ipsos reponere iubet, ne uidelicet transpirent; atque sic integriores perseuerent. Verum ejusmodi reliquias non hunc tantum usum præbent, sed & ipsis uisui seruandis commodæ sunt, uelut Galenus secundo de alimentis tradit, triplicem seruandarum uinarum modum præscribens, primum penitulum, secundum in multum coniectarum, & tertium in ollas nouas indicarum, ita ut hæc ollæ uinarum expressarum reliquijs imponantur & adobruant, qui postremus modus cum sit etiam Columellæ ac Plinio indicatus, de hac re ipsa Galeni uerba adscribam, ut collatis locis res ipsa facilius intelligatur.

[illegible]

[Infusum ad dysentericos Thamyra.] Hoc infusum cum sapa aut passo hispano recocto in pastillos cogere iubet. Sic enim ait. *ἀνὰ λιβάνου τριχίοντος ἐψάμην ἡ γλυκύ καί σπινθ.* Legitur tamen in exemplari *ἐψάμην ἡ γλυκύ καί σπινθ.* Quod uero ad finem reddidi: facit item in potu acceptum pro uiribus ad cochlearij plus minus mensuram ex frigida aqua: in græco satis ancipiti sensu legitur. Num ad aquam frigidam, aut ad medicamentū, cochlearij mensura referri debeat, ego tamen ad pharmacum referendam puto. Sic autem legitur. *ποτὶ δὲ καὶ πινόμενον πῶς δυνάμει μετὰ ψυχρῶ ὕδατος καὶ λιβάνου ἐλαττον ἢ πλεον.*

Quæ ab Asclepiade ad dysentericos scripta sunt.] In primo horum pharmacorum uini myrtitæ sextarios III conuerſi, sed græcum exemplar *αἶνε μυντίνου ὄστρε.* γ. habet manifestatio errore, ex reliquorum collatione patente. Quare pro *ὄστρε.* γ. legendū est *ξ. γ.* uelut conuerſi, uel certe. *κρύβας.* γ. ut uini heminae tres accipiantur, quanquam hæc mensura ad tertias redacta minor mihi uideatur quæ ut mellis artici libra sibi incoquenda opus habeat.

[Pastillus sedās dolorē, præclare inducēs somnū, ad inueteratos dysentericos.] Inueteratos dysentericos dixi *αἶνε λιβάνου τριχίοντος διουσητέριοντος*, nō ad ætatem ægri, sed ad diuturnitatem morbi respiciendo. Plinius lib. 33 capite primo, sic dixit ueteres ægros ut utroque modo accipi possit, quum ait. Quod ad febrium ualeudines attinet, certum est non dandum in febre, nisi ueteribus ægris uinum, nec nisi declinante morbo. Sic etiam libro uigesimo secundo, capite uigesimo, de anchusæ radice. Sanat ulcera in cerato præcipue senum, item adusta, quo loco Dioscorides habet, *ποτὶ σπινθὶ καὶ τανύμακτι καὶ πελάγει ἐλακὶ ὅρα φεψαρίδιον ἡερὸν καὶ ἐλάει.* Cæterū quod ad finem dixi. Vt iuxta apponderationis uariationem fit, secundum quod ægri subuili aut hebetes sensu præditi, id tolerare possunt, in græco corruptum est hoc modo. *ἡ γυνὴς τὸ φὺν τὸ συστάει ἀπαλλαγῆς πρὸς τὰς διηπαθίας καὶ διουσητέριοντος τὸν λιμὸν τῶν.* restituendum est autem sic, & contingeret sensus à nobis expressus. *ἡ γυνὴς τὸ φὺν τὸ συστάει ἀπαλλαγῆς πρὸς τὰς διηπαθίας.* Porro in sequenti mox pharmaco ad finem dixi: & ex eo ad summum cyathi sex infundatur, quod græce est, *ἡσὶς τὸν ὕδατος πλάγος ὅτις τὸν λιβάνου.* s. sed tamen *ἐν ὅσῳ* pro *ἐν ὅσῳ* in uulgato græco exemplari excusum est.

[In cap. vi de affectionibus & utriusque sedis.]

Medicamenta sedis seu ani ab Andromacho conscripta.] Quod supra libro secundo à me annotatum est, peculiare id omnibus græcis medicis uisum esse, & partim latinis, ut *ὀσσην* pro *αἰσων*, id est hyssopus pro cespypo legitur, id uel maxime in omnibus his sedis pharmacis uidere est, quando sanè perperuo *ὀσσην* pro *αἰσων* expressum est: sed nos tamen lectione in integrū restituta, cespypum utique pro hyssopo reddidimus, cum hyssopi herbar nullus sit hic usus, & cespypus ab omnibus medicis græcis, ut pharmacum ulcera explens ac molliens, præsertim quæ circa sedem & uuluum consistunt, prodatur. Sic enim de ipso Dioscorides libro secundo ait. *διὰ μὲν δὲ ἔχθρῳ μνηστικῶν, πηλερωτικῶν ἐλακῶν, μετακρητικῶν, μελίσσι τὸν πῶς διακρίνομεν ὅτις ὀσσην.* possit tamen etiam alicui doctio imponere sextum ex ordine pharmacum, tanquam non cespypum sed hyssopum accipere oporteat, quum ad finem eius habeatur, *λαβεῖν τὸν φρενὶ αἶνε φελάνου ὅτι σπινθ, τὸν πῶς ὀσσην* &c. hoc est. Arida in umbra cum uino falerno terito, hyssopum inpergito. Verum ego non *τὸν πῶς ὀσσην* legendū cenſeo, id est inpergens, sed *τὸν πῶς ὀσσην*, id est infarciens, atque ob id uerū. Arida in umbra cum uino falerno terito, cespypum infarcito. Indicaui aut alio loco has uoces itidem ob similitudinem solere mutuo supponi. Quod autem certum sit cespypum esse legendum & non hyssopum, etiam ex nōno ex ordine pharmaco palam fit, ubi habetur: *ὀσσην* *ἐν ὅσῳ*

rum Heras pro cefypo, adipem anserinum pari pondere coniicit. Neque enim potest adeps anserinus pro hyssopo succedere, cum qua nullam habet similitudinem; pro cefypo autem succedaneus esse potest, cum sint ambo hæc medicamenta molliendi & rarefaciendi ui prædita. Porro ad finem septimi horum pharmacorum uerti, excipe pello cum syriaco, in reliquis cum rosaceo, quod in græco est, *πικρὸν μετὰ ροσάκῳ, ἢ πικρὸν μετὰ ῥοσάκῳ*. Quibus uerbis indicat in pelli usum syriacum unguentum adhibendum esse, utpote uuluis commodius, in reliquis uero rosaceum præstare. Quæ autem medicamentum forma sit pelli, & quod unguentum syriacum appelleretur, alijs locis declarauimus.

Alia (pinguis Galli.) In hac Galli lipara siue pingui confectio, olei myrtæ drach. quatuordecim conuertitur, id est *μυρτὸν δραχ. ιδ'*. Verum in exemplari *μυρτὸν δραχ. ιδ'* habetur manifestario errore. Similiter autem & in sequenti Cleophranti compositione. Olei myrtæ, lentiscini, rosacci singulorū drach. XVI uerti, & postea. Vini ueteris Italici sextarium dimidium. Sed in græco exemplari oleorum *ὁρὲ δραχ. ε.* id est singulorum drach. VI & uini *ς.* id est sextarii sex leguntur, altera parte pondere minuto, altera uero mensura nimis aucta, reliquorum respectu quæ in pharmacum recipiuntur: ut eam quam reddidi ueram & genuinam putem lectionem, ut uidelicet oleorum *ὁρὲ δραχ. ιε.* & uini *ς.* legatur, potuit autem facile elabi character denarius 4. & character medietatis in senarium transire. In sequenti porro deinceps Enneapharmaco ad finem uerti, aliqui & ricini partem 1. id est *ῥικινὸν ἑξήκοντα* q̃. Verum exemplar *ῥικινὸν* falso pro *ῥικινὸν* habet, ut uel ex Pauli descriptione liquet, lib. septimo, capite uigesimoquarto relata, in qua aperte *ῥικινὸν* habetur, & aliàs res omnes liquefæcibiles sunt, hoc pharmacum constituentes, ut ricini neq; semen, neq; folia, apte misceri queant. Variant tamen paululum ab hac descriptione, Pauli Enneapharmacum, itemq; Celsi lib. 5 cap. 19 quam ubi de cefypo tractauimus emendatam adscripsi.

Alia ad obturationes, & alia sedis uitia.) Quas in hoc loco, itemq; paulo post sequenti pharmaco, obturationes dixi, *ἔμψος* Andromachus appellat; uidetur autem nihil aliud per *ἔμψος* indicare quam obturamenta callosa & dura in ano contingentia. Ad ea enim laxanda pingues eiusmodi illitiones sufficere possunt, quanq̃ à natura etiã recens natis anus aliquando *ἔμψος* existat, & aliquando ex ulcere non probe curato adultis cōcrescere soleat, quod uitium chirurgicè subiacet. Sunt autem *ἔμψος* etiã osculi uteri in muliebri sexu obturamenta & coarctationes, uelut Paulus libro tertio, cap. 73 explicat, osculi uteri coarctationem aut propter ulcensationem prægressam, aut ob inflammationem induratum contingere tradens, atque hic sanè *ἔμψος* aliquando etiã chirurgiam requirit, quem admodum *ἔμψος* appellatæ foeminae quarum partes genitales perforatæ non sunt, curantur, uelut idem Paulus lib. 6 cap. 72 pro dicit. Sed & uitium quoddam in masculis fit ex cutis super glandē tam arctato tegmine, ut nudari glans nō possit, quod uitiū *ἔμψος* & *ἔμψος* appellari, etiã Celsus lib. 7 cap. 75 testatur, quo loco etiã huic contrariū uitium, quando uidelicet cutis curta aut retro ab acta glan- dem tegere non potest, refert, quod malum græci *ἔμψος* appellant; quanq̃ nō *ἔμψος*, sed *ἔμψος* tum in Paulo lib. sexto cap. 55. tum in diffinitionum græcarū libro, Galeno falso adscripto legatur: & pleriq; omnes qui eum locum citant, sic recte legi putent, uocabuli ipsius uis non cōsiderantes, quæ contrarium *ἔμψος* uitium indicat. Est autem diffinitio talis: *ἔμψος ἔμψος ἔμψος ἔμψος ἔμψος ἔμψος ἔμψος ἔμψος ἔμψος ἔμψος*. Porro quod in secundo horum duorum pharmacorū dixi Rosacei heminae quartā partem, hoc est fesiicyathū, hoc est sextantem & unciam dimidiā; in græco sic habetur: *ῥοσάκῳ*

ισχυρὸς δ' ὅστις ἐκείνους αἰ. ὁ δὲ τὰς ἑ. Εἴτε, omnino supputatio iusta, si mensura
rum pondera secundū Pauli præscriptum à nobis supra lib. 5. relatum expēderis.
Habet enim acetabulum quæ quarta hemina pars est, & sesquicyathū capit, un-
cias duas & dimidiā, sicut cyathus sesquiciā & scrupulos quatuor, sed non
olei liquoris, uerum uini quod oleum nona parte ponderis exuperatur & hic li-
quorū pondera inter se cōfundantur, quemadmodū isthic etiam Crisponem pon-
dus olei cum mellis pondere confundere demonstrauit. Additur postremum ad
hoc c medicamentū, facit & ad contrāctos articulos, hoc est πρὸς τὰς τῶν ἀγλύνων.
Esse aut grācie ἐγλύνει nihil aliud q̃ articulos cōtrāctos, Cor. Celsus lib. 5. cap. 18.
in malagmate Euticlei testatur. Actius ser. 12. cap. 42. ἐγλύνει expōnit, τὰς τῶν ἀγλ-
θων κρῶχας id est articulos stupore occupatos & contrāctos. Ita etiam Paulus.

In cap. VII. de hæmorrhoidibus.

Hæmorrhoides à sanguinis fluxu grācie appellatæ sunt: Sunt autem uelut
dilatatio quædam uasorum quorundam in sede oscula aperta habētium,
quæ progressu tem poris callosiora redduntur. Et ex hæmorrhoidibus sanè quæ-
dam cæcæ sunt, aliquæ contra apertæ. Et cæcæ quidē omni tempore inflatæ sunt,
nihilq̃ excernunt, & maiorem dolorem inducunt. Apertæ uero quibusdam tem-
poribus sanguinem effundunt. Ad cæcas itaq̃ & non apparentes, aperiendas ac
extrahēdas, ἐκρῶχε appellata pharmaca primum præscribit, quo post eorum
usum, reliqua pharmaca hæmorrhoidibus tollendis apta, commodius adhiberi
possint. At uero hæmorrhoidas non ex toto tollendas esse, sed unam relinquen-
dā, purgationis uidelicet gratia, Paulus lib. 3. cap. 59. tradit, ex Hippocratis ut ap-
paret autoritate. Hic enim sexto aphor. XII. sic ait. αἱμορροΐδες ἐνδόντι χρόνιες, ἢν μὴ
μία ἀφουλαχθῇ, κίνδυνος: ὁ δὲ σπασσὶς ἐκ τῶν χρόνιων ἢ φθίσκει. hoc est hæmorrhoidas in uete-
ratas sanandi, si non una fuerit seruata, periculum est hydropem aut tabem succe-
dere, Quæ uerba exponens Galenus ait, Impossibile esse hæmorrhoidas fieri ci-
tra aperiētionem osculorum uenarum quarundam, ob sanguinis multitudinem &
crassitiem, Nimirum hepate in ipsas fecosum & atrabiliariū sanguinē deponen-
te. Si quis igitur præcludat ipsi hanc uiam, hepar simul durū reddit, simulq̃ multi-
tudine & crassitie grauans, caliditatem ipsius extinguit. Contingitq̃ simile quid-
dam ei quod circa externas flammās accidere uidemus, in quibus multa ligna ac
cumulata ignem suffocant & extinguunt. Si igitur per calorem naturalem sanguis
generatur, manifestum est calore extincto amplius generari non posse, & sic hy-
dro pē fieri, qui nihil aliud est q̃ sanguificatio frustrata. Si uero hepar ualeat mul-
titudinē sanguinis à se depellere in pulmonis uenas, isthic rupto uase tabidi sūt.
Quare merito consult Hippocrates unam hæmorrhoidem seruare, quo per hāc
feculentus & uitatus hepatis humor euacuet, præsertim in quibus longiori tem-
pore per has uenas excerni cōsueuit. Hæc Galenus. Sed Actius hanc Hippocra-
tis sententiā planè contrario sensu accipit, & pro ἢν μὴ μία ἀφουλαχθῇ, quod Ga-
lenus legit & exponit, ἢν μὴ φουλαχθῇ legens, nullam penitus hæmorrhoidem re-
linquendam esse asserit. Verum quum præter receptum uulgo ab omnibus me-
dicis sensum, & præter Galeni expositionem, Actius hæc prodat, locū ipsum in-
tegrum adscribam, ex sermonis decimi quartī, capite quinto, cuius fragmentum
sanctum habuimus, ut cum librum cum octauo, nono, decimo, undecimo, duode-
cimo, decimotertio eius sermonibus nuper à nobis conuersis, inuulgare non po-
tuerimus, atque propterea etiam hunc locum libentius in studiosorum gratiam
proferemus. Sic autem ait, de hæmorrhoidibus sedis tractans. ἡ δὲ διαβόησις αὐτῶν
καὶ ἡ πλῆσις αὐτῶν ἀνθρώποις ἀντία γίνεται. καὶ γὰρ ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἰμπετῶσι, καὶ τὸ κακὸς ζῆν, πολλ-

N *laxum* est *ex* *gula* *mānī* *p* *ap* *is* *o* *n* *i* *s* *a* *t* *e* *r* *a* *d* *e* *m*. Legendum est tamen pro *mānī* *p* *ap*, *mānī* *p* *ap*, aut ut Aetius habet *mānī* *p* *ap*.

In cap. x ad uteri affectus.

AD uulua igitur strangulatus conuenit agarici drach. i in potu accepta ex u[er]bo. In graeco hoc loco non ἀγρίου. ἀγρευόμενος legitur, sed ῥα. α. quod falsum esse, & non recte legi, uel ex Dioscoride apparet, qui lib. 3. de agarico ait, καὶ ὑπερμακρὸς πῖσι καὶ καρκινώδεις ἀγρίου. α. δίδονται. Sequitur mox onyx detractus ex conchylio potatus. Ostendi autem supra lib. 5. quod onyx conchylij Indici testa sit, ut hic non sit opus rem alius repetere. Declarandi itaque eius onychis gratia ipse Galenus hoc loco dixit, οὐκ ἐκ καρχηδὸς πινόμεθα, ne quis onychē lapidem accipiat, de quo eodem libro à me dictum est, aut onychem bdellij, de quo libro octauo, horum commentariorum egi. Legitur tamen in exemplari graeco hoc loco ἐκ καρχηδὸς pro ἐκ κένυρος, uel ἐκ καρχηδὸς.

IANI CORNARIII MEDICI PHYSICI

COMMENTARIORVM MEDICORVM, IN DE

cem libris Galeni de Compositione pharmacorum

localium, siue secundum locos cōscriptor

rum, Liber x

In Cap. I de Nephriticis.



ONFECTIONES Rheneas ab Andromachio ad rhenum
& uescica affectiones conscriptae.) Inter haec pharmaca ha
betur. Alia ad calculosas, qua Bassa uxor Marij curata est,
hoc est, *in Basia si uiscis id est calculi*. Sic enim legendum pu
ro, Nam & uetus sic habet, & alias Rhomanū nomen Ma
rij existit, cuius uxorem Rhomae eo pharmaco curasse ueri
simile est Andromachū, aut certe aliū aliquem medicū, unde
hoc pharmacum Andromachus descripsit: Verum gra

cum exemplar *ὅς βροχὴ ἢ μακρὴ ἐβροχᾶν* habet. At uero in ipsum medicamen-
tū recipitur lapidis Syriaci masculi drach. i. aut feminae drach. i. Opinor itaq;
ego non esse alium Syriacum appellatum lapidem, q̃ Iudaicum Diosc. ac Galeno de-
scriptum, tum quod calculosis hoc loco Syriaci usus praescribitur, qui usus planē
ab ἴσδὲμ de Iudaico lapide proditur, tum quod neuter ipsorū Syriaci mentionē
faciat, utpote de quo sub Iudaici appellatione prodiderunt. Quib. accedit & hoc
quod Galen. lib. 9. *simp. phar.* ait in palestina Syria nasci. & Iudaicum à regione
nominari. Quemadmodū igitur Iudaicus à regione, sic etiam Syriacus & palesti-
nus nominari posse uidetur, uelut hic ab Andromacho, & apud Aetium lib. ii. al-
quorū appellatur, quanq̃ Aetius eodem loco aliquoties Tocolithon etiā eun-
dem lapidē appellet, ab eo quod lapidē tum rhenum, tum uesicae liquefacit, de
qua tamen efficacia, Galenus ei testimoniū non prebet, qui eum frustra in uesicae
calculis exhibuit. Esse autem *πικρὸν* lapidē eundem cum Iudaico Paulus li-
bro 7. testat̃ his uerbis. *ὁ δὲ ἐνδοσπικρὸς καλὸν ἔχει· ἢ ὅτι τοφροὶς λαίανον δὲ ἐν τοφροῖς, δίδου
καὶ πικρὸν λαίανον αὐτῷ αἰ τὸ ἐν τοφροῖς πικρὸν ὁρδίσιν.*

Alia ad calculosos frangens & paulatim expellens &c. Hanc confectiōe ex Andromacho recipit & Aetius undecimo, cap. 13 ex iisdem penitus rebus, sed diuerso pondere constantem. habet enim seminis dauci, anisi, &c. cuiusque sesquidrachmam, & cassiae, cinamomi, nardi celticae singulorum drachmam unam, ita ut priorū quinq; rerū ad posteriores hemiola proportio existat. Quare etiā hoc loco priorum rerum non *aniz. rā. s.* id est singulorum sexuncem, sed *aniz. drach. s.* id est

id est singulorum drachmæ sex legendū existimō; fiet enim etiā hoc modo Hæmiola proportio drachmarum sex priorum rerum, ad posteriores quæ drachmarum quatuor pondere accipiendæ præscribuntur. Habet porro eandem confessionem etiā Scribonius in eo latino libello qui extat, sed & rebus & pondere, & autore medicamenti corruptis, quod ut iudicare facilius sit, ipsum locum totum cōpositione CLII adscribam. Ad calculosos, cucumeris seminis, dauci, anisi, apij, petroselinī, myrrhæ, singulorum * Patrium & uictoriati, cassiæ daphnoidis, cinnami, nardi, singulorum * P. unius, aqua colliguntur, fiunt pastilli lupini magnitudinis, Ex aqua dantur cyathis tribus per dies quadraginta. Hoc medicamentum quomodo componitur, pilum ligneum sit, qui cōtundi tanulum ferreum non habeat. Hæc enim superstitionem adiecit Ambrosius medicus Puteolanus, qui adfirmavit multos se hoc medicamento sanasse, detrahete autem dixit post diem septimum fragmina quædam lapidū quasi arenam. Hactenus Scribonius, et eodē planemodo habet, ex eo ut apparet descriptū, capite XXVI Marcellus, Ceterum & apud Aetium, & apud Scribonium ac Marcellum priores res Vinumero habentur, ut suspicer ex Galeni exemplari *οὐλὴν ἀνέμας*, id est apij semen excidisse, quod uterq; ipsorū inter priores res expressum habet, & ego sane adderem, si pharmaco essem usus, nō tamen ut elapsum cōverti, sed itidem iuxta exemplaris præscriptum reliqui.

Nephriticæ compositiones ab Asclepiadæ conscriptæ. Inter hæc pharmaca habetur. Aliud ad calculosos inspersile, seminis balsami partem unam & c. id est, *Βαλάνου καρπὸν μέρος ἓ.* Sed in græco exemplari *Βαλάνου καρπὸν μέρος 6* habetur. Manifestum est autem hoc falso legi, quum reliquorum quæ sequuntur omnium tantūdem accipere iubeat, hoc est partem unam. Quod si uero partes duas legas, necesse sit esse alia quæ uel maiore uel minore portione in medicamentum recipiantur. Sed & in sequenti mox pharmaco, struthij radicis partem unam reddidi, ubi simili modo *σπυλίου ρίζης μέρος ἓ* legi debet, pro eo quod expressum est, *σπυλίου μέρος 6*. Radicem autem struthij maxime in usum medicum adsumi Galenus testatur, & Dioscorides lapides atterere prōdit. Plinius decimonono, capite tertio, radiculam struthium appellauit. At quæ uocatur radícula, inquit, lauandis demum lanis succū habet, id quod Dioscorides dixit, *6 αἰ ἐπεπλυντο χυρτο πλεῖον ἔσται, καὶ ἔσται, & idem Plinius lib. 13 cap. 3* quum ait, Non opus est lanas in hoc usu radiculis esse curatas, quanquam ex grammaticis quidam uulgo non in celebres, rudiculis pro radiculis eo loco legendum esse falso pronunciant. Alibi uero etiā lanariam herbam idem Plinius struthium uocat.

Catapotia Heraclidæ Tarentini. In hæc catapotia recipiuntur succi Libyci drachmæ duæ, hoc est uelut in græco eodice habetur, *δραχμὰς δύο σπυγὰς 6*. Videtur itaque mihi succum Libycum dixisse cyrenacum alias appellatum, qui uidelicet in Cyrenæica Libya regione prouenit. Nam de hoc testimonium Dioscorides quoque præbet, quod cum pipere & myrrhā potatus menses ducat quod quomodo faciat, multo facilius ei fuerit urinæ stillicidiūq; propellere, & simul uescicæ rosos dissoluere, quod de eo hoc loco Asclepiades ex Heraclida prōdit, si cum pipere & myrrhā, addito simul galbano, in catapotia coactus accipiantur. Quando uero opus est etiā in præcedentibus pharmaciis habitus est, uideri possit etiā hic opium recipiendum esse, doloris leniendi gratia amixtum, dictūque hoc loco Libycum, quod alias hispanum appellari solet, de quo alibi mentionem feci, ita ut non *δραχμὰς δύο*, sed *δραχμὰς δύο* legeretur. Vetus certe interpret opij albi hoc loco uertit, tanquā qui *δραχμὰς δύο* legisset, & sane etiā ego persuaderi possem opium accipiendū esse, ut quod sit per myrrhā, à latione

à lætione quam inferre potest, satis munitum, nisi si opium accipias, non habeas aliud in hac compositione pharmacum, quod vires dissoluendi rosos, & leuandi stillicidij habeat, quæ facultates in Cyrenaico succo existunt, quem & accipiens dum iudico, & ob id Libycum succum iuxta exemplaris præscriptum reddidi. Sequitur mox aliud catapotium, ad cuius finem habetur, tria deuoranda dato, ita ut vini dulcis quadrantem insuper propines: quod in græco est, *δίδω ἡμία, καὶ αὖ τοὺς γλυκὺς ἀποφάστω πεπταμένους. πεπταμένους* itaque pro quarta sextarij parte mihi dixisse uidetur, hoc est pro cyathis tribus. Aequè enim duodecim cyathi in sextario sunt, uelut duodecim uncia in libra. Hoc ipsum itaque *πεπταμένους* quadrantem dixi, quomodo etiam Celsus libro tertio, vini quadrantem pro tribus cyathis dixit, uelut etiā alibi ostendi. Possit autem aliquis & de quadrantē libræ *πεπταμένους* dictum esse putare, hoc est pro uncijis tribus: sed cum non sit alias ei usitatum uncijis in liquorum mensura uti, cyathos omnino accipiens dos existimo, quorum usum & in præcedentibus, & in sequentibus habet, in passia cini cæterisque liquoribus dimitendis. Porro quemadmodum hic *πεπταμένους* pro quarta sextarij parte dictum est, sic ab eodem Asclepiade ex Philoxeno, in quarto pharmacorum secundum genus Galeno citante, tres quartæ minæ partes, hoc est dodrans minæ *ἡμιετέτρετα* appellantur: sicut enim habet, *ἡμίονος τριμυρίας δραχμ. ο. ὁ ἡμιετέτρετα ἀνὸς ποσὶς*. Nisi forte *ἡμία ἡμιετέτρετα* legendum est, uelut alibi *ὁ ἡμιετέτρετα* usurpato ostendi. Quum enim centum drachmæ in minæ sint, LXXV. drachmæ tres quartas partes efficiunt, quæ sunt planè tres quadrantes libræ Romanæ, nisi quod in Libra Quadrans est drachmarum uiginti quatuor. In Mina uero drachmarum uiginti quinque. Nam Mina quatuor tantum drachmis libram excedit: atque ea est Dodrantis significatio, quod uidelicet detractato quadrante, totum pondus ac mensuram libræ, uel assis, uel pedis, uel cuiuscunque rei mensurabilis per ipsum significetur. As enim omnesque ipsius partes, pro omnium rerum mensurabilium partibus accipiuntur, uelut etiā alibi ostendi. Sic hæreditas, inquit Imperator Iustinianus libro secundo de hæreditatibus, plerumque diuiditur in duodecim uncias, quæ assis appellatione continentur. Habent etiā hæ partes propria nomina ab uncia usque ad assen, sextans, quadrans, triens, quincunx, semis siue sexunx, septunx, bes, dodrans, dextas, deunx, as. Sic enim locus ille legi debet Sic & dierum & noctium quadrantes & dodrantes dicuntur: reliquæque partes similiter, imò & horarum, dodrantes, tres quartæ partes appellantur: sicut uncia una duodecima horæ pars, & semuncia pars horæ uelut quarta, atque sic accipiendus est Plinij locus lib. 2 cap. 14 de lunæ motu. Lucere dodrantes semuncias horarum ab secunda adijcientem usque ad plenū orbem, detrahentemque in diminutionem. Vult enim Plinius lunam à secunda die usque ad pleniluniū quotidie tres horæ quartas, & uiginti quartam horæ partē addere, tantumque lucis rursus detrahere quotidie usque in diminutionem. Verū tota hæc res diuisionis horarū in XII partes, apertissime declarat à Constantio Cæsare lib. 1 cap. 7. de agricultura nuper à nobis latine cōscripto. Sed hæc ἀπὸ τοῦ πλάγος, & in digressu satis sit nos indicasse tantum, ac leuiter saltem deiebasse.

Pastillus ciens urinam, detrahūt lapillos &c.) In hoc pastillo, acori, seminis anisi, seminis dauci, apij montani, carpobalsami, tragacathæ, singulorum drachmas duas conuerti, hoc est *ἀκὸρον, ἀνίσον ἀνδράμας, δαυκνόν ἀνδράμας, ἀριστολίαν καρυτῶν, βαλδοκύν καρυτῶν, ἡμιακύνθου καρυτῶν ἀνὰ δραχμ. 6*. Sic enim puro legendum, & non ut expressum habet. *ἀκὸρον, ἀνίσον ἀνδράμας, δαυκνόν ἀνδράμας, ἀριστολίαν καρυτῶν, βαλδοκύν, ἡμιακύνθου καρυτῶν ἀνὰ δραχμ. 6*. Hæcisse autem typographum circa lectio, non asterisco notatum est.

Quæ Archigenes ad renum affectiones scripsit.] Quod mox à principio horum Archigenis uerborum reddidi, Cæterū Antiochus apud Phricen Linophobum ualde iuxta naturalem contrarietatem auxilio fuisse ait, ad mali euerſionem, prototomi caulis decocti cyathos duos, ieiuno ad dies nouem exhibitos: ex mera diuinatione à me sic redditum eſt, quando græca uerba ita corrupta ſint, ut nullam culpam eruerere ſententiā liceat. Sic autem ſacent. *οφείδον εφ' αβυλόνος εσθ' το φείδον λινοςίον αντισπιδις βοθλιν ες αντισπιδιν πρωτεμω καυλον αφιψιμας κινδ.* *ε. νινδ διδωμενς τω κινδς ε.* Hæc itaq; uerba quamuis nullam ſententiā nobis exhibeant, minime tamen putamus nobis prætereunda, ſed omnino hoc modo reſtituenda, uel ut etiam reddidimus. *οφείδον εφ' εφ' αντισπιδιν εσθ' το φείδον λινοςίον αντισπιδις βοθλιν ες αντισπιδιν αντισπιδιν, το πρωτεμω καυλον αφιψιμας κινδ.* *ε. νινδ διδωμενς ες κινδς ε.* Non obnitemur tamen contentioſe ſi quis meliorem lectionem oſtendat. Primum itaq; quod pro *αβυλόνος*, nomen *αντισπιδιν* reſtituendum duximus, non neceſſarium eſt, ita ut non etiam aliud quoddam proprium nomen eius loco poni poſſit. Eſt enim obſcurus autor, qui hoc auxilium prodidit, & ſanè autoritatis rationem non multum referre, etiam alio loco dixi, ut hic nullū uel ſaltem leue crimen ſit, ignorare quis fuerit Antiochus, qui apud Phricen Linophobum hoc teſtimonium de eo auxilio perhibuit, quanquam ſuſpicer Pactum Antiochum hunc eſſe cuius aliquoties mentio ſit in Scribonij li bello latino, & cuius compoſitionem colicam ſupra recensuit Aſclepiades libro nono, capite quarto. Nō dubito autem quin & uerba *εσθ' το φείδον λινοςίον* corrupte legantur, ſed ea tamen ut habent reddidi, quod uelut dixi, non refero omni no aliquid à quo, & circa quem, auxilium fuit admotum, modo ipſum auxilium integrum nobis conſtet, Quod ſanè prototomi caulis decoctum eſſe minime dubito, etiam ſi eius lectio ſit corrupta, uelut oſtendi. Sunt autem prototomi caules braſſicæ teneriores, qui & aſparagi Galeno libro 2 de aliment. appellantur, & à Marcello caules haplofiles, à teneritudine græca appellatione, dicti ſunt, cap. 20 uelut alibi oſtendi, quando uidelicet ad excretionem ſeminis augeſcunt, qui ſiccantur & in ciborum uſum ueniunt, unde ſanè prototomi, à prima cæſura, uocantur. Meiniſit eorum & Martialis poeta.

Et faba fabrorum prototomiq; rudes.

Hic itaq; cauliculus braſſicæ prototomus, etiam *κίωμα* quaſi ſœtura à Dioſcoride dicitur, quidam tamen *κίωμα* dicere malunt, quæ uox Galeno uidetur per ſynæreſim ex triſyllabo *κίωμα* contracta, quanquam Plinius non in neutro genere cymata uſurpet, ſed in ſœminino cymas appellet. De hoc ſanè *κινδς* *αντισπιδιν* genere Dioſc. lib. 2 ait. *το εφ' αντισπιδιν κίωμα διδαμαχίονος εσθ', αντισπιδιν ες αντισπιδιν.* Id eſt, Braſſicæ cyma ſtomacho commodior quidem eſt, uerū acrior & magis urinam ciens. Quare uel ex hoc loco uidetur mihi conſirmari poſſe, auxilij ab Archigene præſcripti efficacia, quanquam ipſum auxilium hoc loco ſic referatur, ut non per aliquam facultatem hanc uim habeat, ſed per naturalem quādam contrarietatem *αντισπιδιν* græcis appellatam, ut non oporteat nos eſſe curioſos iuxta quam facultatem prototomorum braſſicæ caulium decoctum, ea efficacia præditum exiſtat.

In cap. 11 de iſchiade coxendicium morbo, podagra, & morbo articulari ſiue arthritide.

EX genere arthritidis eſt rum iſchias, tum podagra.] Arthritis id eſt articulis morbis, uelut genus quoddam eſt omnium morborū articulos ac neruos occupantium: Eſtq; nihil aliud q̃ debilitas articulorum cum longa fluxione, quæ uicinos neruos tendit aut laxat, ac dolore affligit. Quādo enim in multis articulis

riculis hic affectus hæret, Arthritis appellatur: quando uero in una aliqua cōartticatione siue corporis parte, ab illa ferè nomenclaturam sortitur. Sic Chiragra in manibus, podagra in pedibus, & in coxendicibus Ischias siue coxendici morbus appellatur. Quidam adhuc plures particulares species fecerūt, quæ tamen omnes partim barbaræ, partim inutiles ac superflue sunt, quum omnes eiusmodi affectiones in prædictis nomenclaturis comprehendantur. Quidam amplius sub hoc genus etiam *σπασμὸς*, hoc est conuulsionem cum suis speciebus referunt, quæ sunt *σπασμὸς πόντος*, seu potius *ἐμπροσδιόστος*, *ἐπιδιόστος*, & *τέτανος*, à distentione partium iuxta differentias locales appellationes suas sortitæ. Item *πῆλινος* & *ἄρτηρσις*. Cæterum humoris influxum Galenus ut plurimum pituitosum esse ait, aut si quis exactius dicere uelit crudū, quem ipse describit esse crassum, ad similitudinē puris crassioris, ex quo etiam diutius in articulis moram trahente, callosæ cōcrectiones duriciæq; ac tosi, *πῶροι* græcis appellati, generantur. Aristoteles tamen in quarto de animalium historia, sanguinē in pus conuerti, ex pure uero callosam duriciem, id est, *πῶρον* fieri dixit.

Ita ut in manibus & pedibus pharmacis fluxionē repellentibus utamur. In Podagra & Chiragra, inquit Galen. repellētia fluxiones adhiberi posse, in ischia de uero nō, propterea quod in alto sita sit coxendicis iunctura, atq; sic per repellentium usum sanguis ex uicinis uasis ac musculis ad illam cōpellatur. Sic enim Aetius ait, *ὅτι βαθὺ γὰρ οὗτος σπυλακωνίτης ὅτι ἐκ τῆς πρὸς χόνδρον ἀρθρίας ἀμακτὸς καὶ μὴ πρὸς ἐκέρχιν*. Verum in Galeni exemplari, *σπυλακωνίτης*, id est concipitur, pro *σπυλακωνίτης*, id est cōpellitur, habetur: non multū diuerso sensu, sed tamen clarius res ipsa uerbo *σπυλακωνίτης* indicat, ut *σπυλακωνίτης* supposititiū in Galeno pūit.

Et purgatio per efficaciora infusa, quale est quod ex colocynthide cōstat. Horum uerborum sensus in græco codice corruptus est hoc modo. *καὶ ὁ δὲ τῆς κριτικῆς γυνεῖας ἐλυσσάτωρ, ὁποῖος δὲ καὶ ὁ δὲ τῆς κληροκαυδίδιος*. legendum est autem sic. *καὶ ὁ δὲ τῆς κριτικῆς γυνεῖας κληροκαυδίδιος ὁποῖος δὲ καὶ ὁ δὲ τῆς κληροκαυδίδιος*. quomodo sanè etiam conuerti.

Cōpositiones ab Andromacho cōscriptæ ad Ischiadicos. Prima ex his cōpositionibus in græco exemplari penitus manca est. Desunt enim aliquot simpliciæ reponenda, quod uel ex ipsius Galeni uerbis manifestum sit, ubi consequenter pharmaci ipsius facultates singulatim per omnia quæ in ipsum recipiuntur exquirat ac expendat. Recenset enim quorundam simplicium uires, quæ in præposita Andromachi descriptione non habentur. Quare nos integre à nobis restitutam lectionem reddidimus, quomodo in græco exemplari legi debet, nimirum hoc modo. *πυργίον ἁγρίοις ἀνίρματι δισαχ. δ. σιλικόν δισαχ. δ. ἀφρόνιτρον δισαχ. δ. διαφνίδιον δισαχ. δ. ἀβροτίνον δισαχ. δ. κληροκαυδίδιος ὀφθαλμῶν δισαχ. δ. καρπιδιμάριον δισαχ. δ. ἁμύρας δισαχ. δ. πυργίον γλυκὺ καὶ ὀφθαλμῶν τινος τῶτον αὐτὸ δισαχ. καὶ πίνης, τριμυδίας, μιστίνου, λυγροῦ, ἀπὸ τῶτον, εἰς τὸ ταυρῶν, ἵσον, χαλκῶντος δισαχ. ε. ἁμύρας καὶ θυμάματι δισαχ. ε. ἰπποπῶντος δισαχ. δ. δίκυ ἀνίρμον δισαχ. δ.* Porro sequuntur mox uerba Galeni quibus hæc lectio confirmatur, in quibus tamen *ἄγριον* *πυργίον* *φύμα* falso, pro *ἀγρίον* *πυργίον* *ανίρμα* habetur. At uero uehementer dubitamus an cardamomum recte in hoc pharmacum, itemq; sequentia, tum à Andromachō, tum ab Asclepiade prodita, recipiendum legatur, & non potius pro *καρπιδιμάριον*, sit legendum *κάρδιαμον*, id est, nasturtium, tum quod calidius aliquanto sit nasturtium quàm cardamomum, tum quod à Dioscoride Nasturtium Ischiadicis in cataplasmate auxiliari proditur. Noli tamen publicam imputare *καρπιδιμάριον* lectionem, sed eam retinui, libentius utique ipse in hæc pharmaca nasturtium receptus, si usus ita ferat.

Alia Iſchiadica, hac uſus ſum in Frontino.) Hæc cõpoſitio habetur etiã apud Aetium lib. 12. cap. 5. ſed tum cedriæ, tum olei cyprini cyathi dimidiũ iſtic habetur, utriuſq; autẽ hoc loco, *κνύλας & ἡμισον*, id eſt, hemina dimidium, eſt expreſſum; terror autem exſcribendis eſt, qui uel iſtic *κνύδου. s.* pro *κνύλας. s.* uel hic uice uerſa *κνύλας ἡμισον* pro *λυ. s.* expreſſit, ex ſimilitudine characterum *κν* & *κν*. deceptus. Videtur enim Galeni lectio rectior eſſe, hemina uidelicet dimidia, hoc eſt cyathorũ triũ menſura; præſertim olei, ut in ipſo reliqua diſſoluantur. At uero & nitri drach. 11. tantũ adijciendẽ in Aetio leguntur, hic uero quinque expreſſæ ſunt.

Quæ pharmaca Aſclepiades in 4. externorum prædiſit. Inter hæc pharmaca habetur Malagma Antiochidis præparatũ Fabullæ Libycæ, id eſt, *ισκνυλίδης φαρμάκων λυβυκά*. Videtur tamen mihi hæc lectio nõ recta eſſe, & Fabullam non Libycam, ſed Liuiam legendũ eſſe, hoc eſt *ισκνυλίδης φαρμάκων λυγιά*. Eſt enim malagma hoc Antiochidis mulierculæ eius, niſi penitus fallor, ad quam Heraclides Tarentinus ſcripſit, uelut a libi indicauit, quæ ipſa Antiochis Romæ medicata non Fabullam Libycam, ſed Liuiam appellatam, ex Liuiã uidelicet gente, uelut opinor, hoc pharmaco curauit: quanquam ut ſæpe iam dixi, nõ referat multum quis uel quæ medicamenti autor ſit, ſi de pharmaco conſtat, quod integrum ſit, & experimẽto approbatum, habetur autem in ipſa cõpoſitione, reſtituenti ab expreſſa myrobalano reliqui libra una, id eſt, *μυροβαλανόν πένονατος λίτρα. α.* Dixi uero alio loco *πένονατος* uocem aliquando pro ſucco expreſſo, aliquando pro reſtituenti ab expreſſo ſucco reliquo, apud grecos ſcriptores medicos uſurpari, quã poſteriore ſignificatione, etiã mihi hoc loco dicta uidetur, tum quod inter reliqua ſucculenta & liqueſcibilia, hoc reſtituentum quaſi corpus ſaturum ſit, tum quod Dioſcorides libro quarto ipſam ungentariam glandem, id eſt, myrobalanum, cataplaſmatis uice ad podagricos cum aqua muſſa uſurpari dicit, ut etiã hic cum reliquis ammixtis ad iſchiadicos apta ac commoda uideatur, quum ſuccus & liquor ab ipſa expreſſus, olei uicem præbeat aliis in pretioſa ungenta, eodẽ Dioſcor. multis locis atteſtate. Sequitur mox aliud Malagma Fabullæ cõpoſitum, In quo bdellij onychis libræ duæ habentur, hoc eſt *βδέλλης ὀνυχος λίτρα. β.* Memini autem ſuprà quomodo accipiendum ſit quod bdellij onyx, & bdellij onyches dicatur, quũ ſit & onyx lapis, alias Alabaſtrites appellatus, & onyx conchylj Indici teſta, de quibus ſtem à me in his commentarijs abunde dictum eſt. Quin & aliæ res præter iſtas, à ſimilitudine quadam onyches, id eſt, ungues appellantur. Sic Aetius ſermone undecimo, capite undecimo in medicamento quopiam lapidem expellente, aliorum fruſtula ſiue ſegmenta, *σπόρδων ὀνυχας* id eſt, unguiculos aliorum dicit, quos Galenus ſubinde *πυρῶνες*, hoc eſt nucleos dicit, & Paulus libro quarto, cap. 31. *σκαλίδας*. Sunt autem naturalia hæc oblonga ſegmenta ſiue ſpiceæ, in quæ alliũ ſindiſtur, ubi ipſum decorticamus, quod ipſum *ἔστυγιζον* appellari poteſt, hoc eſt in unguiculos diſparare: quãquam huius uerbi uſus eſt & de his quæ ad unguem inueſtigamus, & quaſi unguiculis exſcalpi mus, uelut etiã ſimplicis *ὀνυχιſτρ*. Artemidorus lib. 4. de ſomniorũ interpretatione principio. *μικρὰ πλὴν καὶ ἂν πολλὰς ἔſται φροντίδας, ὅμως δὲ ὁδὸν ἐν τῷ πόδι καὶ ἐν τῷ χεῖρὶ πόνον. &* lib. 1. cap. 17. *βδέλλαν τινὰ κνύλῳ κνύλῳ, & μετὰ τῷ πόδι καὶ ἐν τῷ χεῖρὶ ἔſται πόνον καὶ ἔſται ὀνυχιſτρ*. Porro de roſarũ unguibus, hoc eſt *ροῦδων ὀνύχων*, roſisq; ex unguibus, hoc eſt *ὀνυχισμῶν* & *ἔſται ὀνυχισμῶν* alibi à nobis dictum eſt.

Malagma quod & aurici coloris appellamus.) In hoc malagmate habet, Hæc liquefacta frigefieri ſiniimus, & craſa tritis ammiſcimus. Hoc eſt *παύρα γλάστρις ἰσχυρὰ ψυχρὰ, καὶ ἀντιſφαιρὰ τοῦ ἀντιſφαιρῶν τοῦ λανθάνοντος*. Legitur tamen in exemplari *ἀντιſφαιρὰ* falſo, quod refrigerantes ſignificat: pro eo itaq; *ἀντιſφαιρὰ* id eſt

Id est eradentes, à uerbo, *ψάω* rado, aut *ἀναψύσσω* *τὴν* legendum est, uelut conuertit. Nam is modus eradendi iam frigesacti medicamenti iam saepe habitus est in his libris. Sic libro octauo capite primo, *τρεῖς θύακες ὅν ἡ ἀρχὴ αἰσθητὴ καὶ τὰ ἐν τῷ ὑποδόρῳ λεγόμενα εἶναι μέγιστον τοῖς λεγόμενοις ἀερίαις*, hoc est liquefiat in duplici uase, atq; ita refrigeratum & rasum ceratum; cum tritis reliquis probe permisce. Sic etiam infra in malagmate ex cicuta & agarico, octauo à fine totius operis habetur liquefabilia uero eliquato & frigesieri finito, & trasa aridis committito, hoc est, *ὅτι αἰσθητὴς ὑγρότης, καὶ ἀναψύσας, ἐπιβάλλει τοῖς εἰρησίοις*. Sed in uulgaro tamen exemplari pro *ἀναψύσας* expressum est *ἀναψάσας* falso & nulla penitus hac pertinetue significatione.

Andree malagma, compositio admiranda ad ea quæ uelis perforare, dissolvere, expurgare, ac uelut excolare. Hæc uerba in græco exemplari ita habentur; *διναμεθαυμασθῆ, πῶς ἂν βούληται τὰ τρησθῆαι, διαλύσθαι, ἐκπύσθαι. Ἐκπύσθαι* itaq; dixi expurgare ac uelut excolare. Ea enim huius uerbi significatio existit. Vnde etiam in his quæ exprimi debent eius usus familiaris est, uelut supra lib. i. cap. 8. de achoribus habetur. *σκόλην ὅς ἐστιν ὡς ἐκπύσθαι, ὡς πύρεθρον καὶ λυκαυδῶν, ὅτι καὶ μαλὰ καὶ ἄλλων τῶν ἐκπύσθαι*, hoc est, Scillam in fornace uelut cucurbitam cinere obruito, quidq; mollis fiet exprimito. Acrius 13. cap. 2. de emplastris ad demorosos à cane uel urso, aut alijs animalibus. *καὶ γὰρ τὸν ἰσθμὸν χυμὸν ἐκπύσθαι καὶ ἐκπύσθαι τὸν τῶν ὀδόντων ἐκπύσθαι*, id est, uenenosum humorem expurgant & uelut exprimunt ac excollant, id est, *καθαίρουσι καὶ ἐκπύσθαι*. Quare apud Galenum. 7. *κατὰ φάρμακα* ea discutientia inspissatam humorem, non tamen fortiter, neq; acuatim, uelut *ἀσφορῆτικα* appellata facere solent, *ἐκπύσθαι* & *ἀποσπῆσαι* appellari traduntur. Verba Galeni hæc sunt, Loquitur de induratis in scirrhum, non tamen penitus; sed ita ut sensus adhuc adsit, sed obscurus. *διερεπνέτω* inquit, *ταῦτα δὲ φάρμακα καὶ ἀσφορῆτικα μὲν δρῶντα τὰ παχυνθῆναι ὅζον, οὐ μὴν ἰσχυρῶς γὰρ καὶ ἀδρῶς τὸ πύσθαι, ὅς τὸ διερεπνέτω πύσθαι φάρμακα, καλοῦσι δὲ ἀποσπῆσαι καὶ ἐκπύσθαι τὰ πύσθαι*. Sequitur porro innox de eodē malagmate. Facit etiam ad corrosa ac corrupta, educit enim aliena, hoc est, *ποῖα εἰς πύρεθρον τὰ λυκαυδῶν, καὶ ἀναγὰρ τὰ ἀλλότριά*. Quæ igitur *λυκαυδῶν* dixit, ego corrosa ac corrupta reddidi. Est enim uerborum *λυκαυδῶν* ac *λυκαυδῶν* ea significatio ac usus apud medicos præsertim, ut corrumpere ac corrumpi significant, quemadmodum lib. 3. cap. 1. offendit quo loco *λυκαυδῶν* *τὸ τὸ ὅτι οὐδὲν ὁσίων* habetur.

Aliud eiusdem Epithema, Ischiadicis & arthriticis auxiliatur cōsestium. Ad finem huius epithematis dixi. Cæterum si in terendo pharmacum induratur, ex liquore quantum sufficit addimus, Liqueor autem tantus sit, ut tractile cataplasma reddatur. Liqueorem itaq; intelligit ex foenigræci decocto addendum, ut ex eo uidelicet tractile cataplasma reddatur, Nimirum ut mollius & tractabilius fiat, hoc est *ὡς τὸ γινώσκει ἀλκιμώτερον*. Verum in græco exemplari, non *ἀλκιμώτερον*, sed *ἀλκιμώτερον*, id est, non tractilius, sed robustius habetur. Ego tamen *ἀλκιμώτερον* legere malo, quod & reddidi: quemadmodum etiam supra libro 7. cap. 2. *ἀλκιμῶν* pro *ἀλκιμῶν* legendum indicauit.

Ischiadicorum cura à Democrate conscripta ex Iberide. Iberis herba à Democrate hoc loco Iambicis uersibus descripta, à regione Iberia appellationē inuenit, & uelut Galenus testatur, eadem est quæ lepidion græcis appellatur. Quomagis mirum est Dioscoridem ad finem primi libri seorsim de Iberide tradere, & in secundo seorsim de lepidio, ut herba in ciborum usum ueniente: quæquam sine de lepidij folijs testetur, eorum esse uim acrem & exulceratoriam, ut ea gratia ischiadicis, commodum cataplasma exhibeant, De Iberidis autem radicibus

prodit planè auxiliū hīc à Democrate præscriptum, quod uidelicet cum adipe
 suillo tuse, ischiadicis impositæ conducant, Paulus tamen Aegineta libro tertio,
 cap. 77. Iberidem, & lepidium, & agriocardamon, pro eadem herba agnoscēs,
 itē foliorum usum ischiadicis præscribit, & si eo tempore quo usus eius expei-
 tur, folia non sint, tum demū corticē radicis cum axungia ad emplastrī formam
 tusum, imponendum Ischiadicis dicit. Damocrates autem foliorum Iberidis
 in hunc usum non meminit, sicut neque Aetius duodecimo, capite secundo, qui
 planè hos uersus Damocratis, sed tamē lege carminis soluta prodiit, & Iberidem
 etiā Cardaminem appellari dicit, propterea quod odorem, & saporem, & figu-
 ram cardami, hoc est nasturtij habeat. Id quod etiā Galenus libro septimo sim-
 pliciū pharm. de lepidio testatur. λεπίδιον inquit, ἐκ τῆς τιταλετρῆς διὰ τῆς αἰ-
 διακισίνης. ἴσους τῆς καρδαμίνης κατὰ τὴν ὁσμὴν, καὶ τὴν φύσιν αὐτοῦ εἶναι, ὡς
 τὸ φραίνον. Quare eadem est herba, lepidion, Iberis, cardamine, & agriocarda-
 mon, siue nasturtium syluestre appellata. In Dioscoride tamen ἰβηρίς ἢ πικρὰ καρ-
 δαμίνης pro καρδαμίνης, falsò legiuit. Sicut descriptio quoq; apud eundem cor-
 rupta est, μικρὸν δὲ ἴσους πικρὰς ἢ ἰλαθῆναι. Deest enim πικρὸν uox, & πικρὰ, ut sic
 legatur, μικρὸν δὲ πικρὸν ἴσους πικρὰς ἢ ἰλαθῆναι, & sit sententia uersuum Da-
 mocratis qui sic habent. ἰσὺς αὐτῆς ἴσους πικρὰς ἢ ἰλαθῆναι.
 μικρὸν δὲ πικρὸν ἴσους πικρὰς ἢ ἰλαθῆναι. Id est.

Caulem cubitalis longitudinis gerit
 Paulo minorem aut rursus ampliorem, &c.

Nam & Aetius sic describit. Sed & quod ad finem eius capitis in Dioscoride ha-
 betur, καὶ ἰλαθῆναι μετ' ἰσὺς τοῦ πικρὸς ἀντιχρίδιον, corrupte legiuit, pro καὶ ἰλαθῆναι μετ'
 ὀνόν τοῦ πικρὸς ἀντιχρίδιον. hoc est oleum cum uino locis illinatur. Sic enim facien-
 dum esse, aperte hic docet Damocrates, & Aetius loco citato habet. Sed & Plin-
 ius libro 25. cap. 8. Postea oleo & uino corpus perungatur dixit. Verum quan-
 do Plinius eo loci ex ipso Damocrate hoc auxiliū herbae Iberidis recenseret, eius
 locum totum adscribam, quoniam eius uerbis hi uersus ad unguem declarētur. In-
 uenit nuper, inquit, & Serullius Democrates primus medētium, quam appella-
 uit Iberida: quanquam fictio nomine inuentioni eius assignato carmine, Nascitur
 maxime circa uetera monumenta, parietinaq; & inculta itinēru. Floret semper
 folio nasturtij, caule cubitali, femine tam paruo, ut uix aspici possit, Radici odor
 nasturtij, Yfus ætate efficacior & recenti tantū, tunditur difficulter, coxendici-
 bus & articulis omnibus, cum axungia modica utilissima, uiris plurimū quater
 nis horis, foeminis minus dimidio adalligata, ut inde in balneum descendat in
 calidam, & postea oleo & uino corpus perungatur, diebusq; uicenis interpositis
 idē fiat: si qua admonitio doloris superfit. Hactenus Plinius. Porro Galeni ex-
 emplar, & ipsi Damocratis uersus aliquoties corrupti sunt, Sic ergo restituēdos
 locos inaneos censeo. Prīmū quod dixi. De primo igitur in Ischiadicorum cura-
 tione in eo libello sic scripsit in græco corrupte habetur sic. πικρὰ πρῶτος δὲ τῶν
 ἰσχυρῶν διραπαῖας ἰσχυρὰς τῆς βιβλιδίου τῶντων. Lego autē ueluti cōuerti etiā
 sic. πικρὰ πρῶτον δὲ ἐπὶ τῇ ἰσχυρῶν διραπαῖας ἰσχυρὰς τῆς βιβλιδίου τῶντων. Dein
 de tertij ex ordinē uersum sic lego. ἢ καὶ τῆς ἰσχυρῶς τοῦ πικρὸς τῆς μύμνης. Sextum
 sic. ἰσχυρὸς μὲν ἐνθαλῆναι καὶ μέγιστον πικρὸν. Versum 37. & 38. sic. ἰσχυρὰς τῆς ὀνόννης ἰσχυρῶς
 ἀπὸ τῆς λίπης. σίκεταις τὸ πικρὸν καὶ τῶν πικρῶν ἰσχυρῶν. Id est ut ego cōnuerti, Ac mox
 madore terfo & pinguitudine, Tortū teges crus mollibus tu uelleribus. Sic enim
 & Aetius habet. Et humore cum aspero panno deterfo, crus ipsum cum leuiss-
 mis lanis cooperito. Versum deinceps 4. sic lego, ἢ καὶ τῶν ἄλλων συμβαλόντων
 τῶντων. Cæterū quod mox post Damocratis uersus Galenus subiungit. Hoc sane
 utendi

uicendi modo & inueteratas capitis dolores, & alias omnes quacunque corporis parte inueteratas & ægre solubiles affectiones ac resolutiones se curasse ait, in græco sic habetur. *τούτω τῇ τροπῇ τῆς χρίσεως καὶ κεφαλῆαιος χρίσις καὶ ἄλλα πάντα καὶ ὅτι θυμὸς αἰσθάνεται χρίναι, καὶ διουλύτους ἀφαιδέσθαι, καὶ τὴν αἰσθάνειαν πυνέμεναι φασί.* Pro καὶ ὅτι θυμὸς ita legendū est, καὶ ὅτι αὐτὸν μίρος, & sententia integra erit, quā uidelicet reddidi. At uero quod dicit huius auxiliij eundem usum esse, qui alias sinapismorum est, & pharmaci ex thapsia, facile colligere est sic habere, ex his quæ alibi de sinapismorum usu dixi, & quæ ipse Galenus libro secundo capite secundo de Thapsiæ & sinapis usu produxit.

In cap. III. De podagricis & arthriticis affectionibus.

PHarmaca ab Asclepiade ad prædictas affectiones in quarto externorū prodita. Inter hæc pharmaca habetur. Aliud, Seminis cicutæ expressi drach. VI. Id est, *ῥιζὸν σκίρματος ἐκτετυμένον. δραχ. 6.* Videtur itaque mihi expressum probare, ut minus noxium futurū succo ablato, & in ipso non existente. Tradit autē Plin. lib. 25. cap. 13. Succū ex semine cicutæ trito expressum, & sole densatū in pastillos, necare sanguinē inspissando. Sequitur mox Epithema podagricorū, arthriticorū, &c. In quo quod uerti. Vīus uero tēpore choenicis quartā partem inde accipito; & passo tritam in uas fictile non picatū cōiicito, & addita secis uīni aridæ quarta heminæ parte, ad prunas posita diligenter mouendo coquito, &c. in græco exemplari corrupte legitur, hoc modo. *ὅτι τῇ χρίσει, λαβὼν χρίναιος τίσεως, καὶ λιάνας, καὶ βαλῶν αἰς ἄγρος κεραιμίου ἀρνίαν, ἐπίβηλις πυγῆς φορᾶς καὶ τύλας τέσσαρες, &c.* Restituendū est autē uelut reddidi sic. *ὅτι τῇ χρίσει, λαβὼν χρίναιος τίσεως, καὶ γλυκὰ λιάνας, καὶ βαλῶν αἰς ἄγρος κεραιμίου ἀρνίαν, ἐπίβηλις πυγῆς φορᾶς καὶ τύλας τέσσαρες.* Similiter quod paulo post dixi, Postea uero eo ablato, exciratas bullas acubus perforari oportet, in græco corruptū est sic, *καὶ μετὰ ταῦτα αἰσθάνεται τὸ ἀνέκμενόν τὸς ἰππασπίδας φλυκτῖδας, πάντας γὰρ βελάναις διὰ κεντῶν.* Lege autē sic, *καὶ μετὰ ταῦτα αἰσθάνεται τὸ ἀνέκμενόν τὸς ἰππασπίδας φλυκτῖδας βελάναις διὰ κεντῶν.*

Aliud eiusdē, hoc pro cucurbitis & hirudinibus utimur. In hoc pharmaco, Lamenti fabæ nigrae molitæ sextarius unus habetur, hoc est, *ἀλδορεν ἱερυμίνον τὸ μίλανος σωμαλλισμῶς ἕξας ἕξ.* Fabæ itaq; farinā lomentū siue ἀλδορεν ἱερυμίνον dici alibi memini. Adiecit autē *σωμαλλισμῶς*, ut nō crassas ἱερυμῶς partes intellige remus, sed omnino farinā cōmolitam. Videtur autē mihi omnino fabarum nigra rum farinam magis probare, ut quæ magis reliquis maiuruerunt, & ob id fortiorē exiccandi ac extergendi uī præditæ existunt, qua gratia podagricis imponuntur, & propterea *τὸ μίλανος* dixit. Sequitur mox pastillus podagricis, arthriticis, In quo thuris non secti trientem cōuertī, id est *λιεύον ἀπὸν 3. α. β.* Sic enim legendum est, & non *λιεύον ἀπὸν*, uelut exemplar habet. Possit tamen non minus recte *λιεύον ἄπρον*, id est, masculi legi. Idem enim Thus est quod & masculum, & non sectum appellatur, uelut alibi declarauī. Sequitur non longe post, aliud tertium à sine malagma, in quo aqua lixiuī figulinī habetur, quæ qualis sit abunde libro primo à nobis est ostensum. Atq; hæcenus quidem de locis, in decem libris Galeni de compositione pharmacorū localium, partim corruptis, partim obscuris, & non temere occurrentibus, commentariū uisum fuit.

Finis decimi & ultimi libri commentariotum.

BASILEAE EX OFFICINA FROBENIANA, PER HIERONYMUM FROBENIUM ET NICOLAVM EPISCOPIVM MENSE AVGVSTO.
M. D. XXXVII.

SERIES CHARTARVM.

a * b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V
X Y Z &. Omnes sunt terniones præter a, ac &
duerniones, * & z quaterniones.



